



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.



A 3 9015 00385 923 1
University of Michigan - BUHR



610.5

A67

A54

P. Hand



22102

ARCHIV
FÜR
ANATOMIE, PHYSIOLOGIE
UND
WISSENSCHAFTLICHE MEDICIN,
IN VERBINDUNG MIT MEHREREN GELEHRTEN

HERAUSGEGEBEN

VON

Dr. JOHANNES MÜLLER

ORD. ÖFFENTL. PROF. DER ANATOMIE UND PHYSIOLOGIE, DIRECTOR DES KÖNIGL.
ANAT. MUSEUMS UND ANATOMISCHES THEATERS ZU BERLIN.

Jahrgang 1857.

Mit neunzehn Kupfertafeln.

BERLIN.

VERLAG VON VEIT ET COMP



Inhaltsanzeige.

	Seite.
Bericht über die Fortschritte der mikroskopischen Anatomie im Jahre 1856. Von K. B. Reichert in Breslau	1
Ueber einige Zellen mit verdickten Wänden im Thierkörper. Von Dr. Fürstenberg in Eldena. (Hierzu Taf. I.)	1
Ueber Knorpelzellen. Von J. Lachmann. (Hierzu Taf. II.) . .	2
Versuche über Muskelreizbarkeit. Von A. W. Volkmann . . .	27
Der Nahrungsdotter des Hechteies — eine kontraktile Substanz. Sendschreiben an Herrn Geheimrath Professor Dr. J. Müller von K. B. Reichert	46
Ueber die Eifollikel der Vögel, namentlich der Tauben und Hühner. Von H. Hoyer in Breslau	52
Die Krystalle in den Malpighischen Gefässen der Raupen. Von J. Schlossberger in Tübingen	61
Ueber den Einfluss, welchen der Wechsel des Luftdruckes auf das Blut ausübt. Von Felix Hoppe	63
Bemerkungen über das Antrum Pylori beim Menschen und einigen Thieren. Von Prof. Dr. Andr. Retzius. Aus dem Schwedischen übersetzt von Dr. Fr. Creplin	74
Beiträge zur vergleichenden Histologie der Milz. Von Dr. Theodor Billroth. (Hierzu Taf. III.)	88
Anatomie und Entwicklungsgeschichte der <i>Neritina fluviatilis</i> . Von Edouard Claparède aus Genf. (Hierzu Taf. IV—VIII) .	109
Ueber die Fische, welche Töne von sich geben und die Entstehung dieser Töne. Von Joh. Müller	249
Physiologische Bemerkungen über den Scheintod. Von Dr. F. T. Kunde	280
Ueber die Elasticität feuchter elastischer Gewebe. Von Dr. Wilh. Wundt	298
Bemerkungen über <i>Trachelius ovum</i> E. Von Prof. Gegenbaur in Jena	309
Die Nervi sphenothmoidales. Von Prof. H. Luschka in Tübingen. (Hierzu Taf. IX. Fig. 1—5.)	313
Ueber eine gegliederte Verbindung des Knorpels mit dem Knochen der ersten Rippe. Von Prof. H. Luschka in Tübingen. (Hierzu Taf. IX. Fig. 6)	327
Ueber den Rippenursprung des Zwerchfelles. Von Prof. H. Luschka in Tübingen. (Hierzu Taf. X.)	333
Zur Lehre von der Verknöcherung des primordialis Knorpels. Von Albert Baur in Tübingen	347

	Seite.
Ueber <i>Dicyema</i> Kölliker. Von Dr. med. G. R. Wagener. (Hierzu Taf. XI—XIV.)	354
Ueber einen neuen Entwicklungsmodus der Ophiuren. Von Dr. A. Krohn. (Hierzu Taf. XIV. B.)	369
Beiträge zur Anatomie der Spongien. Von N. Lieberkühn. (Hierzu Taf. XV.)	376
Ueber <i>Hydatina senta</i> . Von Dr. Franz Leydig in Tübingen. (Hierzu Taf. XVI.)	404
Ueber die umspinnenden Spiralfasern der Bindegewebsstränge. Von Dr. E. Klopsch. (Hierzu Taf. XVII.)	417
Hand und Fuss. Von Ludwig Fick in Marburg	435
Beobachtungen aus der Entwicklungsgeschichte der Pteropoden und Heteropoden. Von Dr. A. Krohn. Briefliche Mittheilung an den Herausgeber	459
Ueber die Gewebe des Flusskrebses. Von Dr. Ernst Häckel. (Hierzu Tafel XVIII. XIX.)	469

Ueber einige Zellen mit verdickten Wänden im Thierkörper.

Von

Dr. FÜRSTENBERG in Eldena.


(Hierzu Taf. I.)

Die Knochenzellen.

Die Natur der sogenannten Knochenkörperchen habe ich schon seit längerer Zeit zu erforschen gestrebt, und wurde ich durch ihre Uebereinstimmung mit den sternförmigen Hohlräumen in den kugelförmigen, eiförmigen oder cylindrischen etc. Zellen, welche in manchen Pflanzentheilen, wie z. B. in den Schalen der Nüsse etc. sich finden, zuerst auf die Vermuthung geführt, dass diese sogenannten Knochenkörperchen nur die inneren Hohlräume von ebenso verdickten Zellen seien, deren äussere Membran die Fortsätze des Hohlraumes umgeben, ohne ihre Gestalt zu theilen. Bei den Pflanzen ist die Natur der sternförmigen Hohlräume leicht nachzuweisen, da die Membran der Zellen, der sie angehören sowohl, wie die Verdickungsschichten leicht zu erkennen sind. Bei den Knochenkörperchen ist dies nicht der Fall, wir können bei trocknen so wenig, wie bei frischen Knochen nicht die den Knochenkörperchen zugehörigen Zellenmembranen unterscheiden, es musste daher meine Ansicht, dass die Knochenzellen ganz so gebildet sind, wie die verdickten Zellen der Fruchtschalen, und dass die sternförmigen Hohlräume derselben sich ebenso verhalten wie die Knochenkörperchen, eine Hypothese bleiben. Als ich aber bei fortgesetzter Untersuchung der harten Schalen von Früchten solche fand, die ohne das Anwenden von Reagentien ebenfalls die, die Hohlräume um-

fassende Zellenmembran nicht erkennen liessen, wie dies, wie ich gefunden, bei vollständig ausgebildeten Kernen des *Isabella* Weines der Fall ist, wodurch dünne Schnitte von diesen, durch das Mikroskop betrachtet, ungemein den dünnen Schnitten von Thierknochen gleichen; ja ich kann sagen, dass von all' den Pflanzen, die ich in dieser Beziehung untersucht habe, keine eine so grosse Aehnlichkeit mit den Thierknochen wahrnehmen liessen, wie diese, und da ich bei diesen durch die Einwirkung von Reagentien die Zellenmembran sichtbar machen konnte, so schien mir meine Ansicht nicht mehr eine Hypothese bleiben zu sollen; es veranlasste mich, die so grosse Uebereinstimmung zu Versuchen auch bei den Knochenzellen die Zellenmembran durch Reagentien hervortreten zu machen.

Ehe ich noch zu diesen Versuchen schritt, wurde ich an gut gelungenen Schliffen von Pferdezähnen die Zellen der Knochensubstanz der Zähne gewahr, Zellen, die ich auch am Cement der Backenzähne des Rindes und Schafes, besonders an den Stellen, wo das Cement an den Schmelz grenzt, wahrgenommen habe. Man sieht hier die einzelnen Zellen mit ihrem sternförmigen Hohlraum sehr deutlich, ja ich erkannte bei den durch das Schleifen geöffneten Zellen den sternförmigen Raum



chen vollständig erwachsener Thiere konnte ich durch das gleich näher mitzutheilende Verfahren die Zellenmembran einer jeden Knochenzelle hervorrufen.

Behandelt man nämlich feine Schnitte von Fötusknochen, oder von vollständig ausgebildeten Knochen mit verdünnter Schwefelsäure, so tritt die Zellenmembran durch Aufquellen um jedes Knochenkörperchen so hervor, dass die Knochenzelle als deutlich abgegrenzte Zelle wahrnehmbar wird. Das so behandelte Knochenschnittchen erscheint dann nur aus Zellen gebildet; bei den Fötusknochen, wo ohne Anwendung der verdünnten Schwefelsäure die Membran ursprünglicher Knorpelzellen nicht mehr wahrgenommen werden kann, tritt diese Membran mehrere Knochenzellen umfassend durch das Behandeln des Knochenschnittes mit verdünnter Schwefelsäure deutlich hervor, wie dies in Fig. 1. 1. abgebildet ist. Bei vollständig ausgebildeten Knochen ist die Knorpelzellen-Membran höchst selten noch nachzuweisen, ich habe nur in einem Falle eine solche gesehen. Es gleichen die mit verdünnter Schwefelsäure behandelten Knochenschnitte den Abschnitten oben angeführter Pflanzentheile sehr, unterscheiden sich aber wesentlich von jenen durch die Anordnung der Zellen.

Man kann nun auf folgende Art die Knochenschnitte mit der verdünnten Schwefelsäure behandeln: entweder befeuchtet man das auf ein Objectglas gebrachte Knochenschnittchen mit einigen Tropfen destillirten Wassers, und fügt, nachdem man das Glas unter das Mikroskop gebracht, eine ganz geringe Menge Schwefelsäure hinzu.

Betrachtet man nun das Knochenfragment, so sieht man gleich nach erfolgter Einwirkung der Schwefelsäure die Zellenmembran deutlich um das Knochenkörperchen hervortreten; störend wirken bei der Betrachtung des Objects die Blasen der entweichenden Kohlensäure und die sich sehr schnell bildenden Gypskrystalle, durch letztere wird das Präparat in kurzer Zeit so verdunkelt, dass man nichts von der Structur desselben wahrnehmen kann. Die Gypskrystalle sind dadurch, dass man das Knochenfragment kurze Zeit in destillirtes Wasser bringt, leicht zu entfernen, nach deren Entfernung dann

die Structur desselben deutlich sichtbar wird und so erscheint, wie ich es in Fig. 1. u. 2. gegeben habe.


Zweitens kann man das Knochenfragment, ehe man es auf das Objectglas bringt, der Einwirkung verdünnter Schwefelsäure aussetzen, indem man es $\frac{1}{2}$ —1 Stunde in verdünnter Schwefelsäure liegen lässt, sollten sich dann noch Gypskrystalle im Präparate zeigen, so bringt man das Präparat nur kurze Zeit in destillirtes Wasser.

Sollten nach der angeführten Behandlung des Knochenschnittes die Zellen noch nicht deutlich genug erscheinen, so kann man denselben mit etwas Jodtinctur tingiren, für den Geübteren jedoch ist dies Tingiren überflüssig.

Acetum concentratum wirkt ähnlich wie die verdünnte Schwefelsäure auf die Zellenmembran, doch treten die Zellen nicht so deutlich hervor, wie nach Anwendung der letzteren, weil die Essigsäure nicht so energisch auf die Zellenmembran und Verdickungsschichten einwirkt.

Schon bei grade durchfallendem Lichte sieht man die so hervorgerufenen Zellen deutlich, noch deutlicher gewahrt man sie bei schief einfallendem Lichte.

Behandelt man frische Knochenschnitte mit verdünnter




Die Knorpelzellen.

Betrachtet man den feinen Schnitt irgend eines bleibenden Knorpels, z. B. eines Gelenkknorpels durch das Mikroskop, so sieht man hier gewöhnlich 2, oft auch mehrere etwas längliche, elliptische Zellen an einander gelagert, denen in geringer Entfernung ähnliche Gruppen von Zellen folgen. Die Membran der Mutterzelle dieser Gruppen von Zellen ist in der Mehrzahl der Fälle, namentlich bei den älteren nicht mehr zu erkennen, und erscheinen daher diese Gruppen von Tochterzellen in eine homogene Substanz eingebettet. Behandelt man das Schnittchen eines Knorpels mit verdünnter Schwefelsäure oder Chromsäure, so tritt die Membran der zu jeder Gruppe von Tochterzellen gehörigen Mutterzelle deutlich hervor; man gewahrt dann, dass der ganze Knorpel aus dicht aneinander gelagerten Mutterzellen besteht, eine Lagerung, die so innig ist, dass von einer Zwischensubstanz auch hier keine Rede sein kann. Lässt man die verdünnte Schwefelsäure, aus 1 Theil Schwefelsäure und 10 Theilen Wassers, mehrere Stunden auf solche Knorpelschnitte einwirken, so lösen sich die Membran und die Verdickungsschichten der älteren nach Einwirkung der Schwefelsäurelösung hervorgetretenen Mutterzellen auf, die vor Einwirkung der Säurelösung sichtbaren Mutterzellen und die Tochterzellen bleiben isolirt liegen. Diese leichte Auflösbarkeit der Membran und Verdickungsschichten der älteren Mutterzellen in verdünnter Schwefelsäure ist auch der Grund, wesshalb die Zellenmembran dieser alten Mutterzellen nicht sehr lange nach Einwirkung stärkerer Schwefelsäure-Lösungen sichtbar bleibt. Wendet man eine Lösung von 1 Theil Schwefelsäure auf 25 Theile Wasser zur Hervorrufung der Membran der Mutterzellen an, so tritt diese nach und nach hervor und bleibt auch so hervorgetreten längere Zeit wahrnehmbar, ausser der Membran der Mutterzellen sind auch die Verdickungsschichten an den jüngeren Mutterzellen und den Tochterzellen so deutlich sichtbar, dass diese keinem Beobachter entgehen werden. Noch deutlicher werden die Zellenmembran und ihre Schichten durch das Tingiren mit Jod.

Aehnlich wie diese Knorpel verhält sich auch der Knochenknorpel, den man erhält, wenn man einem Knochen durch verdünnte Chlorwasserstoffsäure die Erdsalze entzieht und sodann durch Wasser die Säure und Erdsalzlösung entfernt. Lässt man auf feine Schnitte dieses Knochenknorpels verdünnte Schwefelsäure, bestehend aus 1 Theil Schwefelsäure und 10 Theile Wasser, 12 – 14 Stunden einwirken, so werden die Zellenmembran und die ältern Verdickungsschichten der Knochenzellen so erweicht, dass ein auf das Schnittchen ausgeführter gelinder Druck genügt, die sogenannten Knochenkörperchen zu isoliren; diese sind dadurch, dass die Mehrzahl keine Spur von Tüpfelkanälen wahrnehmen lässt, den jüngeren Knochenzellen fast gleich.

Die Zahnbeinzellen.

Den Knochenzellen nahestehend sind die ebenfalls zu den indurirten Zellen gehörenden Zahnbeinzellen, sie besitzen wie jene im Innern einen Hohlraum, der mit dem der auliegenden Zellen communicirt, sie sind direct mit den vor und hinter liegenden, und durch seitliche Fortsätze des Hohlraumes, den Tüpfelkanälen der Pflanzenzellen entsprechend, mit den neben




sitzen aber an der einen Seite dieses abgerundeten Endes gewöhnlich noch eine kleine Verlängerung an der sich eine andere Zahnbeinzelle angelagert findet; nach dem dem Schmelze zugewendeten Ende zu vermindert sich der Durchmesser der Zelle immer mehr und mehr, und endet in einer an der einen Seite gelegenen Spitze, und zwar so, dass die eine Seite grade aufsteigt, die andere aber in einer schrägen Richtung an diese herantritt; an diese schräge Seite der Zelle lagert sich die neben und etwas höher gelegene Zelle an. Die Zahnbeinzellen sind von ziemlich constanter Gestalt und Grösse, der Längendurchmesser variirt zwischen 0,035—0,045 Mm., ihre Breite zwischen 0,0034 und 0,0075 Mm. Die Membran dieser Zellen ist dünn, durchsichtig und structurlos, ihr Inhalt scheint etwas strengflüssig zu sein. Im Innern einer jeden Zelle finden sich 3—4—6 Tochterzellen, deren Länge zwischen 0,0013 und 0,0063 Mm. variirt, und die gewöhnlich so eine hinter der anderen gelagert sind, dass ihr Längendurchmesser mit dem der Mutterzelle in einer Richtung verläuft, nur selten sieht man einzelne der Tochterzellen schräg gegen die Wand der Mutterzelle geneigt.

Die Zahnbeinzellen liegen so aneinander gelagert, wie ich es in der Fig. 3 gegeben, man sieht hier schon mehrere Zellen hintereinander gelagert, ohne dass es zur Bildung einer Zahnröhre gekommen ist, eine Bildung, die erst später eintritt. Durch die Beschaffenheit und Lagerung der Zellen scheint mir die Art und Weise, wie die Röhrenbildung von Statten gehen muss, vorgeschrieben zu sein. Es muss, wenn sich hier aus den Zellen die Zahnröhren bilden sollen, ein ähnlicher Vorgang, wie bei der Bildung der Spiralgefässe in den Pflanzen Statt haben: Wir wissen, dass hier die Zellen ähnlich wie bei den Zahnbeinzellen oben und unten schräg an einander gelagert sind, und dass an diesen Stellen später durch Schwinden der Wände die Communication zwischen den Zellen entsteht; ein ähnlicher Vorgang muss auch bei der Bildung der Zahnröhren aus den Zahnbeinzellen Statt haben; es spricht hierfür nicht nur der Bau und die Lagerung der Zellen, sondern auch die fertig gebildete Zahnröhre. Betracht-

ten wir eine Zahnröhre genau, so finden wir, dass sie nicht in grader Richtung verläuft, sondern vielmehr einen geschlängelten, wellenförmigen Verlauf wahrnehmen lässt, ein Verhalten, wodurch wir verhindert werden, eine Zahnröhre in ihrem ganzen Verlauf an einem Zahnschliffe verfolgen zu können, stets ist die Röhre an verschiedenen Stellen geöffnet, ja selbst durch das Schleifen ganz entfernt, so dass wir bei genauer Betrachtung nur einzelne Theile der Zahnröhre wahrnehmen können.

Ich will hier beiläufig noch bemerken, dass bei allen den Gebilden, denen gestreckte Zellen zur Grundlage dienen, wie Zellgewebe u. dergl. wir diesen geschlängelten, welligen Verlauf, der aus solchen Zellen gebildeten Fasern finden, und zwar, weil hier die Anlagerung der Zellen an und hintereinander ebenso wie bei den Zahnbeinzellen an den schräg abgeflachten, meistentheils spitz zulaufenden, etwas seitwärts von der Mittellinie der Zellen gelegenen Enden erfolgt. Sehr deutlich sieht man dies Verhalten bei den in der Entwicklung begriffenen Bindegewebszellen.

Für die Annahme Kölliker's, dass eine Elfenbeinzelle ein ganzes Zahnkanälchen liefert, kann ich keinen Grund ein-




Schon seit einer Reihe von Jahren habe ich die in der Botanik über die Entwicklung und Bildung der Zellen gewonnenen Resultate auf die Entwicklung der Zellen im thierischen Körper anzuwenden gesucht, indem ich glaubte annehmen zu dürfen das die für die Entwicklung und Bildung der Pflanzenzelle geltenden Grundsätze auch für die der thierischen Zellen massgebend sein müssten, kurz, dass der Vorgang in beiden nach bestimmten gleichen Principien erfolgen muss. Denselben gewiss richtigen Weg haben ja auch Virchow, Remak u. A. mit so vielem Erfolge betreten.

So sehr ich also dafür stimme, dass die über die Entwicklung etc. der Pflanzenzelle gewonnenen Thatsachen auf die der thierischen Zelle übertragen werden, um so mehr, da die Beobachtungen dieser Vorgänge bei den Pflanzen nicht mit so vielen Schwierigkeiten verknüpft sind, als dies bei der thierischen Zelle der Fall ist, so sehr muss ich mich gegen das Uebertragen solcher Lehren, die keineswegs sicher begründet sind, oder gar auf zu geschraubter, man möchte sagen, alles Natürlichke entbehrenden Hypothesen beruhen, erklären. Ferner halte ich dafür, dass Hypothesen und Benennungen, die in der Botanik schon längst abgethan, nicht noch zur Verwirrung der Begriffe beibehalten werden dürfen, da hierdurch nur der ohnehin schon grosse Ballast von haltlosen Hypothesen und Namen ohne Ursache vermehrt wird.

In Bezug auf das Erstere will ich nur den durch Mohl in die Botanik eingeführten Primordialschlauch erwähnen, ein Organ der Pflanzenzelle, wie ihn Mohl bezeichnete, über dessen Vorkommen und Eigenschaften die Botaniker durchaus noch nicht einig sind, ja worüber Mohl mit sich selbst noch nicht einig zu sein scheint. 1844 wagt Mohl es noch nicht, ihn als ein Organ der Zelle zu bezeichnen, hält ihn für eine körnige Haut, die den Zelleninhalt zunächst umgiebt. 1855 hält er den Primordialschlauch nicht mehr für eine Membran, sondern für eine Schleimschicht. Diese von verschiedenen Botanikern sehr bestrittene Membran, zeigt sich bei den Pflanzenzellen, wie Mohl angiebt, nur dann, wenn Substanzen auf die Zellen und ihren Inhalt eingewirkt haben, die den

letzteren coaguliren, oder ihm Wasser entziehen, und ein Einschrumpfen desselben herbeiführen; es zeigt sich bei so behandelten Zellen dann eine körnige membranartige Schicht um den in seinem Volumen verringerten Zelleninhalt, eine Membran, die bei alten inhaltslosen Zellen nicht mehr wahrzunehmen ist.

Dieser Primordialschlauch wurde nun, um über Schwierigkeiten in der Entwicklung etc. der Zellen zu helfen, auch als ein Theil der thierischen Zelle angenommen, aber es wurden dem Primordialschlauch der thierischen Zelle nicht die von Mohl dem Primordialschlauch der Pflanzenzelle beigelegten Eigenschaften mitgegeben, nein, man ging gleich weiter, und liess den Primordialschlauch aus einer derben Membran bestehen und ertheilte ihm verschiedene Fähigkeiten. So hat Virchow und Kölliker, um die eigentliche Natur der sternförmigen Knochenkörperchen zu erklären, den Primordialschlauch in Anwendung gebracht, und sagt Letzterer in dem Handbuch der Gewebelehre pg. 81 über die Bildung der Knorpelzellen Folgendes: „Bei den Knorpelzellen betrachtet man ganz ähnliche Vorgänge, wie wenn Pflanzenzellen unter Bildung von Porenkanälchen verholzen. Es verdickt




Primordialschlauch von Mohl diesen Namen erhalten hat, weil mit ihm die Zellbildung beginnt.

Nehmen wir einen Primordialschlauch in der thierischen Zelle an, und legen ihm die von Mohl demselben beigelegten Eigenschaften bei, so können wir mit Hülfe desselben doch noch nicht die Membran, welche die von Virchow entdeckten sternförmigen Knochenzellen umgiebt, als den Primordialschlauch bezeichnen, es ist diese Membran aber auch nicht der Primordialschlauch der Knochenzellen.

Entzieht man einem Knochen die Kalksalze durch verdünnte Salzsäure, und unterwirft man feine Schnitte davon einer Betrachtung durch das Mikroskop, so sieht man die Knochenzellen sehr deutlich, sie unterscheiden sich in der Form wenig von den Knochenkörperchen eines nicht mit Säure behandelten Knochens. Es umgiebt diese Knochenkörperchen bei ausgebildeten Knochen nun nicht eine Membran, der sogenannte Primordialschlauch nach Kölliker, sondern man sieht hier deutlich bei den mit Säure behandelten Knochen mehrere Schichten, mindestens 2, oft aber auch 3—4. Die Knochenkörperchen vollständig ausgebildeter Knochen lassen, nachdem durch Säure die Erdsalze entfernt worden sind, nur wenig von den Ausläufern erkennen, dahingegen sind sie an den Knochenkörperchen der ebenso behandelten Foetusknochen deutlicher sichtbar. In Fig. 4 u. 5 sind die Knochenkörperchen, so wie ich sie unter anderen in einem frischen mit verdünnter Schwefelsäure behandelten Metacarpalknochen vom Schafe gefunden habe; man sieht hier sehr wenig von den Tüpfelkanälen, wodurch die Zellen vielmehr den Tochterzellen der Knorpelzellen gleichen, ferner sieht man deutlich die aus mehreren Schichten bestehende, einen Hohlraum, das sogenannte Knochenkörperchen, umschliessende Membran. Im Innern dieses Hohlraumes gewahrt man das zu einem bald mehr rundlichen, bald mehr länglichen, in Form dem Hohlraume ähnliches Agglomerat von dunklen Molekülen, zu dem der Inhalt der Zellen durch die Einwirkung der Säure zusammengeschrumpft ist. An diesem Agglomerat müssten wir nun, wollten wir Mohl folgen, den Pri-

mordialschlauch der Knochenzellen suchen und zwar als eine Schleimhaut oder feinkörnige Membran.

Ich kann die den Hohlraum umschliessende Membran nur als die zuletzt gebildeten Verdickungsschichten der Knochenzelle, oder der Knochenkapsel nach Kölliker betrachten. Um sich hiervon zu überzeugen, braucht man nur das durch verdünnte Salzsäure seiner Erdsalze beraubte und durch Wasser von der Salzsäure befreite Knochenschnittchen mit verdünnter Schwefelsäure zu behandeln und mit Jodtinctur zu tingiren, man sieht dann, ganz ebenso wie bei den nur mit verdünnter Schwefelsäure behandelten Knochenschnittchen, dass die sternförmigen Knochenzellen Kölliker's nur die von den jüngsten Verdickungsschichten umgebenen Hohlräume der eigentlichen Knochenzellen sind; oder aber, man lässt Chromsäure auf Schnittchen des durch Salzsäure von den Erdsalzen befreiten Knochens einwirken, um die Umrisse der Knochenzelle und den in ihrer Mitte befindlichen Hohlraum, das Knochenkörperchen, deutlich erkennen zu können. Man benutzt hierzu die trockene krystallisirte Chromsäure, von der einige Krystallfragmente in einem auf dem Objectglase gebrachten Wassertropfen aufgelöst, und in welche



tinctur hervortreten, müsste nun, um mit Mohl zu reden, von dem Primordialschlauch umgeben sein.

Es ist mithin die von Köl liker und Virchow als Primordialschlauch der Knorpel- und Knochenzellen aufgeführte Membran, die den Zelleninhalt umgebende jüngste Verdichtungsschicht der Knochen- und Knorpelzellen-Membran, daher nur ein Theil der Knochenzelle und deshalb die Bezeichnung dieses Theiles als sternförmige Knochenzelle nicht statthaft.

Hat man sich für die Uebertragung der in der Physiologie der Pflanzen geltenden Principien auf die Physiologie des thierischen Körpers entschieden, so darf man, um consequent zu sein, nicht die Bezeichnungen Knochen- und Knorpelkapseln beibehalten, es vermehrt die Beibehaltung dieser Bezeichnungen nicht nur die schon ohnehin grosse Menge derselben, sondern trägt, was noch nachtheiliger ist, zu einer Verwirrung der Lehre über die Zellbildung bei, einer Lehre, die meiner Ansicht nach, so klar und leicht fasslich als nur irgend möglich hingestellt werden muss.

Abbildungen.

Fig. 1. Schnittchen aus dem Armbeine eines 7" langen Rindsfoetus, 425 Mal vergrößert.

1. Ursprüngliche Knorpelzelle mehrere Knochenzellen enthaltend.

Fig. 2. Schnittchen aus der frischen Rippe eines Schweines, 300 Mal vergrößert.

Fig. 3. Zahnbeinzellen vom Backenzahne eines 22 Wochen alten Rindsfoetus, 800 Mal vergrößert.

1. Zahnbeinzellen in der Lage.
2. Zahnbeinzellen durch Druck etwas von einander entfernt.
3. Eine einzelne ganze Zahnbeinzelle.
4. Zahnbeinzelle an deren oberem Ende eine andere angelagert ist.

Fig. 4. Knochenzellen aus dem Metacarpalknochen eines erwachsenen Schafes, dem mit verdünnter Chlorwasserstoffsäure die Erdsalze

14 Fürstenberg: Ueber einige Zellen etc. im Thierkörper.

entzogen und von dem ein Theil hierauf mit verdünnter Schwefelsäure, ein anderer Theil mit Chromsäure behandelt wurde, 500 Mal vergrössert.

- a. Membran der Knochenzelle,
- b. sogenanntes Knochenkörperchen,
- c. Zelleninhalt.

Fig. 5. Knochenzelle von demselben ebenso behandelt und 800 Mal vergrössert.

- a. Membran der Knochenzelle,
- b. sogenanntes Knochenkörperchen,
- c. Zelleninhalt.



Ueber Knorpelzellen.

Von

I. LACHMANN.

(Hierzu Taf. II.)


Da der Streit über die Zellenatur der sogenannten Bindegewebssubstanz noch immer nicht ganz beendet zu sein scheint, da besonders noch immer Viele trotz der vortrefflichen Arbeiten Virchow's und Hoppe's die Knochen- und Knorpelkörperchen nicht als Zellen betrachtet wissen wollen und die durch längere Behandlung der Knochen oder Knorpel mit Salzsäure oder durch Kochen im Papinschen Digestor erhaltenen Membranen nur für die innersten Schichten der die Knochen- oder Knorpelhöhlen umgebenden Grundsubstanz ansehen, so scheint es mir nicht ungerechtfertigt, noch einmal ein Enchondrom in dieser Hinsicht zu beschreiben, obgleich schon Virchow¹⁾ ein solches für diese Frage benutzt hat, da mir das mir zu Gebote stehende Object die Frage über die Zellnatur und die Entwicklung der in Rede stehenden Elemente noch sicherer zu entscheiden scheint, als dies mit dem von Virchow beobachteten der Fall war. Das Enchondrom befindet sich im hiesigen anatomischen Museum, die von demselben angefertigten Präparate sind zum Theil schon vom Herrn Geheimerath J. Müller früher untersucht, und dieser hatte die meisten der zu beschreibenden Thatsachen schon daran beobachtet, vertraute mir aber gütigst die weitere Untersuchung und Mittheilung des Beobachteten an.

Von dem gröberen Bau der Geschwulst abstrahirend, der

1) Verhandlungen der phys.-med. Gesellschaft zu Würzburg 1850. pg. 195 u. f.

ja seit J. Müller's erster Beschreibung 1836 hinlänglich bekannt ist, will ich nur den Theil der mikroskopischen Untersuchung mittheilen, der über die Natur und Entwicklung der Knorpel- und Knochenkörperchen Aufschluss ertheilen kann. Ich will mit der Beschreibung der Knorpelhöhlen, ihrer nächsten Umgrenzung und ihres Inhalts, also mit den Knorpelkapseln Virchow's oder Knorpelzellen der meisten Autoren, beginnen und erst später auch auf die Zwischensubstanz zwischen denselben Rücksicht nehmen.

An den meisten Stellen enthielt die chondringebende Grundsubstanz des Enchondromknorpels Hohlräume, Knorpelhöhlen, Fig. 1–5 a. von bald mehr runder, bald mehr ellipsoidischer oder eiförmiger, oft selbst sehr lang gestreckter Gestalt. Sie waren von einer derben Membran b., Knorpelkapsel Virchow's, eingeschlossen, welche sich deutlich von der umgebenden Substanz, mit der sie übrigens fest zusammen hing, unterschied, und enthielten im Innern einen sie nicht ausfüllenden, rundlichen oder ovalen Körper Fig. 1. c., dessen Farbe bei den lange in Weingeist gelegenen Präparaten bräunlich war. Dieser Körper wurde von J. Müller¹⁾ und den meisten Autoren als Kern der Knorpelzelle, von Vir-




bis an die Kapsel der Knorpelhöhle, doch waren auch einzelne kürzer; unregelmässig gestaltete, mehr oder weniger zackige Zwischenformen zwischen den runden und den radiirten Körpern waren nicht selten: z. B. in Fig. 6 A.¹⁾

Die radiirten sowohl, als die rundlichen oder eiförmigen Körperchen lagen meist einzeln, bisweilen aber auch zu zwei (Fig. 5 A) in ihrer Knorpelhöhle, nur von Flüssigkeit umgeben, nicht in feste Masse eingebettet. Wenn die einfache Beobachtung der geschlossenen Höhlen nicht genügte, dies mit Sicherheit zu bestimmen, so wurde es durch die nicht selten erfolgte mechanische Isolirung derselben erwiesen. Waren nämlich bei der Präparation zufällig Knorpelhöhlen angeschnitten, so traten meist die darin enthaltenen Körperchen heraus, und man fand in der Flüssigkeit sowohl rundliche als radiirte in dieser Weise isolirte Körperchen, Fig. 3 und 4, letztere bisweilen noch, wie Fig. 4 C, mit einem oder mehreren der Fortsätze an dem Rest der angeschnittenen Kapsel b hangend. Die radiirten Körper hatten meist bei der Isolirung einen Theil ihrer Fortsätze eingebüsst, doch kamen wiederholt solche vor, über deren Identität mit den radiirten Knorpelkörperchen kein Zweifel sein konnte. Häufig sah man auch durch den Schnitt geöffnete und entleerte Höhlen, wie in Fig. 6 B, so dass es sicher war, dass man es hier mit Höhlen zu thun hatte, welche von einer derben meist mit der Umgebung innig zusammenhängenden Membran umgeben waren und in einer Flüssigkeit ein oder zwei rundliche oder radiirte Körperchen enthielten.

Der anatomische Werth dieser Körperchen konnte nun entweder der von nur durch den Alkohol geronnenem Inhalt der Höhle, oder der von Zellkernen, oder endlich von ganzen Zellen sein. Die Ansicht, dass sie nur der geronnene Inhalt der Knorpelhöhlen sei, wird schon durch den bald zu beschreibenden Uebergang in ebenso gestaltete in die Grundsubstanz eingebettete Knorpelkörper unwahrschein-

1) Vergl. J. Müller in diesem Archiv 1845 pg. 395.

lich gemacht, durch die vom Herrn Geheimerath J. Müller gemachte Beobachtung derselben in frischem Enchondrom vollständig widerlegt. — Ob die isolirbaren Körperchen aber Aequivalente von Zellen oder nur von Zellkernen waren, schien schwerer zu entscheiden, da man nur selten undeutlich eine blasse, zarte Contur um die braune Masse verlaufen sah, welche man für die abgehobene dünne Membran der Zelle hätte halten können. Fig. 3 e. Waren die Körperchen Zellen, so lag sicher die feine Membran dem durch den Alkoholzusatz coagulirten Inhalt dicht an, in diesem sah man bisweilen einen oder zwei rundliche Körper d in Fig. 1, 2, 3, 4 A und C, welche Kerne mit einem oder gewöhnlicher mit zwei Kernkörperchen zu sein schienen. Da sie bei der trüben Beschaffenheit und der braunen Farbe der ganzen Körperchen nicht deutlicher zu sehen waren, als ich sie gezeichnet, und sie in vielen Körperchen gar nicht erkannt wurden, so möchte ihre Anwesenheit allein nicht hinreichen, die betreffenden Körperchen für kernhaltige Zellen anzusehen, sondern hierzu erst noch die Untersuchung eines ganz frischen Enchondroms erforderlich sein, wenn man nicht auch im normalen Knorpel, bei dem man, wenn er ganz frisch



mit Kernkörperchen führenden Inhalt ausgefüllt sieht, wie Fig. 12 A und B 1, eine ziemlich concentrirte Kochsalz- oder Zuckerlösung, so sieht man den Inhalt der Knorpelhöhle um den Kern zusammenschrumpfen und diesen verhüllen, so dass nun ein geschrumpftes dunkles Körperchen in einer mit Flüssigkeit gefüllten Höhle liegt, Fig. 12 A u. B 2. Da die Kochsalz- oder Zuckerlösung nicht wohl eine Coagulation im Höhleninhalt hervorbringen kann, so führt diese Beobachtung schon zur Ueberzeugung, dass derselbe von einer feinen Membran umgeben sei, welche durch exosmotisch aus derselben erfolgten Wasseraustritt zum Collabiren gebracht werde. Von der Richtigkeit dieser Ansicht überzeugt man sich leicht, wenn man nun den Knorpelschnitt in destillirtes Wasser legt, wo man das vorhin geschrumpfte Körperchen wieder aufquellen und den Kern wieder deutlich hervortreten sieht. Durch abwechselndes Behandeln mit Kochsalz- oder Zuckerlösung und reinem Wasser kann man so dasselbe Knorpelkörperchen zu wiederholten Malen zusammenschrumpfen und sich wieder ausdehnen, den Kern unkenntlich und wieder vollkommen deutlich werden sehen¹⁾, so dass an dem Vorhandensein einer Zellmembran, an der Zellnatur des Kör-

1) Fig. 12 A stellt die Veränderungen einer Knorpelzelle vom Frosch bei zweimal nach einander bewirktem Schrumpfen und Wiederaufquellen dar, B die von zwei anderen kleineren, ebenfalls vom Frosch, welche in dicht an einander grenzenden Höhlen liegen, gleichfalls unter zweimal abwechselnd geschehenem Zusatz von Zuckerlösung und reinem Wasser. A 1 und B 1 ist das ursprüngliche Aussehen der in der Höhle liegenden Zellen, man unterscheidet keine sie umgebende Membran; A 2 und B 2 sind dieselben Zellen nach Zuckerzusatz, die vorhin sehr deutlichen Kerne sind in den geschrumpften Körperchen nicht mehr erkennbar, treten aber nach Behandeln mit reinem Wasser, wo die Zellen wieder zu A 3 und B 3 aufquellen, wieder deutlich hervor. Neuer Zusatz von Zuckerlösung macht sie wieder schrumpfen A 4 und 5, B 4; in reinem Wasser quellen sie wieder A 6 und 7, B 5. Die Zelle quillt nicht immer vollkommen zu ihrer ursprünglichen Grösse auf, sondern bleibt bisweilen etwas kleiner, so dass sie ihre Höhle nicht vollkommen ansüllt.

perchens nicht mehr gezweifelt werden kann. Sind so die Knorpelkörperchen des normalen Knorpels Zellen, so können wir nicht umhin, auch die runden und radiirten des Enchondrom als solche zu betrachten, auch ihnen eine begrenzende Membran zuzuschreiben, besonders da die radiären Fortsätze hohl zu sein scheinen.

Haben wir so die Zellnatur der in mit Flüssigkeit gefüllten Hohlräumen, deren Wand aus einer dicken Membran besteht, gelagerten Knorpelzellen bewiesen, so bleibt uns zunächst der Nachweis der Identität dieser mit den in homogene Grundsubstanz gebetteten radiirten Knorpel- und Knorpelkörperchen.

Wie schon J. Müller in seiner Abhandlung über das Enchondrom schrieb, kommen auch Knorpelkapseln vor, deren radiirtes Körperchen, die Knorpelzelle, sich mit ihren Ausläufern nicht auf die Höhle der Kapsel beschränkt, sondern sich über die dicke Begrenzungshaut in die Grundsubstanz erstreckt. Fig. 7 und Fig. 4 C. Ein deutliches Ausbuchten der Kapselwand, wie es Virchow hier schildert, konnte ich nicht entdecken, ich sah die Fortsätze der Knorpelzelle einfach in der homogenen oder schwach granulirten Grundsub-




körnte, halb oder ganz feste Masse gefüllt ist. Fig. 8. Von diesen, bei denen der Inhalt der Kapsel noch ein von dem der Umgebung sehr verschiedenes Aussehen besitzt, bis zu solchen, wo derselbe nicht mehr von der Grundsubstanz zu unterscheiden, Fig. 10, wo auch die Kapselmembran vollkommen undeutlich geworden oder gar nicht mehr zu erkennen ist, kommen alle Zwischenstufen vor, z. B. Fig. 9.

Wir haben so alle Uebergänge von dem Knorpel, in welchem die rundliche Knorpelzelle in einer von deutlicher Kapselmembran ausgekleideten Höhle liegt, bis zu dem, welcher sich anatomisch vom soliden Knochen nur durch den Mangel an Haversischen Kanälen unterscheidet, gefunden, und glauben den Beweis geliefert zu haben, dass die radiirten Knochenkörperchen dieses osteoiden Knorpels durch Veränderung der rundlichen Knorpelzellen entstanden sind, deren Zellnatur wir bewiesen haben, dass also wohl kein Zweifel sein kann, dass die Membran, welche man durch Behandeln dieses Knorpels mit Salzsäure etc. isoliren kann, wirklich als die Membran dieser als Zellen zu betrachtenden Körper, nicht als innerste Schicht der sie einschliessenden Grundsubstanz zu betrachten ist.

Ist es nun erlaubt, die Entwicklung des normalen Knorpels, welcher wegen des rascheren Verlaufs aller Veränderungen an den Elementen des ossificirenden Knorpels schwerer alle Stadien erkennen lässt, als in ähnlicher Weise vor sich gehend zu betrachten (und hierfür scheinen die meisten Angaben über Verknöcherung zu sprechen), so möchte der Verknöcherungsvorgang etwa in folgender Weise vor sich gehen:

Die rundliche Knorpelzelle wächst in sich verästelnde hohle Fortsätze aus, die bis an die oft aus einer derben Membran, Kapsel, gebildete Wand der sie enthaltenden Höhle treten und sich endlich noch über dieselbe hinaus verlängern. In solchem Knorpel, in welchem vorher die

Knorpelzelle ihre Höhle ganz ausfüllte, bildet sich während dieses Auswachsens in Fortsätze oder vor demselben durch Vergrößerung der Höhle und Verkleinerung der Zellen ein Zwischenraum zwischen der Wand der Höhle, also der Kapsel, und der Zelle¹⁾. Zugleich oder bald darauf tritt nun in diesem anfangs von Flüssigkeit erfüllten Zwischenraum eine Veränderung ein: es lagert sich feste Masse in demselben ab, entweder in der ganzen Höhle zugleich auftretend oder von der Peripherie nach dem Centrum vorschreitend. (Auf diese Weise scheinen mir die Angaben der Autoren über die Bildung von Porenkanälchen zu deuten, auch im Enchondrom findet man Thatfachen für das peripherische Beginnen der Ablagerung von fester Substanz in der Kapselhöhle; man findet nämlich Höhlen mit deutlicher Kapselmembran, welche in ihren äusseren Parthieen schon von fester Substanz gefüllt sind, zunächst dem Körper der radiirten Zelle aber noch Flüssigkeit enthalten.) Damit, dass die Kapselmembran immer undeutlicher wird (dies geschieht oft schon vor dem Auswachsen der Zelle in Radian), dass der Inhalt der Kapsel der umgebenden Grundsubstanz ähnlicher wird, die sich verlängernden Fortsätze einer Zelle mit denen der be-



det, der bei der Verknöcherung noch die Abweichung zeigt, dass während desselben die Grundsubstanz des anfangs Chondrin gebenden Knorpels sich in Kalksalze führende, Glutין gebende Masse umwandelt, dass gleichfalls die in der Knorpelkapsel auftretende feste Substanz nicht ein Chondrin gebender, sondern ein Glutין gebender, mit Kalksalzen verbundener Stoff ist. Die Verkalkung tritt bald ausserhalb, bald innerhalb der Kapsel zuerst auf.

Es bleibt uns nun noch die Ermittlung des histologischen Werthes der Kapselmembran und der Grundsubstanz, in die sie eingebettet, welchen wir bis jetzt ganz unberücksichtigt gelassen haben.


Im fertigen Knorpel und Knochen sehen wir die homogene Grundsubstanz die Intercellularsubstanz zwischen den Knochen und Knorpelzellen bilden, anders ist dies im in der Bildung begriffenen Knorpel. Von einem Theil derselben sahen wir schon, dass er als Inhalt der Knorpelkapseln entstand, und müssen ihn, da ich glaube, es mehr als wahrscheinlich machen zu können, dass die Knorpelkapsel die Mutterzelle der Knorpelzelle ist, als veränderten Zellinhalt ansehen. Dasselbe gilt nun auch von der je eine oder mehrere Kapseln umgebenden Grundsubstanz. Wir finden nämlich Kapseln, welche zu zwei (Fig. 5 A und B) oder mehr in einer gemeinschaftlichen von einer äusseren Kapselmembran (Fig. 5 β) umschlossenen Höhle liegen, die von Flüssigkeit, wie in dem gezeichneten Falle, oder von fester Masse ausgefüllt ist, und bei denen wohl kein Zweifel sein kann, dass sie dasselbe Verhältniss zu den eingeschlossenen Kapseln, wie diese zu den in ihnen liegenden Knorpelzellen hat. Schon diese Beobachtung einer oder mehrerer Kapseln, frei in einer Höhle liegend, macht die Annahme unwahrscheinlich, dass die Kapseln etwa nur der innerste veränderte Theil von Intercellularsubstanz sei, und drängt zu der Ueberzeugung, dass sie veränderte Zellmembran sei, die durch bald zu beschreibende Zwischenstufen zwischen Knorpelzellen und Kapseln befestigt wird. Statt mehrerer innerer Kapseln kann eine äussere Kapsel auch nur eine innere

Kapsel einschliessen und selbst wieder von einer noch weiter aussen liegenden allein oder mit anderen eingeschlossen werden ¹⁾).

Wie der Inhalt der inneren Kapseln, anfangs von der umgebenden Masse sehr verschieden, dieser allmählich gleich wird, so geschieht dies auch mit dem der äusseren Kapseln, so dass die meisten äusseren Kapseln einen wenig oder gar nicht von der Grundsubstanz verschiedenen Inhalt einschliessen; die äusseren Kapseln selbst werden gleichfalls immer undeutlicher, zuletzt gar nicht mehr zu erkennen ²⁾).

Der grösste Theil, wo nicht der ganze Knorpel ist so als aus dem Inhalt ältester Mutterkapseln hervorgegangen anzusehen, deren Membranen allmählich, während sie zugleich immer weiter ausgedehnt wurden, ihrem Inhalt immer ähnlicher wurden.

Wir haben nun noch die oben erwähnte Zwischenstufe zwischen Knorpelzellen und Knorpelkapseln anzuführen, um unsere Ansicht, dass die letzteren aus ersteren durch endogene Zellbildung entstanden sind, zu stützen. In einigen, freilich sehr vereinzeltten Fällen wurden radiirte Knorpelzellen, Fig. 11 c, in Höhlen beobachtet, welche von einer mit



konnte sie nicht wohl die abgehobene Membran dieser sein, sondern musste als selbstständige Membran entweder der Membran einer Knorpelzelle oder einer Knorpelkapsel entsprechen. Mochte sie nun eine Kapselmembran sein, welche, während sie eine Knorpelzelle enthielt, in Fortsätze ausgewachsen war, also sich wie eine Knorpelzelle verhalten hatte, oder mochte sie eine radiirte Knorpelzelle gewesen sein, welche durch endogene Zellbildung eine neue Knorpelzelle hervorgebracht hatte, also zur Kapsel geworden war, so bildete sie jedenfalls ein solches Zwischenglied zwischen Zellen und Kapseln, dass wir mit Berücksichtigung der schon erwähnten Gründe wohl die Kapselmembranen als nach der Bildung von Tochterzellen im Innern veränderte Zellmembranen von Knorpelzellen ansehen müssen.

Nach den mitgetheilten Beobachtungen würde sich also der Entwicklungsgang des Knorpels kurz in folgender Weise darstellen lassen. In den ursprünglichen Bildungszellen des Knorpels (mögen sie nun durch Zwischensubstanz getrennt sein oder nicht) entwickeln sich durch endogene Zellbildung neue Zellen, Knorpelzellen oder Knorpelkörperchen, die Membranen der Mutterzellen sind damit zu Knorpelkapseln geworden; während die neuen Knorpelzellen durch endogene Zellbildung gleichfalls zu Kapseln werden und ihre Membranen sich dabei oft bedeutend verdicken ¹⁾, hat sich zwischen ihnen und der Membran ihrer Mutterzelle feste, Leim gebende Substanz abgelagert; der Raum innerhalb der Membran ihrer Mutterzelle ist dadurch vergrößert, diese selbst wird undeutlicher. In gleicher Weise schreitet der Prozess fort, indem stets die frühere Knorpelzelle durch endogene Zellbildung zur Kapsel wird, und dadurch und mit der Einlagerung von fester Substanz in die Kapseln der ganze Knorpel wächst. Im ossificirenden oder sich osteoid umbildenden

1) Dies scheint nicht immer der Fall, häufig scheinen sie vielmehr sehr früh mit der Grundsubstanz so zu verschmelzen, dass sie kaum oder gar nicht mehr von ihr zu unterscheiden sind.

Knorpel tritt endlich ein Zeitpunkt ein, wo gewisse Knorpelzellen nicht mehr Tochterzellen hervorbringen, sondern in Strahlen auswachsen, und wo die oben geschilderten Veränderungen im übrigen Knorpel vor sich gehen.

Erklärung der Figuren.

Fig. 1–11 stellen Knorpelzellen und Kapseln aus dem Enchondrom vor, a bedeutet bei allen Figuren die Höhle, welche die Knorpelzelle c einschliesst, b ist die Kapsel der Höhle, d der Kern der Knorpelzelle, β , β' , β'' sind äussere Kapseln.

Fig. 1. Eine rundliche Knorpelzelle mit doppelter Kapsel.


Fig. 2. Eine radiirte Zelle von vier Kapseln eingeschlossen.

Fig. 3. Eine rundliche aus der angeschnittenen, von doppelter Kapsel umschlossenen Höhle hervortretende Zelle, deren Membran e ein wenig vom coagulirten Inhalt abgehoben ist.

Fig. 4. Drei isolirte radiirte Zellen, die eine C mit ein paar Fortsätzen noch an dem Rest ihrer grossentheils weggeschnittenen Kapsel, die von denselben schon überragt wurde, festsitzend.

Fig. 5. Eine ältere Kapsel mit Tochterzellen verschiedener Generationen.

Fig. 6. Die Abkömmlinge zweier Mutterzellen, deren Membranen



Versuche über Muskelreizbarkeit.

Von

A. W. VOLKMANN.

Die Versuche, welche den Inhalt der nachstehenden Abhandlung ausmachen, sind in den Berichten der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften schon mitgetheilt worden. Der Wunsch, mich über einige wichtige Punkte ausführlicher auszusprechen, als dort geschehen, veranlasst mich, auf den schon einmal behandelten Gegenstand zurückzukommen. Indem meine Untersuchungen sich an die Arbeit E. Webers über Muskelbewegung aufs engste anschliessen, scheint es angemessen, an den Standpunkt, welchen dieser ausgezeichnete Forscher einnahm, in der Kürze zu erinnern ¹⁾).

Bekanntlich leitet Weber die Bewegungserscheinungen der Muskeln zunächst von der Elasticität ab, während er eingesteht, dass die Elasticität schliesslich von dem Einflusse des Lebens abhängt. Anlangend den ruhenden Muskel, so ist er einem Stück Kautschuk vergleichbar. Verändert man seine natürliche Form, beispielsweise durch Dehnung, so reagirt er mit einer elastischen Kraft, welche der Zugkraft gleichkommt, und beseitigt man hierauf diese Zugkraft wieder, so kehrt er aus der ihm aufgezwungenen Form zu seiner natürlichen zurück. Mittelst dieser Verkürzung kann er ruhende Körper in Bewegung setzen, er kann also auch ein Gewicht heben, und die Kraft, die er hierbei entwickelt, ist einerseits von dem Unterschiede der natürlichen und der künst-

1) Vergl. Muskelbewegung in R. Wagners Handwörterbuch der Physiologie B. III. Abth. 2.

lich hergestellten Länge des Muskels abhängig, andererseits von dem Elasticitätsmodulus. Was ferner den thätigen Muskel betrifft, so suchte Weber zu zeigen, dass in diesem die eben geschilderten Verhältnisse sämmtlich wiederkehren. Er behauptet nämlich, dass die verkürzte Länge und vermehrte Dicke, welche den thätigen Muskel auszeichnen, nichts anders als Eigenthümlichkeiten seiner natürlichen Form sind. Diese natürliche Form sucht der Muskel mit Hülfe elastischer Kräfte zu erhalten, wenn er sie hat, und er sucht sie herzustellen, wenn er sie nicht hat. Die Verkürzung, welche man an einem Muskel bemerkt, wenn man ihn reizt, ist ein derartiger Act, wo der aus dem Zustande der Ruhe in den Zustand der Thätigkeit übergegangene Muskel die kurze Form herstellt, die ihm unter den neuen Verhältnissen, in die er eingetreten, allein die natürliche ist. Bei dieser Auffassung der Sachlage versteht es sich von selbst, dass die Kraft des sich contrahirenden thätigen Muskels von ganz analogen Bedingungen abhängen müsse, wie die des unthätigen Muskels, welcher nach Beseitigung einer vorübergehenden Dehnung zu seiner normalen Länge zurückkehrt. Die Hubkraft hängt also ab: einerseits von dem Unterschiede der

der That sollten ja alle Bewegungen und alle aus diesen resultirenden Leistungen der Muskeln nur Folgen der Veränderung sein, welche die natürliche Form und die Elasticität der Faser beim Wechsel von Ruhe und Thätigkeit zu erleiden hat.


Anlaugend die natürlichen Formen, so liessen diese sich messen, die natürliche Form des unthätigen Muskels unmittelbar, die des thätigen Muskels mittelbar durch Bestimmung der Contractionsgrösse. Letztere von der Länge des ruhenden Muskels abgezogen, giebt die natürliche Länge des thätigen Muskels. Die elastischen Kräfte wurden nur nach ihren relativen Werthen bestimmt, und aus dem gemessenen Werthe der Dehnbarkeit abgeleitet, was zulässig ist, da die elastischen Kräfte der Dehnbarkeit umgekehrt proportional sind.

Bei derartigen Messungen trat die Nothwendigkeit hervor, auf den Einfluss der Ermüdung Rücksicht zu nehmen, von welcher die Muskelfunctionen merklich abhängen. Weber ordnet daher seine Versuche, in welchen er mit verschiedenen Gewichten operirte, in der Weise, dass er die Belastung des Muskels in der ersten Hälfte der Reihe mit jedem neuen Versuche um ein Bestimmtes vermehrte, in der zweiten Hälfte dagegen um dasselbe Quantum verminderte. War nun beispielsweise eine Reihe von fünf Versuchen in der Weise ausgeführt worden, dass der Muskel successive 10 gr. 20 gr. 30 gr. 20 gr. 10 gr. zu heben hatte, so schiene jetzt das mittlere Ergebniss des 2ten und 4ten Versuches, desgleichen das des 1ten und 5ten mit dem Ergebnisse des 3ten vergleichbar, denn man wird annäherungsweise annehmen dürfen, dass die Ermüdung mit der Zeit gleichmässig fortschreite, in welchem Falle der in der Mitte stehende 3te Versuch von der Ermüdung in mittlerem Maasse behaftet ist. Liegen nun 2 Versuche in gleicher zeitlicher Distanz vor und hinter ihm, wie etwa ein 1ster und ein 5ter Versuch, so ist die Einwirkung der Ermüdung in jenem annäherungsweise um eben so viel geringer, als in diesem

grösser, als im 3ten Versuche, wodurch die Reduction derselben auf ein gemeinsames mittleres Maass ermöglicht wird¹⁾.

Ich habe nun dieselben Fragen, welche Weber behandelt, unter Anwendung verschiedener Experimentalmethoden ebenfalls behandelt, und habe, je nach der Verschiedenheit der Methoden, die ich benutzte, sehr verschiedene Ergebnisse bezüglich der Grösse der elastischen Kräfte erhalten. Ich habe gefunden, dass die Dehnbarkeit, und folglich auch die elastische Kraft der Muskeln, selbst dann beträchtlichen Veränderungen unterliegen können, wenn alle die Umstände constant sind, von welchen Weber die Elasticität abhängig machte. Meine Versuche werden daher jedenfalls zu der Frage nöthigen, wie sich die von mir beobachteten Erscheinungen mit der von Weber aufgestellten Lehre vereinigen lassen.

Unter den verschiedenen Methoden, welche ich benutzte, um über die Dehnbarkeit der Muskeln, und somit über die elastischen Kräfte derselben, Aufschluss zu gewinnen, war die erste eben dieselbe, welche Weber anwendete. Der ruhende Muskel wird lothrecht aufgehangen, bezüglich seiner Länge gemessen und, nachdem er durch ein angehangenes




zeichnet man die ursprüngliche Länge mit l und die durch die Belastung vergrösserte Länge mit L , so ist $L - l = D$, wo D die Dehnung bedeutet, und D/l ist die Dehnbarkeit des ruhenden Muskels für das in Anwendung gebrachte Gewicht p . Es kommt nun darauf an, auch die natürliche Länge und die Dehnbarkeit des thätigen Muskels zu bestimmen.

Weber nimmt an, der unbelastete Muskel stelle im Zustande der Thätigkeit seine natürliche Form her. Ist das richtig, so braucht man nur den ruhenden Muskel zu reizen, und die Höhe h , bis zu welcher sein unteres Ende erhoben wird, zu messen, dann erhält man durch die Subtraction $l - h$ die gesuchte natürliche Länge des thätigen Muskels, sie heisse λ . Um endlich die Dehnbarkeit des thätigen Muskels zu messen, verfuhr Weber in folgender Weise. Er belastet den ruhenden Muskel wieder mit dem Gewichte p und reizt ihn. Die Hubhöhe h' wird gemessen und von der ursprünglichen Länge des belasteten und ruhenden Muskels $= L$ abgezogen. Man erhält auf diese Weise $L - h' = \mathcal{A}$, wo \mathcal{A} die Länge des belasteten aber thätigen Muskels bedeutet. Von diesem Werthe zieht Weber die Länge des unbelasteten thätigen Muskels ab und betrachtet den Unterschied $\mathcal{A} - \lambda = D'$ als die Dehnung, welche der thätige Muskel durch das Gewicht p erlitten hat. Unter diesen Voraussetzungen ist endlich $\frac{D'}{\lambda}$ die Dehnbarkeit des thätigen Muskels.

Benutzt man das eben beschriebene Verfahren zur Messung der in Frage kommenden Grössen, so kommt man zu dem paradoxen aber constanten Resultate, dass die Dehnbarkeit des thätigen Muskels grösser und folglich seine elastische Kraft kleiner ist als die des ruhenden Muskels. Die organischen Kräfte machen sich einer Zweckwidrigkeit schuldig. Der thätige Muskel soll nämlich Gewichte heben, er soll sie durch Vermittelung elastischer Kräfte heben, und diese Kräfte werden in dem Momente, wo sie in Anwendung kommen sollen, d. h. in dem Momente, wo der Muskel aus dem Zustande der Ruhe in den der Thätigkeit übergeht, vermindert.

Ich habe das Verfahren Webers, welches ich der Kürze wegen die a Methode nennen will, einer gewissen Modification unterworfen, und habe dadurch eine zweite oder b Methode erhalten. Weber reizte den Muskel, nachdem er ihn vorher belastet und durch die Belastung über sein normales Maass verlängert hatte. Die an unserem Skelette angebrachten Muskeln werden aber durch die Art ihrer Befestigung vor jeder Ausdehnung über ihr normales Maass geschützt. Die Länge des ruhenden Muskels ist also, gleichviel ob er belastet oder unbelastet ist, constant = 1. Um dieses Verhältniss beizubehalten, brachte ich unter dem lothrecht aufgehängenen Muskel eine passende Stütze an, auf welcher das Gewicht ruhte. Im Uebrigen wurde der Versuch ganz nach den Angaben Webers ausgeführt. Ich reizte also den beladenen Muskel, bestimmte seine Länge im Momente der grössten Contraction, zog von dem gefundenen Werthe die Länge des thätigen aber unbelasteten Muskels ab und betrachtete die gefundene Differenz als die durch das Gewicht bewirkte Dehnung. Die Versuche lehren, dass der beladene Muskel bei Anwendung der b Methode sich stärker verkürzt als bei Anwendung der a Methode. Wird demnach die We-



Nachträglich ist zu diesen Versuchsreihen zu bemerken, dass der Muskel nicht mit Hülfe eines anhaltenden Reizes zu anhaltender Contraction, sondern durch Inductionsschläge zu Zuckungen veranlasst wurde. Die äusserst feinen Messungen der Muskellängen wurden, trotz der Schnelligkeit der Bewegung, dadurch möglich, dass ich, unter Zuziehung des Kymographion, die Contractionen graphisch dargestellt hatte.

Schon ein flüchtiger Blick auf die Tabelle lehrt, dass der Muskel im a Versuche viel weniger contrahirt, oder, nach Webers Auffassung, viel stärker gedehnt ist, als im b Versuche. Zieht man aus allen Beobachtungen die mittleren Werthe aus, so erhält man folgende:

Dehnbarkeit des ruhenden Muskels = 0,228

Dehnbarkeit des thätigen a Muskels = 0,618


Dehnbarkeit des thätigen b Muskels = 0,278

Die Dehnbarkeit des thätigen Muskels ist also, wie Weber angab, grösser als die des ruhenden Muskels, aber der Unterschied ist zufolge der b Methode viel geringer als nach Angabe der a Methode.

Eine dritte Methode, welche ich in Anwendung brachte, bestand darin, dass ich den unbeladenen Muskel reizte und ihn im Momente der grössten Verkürzung belastete. Meine Absicht ging dahin, zu ermitteln, um wieviel der thätige Muskel unter solchen Umständen verlängert oder gedehnt werde. Man sieht leicht, dass dieses Verfahren, welches der Kürze wegen mit c bezeichnet werden mag, dasselbe ist, welches Weber (a. a. O. pg. 111) als das einfachste zur Bestimmung der Dehnbarkeit, aber gleichzeitig als ein praktisch unausführbares bezeichnet. Das Wahre ist, dass die Messungen, um welche es sich handelt, ohne Zuziehung des Kymographion unüberwindliche Schwierigkeiten bietet.

Wenn man einen Muskel mit Hülfe des Neffschen Apparates anhaltend reizt, so contrahirt er sich anfangs auffallend rasch, dann immer langsamer, bis die Contraction gänzlich unmerkbar wird. Schlägt dann die contractile Bewegung in die expansive über, so ist die rückgängige Bewegung anfangs wiederum unendlich langsam und wird nur allmählig

etwas schneller. Im Allgemeinen ist aber die retrograde Bewegung eine äusserst träge, indem der anhaltend gereizte Muskel wohl eine halbe Stunde gebraucht, um aus der stärksten Verkürzung zu der Länge, die er im Zustande der Ruhe hatte, zurückzukehren. Um eine ungefähre Vorstellung von dem Bewegungsvorgange zu geben, will ich annehmen, der Cylinder des Kymographion vollende eine Umdrehung in drei Secunden. Dann würde die Muskelkurve während der ersten Umdrehung etwa bis zum Scheitelpunkte aufsteigen, sie würde während der zweiten Umdrehung approximativ auf dieser Höhe verharren, also eine merklich gerade Linie bilden, und würde während der dritten und während aller folgenden Umdrehungen äusserst langsam abwärts sinken. Man erkennt also aus der Richtung der Linie, welche der Muskel verzeichnet, den Grad seiner Verkürzung, und hat, wenn diese ihr Maximum erreicht, ungefähr 3 Sekunden Zeit, um das Gewicht anzuhängen, welches die Dehnung des thätigen Muskels bewirken soll. Diese Zeit ist für einen geübten Experimentator ausreichend den Versuch auszuführen. In dem Augenblicke, wo man den lothrecht hängenden Muskel an seinem untern Ende belastet, entsteht eine steile Senkung



wichtiges wird der Muskel im Uebermaass expandirt, so dass die Kurve bei *a'* eine merkliche Welle bildet und dann erst in der Richtung *BB'*, parallel *AA'*, ihren normalen Verlauf fortsetzt. Das Vorhandensein dieser Welle ist darum sehr schätzbar, weil hierin ein Beweis liegt, dass die Dehnung vollendet ist, und weil die genaue Messung der Dehnungsgrösse dadurch erleichtert wird. Man errichtet auf der halben Höhe der Welle eine Senkrechte *a'a*, bis zur Berührung mit der Waagerechten *AA'* und erhält hiermit die gesuchte Grösse der Dehnung des Muskels = *aa*.

In einer Versuchsreihe, welche wiederum am Zungenmuskel des Frosches, unter Anwendung eines Gewichtes von 10 Gramm, angestellt wurde, ergaben sich folgende relative Werthe der Dehnbarkeit:

im ruhenden Muskel 0,382

im thätigen a Muskel 0,872

im thätigen b Muskel 0,527

im thätigen c Muskel 0,390

wobei zu bemerken, dass hier wie oben die störenden Einflüsse der Ermüdung nach Weber's Methode schon eliminiert sind.

Bei Anwendung der c Methode war die Dehnbarkeit und folglich die Elasticität des thätigen Muskels nicht geringer als die des ruhenden. Dies Resultat verdient um so mehr Beachtung, als bei dem eben beschriebenen Verfahren der Längenunterschied des belasteten und unbelasteten Muskels eine viel unzweifelhaftere Dehnung ist, als in den vorhergehenden Versuchen.

Endlich habe ich noch eine 4te oder d Methode angewendet. Ihre Eigenthümlichkeit besteht darin, dass das Gewicht dem Muskel in dem Momente angehangen wird, wo seine Kraft der des Gewichtes gleich ist. Um dies auszuführen verfähre ich in folgender Weise. Der lothrecht aufgehängene Muskel ist, wie schon in den früheren Versuchen, an seinem unteren Ende mit einem ziemlich langen Haken verbunden, an welchen das Gewicht angehangen werden kann. Das Gewicht aber ist mit einem langen haarnadelförmigen Henkel

versehen und kann, mit Hilfe der schon erwähnten Stütze, eine derartige Stellung bekommen, dass der am untern Muskelende befindliche Haken den Henkel erst fasst, wenn der Muskel sich bereits mehr oder weniger contrahirt hat. Gesetzt der Muskel hebt in dem ersten Versuche das Gewicht noch beträchtlich, so schraubt man die Stütze und mit ihr das Gewicht etwas höher, und sieht zu, ob auch dann noch das Gewicht gehoben werde. Auf diese Weise lässt sich durch *tatonnement* die Länge des Muskels finden, bei welcher der Muskel das Gewicht eben nur trägt, also nach Weber's Auffassung: die natürliche Länge des thätigen Muskels, vermehrt um die Dehnungsgrösse. Wir haben diese Summe oben mit \mathcal{A} bezeichnet, die natürliche Länge des thätigen Muskels aber mit λ . Nun ist $\mathcal{A} - \lambda$ die Dehnung im d Versuche. Die relativen Werthe der Dehnbarkeit waren in einer Versuchsreihe am Zungenmuskel des Frosches folgende:

für den ruhenden Muskel = 0,208


für den thätigen a Muskel = 0,673

für den thätigen d Muskel = 0,107

Hieraus ergibt sich, dass die Dehnbarkeit des thätigen Muskels unter Umständen grösser ist als die des ruhenden.

und entsprechen in ihren Längen den Weber'schen Dehnungsgrössen. Die Summe der ausgezogenen und punktirten Linien rp , ap , bp , cp , dp , entspricht demnach der Länge der belasteten Muskeln während das Verhältniss der punktirten Linien zu den ausgezogenen die Dehnbarkeit giebt.

Man übersieht nun mit einem Blicke, wie die Länge des thätigen Muskels, trotz der gleichen Belastung, in jedem Versuche eine andere ist, und wie die Grösse der Dehnbarkeit in der Richtung von a nach d abnimmt.



Wir wollen nun untersuchen, in wie weit sich die neuen Erfahrungen mit Weber's theoretischen Ansichten vereinigen lassen.

Zunächst ist klar, dass die Versuche der a Methode, deren sich Weber ohne Ausnahme bediente, über das Verhältniss der elastischen Kräfte des thätigen Muskels zu denen des unthätigen nichts Allgemeingültiges aussagen. Die von Weber gefundenen Verhältnisse haben im günstigsten Falle nur für die a Methode Gültigkeit, also für eine Methode,

welche die Muskelbewegung unter Bedingungen bringt, welche unter den natürlichen Verhältnissen nicht vorkommen.

Gehen wir nun zu der Frage über: warum fällt die Länge des beladenen thätigen Muskels je nach Anwendung unsrer 4 Experimentalmethoden verschieden aus? Nothwendig muss in jeder dieser Methoden ein Umstand besonderer Art mitwirken, welcher die Resultate ändert, gleichwohl haben wir die in Vergleich gestellten Versuche an einem und demselben Muskel angestellt, haben überall dasselbe Gewicht und denselben Reiz angewendet, und sind bemüht gewesen, die Einwirkungen der Ermüdung nach der von Weber empfohlenen Methode auszugleichen. Aber diese Bemühung ist erfolglos geblieben, denn offenbar ist der einzige Umstand, welcher die von uns angewendeten Methoden unterscheidet, dass dem Muskel bei jeder derselben ein andres Maass von Arbeit zugemuthet wird, womit denn selbstverständlich auch ein verschiedener Grad von Anstrengung und Ermüdung gegeben ist.

Vergleichen wir beispielsweise den a und b Versuch, so ist einleuchtend, dass in letzterem die Arbeit eine geringere ist, als in ersterem. Im a Versuche nämlich ist der ruhende

Verminderung der Arbeit herbei, indem durch die Kunst des Experimentes die Dauer der Periode, in welcher Elasticität und Zugkraft sich ausgleichen, verkleinert, also auch die Zeit verkürzt wird, in welcher die sich contrahirende Faser das Gewicht zu tragen hat.


Man sieht aus dem eben Erörterten, dass die verschiedenen Werthe der Dehnbarkeit, auf welche wir in unsern Untersuchungen gestossen, mit den Principien der Elasticitätstheorie nicht in Widerspruch stehen. Denn die Verschiedenheit der von uns wahrgenommenen Werthe lässt sich auf Differenzen der Ermüdung zurückführen, und Weber hatte ausdrücklich anerkannt, dass die elastischen Kräfte, von welchen die Muskelbewegungen zunächst ausgehen, als abhängig vom Lebensinflusse und namentlich von der Ermüdung zu denken seien.

Hiernach könnte es scheinen, dass die von mir beobachteten Thatsachen nur specielle Beispiele für eine in ihren Grundsätzen schon fertige Lehre bildeten. Indess ist ihre Bedeutung, so viel ich sehe, eine andere und für die Kritik des vorhandenen Erfahrungsmaterials ziemlich wichtige.

Weber behauptete, dass die Muskelbewegungen zunächst aus den elastischen Kräften ableitbar wären, gab aber zu, dass diese wieder unter dem Einflusse des Lebens stünden. Sein letztes Ziel musste nun sein, das Gesetz der in den Muskeln wirksamen Elasticität zu finden. Nach diesem Ziele hinstrebend, machte er seine Versuche mit Hilfe der aMethode, die oben beschrieben wurde. Er constatirte die Abhängigkeit der Muskellänge von den Zugkräften, indem er die Einwirkungen der Ermüdung soviel als thunlich eliminirte, denn er ging von dem vollkommen richtigen Grundsatz aus, dass die bei verschiedener Belastung der Muskeln ermittelten Werthe der Dehnbarkeit gar nicht vergleichbar sein würden, wenn nicht der Einfluss der Ermüdung in allen Fällen derselbe wäre.

Weber hoffte vergleichbare Versuche zu erhalten, wenn er den Einfluss der Ermüdung auf verschiedene in der Zeitfolge angestellte Versuche ausglich. Er abstrahirte von der

Ermüdung, die in jedem Versuche entsteht, wahrscheinlich weil er annahm, dass ein bemerkenswerther Einfluss von hier aus nicht zu erwarten stehe. In der That ist der Unterschied der Muskelkräfte, welcher sich in 2 successiven Versuchen darstellt, sehr gering, und so könnte es scheinen, dass die, während der Zeitdauer nur eines Versuches entstandene Ermüdung noch kleiner sein müsse und vernachlässigt werden dürfte. So ist es aber nicht, wie meine Erfahrungen beweisen. Vielmehr tritt in jedem Versuche eine schnell fortschreitende und sehr beträchtliche Ermüdung ein, eine Ermüdung, die in dem nächstfolgenden Versuche nur darum nicht merklich ist, weil die, zwischen je zwei Contractionen stattfindende Ruhe eine fast ebenso vollständige als merkwürdig rasche Wiederherstellung der verbrauchten Kräfte vermittelt. Weber eliminirte die kleinen Ermüdungseinflüsse, welche von einem Versuche auf den nächstfolgenden übergehen, und liess die grossen Einflüsse unberücksichtigt, welche innerhalb der Grenzen einer und derselben Contractionsperiode sich geltend machen. Es sind nämlich bei Weber nicht eliminirt die Ermüdungseinflüsse, welche von dem Heben verschiedener Gewichte momentan abhängen. Wir wissen, dass Ermüdung



Ich will nun auf einige Fälle aufmerksam machen, in welchen die im Vorhergehenden gewonnenen Erfahrungen berücksichtigt werden müssen. Freilich würde ich kaum zu viel sagen, wenn ich behauptete, dass diese Berücksichtigung überall stattfinden müsse, wo es sich um Erscheinungen der Contractilität handelt, denn von welcher Seite man auch die Muskelbewegung betrachten möge, immer werden die Dimensionen der beladenen thätigen Muskeln mit in Frage kommen, und gerade die Abhängigkeit dieser Dimensionen von dem Gange der Versuche ist es, auf welche ich aufmerksam gemacht habe. Soll demnach aus Experimenten an Muskeln etwas gefolgert werden, so ist die unabweisliche Vorfrage die, nach welchem Principe die Versuche veranstaltet wurden.

Von den 4 Methoden, welche ich beschrieben habe, sind bereits 3 von verschiedenen Beobachtern in Anwendung genommen worden. Aber Niemand, scheint es, hat geahnet, dass jede derselben zu Resultaten besonderer Art führe und folglich in gewissen Beziehungen ganz unvergleichbar mit den übrigen sei.

Untersuchen wir zunächst die viel besprochenen Versuche Schwann's,¹⁾ so findet sich bei einer genaueren Analyse derselben das wohl den Meisten Unerwartete, dass sie in die Kategorie meiner d Versuche gehören. Denn obschon der doppelarmige Hebel, dessen Schwann sich bediente, mit meinen gehenkeltten Gewichten keine Aehnlichkeit hat, so ist doch sein Verfahren dem meinigen in dem wesentlichen Umstande gleich, dass der sich verkürzende Muskel mit dem zu hebenden Gewichte erst dann in Conflict kommt, wenn die contractile Kraft, die er ausübt, und die Zugkraft, die vom Gewichte ausgeht, sich im Gleichgewicht befinden. Bei einem derartigen Verfahren wird also die Länge eines Muskels gemessen, dessen Verkürzung durch eine seiner Contractilität gleiche Expansionskraft plötzlich unterbrochen wird. Schwann misst also, wie ich in d Versuche, die Länge des thätigen Muskels unter Bedingungen, bei welchen die Ermüdungseffekte


1) Joh. Müller, Handbuch der Physiologie des Menschen. II. S. 59.

so klein als möglich, man könnte sagen unnatürlich klein sind. Dieser Ausdruck findet seine Rechtfertigung in dem Umstande, dass dem Muskel durch die Kunst des Experimentes eine ermüdende Arbeit erspart ist, welche ihm unter normalen Verhältnissen jedes Mal zufällt.

Man wird nicht verkennen, dass dies Beachtung verdiene. Schwann war der Ansicht, dass die Muskeln durch elastische Kräfte wirkten. Um diese Kräfte kennen zu lernen, stellte er die vorerwähnten Versuche an. Nun kann nicht gleichgültig sein, dass die Werthe der Dehnbarkeit, die er erhielt, unter dem Einflusse der ganz eigenthümlichen und ungewöhnlichen Bedingungen seiner Experimentalmethode stehen.

Während Schwann in seinen Versuchen dem Muskel eine Arbeit ersparte, die er unter natürlichen Verhältnissen jedes Mal hat, muthete Weber, im aVerfahren, demselben eine Arbeit zu, die er unter normalen Verhältnissen nicht hat. Indem nun die Arbeit, oder genauer gesagt die durch die Arbeit bedingte Ermüdung, die elastischen Kräfte influenzirt, können Schwann und Weber, welche beide eben diese Kräfte suchen, unmöglich dasselbe finden.

Endlich hat Weber ausser der aMethode auch die bMe-



Die von mir erläuterten 4 Experimentalmethoden influenzieren die für die Muskellehre so wichtige Frage nach dem Nutzeffecte. Bekanntlich ist der Nutzeffect, oder die Arbeitsgrösse, das Product aus dem Gewichte p und der Höhe h , bis zu welcher es gehoben wird, also $h p$. Wendet man zur Erregung der Muskeln anhaltenden Reiz an, so ergibt sich, wie es scheint ohne Ausnahme, dass die Contractionsgrössen oder Hubhöhen unter dem Einflusse der aMethode grösser ausfallen, als unter dem der bMethode. Natürlich sind nun auch die Nutzeffecte des aMuskels grösser. Ich will die Unterschiede, welche nach Maassgabe des Experimentalverfahrens eintreten, an einer Versuchsreihe zeigen, aus welcher die Ermüdungseinflüsse nach der von Weber empfohlenen Weise schon eliminirt sind.

Zum Verständniss der nachstehenden Tabelle bemerke ich, dass wo sich in der Columnne der Experimentalmethode keine Angabe findet, von der Benutzung einer besonderen Methode eben nicht die Rede sein konnte. Wenn nämlich entweder ein unbelasteter Muskel, oder aber ein belasteter im Zustande der Ruhe gemessen wird (in letzterem Falle, um die Dehnung der nuthätigen Faser zu ermitteln), so können die Versuchsmethoden, welche auf die Effecte der Ermüdung Bezug nehmen, gar nicht in Frage kommen.


Versuche am Zungenmuskel des Frosches.

Länge des Muskels

Methode.	Belastung.	Länge des Muskels		Nutzeffect.
		ruhend.	thätig.	
—	0 Gramm	53,75 Mm.	28,2 Mm.	—
—	5 "	59,55 "	—	—
a	5 "	59,55 "	33,75 "	129 Mmgr.
b	5 "	53,75 "	32,05 "	108,5 "
—	10 "	61,45 "	—	—
a	10 "	61,45 "	44,15 "	183 "
b	10 "	53,75 "	38,35 "	154 "
—	15 "	62,8 "	—	—
a	15 "	62,8 "	53,65 "	137,25 "
b	15 "	53,75 "	45,2 "	128,25 "
—	20 "	63,45 "	—	—
a	20 "	63,45 "	60,5 "	59 "
b	20 "	53,75 "	52,4 "	27 "

Man übersehe nicht, dass die Nutzeffecte, welche bei Anwendung der aMethode gewonnen werden, nur dem Scheine nach grösser sind, als die gegentheiligen. Zufolge der Mechanik unsrer Bewegungsorgane kommt Alles darauf an, dass das bewegliche Ende eines Muskels dem unbeweglichen genähert werde, und die Grösse des Nutzeffectes wächst demnach, bei gleicher Belastung, mit dem Grade der gegenseitigen Annäherung beider Enden, oder mit der Grösse der Verkürzung der normalen Muskellänge. Die vorhergehenden Versuche haben aber bewiesen, dass der bMuskel, bei gleicher Belastung, sich mehr verkürzt, als der aMuskel, und folglich ist auch sein Nutzeffect grösser.

Diese Behauptung ist mit den Resultaten der eben vorgelegten Tabelle nur scheinbar in Widerspruch. Wenn die Physik den Nutzeffect als das Product des Gewichtes in die Hubhöhe definirt, so hat die Physiologie hinzu zu setzen, dass unter Hubhöhe das Maass der Verkürzung des Muskels, im Vergleiche zu seiner Länge im Zustande der Ruhe, verstanden werde. Denn wenn im aVersuche der ruhende Muskel durch ein angehangenes Gewicht verlängert wird, und wenn nochmals, bei eintretender Erregung, die Verkürzung



Indem nun die am Skelete angebrachten Muskeln, wie mehrmals bemerkt, nach dem Principe der b Methode wirken, ergibt sich, dass der Mechanismus des Skelets, welcher jede Dehnung der ruhenden Muskeln durch die Gewichte verhindert, die Nutzeffecte begünstigt. Diese Betrachtung ist meines Wissens neu und erläutert die oben gemachte Bemerkung, dass bei Schätzung der Muskelkräfte, für je ein Quadratcentimeter Querschnitt, die mit a und b bezeichneten Methoden nicht promiscue gebraucht werden können.

Contraction nicht einmal die Länge wieder gewonnen, die er unbelastet von vorn herein hatte, und dass also, mit Bezug auf den Zweck der Bewegung, ein Arbeitsverlust entstanden ist.


Der Nahrungsdotter des Hechteies — eine kontraktile Substanz.

Sendschreiben an Herrn Geheimrath Professor Dr. J. Müller

von

K. B. REICHERT.


Im vorigen Jahre hatte ich Ihnen mitgetheilt, dass die Bewegungen des befruchteten Hechteies weder nach den Erscheinungen, noch nach den Ursachen mit den sonst bekannten Rotationen der Embryonen zu vergleichen seien. Die Bewegung des befruchteten Hechteies giebt sich hauptsächlich als ein Hin- und Herschwanken der nur leicht auf dem Boden der Höhle gestützten Dotterkugel zu erkennen und tritt bereits während des Furchungsprocesses auf; die Ursache der



riger Beschaffenheit durchsetzt wird, sondern auch die Ursache erkannt, durch welche fortdauernd der Schwerpunkt der Dotterkugel verrückt und der eigenthümliche Rhythmus in den Schwankungen bedingt ist.

Schon in meinen Mittheilungen über die tubulöse Beschaffenheit des in Weingeist erhärteten Nahrungsdotters befruchteter Hechteier habe ich angeführt, dass an der Oberfläche der Kugel nicht selten Erhöhungen und Unebenheiten sichtbar werden. In diesem Frühjahr hatten die vorübergehenden Verzerrungen der Zellen in der Umhüllungshaut, desgleichen die Runzeln und Falten an der letzteren, so wie die vorübergehende Annäherung der Fettkörnchen und sonstiger Bläschen auf der Oberfläche der Nahrungsdotterkugel meine Aufmerksamkeit in Anspruch genommen. Es war mir aber nicht möglich gewesen, über die Erscheinungen ins Klare zu kommen; Sie wissen, Hochzuverehrender Lehrer, man sieht bei mikroskopischen Beobachtungen gar leicht den Wald vor den Bäumen nicht. So viel aber liess sich übersehen, dass ausser den Schwankungen des Eies noch andere Bewegungsverhältnisse an der Dotterkugel obwalteten, und die Einsicht in dieselben wurde mir erst mit Hilfe der Lupe gewährt. Ich beobachtete einen Embryo, dessen Herz sich zusammenzuziehen begonnen hatte. Der Embryo lag, mit dem Rücken mir zugewendet, auf der Nahrungsdotterkugel und umfasste dieselbe als Halbring derartig, dass anfangs nach der rechten und linken Seite ganz gleiche Abschnitte des Nahrungsdotters sichtbar waren. Nach einer Minute bemerkte ich, dass so zu sagen der Rücken des Embryo bis nahe zum linken Pole herübergerückt war, und dass etwas später dieselbe langsame Bewegung vom linken Pole zum rechten Statt fand u. s. f. In etwa fünf Minuten bewegte sich so der Rücken des Embryo an der Dotterkugel von einer Seite zur anderen, und umgekehrt. Da diese Umlaufszeit der Bewegung des Embryo-Rückens mit derjenigen übereinstimmt, innerhalb welcher das Hin- und Herschwanken oder das Hin- und Herwälzen der ganzen Dotterkugel absolvirt wird, so lag es nahe, daran zu denken, dass die erstere Bewegung nur scheinbar durch die


letztere hervorgerufen sei. Bald jedoch überzeugte ich mich, dass dies nicht der Fall war. Wenn nämlich der Embryo-Rücken sich nur scheinbar bewegte, so musste das Lageverhältniss desselben zur Nahrungsdotterkugel, die im Bauche des Embryo Platz genommen hatte, bei allen Schwankungen unverändert sich erhalten. Ursprünglich lag nun der Embryo-Rücken so, dass gleiche Abschnitte der Nahrungsdotterkugel zu seinen beiden Seiten hervortraten. Bei der Bewegung des Embryo-Rückens nach Rechts oder Links änderte sich dieses Verhältniss in der Art ab, dass jedes Mal derjenige Abschnitt der Nahrungsdotterkugel allmählig an Umfang abnahm, nach welchem der Embryo-Rücken sich hinzog, und dass in gleichem Maasse der entgegenstehende Abschnitt im Volumen sich vergrösserte. Gleichzeitig bemerkte man, dass der Embryo-Rücken, welcher bei seiner Lage im grössten Kreise der Dotterkugel etwa die halbe Peripherie einnahm, bei seiner Bewegung nach den seitlichen Polen hin mit Kopf und Schwanz sich allmählig näherte und mehr oder weniger zum vollkommenen Ringe abschloss. Es war nunmehr unzweifelhaft, dass ausser dem Hin- und Herschwanken der ganzen Dotterkugel noch eine zweite Bewegung an derselben



ihren Ausgangs- und Endpunkt besass. Gelangte die Einschnürung in die Nähe eines Poles, so erhob sich derselbe warzenförmig über das Niveau der Bauchfläche; darauf glich sich allmählig der Vorsprung aus, und die Einschnürung verfolgte ihren Weg zurück nach dem entgegengesetzten Pole. In der Gegend des Embryo-Rückens entzog sich die Einschnürung dem Blicke; man bemerkte aber an der Verschiebung desselben, dass sie im Vorwärtsrücken etwas auf die Veränderung seiner Lage an der Dotterkugel einwirkte, dann auf der andern Seite zum Vorschein kam und zum entgegengesetzten Pole fortging. Aus dieser Beobachtung ergab sich, dass die Bewegungen des Embryo-Rückens nur secundär erfolgen, und dass vielmehr in den Bestandtheilen des Bauches eine peristaltische Kontraktion, die von einem seitlichen Pole zum andern rhythmisch fortzieht, vorliege.

Als Bestandtheile des Bauches lassen sich bei vorliegenden Embryonen unterscheiden: die epitheliumartige Umhüllungshaut zu äusserst; darunter eine dünne Schicht von Zellen, die sich wenigstens später unzweifelhaft als eine Fortsetzung der Cutis zu erkennen giebt; eine Zellschicht, die sich unmittelbar unter der Wirbelsäule entlang zieht; endlich die Hauptmasse, welche gleichsam die Höhle des Bauches anfüllt, der Nahrungsdotter. Es stand nunmehr die Frage, welchem von den genannten Bestandtheilen die Eigenschaft der Kontraktilität zuzuschreiben sei, wobei nach den vorhandenen Umständen nur die Umhüllungshaut, die Fortsetzung der Cutis am Bauche und der Nahrungsdotter in Betracht gezogen werden konnten. Mit Hilfe des Mikroskops bemerkt man die Erscheinungen, deren ich oben gedacht habe. Grade da, wo die Kontraktion oder Einschnürung Statt hat, erhoben sich allmählig Runzeln der Umhüllungshaut, etwa vorhandene Fetttröpfchen rückten dicht an einander, in der Umgebung bildeten sich feine Faltenzüge, und die Zellen der Umhüllungshaut wurden oft auffallend in die Länge gezerrt. Der sonst durch seine Durchsichtigkeit so ausgezeichnete Bauch des Embryo wurde entsprechend der Einschnürungsfurche dunkel gezeichnet; an den seitlichen Polen, wo sich die Kontraktion

in Vorsprünge konzentrierte, trat ein sehr markirter dunkler Fleck auf. In dem Grade, als an Ort und Stelle die Kontraktion und zwar ganz allmählig wieder abnahm, also Dilatation eintrat, gewann der Bauch des Embryo wieder seine Durchsichtigkeit. Aus den Runzeln, Falten, Zerrungen der Umhüllungshaut glaubte ich schliessen zu dürfen, dass diese Hülle an der peristaltischen Kontraktion zunächst nicht betheiligt sei; desgleichen sprachen auch kaum irgendwelche erhebliche Umstände dafür, dass die darunter liegende Zellschicht in dieser Beziehung von Bedeutung sei; dagegen wurde meine Aufmerksamkeit mehr und mehr auf den Nahrungsdotter gerichtet, zumal die unmittelbar auf seiner Oberfläche befindlichen Fettkügelchen so augenscheinlich bei jeder Kontraktion und Dilatation ihre Lage veränderten. Die Entscheidung war nun leicht und sicher zu treffen. Da die beschriebenen Kontraktionen so offenbar durch die Formveränderung des im Allgemeinen kugelförmigen Embryo's den Schwerpunkt verrücken und dadurch die rhythmischen Schwankungen der ganzen Dotterkugel unterhalten mussten, so war vorauszusetzen, dass dieselben Kontraktionen auch zur Zeit des Furchungsprozesses auf die rhythmischen Schwankungen des



hin- und herziehende Kontraktionsfurchen verfolgen, durch welche die Nahrungsdotterkugel vorübergehend zu zwei gleichen oder ungleichen Kugelabschnitten eingeschnürt wird. Dieselben Formveränderungen des kugelförmigen Nahrungsdotters wurden auch mit Hilfe des Mikroskops erkannt; dagegen fehlte jene dunkle Zeichnung an den Kontraktionsstellen, die besonders durch die Runzeln der Umbüllungshaut und durch die Aneinandernäherung der Fettkörperchen, die gegenwärtig unter dem Bildungsdotter liegen, hervorgerufen wird. Gewöhnlich machte sich die Kontraktionsstelle durch eine feine granulirte Zeichnung an der äusserst durchsichtigen Dotterkugel bemerkbar; desgleichen sah man die auf der Oberfläche des Nahrungsdotters mehr oder weniger zahlreich vorkommenden lichten Bläschen und kreisförmigen Zeichnungen bei jeder Kontraktion und Dilatation in Bewegung gerathen.


Der Nahrungsdotter des Hechteies erweist sich demnach als eine kontraktile Substanz, die der morphologischen Beschaffenheit nach am meisten der sogenannten Sarcodien wirbelloser Thiere gleicht, und an welcher nach einem bestimmten Rhythmus peristaltische Bewegungen auftreten. Durch die Zusammenziehungen und Erweiterungen des Nahrungsdotters wird die kugliche Form desselben verändert, der Schwerpunkt in einem gewissen Rhythmus verrückt und die Schwankung oder sogenannte Rotation des in der Entwicklung begriffenen, befruchteten Hechteies fortdauernd unterhalten und auch wahrscheinlich eingeleitet. An den befruchteten Eiern hiesiger Cyprinoiden habe ich bisher keine Spur einer Kontraktion des Nahrungsdotters wahrnehmen können. Gleichwohl finden sich auch hier Vacuolen in dem Nahrungsdotter vor, und auf die röhrlige Form dieser Vacuolen bei dem befruchteten Hechteie möchte ich kein grosses Gewicht legen, weil die Röhrenform der Vacuolen in der Sarcodien wirbelloser Thiere nicht bekannt ist.

Ueber die Eifollikel der Vögel, namentlich der
Tauben und Hühner.

Von

H. HOYER in Breslau.

Eine der ersten gründlichen Untersuchungen über die Eihäute und den Inhalt im Eifollikel der Vögel hat uns Dr. Th. Schwann in seinen „Mikroskopischen Untersuchungen über die Uebereinstimmung in der Struktur und dem Wachsthum der Thiere und Pflanzen. Berlin 1839“ S. 59 u. a. mitgetheilt. Er unterscheidet am Eifollikel zunächst nach aussen die Kapselmembran; alsdann auf deren Innenfläche eine Epithetialmembran, bestehend aus Pflasterepithel; sie gehört zur Kapsel




likeln von $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Zoll Durchmesser soll die zellige Haut aus zwei Schichten bestehen, von denen die äussere blos körnig ist und keine Zellen mehr zeigt, die innere aber aus platten eckigen Zellen besteht, die wie eine Art Epitel zur äusseren Schicht sich verhalten. Auf diese innere Schicht folgen endlich kleine gelbe Dotterkugeln, die noch kleiner sind, als die Zellen der Zellschicht, die jedoch nach Innen zu allmählig grösser werden, bis sie die gewöhnliche Grösse der Dotterkugeln der Dottersubstanz erreichen. Bei ausgetretenen oder zum Austritt ganz reifen Eiern verschwindet auch die innere Schicht, so dass die Dotterkugeln unmittelbar auf die äussere umgewandelte Schicht der Zellenhaut folgen.

In neuester Zeit hat Dr. H. Meckel v. Hemsbach in der „Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie von v. Siebold und Kolliker“ 3. Band, eine Arbeit veröffentlicht über „die Bildung der für partielle Furchung bestimmten Eier der Vögel im Vergleich mit dem Graafschen Follikel und der Decidua des Menschen.“ Auch Meckel unterscheidet bei allen Vogeleifollikeln die Kapselmembran und auf diese folgend und ihr angehörig die Membrana granulosa oder Epithelialmembran. Doch fehlt nach ihm in den kleineren Follikeln die von Schwann und allgemein sogenannte Dotterhaut des reifen Vogeles; desgleichen fehlen die Zellen der Dotterhöhle und Dottersubstanz, die Reichert später unter dem gemeinschaftlichen Namen „Nahrungsdotter“ zusammengefasst hat. Nach Meckel ist in den kleinsten Follikeln nur jener Bestandtheil des Vogeles vorhanden, den man bei mehr entwickelten Eiern für das Keimbläschen gehalten und so benannt hat. Indem Meckel somit dieses Keimbläschen mit dem einfachen Ei des Säugethieres identificirt, nennt er die Membran desselben die Zona pellucida; er unterscheidet ausser dem körnigen Inhalt des Bläschens noch einen besonderen Bestandtheil, das eigentliche Keimbläschen mit Keimflecken. Der Inhalt dieses „Eies“ nach Meckel soll sich zur späteren Keimschicht oder dem Bildungsdotter des ausgebildeten Vogeles verwandeln. Seine Zona pellucida und Keimbläschen scheinen nach seinen Untersuchungen schon zeitig hinzu-

schwinden; dagegen lässt er den Nahrungsdotter und die Dotterhaut als Umlagerungsschichten um das von ihm sogenannte Ei unmittelbar aus den Zellen der Membrana granulosa hervorgehen, indem namentlich sich auch die sonst ganz strukturlose Dotterhaut aus den verklebten Zellen bilden soll. Das Eigelb der reifen Vögeleier ist hiernach nicht mehr den einfachen Eiern anderer Thiere zu vergleichen, sondern ein Compositum aus dem eigentlichen Ei und mehrfachen Umhüllungsschichten, die theilweise aus dem Eifollikel herkommen und mit dem corpus luteum der Säugethiere gleichgestellt werden.

Ich habe nun unter Anleitung und gütigster Beihülfe des Herrn Prof. Staatsrath Dr. Reichert eine Bearbeitung dieses Gegenstandes unternommen und folgende Resultate an Eifollikeln, hauptsächlich von Sperlingen, Tauben und Hühnern gewonnen:

Die Eifollikel von jeder Grösse und jeder Stufe der Entwicklung bestehen zunächst nach aussen aus einer Kapselmembran von Bindegewebe. Die Innenfläche der Kapsel ist ausgekleidet von einer Epithelialmembran, Membrana granulosa, die bei den kleinsten Follikeln nur aus einer einfachen




ohne dass die Dotterhaut riss und die von ihr eingeschlossene Flüssigkeit herausfloss. Die Dotterhaut markirte sich dann durch eine sehr zarte doppelte Contour, welche am Rande des herausgepressten Eies einen schmalen lichten Saum einschloss, von dem dunklen granulösen Inhalte. Bei grösseren Follikeln, deren Kapsel nicht geöffnet werden kann, ohne dass auch die Dotterhaut gleichzeitig zerrissen wird, erkennt man die Dotterhaut auf gleiche Weise an einer Falte der herausgepressten Eihülle. Wäscht man letztere behutsam ab zur Entfernung des körnigen, das Bild verunreinigenden Einhaltes, und behandelt sie mit Essigsäure und Jodtinktur, so sieht man die Dotterhaut als eine zarte strukturlose, schwach gelblich gefärbte Membran, vorzüglich an solchen Stellen, wo sie isolirt und gefaltet ist. Oft jedoch bleibt die Dotterhaut beim Pressen des Follikels in der Kapsel zurück, alsdann lässt sie sich als eine feine doppelte Contour am Rande einer Falte der umgestülpten Kapsel erkennen. Endlich bleibt die Dotterhaut zuweilen auch an der herausgepressten Membrana granulosa hängen; auch hier wird sie an einer Falte der umgestülpten Membran oder mittelst Jod und Essigsäure erkannt. Auf Querschnitten gekochter Follikel, die man erst trocknen muss, um sie bequem zu schneiden, und die dann mit einer sehr verdünnten Kalilösung zu behandeln sind, damit die Theile wieder aufquellen, verräth sich die Dotterhaut ebenfalls durch doppelte Contouren, welche einen lichten Saum einschliessen. Zuweilen jedoch verschwindet die innere Contour in dem granulösen Inhalt; doch bleibt der lichte Saum fast stets deutlich zu sehen.

Das Verhalten der auf die Dotterhaut nach Innen folgenden Schichten ist bei Follikeln von verschiedenen Entwicklungsstufen ein ganz verschiedenes. — Die kleinsten Taubeneifollikel, die ich zu beobachten Gelegenheit hatte, zeigten einen Durchmesser von $\frac{1}{15}$ — $\frac{1}{25}$ Mm. Bei diesen Follikeln, die ich niemals isolirt zu sehen bekam, sondern stets umgeben von einem dichten Stratum von Bindegewebe, worin dieselben eingebettet sind, konnte ich nicht am Rande die Contouren und noch weniger die Struktur der verschiedenen

Membranen erkennen. Es war eine deutliche Gränze nur zwischen der Kapsel und dem Inhalt wahrzunehmen; es sah aus, als ob eine dünne Schicht von sehr feinkörniger Masse auf der Innenfläche der Kapsel abgelagert wäre. Der innere Raum erschien ganz hell. Ob derselbe vom Keimbläschen eingenommen wird oder von einer Flüssigkeit, liess sich nicht entscheiden, da ein so kleiner Follikel wegen des umgebenden Bindegewebsstratums durch Druck nicht zum Platzen gebracht werden konnte. Follikel von Hühnern von $\frac{1}{13}$ Mm. Durchmesser erschienen ganz in derselben Weise, nur waren die Körnchen der körnigen Masse bedeutend grösser und sahen aus wie feine Fetttropfchen. Der Durchmesser des Eichens betrug $\frac{1}{25}$ Mm.

Erst in Follikeln von $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{7}$ Mm. liess sich eine deutliche Gränze zwischen Kapsel und Epitel wahrnehmen. Die Struktur des letzteren erschien so, wie die des Pflasterepithels auf Querschnitten. Die Contouren der Dotterhaut waren nicht erkennbar, doch liess sie sich leicht nachweisen an dem herausgepressten Inhalt der Follikel auf die vorher angegebene Weise. Das Innere der unversehrten Follikel schien ganz von grobkörniger Masse erfüllt zu sein und war ganz




zusammengepressten Membran sah man nun gewöhnlich, namentlich bei Zusatz von etwas Wasser, wie sich eine glas- helle strukturlose Membran von der körnigen Schicht abhob, oder man sah wenigstens eine feine Contour, welche einen feinen lichten Saum am Rande der Falte der körnigen Membran abgränzt. Man ersieht also hieraus, dass die körnige Masse von der Dotterhaut umschlossen ist. Dass die körnige Masse eine Art Membran bildet, ersieht man an dem Flottiren derselben bei bald verstärktem, bald verringertem Drucke auf das Deckgläschen an solchen Stellen, wo sich die Dotterhaut von ihr stärker abgehoben hat. Fügt man zu einem solchen Präparate Essigsäure, so wird die körnige Membran gewöhnlich augenblicklich gelöst, so dass man unter dem Mikroskope plötzlich gar nichts sieht, indem auch die Dotterhaut durchsichtiger wird und ihre Contouren an Schärfe verlieren; fügt man alsdann Jodtinktur hinzu, so tritt die Dotterhaut deutlicher wieder hervor und man erkennt sie in ihrer ganzen Ausdehnung, da der körnige Inhalt nun verschwunden ist.

Ganz ähnlich verhalten sich Follikel von $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{2}$ Mm. Durchmesser, nur sieht man bei diesen am Rande schon ziemlich scharf die Gränze zwischen Kapsel und Membrana granulosa. Die Dotterhaut jedoch ist durch die Kapsel hindurch nicht zu erkennen, zumal ein solcher Follikel sich nicht platt genug drücken lässt, um die Contouren der verschiedenen Membranen deutlich darzustellen, ohne dass er platzt und der Inhalt austritt. Das Verhalten der auf die Dotterhaut folgenden granulirten Schicht ist ganz gleich dem vorher beschriebenen. Mit einer sehr verdünnten Lösung von kaustischem Kali behandelte Querschnitte von gekochten und getrockneten Follikeln zeigen ganz dieselbe Aufeinanderfolge von Schichten, wie ich sie bei frischen Eiern gefunden: Kapsel, Membrana granulosa, Dotterhaut, an dieser anliegend eine granulirte dunklere Masse von Fetttropfen ähnlichen Körnern, an die sich das wasserhelle Keimbläschen anschliesst; der übrige Raum ist mit einer hellen geronnenen Masse angefüllt, die eine Unmasse von sehr kleinen hellen Körnchen enthält.

In Follikeln von 2 Mm. Durchmessern besteht der Inhalt aus kleinen hellen Bläschen mit einem Kern, der einem Fetttropfen ähnlich kontourirt ist; sie sehen ganz so aus, wie die Kugeln der Dotterhöhle in den späteren Entwicklungsstadien des Follikels. Die Schicht an der Dotterhaut besteht gleichfalls aus kleinen Bläschen, von denen mehrere Schichten übereinander gelagert zu sein scheinen; Durchmesser derselben beträgt $\frac{1}{120}$ Mm. Der Inhalt dieser Bläschen ist fein granulirt; der Durchmesser der darin enthaltenen Körnchen variirt von $\frac{1}{225}$ Mm. bis zur Unmessbarkeit. Hat man eine Falte der Dotterhaut, so erscheinen die Bläschen der auf ihrer innern Fläche abgelagerten Schicht als cylindrische Zellen, indem vermöge der optischen Täuschung die Contouren der aufeinander gelagerten Bläschen zu einem Bilde verschmelzen, welches die Gestalt einer cylindrischen Zelle darbietet. Dieselbe Erscheinung zeigt sich auch auf Querschnitten gekochter und auf die oben angegebene Weise behandelter grösserer Follikel.

Alle die bei Follikeln dieser Grösse angeführten Theile finden sich auch in Follikeln bis zu dem Durchmesser von 7 Mm., wo dieselben anfangen, sich mit einem gelblichen In-



bis schliesslich die gewöhnlichen Kugeln der Dotterhöhle auftreten. Letztere füllen den übrigen inneren Raum des Follikels ganz aus.

Ganz gleich ist das Verhalten der noch grösseren Follikel, nur zeigen sich hier mehrere abwechselnde Schichten von Kugeln von der Form der Kugeln der Dotterhöhle und der der Dottersubstanz; und dann werden die Bläschen an der Dotterhaut bei zunehmender Grösse der Follikel immer undeutlicher; sie erscheinen immer mehr granulirt; man sieht auf dem vorletzten Stadium der Entwicklung des Follikels nur noch eine feine, gelbliche, granulirte Schicht zwischen der Dotterhaut und den Kugeln der Dottersubstanz; und endlich beim vollständig entwickelten Ei scheinen die gelben Dotterkugeln unmittelbar an der Dotterhaut anzuliegen.

Was nun das Keimbläschen anbetrifft, so schien es mir überall, wo ich es aus dem Follikel unversehrt herausgepresst, rund, wasserhell und durchsichtig. Da man es aber nie isolirt bekommt, sondern stets nur anhängend an der auf die Dotterhaut folgenden Schicht, so sah es aus, als ob der Inhalt granulirt oder wenigstens einige Körnchen darin enthalten wären, indem man den dem Bläschen anhängenden Theil der Membran, der vermöge seiner Schwere stets auf der untern Seite des Bläschens befindlich ist, durch das Bläschen hindurch erblickt und für dessen Inhalt ansieht. Dass jedoch das Keimbläschen an sich vollständig klar und durchsichtig sei, davon scheint der Umstand Zeugniss abzulegen, dass man dasselbe auf Querschnitten gekochter Follikel stets mit einem klaren, durchsichtigen und körnerfreien Inhalt findet. Auf solchen Querschnitten sieht man das Keimbläschen auch nie von einer dichteren Schicht von Körnern oder Bläschen, sondern nur vom gewöhnlichen Inhalt umgeben.


Um die Struktur der Keimscheibe zu erkennen, machte ich durch gekochte und etwas eingetrocknete Eifollikel einen solchen Durchschnitt, dass dieselben zugleich mit der Keimscheibe halbirt wurden, und nahm feine Schnitte von der Schnittfläche an der Stelle, wo die Keimscheibe an der Dotterhaut lag. Ich fand nun an der Dotterhaut unmittelbar eine

körnige Schicht, die nach den Rändern und dem Innern der Keimscheibe zu in kleine Bläschen von der Gestalt der Dotterkugel überging. Weiter seitlich und nach Innen zu wurden diese Bläschen immer grösser und grösser, bis sie nicht mehr zu unterscheiden waren von den Kugeln der Dottersubstanz. Eine sichere Grenze zwischen Keimscheibe und Eisubstanz liess sich also nicht wahrnehmen.

Genauere Untersuchungen über die Verhältnisse der Keimscheibe an frischen Eifollikeln, so wie über die Schichten an der Innenfläche der Dotterhaut bei fast ganz entwickelten Follikeln, konnte ich wegen Mangel an eierlegenden Hühnern in der vorgeschrittenen Jahreszeit nicht mehr anstellen.

Die Massbestimmungen bei Follikeln von verschiedenen Entwicklungsstufen beziehen sich alle auf Hühnereifollikel. Die Vergrösserungen, bei denen ich gearbeitet, waren gewöhnlich 120, selten 200, und nur zur Erkennung der Zellen und kleinen Bläschen 500.

Aus diesen meinen Untersuchungen ist mir die Ueberzeugung geworden, dass die bisher sogenannte Dotterhaut des Vogeleies (Eigelb) schon ursprünglich an den kleinsten, für uns sichtbaren Eiern vorhanden ist, dass dieselbe dann mit



Die Krystalle in den Malpighischen Gefässen der Raupen.

Von J. SCHLOSSBERGER in Tübingen.

Unlängst übersandte mir Prof. Leuckart auf einem Uhrglas eine kleine Menge einer gelblichen aus eingetrockneten Schläuchen bestehenden Masse, die Malpighischen Gefässe der Eichenspinnerraupe.

Das Mikroskop wies als Inhalt dieser Schläuche zahllose, glänzende und ungefärbte krystallische Körperchen von sehr verschiedener Grösse nach, doch selbst die grössten kaum von der gewöhnlichen Grösse der im menschlichen Harn vorkommenden Quadratoctaëder von kleeurem Kalk. Die meisten waren isolirt; hie und da bemerkte man auch Krystallhaufen, in welchen die einzelnen Kryställchen durch ein amorphes oder häutiges Bindemittel unter einander zusammenhingen. Die isolirten Körperchen liessen immer nur eine Fläche erkennen, welche allermeist quadratisch, in einzelnen Fällen oblong erschien. Von Octaëdern liess sich nichts entdecken.

Sie waren unlöslich in Wasser, Alkohol und Aether, eben so unlöslich in Essigsäure auch bei längerem Stehen oder beim Erwärmen. Mit Salpetersäure unter schliesslichem Zusatz von Ammoniak eingedampft gaben sie keine Spur einer Murexidfärbung. Verdünnte Salz- oder Salpetersäure lösten ohne Aufbrausen den grössten Theil von ihnen auf, die Lösung wurde durch Ammoniak stark gefällt, die Fällung war unlöslich in Essigsäure. Mit Vitriolöl übergossen entwickelten sich Gasbläschen und es schossen Büschel von Gypsnadeln an. Beim Erhitzen auf dem Platinblech wurden sie gebräunt, ohne zu schmelzen, und brausten dann mit Säuren auf.

Es konnte nach Obigem kein Zweifel obwalten, dass die Körnchen wesentlich aus kleeurem Kalk bestanden, und es ist sicher nicht ohne Interesse, im menschlichen und

Insecten - Harn, nachdem schon von Anderen die Harnsäure auch in letzterem aufgefunden, einen zweiten Bestandtheil, vielleicht als Abkömmling der letztern Säure, nämlich die Oxalsäure als gemeinschaftlich vorhanden kennen zu lernen.

Wurden die Kryställchen auf dem Objectträger mit verdünnten Mineralsäuren zusammengebracht, so zeigten sie ein sehr eigenthümliches Verhalten. Es erschien eine dunkle Halbierungslinie quer durch die ganze Fläche, häufig auch eine zweite auf der ersten senkrecht stehende, so dass die Fläche in vier Felder getheilt wurde. Endlich schmolzen sie auch von den Rändern ein, lösten sich aber häufig nur theilweise auf, indem ein ganz kleines Körnchen oder höchst dünnes Blättchen, offenbar von organischer Materie herrührend, hinterblieb. Wurden die Kryställchen vorsichtig erhitzt und dann mit dem Mikroskop betrachtet, so hatten viele die ursprüngliche Form beibehalten, aber den Glanz und die Durchsichtigkeit eingebüsst und eine gelbliche Färbung angenommen. Ich lasse dahingestellt, ob die beschriebenen Körper als echte Krystalle, oder aber als eine Art von Afterkrystallen oder Incrustationen aufzufassen sind und erinnere dabei nur an die Thatsache, dass auch die im Thierkörper gebildeten Krystalle von kohlensau-

Ueber den Einfluss, welchen der Wechsel des Luftdruckes auf das Blut ausübt.

Von

FELIX HOPPE.

Es ist bekannt, dass selbst ein plötzlicher mässiger Wechsel des Luftdruckes ohne Nachtheil von Thieren ertragen wird; mag dieser Wechsel in einer Verringerung oder Steigerung des Druckes bestehen. Ueberschreitet jedoch dieser Wechsel gewisse Grenzen, so treten Verhältnisse ein, welche plötzlichen Tod zur Folge haben.


Eine trächtige Ratte auf dem Recipienten der Luftpumpe, in eine Atmosphäre von 150 Mm. Quecksilber höheren Druck als der äussere Luftdruck (zusammen 908 Mm. Hg.) gebracht, gab kein Zeichen irgend welcher Störung in ihrem Befinden, und als durch die comprimirt Luft die Glasglocke plötzlich losgerissen wurde, und der Luftdruck innerhalb und ausserhalb der Glasglocke sich ins Gleichgewicht setzte, erschrak das Thier, blieb aber sonst wohl, auch bei mehrmaliger Wiederholung des Versuches.

So viele Beispiele von Verletzungen durch einseitige plötzliche Druckvermehrung vorliegen, Sprengung des Trommelfelles, Bruch der Rippen etc. durch Expansion der durch vorüberfliegende schwere Geschosse comprimirt Luft, scheint doch kein Beispiel allgemeiner plötzlicher hoher Steigerung des Druckes und dadurch verursachter Todesfälle vorzuliegen, ausser den Explosionen von Grubengas in Bergwerken. Bei diesen letzteren sind aber die Verhältnisse sehr complicirt und Sectionsberichte fehlen. Dass das Verweilen in sehr compri-

mirter Luft keinen Nachtheil für Menschen bringt, dafür zeugen die Versuche mit Taucherglocken und besonders die Steinkohlengruben bei Douchy, Depart. du Nord, und zu Châlone an der Loire in Frankreich, in welchen die Arbeiter unter einem Druck von 2 bis 4 Atmosphären arbeiten müssen. Durch eine Schleussenvorrichtung werden hier die Arbeiter beim Anfahren in nach und nach dichtere Luft gebracht. Die Aerzte T. J. J. Watelle und A. Guérard¹⁾ berichten, dass beim Anfahren der Arbeiter nie Unfälle vorgekommen seien, dass dieselben aber beim Verlassen der Gruben hier und da einträten. Die Section der plötzlich beim Herausgehen Verstorbenen hat nach ihrem Berichte nichts Abnormes gezeigt, als Blutfülle des Gehirns und der Lungen.

Untersuchungen über die Ursache des Todes der Thiere, welche einer schnellen Erniedrigung des Luftdruckes auf dem Recipienten der Luftpumpe ausgesetzt wurden, haben mir, wie ich glaube, genügenden Aufschluss über diesen plötzlichen Tod gegeben.

Als eigentliche Ursache des Todes dieser Thiere wird in den wenigen Bemerkungen, die ich über diesen Gegenstand in Handbüchern der Physiologie und Physik finde, der Mangel



Resultat, und zwischen 40 bis 50 Mm. Druck trat Tod ein. Bei der Oeffnung des Thorax und des Pericardium ohne weitere Gefässverletzung, als die der vasa intercostalia und mammaria, war durch die Wandungen der v. cavae und des rechten Vorhofs und Ventrikels mit grösster Deutlichkeit die Gegenwart eines reichlichen Volumens von Gas in diesen Gefässen zu erkennen, und dasselbe trat durch einen Einstich in Blasen hervor. Das rechte Herz war im Uebrigen gespannt mit Blut erfüllt.

Eine junge, etwa 3 Wochen alte Katze wurde auf den Recipienten unter eine tubulirte Glasglocke gebracht. In den Tubulus war eine Glasröhre eingesetzt, welche in eine feine Oeffnung auslief, so dass während des Auspumpens der Luft aus der Glocke durch diese feine Oeffnung fortdauernd neue Luft zuströmte, und zwar so viel, dass bei schnellem Evacuiren gerade ein Druck von 36 Mm. Quecksilber erhalten werden konnte.


Während bei den früheren Experimenten eine kleine über Quecksilber abgesperrte Luftsäule als Maass des Druckes gedient hatte, benutzte ich jetzt und zu den späteren Versuchen ein kleines Barometer, welches 140 Mm. Druck noch ablesen liess, und dessen Angaben genau geprüft waren. Die Temperatur der Katze in der Achselhöhle, 10 Min. lang gemessen, betrug 34° C. Beim schnellen Evacuiren wurde die Katze bald unruhig und suchte nach Luft. Bei 50 Mm. Druck Convulsionen und Ohnmacht, durch schnelles Zulassen von Luft beseitigt; sie erholte sich wieder vollständig. Als der Versuch wiederholt wurde, traten an dem beschriebenen Punkte dieselben Symptome ein, und ein Verweilen $\frac{1}{2}$ Min. lang auf einem Drucke von 40 Mm. liess die Katze nicht wieder aus der Ohnmacht bei Luftzutritt erwachen.

Bei der sogleich vorgenommenen Section fand sich etwa 0,3 Ccm. Luft in den vv. cavae, rechtem Vorhofe und Ventrikel schon durch die Wandungen hindurch deutlich zu erkennen. Einige Luftbläschen im linken Vorhofe. Grosse Venen und rechtes Herz gespannt mit Blut gefüllt, das linke Herz fast leer. Das Blut war noch vollkommen flüssig, die Arterien

contrahirten sich noch spontan, die Ventrikel nur auf Reizung. Lungen fast luftleer, gesund. Nirgends eine Gefässruptur zu finden. Das Gehirn anscheinend normal.

Zwei Schwalben, deren Verhalten einzeln untersucht wurde, zeigten ganz gleiche Erscheinungen; beide starben bei 120 bis 125 Mm. Druck binnen weniger Secunden. Vor dem Tode traten dieselben Symptome ein, wie bei den früheren Thieren. Sie sassen ruhig, öffneten zuweilen den Schnabel; bei etwa 130 Mm. traten erst Convulsionen ein. Bei beiden ergab die Section ein paar kleine Luftbläschen. Das rechte Herz sehr mit Blut überfüllt, des linke fast leer. So wie bei jenen Säugethieren, war das Blut des linken Herzens sehr hellroth, also noch sauerstoffhaltig.

Marchand überzeugte sich bereits, dass Frösche durch Erniedrigung des Luftdruckes nicht getödtet werden können. So wie bei den warmblütigen Thieren, wird durch Expansion der Darmgase der Darminhalt nach unten oder nach oben und unten entleert. In der Nähe des Kochpunktes der Flüssigkeiten ihres Körpers werden sie zuweilen unruhig und verfallen zum Theil in Ohnmacht. Beim weiteren Evacuiren schwillt bekanntlich ihr Körper durch Expansion des sich



gelassen ohne Nachtheil für das Thier, es war nachher eben so wohl, als vor dem Versuche.

Der Einfluss, welchen der Wechsel des Luftdruckes alles Uebrige gleichgesetzt hat, ist also für die drei Klassen von Thieren sehr verschieden.

1. Die Vögel sterben schon viel früher als der Kochpunkt des Blutes erreicht wird; die Säugethiere sterben bei einem den Kochpunkt des Blutes wenig übersteigenden Drucke, und die Amphibien sterben nicht beim Kochpunkte ihres Blutes.


2. Bei den warmblütigen Thieren entwickelt sich Gas innerhalb der Blutgefässe mit dem Blute bei schneller Erniedrigung des Luftdruckes. Bei Amphibien wurde dies nicht bemerkt.

Wenn es sich nun darum handelt, zu entscheiden, ob der Mangel an Sauerstoff oder die Entwicklung von Gas in den Blutgefässen die Ursache der Convulsionen, Ohnmacht und des Todes sei, ist allerdings nicht zu verkennen, dass der bei so geringem Druck in dem arteriellen Blute noch restirende Sauerstoff, an dessen Vorhandensein das Leben geknüpft ist, nur sehr gering sein kann und in kurzer Zeit gänzlich verbraucht werden muss. Dagegen fand sich aber das arterielle Blut bei den Sectionen jener Thiere noch ganz hellroth, besonders deutlich bei den Schwalben, während dieser Unterschied des venösen vom arteriellen Blute bei Tod durch Erstickung verschwindet.

Das bei der Katze im Herzen gefundene Gasvolumen betrug bei gewöhnlichem Luftdrucke 0,3 Ccm., bei einem Drucke von 40 Mm. Quecksilber würde dieses Gas 5,7 Ccm. Raum eingenommen haben, wenn die Gefässwandung der Expansion der Luft keinen Widerstand geleistet hätte. Dies Volumen übertrifft bei weitem das der Höhle des atrium und Ventrikels. Da der Druck des Blutes in den grossen Venenstämmen am geringsten ist, so musste hier zuerst Gas entwickelt werden, und so erhielt dann das Herz grösstentheils Gas anstatt Blut. Die Wirkung der Herzcontraction und der Gefässwiderstände, die Circulation, ist aber abhängig von der Incompressibilität der enthaltenen Flüssigkeit; wenigstens muss

die Geschwindigkeit der Bewegung des Blutes in den Arterien mit dem Zunehmen der Grösse der Elasticität der gepumpten Flüssigkeit abnehmen, da das Volumen der geförderten Flüssigkeit um so kleiner ausfällt, je stärker es comprimirt werden muss, um in die Arterien eingetrieben werden zu können.

Das Herz übt nun auf seinen Inhalt einen 100 Mm. übersteigenden Druck aus. Stand nun die Luft in den grossen Venenstämmen unter 50 Mm. Druck, so wird sie auf ein Drittel ihres Volumens comprimirt werden müssen, um in die Arterien eintreten zu können, und somit eine bedeutende Verlangsamung der Circulation hervorgerufen. Wenn nun auch diese Verlangsamung in Verbindung mit dem geringen Sauerstoffgehalte des Blutes und der Ungleichheit des Effectes vom rechten und linken Herzen den Tod zur Folge haben müssten, so könnte dies doch kein plötzlicher Tod sein. Dieser plötzlich eintretende Tod muss also Folge eines andern Umstandes sein und zwar ist das ohne Zweifel kein anderer, als die Verstopfung der Lungencapillaren durch Luftbläschen und hierdurch bedingtes Aufhören der Circulation. Das linke Herz pumpt sich und die Lungenvenen leer und erhält keine



und gesund. Hat jedoch Gerinnung des Blutes begonnen, oder ist die ausgeschiedene Quantität Gas zu bedeutend, als dass sie vom anliegenden Blute gleich wieder absorbiert werden könnte, so bleibt natürlich das Thier todt.

Das Blutkörperchen-arme Blut der Amphibien hat ohne Zweifel ein geringeres Absorptionsvermögen für Gase als das der Säugethiere und besonders der Vögel, und eine Hinderung der Circulation hat bei diesen Thieren nicht die plötzlichen Folgen als bei den warmblütigen Thieren. Lässt man durch langsames Evacuiren den Druck sich allmählig senken, so treten die Symptome des Sauerstoffmangels deutlich hervor als angestregtes Respiriren der Thiere.


War nun wirklich der verminderte Druck und nicht der Sauerstoffmangel die Todesursache, so war beim schnellen Hinzulassen von Wasserstoff statt atmosphärischer Luft eine kurze Erholung der Thiere wahrscheinlich.

Ein Meerschweinchen fiel beim schnellen Sinken des Luftdruckes bei etwa 80 Mm. Druck plötzlich in Convulsionen hin, es wurde jetzt Wasserstoff hinter die Glocke geleitet aus einem Gasometer; das Thier begann angestrengt zu athmen und lebte auf diese Weise etwa noch 2 Minuten. Ein junges Meerschweinchen fiel bei 77 Mm. in Convulsionen um; es wurde reines Sauerstoffgas hinzuströmen gelassen; es erholte sich vollständig, fiel aber beim schnellen Evacuiren genau bei 75 Mm. um, erholte sich wieder beim 2ten Einströmen von Sauerstoff, fiel beim 3ten Evacuiren wieder bei 75 Mm. Druck um; es wurde jetzt atmosphärische Luft zugelassen, und als es sich wieder erholt hatte, wieder schnell evacuirt bis 75 Mm. Druck, wo es ebenso in Ohnmacht fiel, aber durch wieder einströmende Luft gerettet wurde.

Das erstere Meerschwein zeigte bei der Section keine Gasblasen im Blute; das venöse und arterielle Blut zeigten beide braunrothe Farbe, in den Lungen fanden sich braunrothe Flecke, welche entweder von ungleicher Blutvertheilung oder Capillärhämorrhagie herrührten; im Herzen und den grossen Venen viel Blut aber nicht in solch strotzender Fülle, als in den früheren Experimenten. Nach diesem Befunde ist ein-

leuchtend, dass der Tod dieses Thieres durch Mangel an Sauerstoff bedingt gewesen ist. Das Thier erholte sich bei der Herstellung des Luftdruckes durch Resorption der in den Gefässen entwickelten Luft; die Respiration, die wieder kräftiger eintrat, konnte jedoch nur das bewirken, dass der Wasserstoff eingeathmet den Sauerstoff des Blutes zum Theil austrieb und selbst an seiner Stelle vom Blute absorbirt wurde, soweit der im Blute enthaltene Sauerstoff nicht in dieser kurzen Frist von den Organen verbraucht war.

Bei dem jungen zweiten Meerschwein traten die Symptome plötzlicher Asphyxie bei demselben Barometerdrucke ein, mochte das Thier in Sauerstoff oder in atmosphärischer Luft sich befinden. Wenn man annimmt, dass bei 75 Mm. etwa $\frac{1}{10}$ der Luftmenge in der Glocke noch restirt, so würde sich das Thier beim 1sten Hinzulassen von Sauerstoffgas in 92 pCt. Sauerstoff haltender Luft befunden haben und beim 2ten Hinzulassen in 99 pCt. haltiger. Wenn die Menge des Sauerstoffes in einem bestimmten Volumen atmosphärischer Luft bei 75 Mm. Druck = 15,75 war, so hatte es in der 90 pCt. Sauerstoff haltender Luft in demselben Volumen 67,5 davon und das Thier würde bei diesem verminderten Drucke



den, so kann nicht der Sauerstoffmangel diese Asphyxie herbeigeführt haben, sondern die plötzliche Verminderung des Druckes, und man kann hiernach als erwiesen ansehen:

dass bei schneller und bedeutender Erniedrigung des Luftdruckes eine Entwicklung von Gas in den grossen Venenstämmen stattfindet, dass diese Gasblasen den Nutzeffect der Herzthätigkeit verringern, die Lungencapillaren verstopfen und somit unmittelbaren Tod durch Aufhebung der Circulation bedingen ohne weitere anatomische Läsion; dass jedoch eine bald folgende entsprechende Erhebung des Luftdruckes die Resorption des Gases, Wiederherstellung der Circulation und somit vollkommene Gesundheit zurückbringt.

Der Punkt, bei welchem die Entwicklung von Gasen im Blute stattfindet, wird bestimmt: durch die vorhergehende Grösse des Druckes, die Temperatur des Thieres und die Absorptionskraft oder Adhäsivkraft des Blutes für Gase, welche von dem Blutkörperchengehalt der Flüssigkeit abzuhängen scheint.

Das mit der Erniedrigung des Luftdruckes eintretende verringerte Absorptionsvermögen des Blutes für Sauerstoff mag nicht ohne Einfluss auf das Befinden von Menschen sein, welche hohe Berge besteigen. Die an sich anstrengende Arbeit des Steigens, noch vermehrt durch das geringere Haften der Gelenke erfordert bedeutenden Aufwand von Muskelthätigkeit; diese ist abhängig von der Sauerstoffzufuhr, da ohne diesen kein Stoffumsatz also keine Kraftentwicklung stattfinden kann. Hat nun das Blut geringeres Absorptionsvermögen für Sauerstoff, so wird es auch bei beschleunigter Circulation den Muskeln weniger Sauerstoff in jeder Zeiteinheit bieten können, als unter normalem Luftdrucke; es tritt also Mangel an Proviant, schnelle Ermüdung ein, welche durch kurze Rast gehoben ist, aber eben so schnell wieder erscheint.

Bei Erhöhung des Luftdruckes muss sich das Absorptionsvermögen des Blutes für Gase entsprechend steigern, das Blut enthält viel Sauerstoff, es tritt erhöhte Wärmeproduction,

Verringerung des in einer bestimmten Zeit geathmeten Luftvolumen etc. ein.

Die Angabe von Pravaz¹⁾, dass in sehr comprimierter Luft weniger Kohlensäure als bei gewöhnlichem Luftdrucke ausgehaucht würde, ist vielleicht aus dem geringen Luftvolumen erklärlich, mit dem er experimentirte. Für geringere Erhebungen des Luftdruckes giebt er constante allgemeine Intensitätsvergrößerung des Stoffwechsels an.

Wird jedoch nach einiger Zeit, welche ein Thier in einem erhöhten Luftdruck zugebracht hat, dieser Druck schnell erniedrigt, so dass die Lungenthätigkeit den Ueberschuss der Gase nicht entfernen kann, so muss Gas in den grossen Venenstämmen selbst sich entwickeln und die oben beschriebenen Symptome herbeiführen. So wird es sich mit den in jenen französischen Kohlengruben beobachteten plötzlichen Todesfällen ohne anatomische Läsion verhalten.

Ueber beobachtete Entwicklung von Gas in den Blutgefässen durch schnelle Veränderung des Luftdruckes habe ich, von Hrn. Prof. Haeser auf das Gütigste unterstützt, in der Litteratur keine Bemerkung finden können. Dagegen finden sich zahlreiche Fälle von plötzlichem Tode durch in die Ve-

unzuverlässig, indem die Section bei bereits vorgeschrittener Fäulniß unternommen wurde. Wenn auch diese Entwicklung durchaus nicht unmöglich erscheint, so würde sie doch nur dann stattfinden können, wenn plötzliche chemische Prozesse im Blute erregt werden könnten, die eine Gasentwicklung zur Folge haben. In den meisten dieser Fälle wird von Convulsionen kurz vor dem Tode nichts erwähnt; nur im Falle 10 von Popp und Herrich sind diese Symptome hervorgehoben.

Bemerkungen über das Antrum Pylori beim Menschen und einigen Thieren

von


Prof. Dr. Andr. Retzius.

Aus dem Schwedischen ¹⁾ übersetzt

von

Dr. FR. CREPLIN.

Viele Schriftsteller über Anatomie nehmen in die Beschreibung des menschlichen Magens einen Theil in der Nähe des Pförtners unter der Benennung Antrum Pylori (Pförtnerhöhle, Cul de sac pylorique) auf; Viele erwähnen ihn nicht, Andere seiner nur sehr flüchtig. Ich war lange mit Dissectionen menschlicher Leichname beschäftigt gewesen, ehe ich




der Ursprung des Namens sich auf Beobachtungen gründete, welche Aehnlichkeit mit meinen eigenen hätten, und ich nahm mir deshalb vor, jenem nachzuspüren. Ich fand dann, dass Cruveilhier (*Traité d'Anatomie descr.* T. III. pg. 281), welcher die Sache fast aus demselben Gesichtspunkte als ich selbst ansah, Willis diese Benennung zuschrieb, und auch, dass Haller (*Elem. Physiol.* T. VI. Lib. XIX. Sect. 1. § 3, *Ventriculi figura*) das Werk und die Stelle citirt, wo Willis sich des Namens bedient. Seines theils äussert jedoch Haller a. a. O. darüber: „non raro aliqua strictura quasi divisus“ (hier citirt er Morgagni und mehrere Fälle von Mägen, welche durch Stricturen getheilt gewesen), „maxime posterior, tum paulo cis pylorum, unde tunc antri aliqua imago nascitur (Willis), quam aliqui clarissimi viri nimis fecerunt.“

Das Werk von Willis, in welchem die Benennung Antrum Pylori vorkommt und ihren Ursprung zu haben scheint, ist seine *Pharmaceutica rationalis sive diatribe de medicamentorum operationibus in corpore humano etc.* Cap. II. Partium, intra quas medicamenta operari incipiunt, descriptio, usus et affectiones. Die, wie es mir scheint, wichtigste Stelle, welche den fraglichen Theil berührt, ist die, in welcher der Vf. von der Bestimmung des Pylorus redet, wo es heisst: „Pylori munus est, non tantum contenta affatim et simul in magna copia ad intestina transmittere (quod quidem in catharsi et diarrhoea frequenter facit), sed potius chylum satis confectum in sinum suum excipere, aliquamdiu continere et dein paulatim et per minutas portiones excernere. Enim vero hujus Antrum longum et capax quidem in ventriculo recessus et diverticulum esse videtur, in quod massae chylaceae portio magis elaborata et perfecta secedere et inibi manere queat, donec alia crudior et nuperius ingesta in ventriculo fundo plus digeratur“ etc. Man ersieht aus dieser und auch aus mehreren anderen Stellen in demselben Werke, dass Willis viel Gewicht auf diese Abtheilung des Magens gelegt hat.

Bei einer flüchtigen Betrachtung scheint der Magen des

Menschen ein ganz einfach gebauter, konischer Sack zu sein, aus dessen Form der Anatom nicht viel zu erlernen haben möge. Denkt man jedoch an die künstlichen Verrichtungen, welche dieser Sack sowohl bei den Thieren als beim Menschen auszuführen hat, und an die mehrfachen Abtheilungen und merkwürdigen Bildungsformen, die er bei einer grossen Anzahl von Thieren darbietet, ferner an mehrere schwer zu erklärende Verhältnisse während Gesundheit sowohl als Krankheit, so gelangt man bald zu der Ueberzeugung, dass in diesen dem Anscheine nach einfachen Bau sehr kunstreiche Anordnungen niedergelegt sein müssen. Es ist vorzüglich dies, was mich zu dem Wunsche veranlasst, hier dem fraglichen Theil eine grössere Aufmerksamkeit zuzuwenden.

So viel ich mich erinnern kann, hat kein Schriftsteller neuerer Zeiten den Pfortnertheil des Magens besser beschrieben, als Cruveilhier (a. a. O.). Nachdem er vom Pfortner selbst gehandelt hat, sagt er: „C'est au voisinage de ce rétrécissement (pylore), à un pouce environ, que l'estomac, se recourbant fortement sur lui-même, forme du côté de la grande



konische genannt werden kann, ist die, bei welcher die hier von Cruveilhier so benannten Ampullen (welche ich in unserer Sprache bubblorna [deutsch: Blasen, blasenartige Auftreibungen] genannt habe) sowohl, als deren Begrenzungen wenig ausgezeichnet sind und der Theil mehr konisch ist.

Fig. 1.





Fig. 1. stellt die kurze Form des Pfortnertheils beim Menschen vor. d* die tiefe Stricture im Arcus minor — d eine schwache Einbiegung im Arcus major links von der grossen Krümmung — e Einbiegung an der grössern Auftreibung ed* im Arcus minor — e* entsprechende Einbiegung im Arcus major — fe, fe* die kleine Abtheilung der Pars pylorica, zunächst dem Pylorus — ff die Pfortnerstricture — g die grosse Krümmung (le coude de l'estomac) — h der Anfang des Duodeni, fast flaschenförmig erweitert (Antrum duodeni mihi) — kk das Ligamentum pylori, vornehmlich von longitudinalen Muskelfasern gebildet.

In der ersten oder kürzern Form (Fig. 1.) ist der Pfortnertheil an der Basis ziemlich eben so breit vom Arcus minor an bis zum Arcus major, als er lang ist, hat zwei Auftreibungen gegen den A. minor (Fig. 1, fe, ed*) und meistens eine gegen den A. major hin (fe*), ausser der grossen Krümmung (Fig. 1, g). Die erste Auftreibung im A. minor wird nach dem dickern Ende zu von einer tiefen Stricture (d*), welche der genannten grossen Krümmung gerade gegenüber steht, „coude de l'estomac“, und am schmälern Ende von einer seichtern Stricture, welche sie von der andern, dem Pfortner zunächst liegenden Auftreibung trennt, begrenzt. Die Auftreibung im A. major ist vom „coude de l'estomac“ durch eine seichte Stricture abgesondert, die oft nur eine zur Hälfte rundum gehende Vertiefung ist; diese Auftreibung ist gemein-

hin etwas grösser, als die entsprechende am A. minor, und grenzt so wie sie an den eigentlichen Pförtner.


Dieser ganze Theil des Magens ist gewöhnlich mit einer sehr dicken Muskelhaut versehen. Es ist eigentlich die circulare Schicht der Muskelwand, welche dem Pförtnertheile seine überwiegende Dicke verleiht. Die äusseren, längslaufenden Muskelfasern liegen hier, beinahe wie am Kolon, zu Bändern angehäuft (Fig. 1, kk), einem an der vordern, einem an der hintern Seite. Diese Bänder sind jedoch nicht, wie beim Kolon, deutlich begrenzt, sondern nur dickere Ansammlungen von Muskelfaserbündeln, welche nach vorn und hinten dünner werden, um sich über den ganzen Umkreis auszubreiten. Diese Aehnlichkeit mit den Taeniae Valsalvae beim Kolon, zuerst, wie es scheint, von Helvetius (*Sur la digestion*) wahrgenommen, rief die jetzt abgeschaffte Benennung *Ligamenta pylori* hervor. Auch Winslow (*Exposition anatomique de la structure du corps humain*) hat ihnen seine Aufmerksamkeit geschenkt. Er äussert nämlich über sie: „Le long du milieu de chaque face latérale de la petite extrémité il y a une Bande tendineuse ou ligamenteuse large de trois ou quatre lignes, qui se ter-



zenden Theil untersucht und befunden, dass er, wie Winslow angedeutet hat, aus einem dünnen, sehnichten Gewebe in der Peritonealhaut besteht, welche hier mit Fasern von elastischem Gefüge reich versehen ist. Diese sehnartigen Bildung, welche beim Menschen so unbedeutend entwickelt ist und nicht selten fehlt, erhält doch dadurch eine grössere Wichtigkeit, dass sie stark ausgebildet bei mehreren Thieren vorkommt.

Im äussersten, gegen den Pförtner grenzenden Theile des Magens ist die Muskelhaut am allerdicksten; die längslaufenden Muskelfasern bilden hier wieder eine dichte, den ganzen Theil gleichmässig bekleidende Schicht, sowie am unteren Theile des Mastdarms. Dieser kleine Theil des Magens zunächst am Pförtner macht gleichsam eine kleine Abtheilung für sich aus und ist nach meiner Erfahrung derjenige, welcher am wenigsten zu fehlen pflegt.

Fig. 2.



Der Magen eines Weibes von mittleren Jahren, um die lange Form des Pförtnertheils beim Menschen zu zeigen. a Oesophagus — b Cardia — c Mitte des Magensackes — d die Stricturen am Anfange des Antrum pylori — e Antrum pylori — ff Pylorus — g Duodenum — h Antrum duodeni — ii Ansatzstelle des Omentum majus — k Ligamenta pylori.

In der langen Form (Fig. 2.) sieht diese Abtheilung des Magens wie ein Darm aus und wird bisweilen irrig für einen Theil des Duodenums gehalten. (In mehreren, mir zur Untersuchung übersendeten Mägen war sie weggeschnitten.) Sie kommt am meisten bei Weibern vor. Sie hat mehrentheils nur eine Auftreibung am Arcus minor (fd), dagegen aber zwei am A. major, deren hintere die durch eine deutlichere Stricture (d) vom übrigen Theile des Magens gesonderte grosse Krümmung ist.

In der dritten oder konischen Form ist gewöhnlich die grosse Krümmung gleichsam näher an den Pförtner gerückt und die grössere Auftreibung im A. minor klein. Die übrigen beiden, dem Pförtner zunächst liegenden Auftreibungen sind klein, besonders die im A. minor, und die kleine, dem Pförtner zunächst liegende Abtheilung mehr ausgezeichnet, als bei den vorigen Formen.

Beim neugeborenen Kinde, dessen Magen mehr gerundet ist, habe ich diese Auftreibungen oder Stricturen nicht gesehen. Aber hier ist doch der dem Pförtner zunächst liegende Theil des Antrum zu einer kurzen cylindrischen Röhre von etwa 1 Centim. Länge mit dicken Wänden ausgebildet,





Fig. 3.



Der Magen von *Ursus arctos*. kk. die starke Magensehne.

Der Magen eines Bären (*Ursus arctos*), welchen ich im verwichenen Sommer zu untersuchen bekam, zeigte die oben angeführte Sehne sehr stark entwickelt (Fig. 3, kk). Die tiefe Stricture ist von diesen Sehnen so zusammengezogen, dass die beiden Seitenwände derselben fast an einander liegen und dass somit eine tiefe Grube gebildet wird. Die kleine dem Pförtner zunächst liegende Abtheilung ist ausgezeichnet und mit besonders dicken Wänden ausgerüstet. Beim Uebergange des Magens in das Duodenum findet sich keine Valvel, kein eigner Sphincter pylori; dagegen ist hier, eine kleine Strecke hinter dieser Stelle, die Muskelwand in einer Ausdehnung von 3 Decimetern über $1\frac{1}{2}$ Decimeter dick. Diese Dicke wird fast ganz und gar von circulären Muskelfasern gebildet, welche zu mehreren Schichten mit dicken Bindegewebscheiden verbunden sind. Ungeachtet dieser Dicke ist gerade hier, an der Innenseite des A. major, gleich innen vor der Stelle, an welcher sich der Magensack endigt, eine tiefe Grube, einem kleinen Teiche gleichend. Diese kleine

Grube, welche auswendig kaum bemerkt wird, ist hier an der Innenseite im A. major fast so gross wie eine Wallnuss und hat dünnere Muskelwände; um ihren Rand gehen Cirkel von Fleischfasern. Der vordere Rand dieser Grube kann als eine halbmondförmige Klappe bildend betrachtet werden, welche auf ihre Weise der Valvula pylori entsprechen dürfte. Die längslaufenden Muskelfasern, welche aussen um die circulären gehen, machen nur eine dünne Schicht aus. — Die Drüsenhaut in dieser Gegend hat ausgezeichnet grosse, netzförmige Gruben, deren Scheidewände in lange, schmale Zotten (*Plicae villosae*) auslaufen. Die Dicke derselben Drüsenhaut, welche für ungefähr der Tiefe der röhrenförmigen Drüsen gleich erachtet werden kann, beträgt nahe 2 Millimeter. Die Drüsen selbst sind hier nach den Enden hin sehr getheilt; die blinden Enden sind kolbenförmig. Im übrigen Theile des Magensackes fehlen die *Plicae villosae*; die Röhrendrüsen sind viel feiner, kürzer und in Bündel geordnet. — Der Uebergang in das Duodenum wird, wie eben erwähnt ward, durch keine Klappe oder Schliessmuskel bezeichnet; doch ist eine deutliche Grenze in der Drüsenhaut sichtbar, an welcher die netzförmigen Gruben aufhören. Aussen an

Stelle, etwas nach innen vom Pförtner, an welcher die circuläre Muskelschicht dicker und 1 Centim. breit ist.

Beim Hunde kommen zwei ganz eben solche Sehnen über der tiefen Stricture im A. minor, zwischen dem Pförtnertheil und dem übrigen Magensacke vor; dieselbe Bildung findet sich vermuthlich auch bei mehreren anderen Raubthiergattungen.

Beim Seehund ist das Antrum pylori besonders gross, merkwürdig und aufs Deutlichste bestimmt, aber sehr einfach. Die einzige von mir untersuchte Art ist *Phoca annellata* Nilss.

Fig. 4.



Der Magen von *Phoca annellata* N. a Oesophagus — b Cardia — c Corpus ventriculi — d grosse Krümmung des Magensackes — d* die der Krümmung entsprechende tiefe Stricture — f Uebergang des Magens in das Duodenum — g Duodenum — k die Pförtnerhöhlung mit dicken Muskelwänden.

Der Magen ist hier durch eine constant engere Stelle zwischen der grossen Stricture und der grossen Krümmung deutlich in zwei Theile getheilt. Der grosse Theil des Blindsackes tritt als ein kurzer, abgestutzter Kegel in den Oesophagus ein, dessen Längsfalten hier endigen (b). Der grosse Blindsack ist unbedeutend. Die Drüsenhaut bildet nur Quer-, keine Längsfalten. Diese Falten sind in der Pförtner-Abtheilung sehr klein. Diese (Antrum pylori) hat dickere Muskelwände, als der übrige Theil. Die grosse Dicke rührt von


den Ringmuskelfasern her. Eine Valvula pylori ist nicht vorhanden; aber die Ringmuskelschicht ist vorzugsweise dick an der Stelle, an welcher diese Klappe sonst vorkommt. Im Uebergange des Magensacks in das Duodenum befindet sich eine kleine Grube, wie beim Bären, dem Hunde und der Katze. Die vor dieser stehende Strictur ist das Einzige, was einer Valvula pylori entspricht.

Ligamenta pylorica, wie beim Hunde und Bären, scheinen nicht vorzukommen. Die Längsfasern sind, wie es scheint, gleichmässig ausgebreitet; aber unter dem Peritoneum liegt eine glänzende Fascia, welche, wie bei der Katze, weit ausgebreitet ist.

Für diesen Pförtnertheil passt, wie für den mehrerer anderer Raubthiere, Duvernoy's Benennung, „Boyau pylo-rique“ ganz gut.

Im vergangenen Winter, in welchem unsere Märkte reichlich mit Hasen versehen waren, benutzte ich die Gelegenheit, den Magen dieser Thiere zu untersuchen und machte dabei einige, wie mich dünkt, bemerkenswerthe Beobachtungen hinsichtlich des Pylorustheils.

Fig. 5.



Die oben vom Bären beschriebene Sehne ist beim Hasen gerundet vierkantig, sehr deutlich, etwas an die Sehne im Vogelmagen erinnernd (k). Die grosse Krümmung des A. major (Coude de l'estomac) ist wenig vorspringend, nach beiden Seiten hin begrenzt. Die in den vorhergehenden Raubthiermägen tiefe Stricture (d), welche ihr (der Krümmung) im A. major entspricht, ist wenig ausgezeichnet. Auch die darauf folgende (e), welche an die kleine Abtheilung zunächst dem Pfortner gränzt, ist auswendig wenig ausgezeichnet, springt aber in die Höhlung des Magens als eine Falte vor, deren beide Lamellen mit einander beinahe verwachsen sind. Diese Falte ist, mitten unter dem A. minor, 1 Cent. breit. Auch im A. major erscheint oft eine bedeutende Querfalte von Binde- und Schleimhaut in der Innenseite des Hasenmagens. Zwischen d und e im A. minor ist nur eine kleine Auftreibung; die zwischen e und dem Pfortner, f, ist dagegen sehr gross und fest. Die kleine Abtheilung des Antrum pylori, welche innerhalb dieser Auftreibung liegt, ist beim Hasen besonders ausgezeichnet. Wenn der Magen noch frisch ist, so hat diese kleine Abtheilung (ffe) eine eigene, von der im Uebrigen verschiedene, dunkelrothe Farbe, ist an allen Seiten gerundet und sehr dünnwandig. Die Drüsenhaut in diesem Theile hat ausserordentlich grosse Netzgruben und grobe Villositäten; – die Röhrendrüsen sind auch länger und gröber, als in der grossen Cavität des Magensacks. Auch hier ist es die circuläre Muskelfaserschicht, welche dem Theile seine Gestalt und sein eigenes Ansehen verleiht. Sie liegt hier wie ein Gürtel von etwa $2\frac{1}{2}$ Cent. Ausdehnung, von der Stricture bis zur Gränze des Duodenum, und in der Nähe des letztern hat sie beinahe 2 Millim. Dicke. Die aussen liegenden längslaufenden Muskelfasern umgeben die Röhre vollständig. Auch hier besteht die Valvula pylori nur aus einer halbmondförmigen Falte, welche an derselben Seite, wie der A. major, liegt. Es ist deutlich, dass dieser kleine muskulöse Theil demselben zusammengezogenen Theil entspricht, welcher bei den Raubthieren die kleine Pfortnerhöhle ausmacht. Dass er derjenige Theil des Magens ist, in welchem die Thätigkeit in der Verdauung

größerer, holzartiger vegetabilischer Theile am grössten ist, davon habe ich mehrere Male mich überzeugt, wenn ich eben getödtete Winter-Hasen öffnete, deren Magen voll von zerkauteu Zweigen war.

Beim *Tümmeler*, *Delphinus Phocaena*, macht der Pfortnertheil den von Cuvier (Leç. d'Anat. comp., T. III, 1ste Ausg.) s. g. dritten Magen aus, wogegen der vierte Magen ein Theil des Zwölffingerdarms ist.

Fig. 6.



Magen von *Delphinus phocaena*. aa Oesophagus — bbb
erster Magen — cc Drüsenmagen — dd Pylorus-Magen oder An-

haben müsse, und ihn Antrum oder Atrium duodeni genannt. Der Anfang dieses Darmtheils ist nämlich, sowohl beim Menschen, als auch bei einem grossen Theile der Säugethiere, oft besonders gerundet, ermangelt an der Innenseite der Valvulae conniventes, hat kleine Villi, grosse Brunner'sche und Lieberkühn'sche Drüsen. Beim Tümmler ist diese Höhle so eigenthümlich, dass sie, wie eben erwähnt, für eine Abtheilung des Magens gehalten wurde.

Ich schliesse für dies Mal diese Betrachtungen über das Antrum pylori mit der Bemerkung, dass dasselbe an den Muskelmagen der Vögel erinnert, welcher meiner Ueberzeugung nach nichts Anderes, als ein kunstvoll ausgebildetes Antrum pylori ist. Im Vorhergehenden ist bereits angedeutet, dass die hier bemeldeten Sehnen wahrscheinlich dieselbe Bildung seien, wie die bekannte Sehne am Magen der Vögel; dass diese Sehnenbildung bei den Krokodilen vorkommt, ist lange bekannt; dass sie auch am Magen des Silurus Glanis und wahrscheinlich bei mehreren Fischen Statt finde, habe ich bei einer andern Gelegenheit zu zeigen gesucht. (S. Förhandl. vid de Skand. Naturforskarnes 3dje möte, i Stockholm 1842, p. 695: „Om Magens byggnad hos slägtet Silurus“ [deutsch in der Isis v. J. 1845, S. 455.]) -- Sie findet sich sonach in allen vier Ordnungen der Rückgrathsthiere, obzwar allgemein nur bei den Vögeln.


Beiträge zur vergleichenden Histiologie der Milz.

Von

Dr. THEODOR BILLROTH.

(Hierzu Taf. III.)

Es ist zu verwundern, dass die vergleichende Histiologie der Milz nicht schon früher von Anatomen und Physiologen mit grösserer Energie angegriffen ist; man ist sich lange klar, dass dies Organ mit der Blutbildung im innigsten Zusammenhange stehe, und es scheint nahe zu liegen, dass dieser Connex wahrscheinlich bei niedern Wirbeltbieren leichter aufzufinden ist, als grade beim Menschen, auf dessen Milz bis in die neueste Zeit sich die grössere Anzahl von Forschungen concentrirt hat. Seitdem es ferner unzweifelhaft geworden, dass speciell die



stantes Vorkommen in allen von mir untersuchten Milzen für ihre wichtige Bedeutung sprach. Ich will zunächst die Resultate meiner Beobachtungen hinsetzen, indem sich daran die früheren Ansichten bequemer und kürzer anschliessen lassen. —

Amphibien.


Untersucht man die Milz von Fröschen und Salamandern frisch, so findet man wenig Erfrenliches: feine körnige Molekularmasse, weisse und rothe Blutkörperchen, Gefässe, zuweilen feinste dünne Fasern netzartig verbunden; Essigsäurezusatz macht auch diese Elemente völlig unklar.

Legt man frische Froschmilzen in Liq. Ferri sesquichlorati (ein Reagens welches, so weit mir bekannt, zuerst von Führer für die Untersuchung der Milz empfohlen wurde) und verdünnt denselben so, dass die Flüssigkeit ungefähr die Farbe von Madeira oder Malaga hat, so findet man das Präparat schon nach 1–2 Stunden zur Untersuchung geeignet; doch kann man dasselbe auch viele Tage in dem genannten Reagens liegen lassen, sogar Monate lang darin conserviren. Die Milz wird dunkelbraunroth und zeigt auf dem Durchschnitt eine Menge kleiner, grauer, unregelmässiger Stellen: die weissen Milzkörper. Die Consistenz darf nicht zu fest sein, da das Gewebe sonst bröcklig wird, doch muss das Präparat fest genug sein, um feine Schnitte machen zu können. Man wird an solchen Milzen alle zelligen Elemente, besonders auch die Blutkörperchen wohl erhalten finden, nur etwas zusammengeschrunpft. Folgende Struktur ist jetzt leicht zu erkennen: die rothe Milzpulpe besteht aus einem feinen cavernösen Netzwerk mit Maschen von 0,012–0,016 Mm. Durchmesser (Fig. 1. A.); in diesen Maschen liegen vorwiegend rothe Blutkörperchen, die sich jedoch herausdrängen lassen, so dass man erkennt, dass die Fäden des Netzes theils sehr fein sind, theils etwas breit und flach, zuweilen wie feinste unterbrochene Membranen. Die Knotenpunkte der Fasern sind ziemlich dick und enthalten gewöhnlich einen ovalen mit 2–4 und mehren Kernkörperchen gefüllten Kern; andere Knotenpunkte sind dünn, nur durch den Zusammenstoss der Fäden

gebildet. Setzt man dem Präparate einen Tropfen sehr verdünnter Essigsäure zu, und wartet nun ab, bis die Blutkörperchen aufquellen und ihre Farbe verlieren, so ist das Gewebe so erweicht, dass es sich aus einander drücken lässt; hiebei trennen sich die Balken des Netzwerks und zwar so, dass die Knotenpunkte mit den Kernen jetzt als isolirte sternförmige Zellen mit mehr oder weniger vielen und langen feinen Fortsätzen erscheinen und frei herumschwimmen (Fig. 1. B.).

Was die schon mit freiem Auge als Milzbläschen erkann-
ten graulichen Stellen betrifft, so sind dies unbegrenzte, unregelmässig ästige den Arterien anliegende Parthieen, in welchen die rothen Blutkörperchen fehlen und durch weisse ersetzt sind; sie sind jedoch im Wesentlichen ebenso gebaut wie die rothe Pulpe; nur die Maschen des cavernösen Gewebes sind wenigstens um die Hälfte enger, die Kerne in den Knotenpunkten kleiner, die Fortsätze der isolirten Sternzellen kürzer.

Diese Struktur kann nicht als ein Kunstprodukt angesehen werden, die feinen Fasern und Kerne der Knotenpunkte sind alle so exact in ihren Contouren, dass sie nicht durch Gerinnung entstanden sein können.



dabei nicht nur nicht ausgedehnt, sondern stark comprimirt, mit Ausnahme der in ihnen verlaufenden Blutgefässe.

Während die Milz beim Frosch stets eine runde Form hat, so ist die des Wassersalamander lang und platt; an den Liq. Ferri-Präparaten erkennt man auf Durchschnitten leicht die Milzbläschen theils als runde Körnchen, theils als unregelmässig geformte grauliche Masse, welche reichlich die Hälfte des Parenchyms einnimmt. Feine Abschnitte durch verdünnte Essigsäure etwas erweicht zeigen das cavernöse Netz der Milzpulpe mit eminenter Klarheit; die Maschen sind hier grösser als beim Frosch (Fig. 2. A.); sie haben einen mittleren Durchmesser von 0,02–0,025 Mm. Ich empfehle dies Object besonders denjenigen, welche sich von der Existenz dieses Netzwerkes rasch überzeugen wollen. Die Kerne in den Knotenpunkten sind nicht so häufig wie in der Froschmilz, die durch Druck sich lösenden Sternzellen mit sehr langen Fortsätzen versehen (Fig. 2. B.). An einem leidlich gelungenen Injectionspräparat sah ich die Maschen von 0,05–0,1 Mm. Die Milzbläschen haben auch hier keine Membran, wenngleich sie sich ziemlich scharf von der rothen Milzpulpe abgränzen; ihr Maschenwerk ist enger, doch übrigens ebenso wie das der übrigen Milz (Fig. 2. A. a.).


Von besonderer Wichtigkeit war es nun, das Verhältniss der Gefässe, besonders der Blutcapillaren zu dem cavernösen Maschenwerk zu ermitteln; dass sie sich in dasselbe öffnen mussten, lag auf der Hand, da, wie oben bemerkt, einerseits die rothen Blutkörper überall zwischen dem Balkennetz liegen, und letzteres sich von den Blutgefässen aus injiciren lässt. Wir pretendirten daher zu sehen, wie und wo die Oeffnungen in den Capillaren liegen möchten. Dies ist uns nicht ganz nach Wunsch gelungen, wenngleich es keinem Zweifel unterliegt, dass auch dies zu Tage kommen muss, wenn ein Meister der Injection die Sache noch einmal in die Hand nähme. Ich sah die Auflösung der Capillaren in das cavernöse Netz selten besser als ich es in Fig. 1. A. a. dargestellt habe. Man konnte den Gefässcanal noch einige Zeit lang verfolgen, bis er sich

in dem Netzwerk verlör, ohne dass man den Rand der Capillargefässmembran, das Ende des Gefässrohrs sehen konnte.

Querschnitte mit Blutkörperchen strotzend gefüllter Gefässe sieht man an Liq. Ferri-Präparaten häufig, und erkennt daran mit Leichtigkeit, dass die feinen Balken des cavernösen Netzes mit der Gefässmembran unmittelbar im Zusammenhang stehen (Fig. 2. A. b.).

Dass die Arterienenden in das cavernöse Netz ausmünden, die Venenanfänge aus demselben entspringen, scheint mir zweifellos.

Weniger einfach ist die Sache mit der weissen Milzsubstanz und ihrem Verhältniss zu den Lymphgefässen. Letztere glaubt man oft genug zu sehen, d. h. man sieht ziemlich dicke, mit farblosen Zellen gefüllte Canäle mit äusserst dünner, zuweilen kernhaltiger Membran; aus solchen bestehen nicht selten ganze Partien der weissen Substanz. Sieht man sich diese Cylinder genauer an, und sucht namentlich ihren Inhalt näher zu erforschen, so wird man gewahr, dass sie wiederum in ihrem Innern aus einem engmaschigen Fasernetz zusammengesetzt sind, und nicht selten in ihrer Achse ein Blutgefäss enthalten. Kurz es sind dies keine reinen Lymph-



suchung giebt sehr negative Resultate; wir wenden uns daher gleich zu den Liq. Ferri-Präparaten. Die Milzen der Eidechsen und der Natter, erstere länglich weiss graugelblich, letztere rund, enthalten fast ausschliesslich weisse Milzpulpe; trotzdem, wenn deutliche Gefässe zu erkennen, stellen sich diese immer als Blutgefässe dar; die Oberfläche zwar höckrig, die Schnittfläche fein körnig, doch aber die einzelnen Körnchen nicht von einer Membran umgeben. Ein sehr enges feines Maschenwerk, noch feiner wie die der weissen Milzpulpe beim Salamander, ist ohne Schwierigkeit darstellbar, auch die einzelnen Sternzellen leicht isolirbar, doch aber das Ganze nur erst leichter verständlich, wenn man an oben beschriebenen Objecten sich überzeugt hat. — Injectionspräparate habe ich leider nur von Fröschen und Salamandern machen können; es mangelte mir an Zeit bei jedesmal zugegangenem Material, so wie an den gehörigen Apparaten.

Die Milz einer einheimischen Schildkröte war dick rundlichoval, zeigte auf dem Durchschnitt eine Menge verschieden geformter weisser Körper, die weisse und rothe Milzpulpe un ungefähr zu gleichen Theilen. Das Netzwerk schön ausgebildet, in Bezug auf Durchmesser der Maschen zwischen Frosch und Eidechse; in Bezug auf das Verhältniss der weissen Milzsubstanz zu den Gefässen schienen noch besondere Verhältnisse obzuwalten, deren Ermittlung mir nicht gelungen ist; jedenfalls zu weiteren Untersuchungen zu empfehlen.

Die Milz der Kröten enthält vorwiegend rothe Milzpulpe, ist aber meist so klein, dass sie wenig zu diesen Untersuchungen geeignet ist; das cavernöse Netz habe ich nicht allein an Milzen ausgewachsener Thiere, sondern auch von Larven mit hintern Extremitäten sehr deutlich gesehen; es ist sehr eng. —

Nur bis auf die besprochenen Strukturverhältnisse traue ich den künstlichen Präparaten; die darauf sich gründenden physiologischen Hypothesen will ich am Schluss zusammenfassen. Dass bis so weit die angewandte Methode nicht irre leitet, davon hoffe ich, wird sich jeder überzeugen, der es

will; dass natürlich ein Präparat besser ausfällt wie das andere, dass man eine Uebung in den richtigen Mischungsverhältnissen für verschieden grosse Milzen gewinnt, und nicht die ersten Objecte so ausfallen wie ich sie gezeichnet habe, brauche ich wohl kaum zu erwähnen.

Fische.

Die Milz des Karpfen, Schlei, Plötzen, Hecht habe ich wiederholt untersucht; sie zeigen weder in ihrem äusseren Verhalten noch in ihren feineren Strukturverhältnissen sehr erhebliche Unterschiede, nur etwa dass die Milz beim Hecht eine mehr herzförmige Gestalt hat, während sich die der übrigen Fische mehr länglich, zuweilen gelappt (Karpfen) darstellt, und dass beim Karpfen und Schlei sich am häufigsten goldgelbe Pigmenthaufen, und Pigmentkörnchen in den Zellen finden. In keiner dieser Milzen fand ich eine Andeutung Malpighischer Körper mit freiem Auge sichtbar, wenngleich an den mikroskopischen Präparaten hie und da einzelne Stellen mit mehr weissen, andere mit ausschliesslich rothen Blutkörperchen sich vorfinden.

Das Auffinden des cavernösen Netzes ist hier zuweilen



schon erwähnt beim Frosch und Salamander, auch bei manchen Vögeln, wie weiter unten zu besprechen ist.

In den Milzbalken beim Schlei habe ich deutliche Muskelfaserzellen gesehen; isolirte Muskelfasern zeigen sich bei den Liq. Ferri-Präparaten häufig, wenn man dieselben etwas mit Säure unter dem Mikroskop manipulirt, doch stammen sie meist von den Gefässen.

Im Ganzen ist mir die Untersuchung der genannten Fischmilzen wenig lohnend erschienen.


Vögel.

Es sind unter den von mir untersuchten Vogelmilzen einige, welche eigenthümliche Verhältnisse darbieten, wie die Milz einiger Schnepfenarten, des Wasserhuhns und einer Ohreule. Im Allgemeinen zeichnen sich die Vogelmilzen dadurch aus, dass sie ausserordentlich deutliche rundlich abgegrenzte, dem freien Auge als deutliche weisse Körnchen erscheinende Milzkörperchen besitzen, und dass diese nicht selten vorwiegend die Substanz der Milz zusammensetzen.

Die Milz des Wasserhuhns ist ganz und gar durch und durch weissgelblich, enthält wenige und enge Blutgefässe. Das mikroskopische Präparat fällt, so wie es etwas zertheilt ist, auf durch dunkle, rundlich ovale, auch höchst unregelmässig biskuit-kleeblatt-förmig geformte Körper, welche in die übrige Milzsubstanz in Menge eingelagert sind, und mit Gefässen innig zusammenhängen. Erst nach längerer Manipulation durch Wegschwemmen der freien Zellen gelingt es diese Körper zu isoliren, selten jedoch so weit, dass man die Oberfläche der Körper frei sieht, meist hängt derselben eine Menge von Zellenmassen an (Fig. 3. a. b.). Der grösste Theil dieser Körper, besonders alle kleineren unregelmässig geformten, enthielt eine Menge feinsten Fettkörnchen, wogegen andere grössere runde völlig frei von Fett waren (Fig. 3. c.); der Durchmesser der ersteren betrug 0,05—0,08 Mm., der letzteren 0,1—0,3 Mm. Anfangs glaubte ich, dass diese beiden Arten von Körper von einander zu trennen seien, doch fanden sich so viele Mittelstufen und so viel Gradationen

des Fettgehalts, dass kein wesentlicher Unterschied zu sein scheint.

Die feinere Struktur dieser Körper anlangend, so bestehen sie aus Membran und Inhalt; die Membran erscheint zuweilen völlig strukturlos, zuweilen aber sehr deutlich feinfasrig und kernhaltig (Fig. 3. c.) Der Inhalt besteht aus kleinkernigen, fein granulirten, runden und verästelten Zellen. Die Gefässe gehen zum grössten Theil durch diese Körper hindurch, und verzweigen sich in denselben, so dass die Aeste aus den Körpern wieder hervortreten; man kann auch das Verhältniss so auffassen, dass die Körper um die Theilungsstellen der Gefässe liegen; nur in seltenen Fällen liegt das Gefäss dem Körper an, immer aber so, dass die Kapsel des letzteren mit der Gefässhaut innig zusammenhängt (Fig. 3. c.). Was die Gefässe selbst betrifft, so war ich sehr geneigt, sie für Lymphgefässe oder auch wohl für solide Milzbalken zu halten, bis ich mich jedoch überzeugte dass es Blutgefässe sind, da ich in ihnen oft genug die rothen Blutkörperchen sah; — es reissen diese Gefässe übrigens sehr leicht an ihren Ein- und Austrittsstellen ab, so dass es zuweilen den Anschein gewinnt, als wenn sie sich an der Innenfläche der



und setzten sich dann nicht selten sofort in eine daranliegende Kapsel fort. War die Umhüllungsmembran an einer Stelle geplatzt, so liess sich der Inhalt wenigleich schwierig herausdrücken, und dieser bestand aus denselben Elementen, wie der übrige Theil der Milz, die rothe oder weisse Milzpulpe; in welchem näheren Verhältniss das durchtretende Blutgefäss zu den Elementen des Inhalts stand, konnte ich nicht herausbringen. Die Milzpulpe bestand aus denselben Elementen, wie bei andern von mir untersuchten Vogelmilzen.

Bei der Taube ist die Milz hellroth länglich, die weisse Substanz überwiegend; bei der Krähe und Elster langgestreckt gross, mit dunkelrother Pulpe und vielen weissen Körperchen, ähnlich beim Kibitz; bei verschiedenen Finken- und Meisen-Arten klein, länglich, stets mit ausgezeichnet deutlichen weissen Körperchen ungefähr zu gleicher Masse mit der rothen Substanz.

Was nun die Milzsubstanz der letztgenannten Vögel, so wie die der ersteren ausser den beschriebenen Kapseln betrifft, so war an ihr mikroskopisch kein erheblicher Unterschied rother und weisser Pulpe aufzufinden; die ganze Masse bestand aus einem sehr feinen und sehr engen Netzwerk, das wieder durch isolirbare sternförmige Zellen zusammengesetzt war (Fig. 4. b), am meisten ähnlich dem gleichen Gewebe bei den Fischen, doch die Gefässe kaum so deutlich herauszufinden. Das schwarze Pigment in der Eulenmilz lag theils in den Sternzellen, theils in isolirten, schwarzen, unförmlichen Klumpen; ob dies normal oder pathologisch ist, weiss ich nicht zu sagen, da ich nur ein Exemplar zu untersuchen Gelegenheit hatte.

Kommen wir jetzt auf die Bedeutung der oben beschriebenen Kapseln um die Gefässe zurück, welche wir in der Milz der Eule, des Wasserhuhns und der Schnepfe fanden, so lag bei dem ersten Auffinden dieser Organe nahe, dass sie als kleinste Malpighi'sche Bläschen aufzufassen seien; wenn dies auch zum Theil richtig sein möchte, so entsprechen sie doch nicht völlig den genannten Organen bei den Säugethieren, da diese dort allein die weisse Milzsubstanz bilden,

während bei den Vögeln ausserdem noch eine grössere Menge davon vorhanden ist, und jedenfalls nur ein Complex dieser Kapseln ein mit freien Augen sichtbares Milzkörperchen darstellt; sie sind also nur als Theile der weissen Milzsubstanz zu betrachten. Dass sie um die Blutgefässe fest angeschlossen sind, und weder in sie hinein, noch aus ihnen heraus Lymphgefässe treten, lässt sich bei ihrer relativen Kleinheit leicht übersehen. Ihr Inneres scheint, den herausdrückbaren Sternzellen nach zu schliessen, ebenso construiert zu sein, wie die übrige Milzpulpe. Wie sollen nun die in ihnen liegenden weissen Blutkörperchen in den Kreislauf gelangen? Dass man die Kapseln einfach platzen lässt, wenn sie voll sind, scheint mir doch eine fast zu grob mechanische Anschauung; möglich wäre es, dass das durchtretende Blutgefäss Oeffnungen im Innern der Kapseln besitzt, durch welche die eventuell neu gebildeten Körperchen aus dem Follikel direct in den Blutkreislauf gelangen; dies ist nur eine Hypothese; ich habe Nichts gesehen, was diese Annahme nothwendig machte, und sehe mit Freuden einer besseren Aufklärung entgegen.

Dass die weisse Milzsubstanz der Frösche und Salaman-



Untersucht habe ich Milzen vom Maulwurf, von der Maus, Ratte, Fledermaus, vom Fuchs, Kaninchen, von der Katze, vom Menschen, alle zuerst frisch, dann an erhärteten Präparaten. Alle diese Milzen zeigten deutliche Malpighische Bläschen, theils mit unzweifelhafter Kapsel rund oder oval, theils ohne Kapsel als ästige weisse Stellen, um Theilungen der Gefässe abgelagerte weisse Milzpulpe; dies scheint mir auch beim Menschen vorzukommen; an menschlichen Milzen, wo die weissen Körper recht entwickelt sind, besonders bei solchen Individuen, die durch carcinöse Kachexie zu Grunde gegangen sind, habe ich die weisse Substanz sehr häufig in Form verästelter Figuren verbreitet gesehen, ausserdem aber auch runde Körper, letztere mit deutlicher, erstere mit höchst zweifelhafter Membran.


Allen diesen Milzen waren im Gegensatz zu denjenigen der übrigen Wirbelthiere die deutlichen Spindelzellen eigen, welche beim Menschen so lange schon bekannt sind und sich gefallen lassen mussten, bald diesem bald jenem Gewebe zugeordnet zu werden. — Nach den vorstehenden Mittheilungen ist man leicht geneigt, diese den sternförmigen Zellen bei den übrigen Wirbelthieren gleichzusetzen, und man würde nun ein Netz erwarten, welches aus jenen Spindelzellen zusammengesetzt ist, und damit würden wir dann mit den faktischen Beobachtungs-Resultaten übereinstimmen, welche Führer durch seine Untersuchungen an normalen und pathologischen menschlichen Milzen gewonnen hat. Was a priori dagegenspricht ist, dass bei der Grösse der betreffenden Zellen das Maschenwerk sehr weit sein müsste, und aus den vorstehenden Untersuchungen schon zu übersehen ist, dass die Weite dieses Maschenwerks im Allgemeinen dem Durchmesser der betreffenden Blutkörperchen adäquat ist.

Folgendes habe ich an einigen menschlichen Milzen, die mir im Ganzen noch am geeignetsten erscheinen, gesehen.

Die rothe Milzpulpe besteht aus einem Netzwerk feiner, blasser, sehr leicht zerstörbarer Fasern, die Maschen sind je nach dem Blutreichthum der Milz sehr verschieden gross im Durchschnitt von 0,01—0,009 Mm., also wenig grösser als

bei den Fischen. In den Knotenpunkten dieses Netzes sind sehr wenig Kerne enthalten (Fig. 6.); die stärkeren Balken werden durch die zuweilen leicht isolirbaren Spindelzellen mit dicken seitlich angehefteten oder in der Mitte liegenden Zellkörpern gebildet (Fig. 6.), diese Zellen setzen die mikroskopisch dickeren Balken des Netzes zusammen, und liegen hier meist dicht aneinander; sie bilden also nicht unmittelbar das feinste Maschenwerk der Milz, sondern dienen mehr als solidere Stützen desselben. Führer's Abbildungen halte ich für richtig, doch die körnige Zwischensubstanz, welche er abbildet, ist das zerfallene Netz feinsten Fasern, welches den gleichen cavernösen Netzen bei den übrigen Thieren entspricht.

Die Darstellung dieser Verhältnisse hat mir viel Mühe gemacht, und ich bilde mir daher ein, dass sie schwer ist. Für dieses feinste Netzwerk ist nämlich die Methode noch nicht vollkommen genug, es wäre eine bessere sehr wünschenswerth. Weiche Milzen, in denen die Spindelzellen sich leicht isoliren, eignen sich eben deshalb schlecht. Die Abbildung ist nach einem Präparat von der ziemlich derben Milz eines dreijährigen atrophischen Kindes genommen. Die Präparate



sind (Fig. 7.); sehr selten sieht man Zellen mit mehr Fortsätzen; es muss eine Methode gefunden werden, wo man diese Zellen auch als Sternzellen darstellen kann, wie bei den andern Wirbelthieren. Ueber den letzten Uebergang der Gefässe bleibt man im Unklaren; vielleicht kann auch hier Injection mit farbloser Leimlösung helfen bei geeigneten Milzen.

Die weisse Milzsubstanz ist im Wesentlichen ebenso construirt wie die rothe, und die Struktur hier wie in den Lymphdrüsen leichter zu erkennen; die Spindelzellen scheinen mir hier entschieden seltner zu sein, die Maschen grösser; letzteres kann zufällig sein, die Durchmesser der Maschen schwanken auch hier je nach Inhaltsmasse. Ueber das Verhältniss der Lymphgefässe habe ich keine neue Thatsachen beizubringen.


Resumé. Entwicklung der rothen Blutkörper. Hypothesen.

Fassen wir das Gesamtergebniss vorstehender Untersuchungen zusammen, so glauben wir durch dieselben nachgewiesen zu haben, dass das Parenchym der Milz aus einem feinen cavernösen Netzwerk besteht, in welches wahrscheinlich die Arterien schliesslich frei ausmünden, aus welchem die Venen entspringen; dies ist deshalb wahrscheinlich, weil man die Blutkörperchen zwischen diesem Netz vorfindet, und weil dasselbe von Venen und Arterien aus injicirbar ist.

Ein gleiches feines cavernöses Netz besteht in der weissen Milzsubstanz, welche bei den höheren Wirbelthieren, besonders den Säugethieren in den meisten Fällen von einer nachweisbaren Kapsel umgeben ist. Bei den Vögeln stehen diese Kapseln nicht mit Lymphgefässen in Verbindung. Bei den Amphibien ist die weisse Milzsubstanz nicht scharf von der rothen abgegränzt; auch bei manchen Fischen ist dies nicht der Fall (Leydig). —

In Betreff der älteren Litteratur ist Kölliker's histologische Bibel nachzusehen; ich berühre hier nur die neusten veröffentlichten Ansichten.


Bleiben wir bei den rein anatomischen Daten, die nicht streng genug von den physiologischen Deutungen zu trennen sind, stehen, so bestätigen dieselben in einiger Hinsicht die Beobachtungen Führer's (Arch. f. ph. Heilk. 1854. p. 149.), andererseits das Postulat Kölliker's (Gewebelehre 1855. p. 473): „Sollte die Darstellung, die ich vom Gefäßsysteme gegeben habe, sich nicht als zutreffend erweisen, was ich jedoch nicht glaube, so bliebe nichts anderes übrig als anzunehmen, dass in der Milz Capillaren und Venenanfänge nicht direct zusammenhängen, sondern frei in der Pulpa ausgehen und dass das Blut ohne bestimmte Bahnen ebenso durch diese sich bewegt, wie der Chylus nach den neuesten Erfahrungen durch die mit Zellen und Capillaren gefüllten Alveolen der Lymphdrüsen.“ Auf eine ähnliche anatomische Anschauung scheinen auch die Ansichten von Hlasek (Disquisit. de struct. lienis. Dorp. 1852.) hinauszuzielen, dessen Originalarbeit mir leider nicht zu Gebote stand. Ob aber wirklich in der Milz des Menschen und vieler Thiere gar keine Venenräume existiren (Kölliker l. c. p. 474) und der Zusammenhang von Venen und Arterien in ge-



Dass das cavernöse Netz Contractilität besitzt, ist nicht erwiesen (wenigstens nur bei sehr wenigen Thieren); dass seine Fasern sehr elastisch sind, geht aus den verschiedenen Durchmessern bei verschiedenen Individuen gleicher Art, so wie aus der Ausdehnbarkeit durch Injection hervor. Auf diese Elasticität wäre dann auch die rasche Volumenzunahme der Milz in pathologischen Fällen zu beziehen, dann eben nur durch stärkere Blutanhäufung (wie die Erection des Penis) bedingt.

Dass in der rothen Milzpulpe die rothen Blutkörperchen gebildet werden, wie die Lymphkörper in der Alveolarsubstanz der Lymphdrüsen, dürfte in dem Nachweis der gleichen Strukturverhältnisse eine neue Stütze gefunden haben, doch eine schwache, weil hier bei dem Verfolg von Zellenentwicklungsstadien künstliche Präparate völlig zu verwerfen sind; man verfährt in dieser Beziehung nicht sorgfältig genug; um einen neuen Beweis zu liefern, wie man sich bei solchen Präparaten täuschen kann, will ich hier einer Beobachtung episodisch erwähnen, die ich in Betreff der Blutkörperchen theilung gemacht habe. In meiner Abhandlung: Untersuchungen über die Entwicklung der Blutgefäße 1856. p. 7. habe ich erwähnt, dass ich eine Theilung der bereits im Kreislauf befindlichen Blutkörperchen nie mit Sicherheit habe nachweisen können, trotzdem dieselbe von Remak gesehen und von Kölliker bestätigt ist; ich glaubte mit Reichert, dass hier die Täuschung durch die Neigung der Blutkörperchen zusammenzukleben, entstanden sei. Herr Dr. Remak hatte die Güte mir mitzuthellen, dass er noch neuerdings diese Theilungsformen aufs Evidenteste an Natterembryonen gesehen habe, die er seit langer Zeit in chromsaurem Kali vortrefflich conservire. Ich konnte seine Ansicht über den Werth einer solchen Beobachtung nicht theilen, wenngleich ich jetzt zugeben muss, dass die Täuschung nicht durch das Zusammenkleben entstanden ist. Durch einen glücklichen Zufall erhielt ich ein Weibchen eines gefleckten Landsalamanders, welches viele ungefähr 4 Mm. lange Embryonen

bei sich trug. Die Blutkörperchen enthielten zum grossen Theil noch Dotterkugeln, wenngleich sie bereits schon gelblich gefärbt waren; andere waren jedoch vollständig ausgebildet. Nachdem ich einen Tropfen höchst verdünnter Essigsäure zugesetzt hatte, wie es Remak zur Darstellung der Kerne empfiehlt, und nach einiger Zeit das Object wieder ansah, fand ich die schönsten Theilungsformen vor, wie sie in Fig. 8 dargestellt sind. Ich war höchst überrascht durch diesen Befund und glaubte schon sehr voreilig einem Beobachter wie Remak entgegen getreten zu sein, bis ich bei Wiederholung dieser Untersuchungen aus den runden Formen auf Einwirkung des Reagens vor meinen Augen die genannten Theilungsformen entstehen sah; ich machte den gleichen Versuch mit chromsaurem Kali und erzielte denselben Erfolg; die Täuschung liegt hier also nicht am Zusammenkleben, sondern am Reagens; ich kann mir nun auch erklären, dass Herr Dr. Remak eine Theilung einer Blutzelle in 4 Zellen gesehen hat, wie ich es aus mündlicher Mittheilung erfahren habe. Die Veränderung der Blutkörperchen auf genannte Reagentien geht so vor sich, dass die Dotterkugeln sich mehr auf einen oder zwei Punkte concentriren




Dies ist eine Cardinalfrage für die Blutkörperchenbildung in der Milz, die, wenn sie dort vor sich geht, wahrscheinlich auf dieselbe Weise auftritt, wie im Embryo. Dies angenommen, würden wir für die Bildung der Blutkörperchen die weisse Milzsubstanz vollständig ausschliessen und letztere dem Lymphgefässsystem allein zuweisen können. — Für die Bildung der rothen Blutkörper in der Milz ist bisher wenig Positives anzuführen. Wenn bei Thieren mit ovalen Blutkörperchen, diese anfangs rund und mit grossem Kern auftreten, so würde dadurch die Untersuchung noch erschwert, da dann die Unterscheidung von den Lymphkörpern misslich werden kann. Ich glaube an Injectionspräparaten öfter rothe Blutkörper in den Zellen des cavernösen Netzwerks gesehen zu haben; an Liq. Ferri-Präparaten kommt dies auch vor sowohl in den Sternzellen, als in den Spindelzellen (Fig. 1. B. b. 2. B. b.); in Milzen von Hühnerembryonen vom 18—20sten Tage sah ich an frischen Präparaten mehrere Mal verästelte Zellen, deren Körper sich beim Schwimmen als geplatzte Hülsen darstellten, wo etwa das Blutkörperchen herausgefallen sein könnte; das Pigment in den Sternzellen des cavernösen Netzes möchte ich für nicht befreite und am Ort der Entstehung entartete Blutkörperchen halten. — Dies Alles kann und soll nichts Positives beweisen, wenngleich ich nicht läugnen will, dass es mir die moralische Ueberzeugung gegeben hat, dass aus dem cavernösen Netz als feinstem Gefässnetz die Blutkörperchen hervorgehen, vielleicht durch Sprossenbildung. Nur neue Untersuchungen durch alle Thierklassen, und Experimente können hier zum Ziele führen; die vergleichende Histologie hat die grösste Zukunft, sie wird hoffentlich in dieser Hinsicht mehr zu Tage fördern, als die Blutkörperchenzählungen und anderes modernes mathematisches Gebahren. —

Wenn normaler Weise die rothen Blutkörperchen in der rothen Milzpulpe gebildet werden, wo entstehen sie, wenn die Milz extirpiert wird? Nach Führer in den Abdominallymphdrüsen; diese Versuche sind gewiss zunächst wieder aufzunehmen; zugleich aber auch bei niedern Thieren, wie

von Moleschott bei Fröschen weiter zu verfolgen, wo keine Lymphdrüsen bekannt; ob dort andere Blutdrüsen vikariiren und in welcher Weise? Moleschott's Schlussfolgerungen sind so vielfach und von so gewichtigen Seiten angegriffen, dass ohne neue Untersuchungen kein Urtheil möglich.

In Betreff der weissen Milzsubstanz ist es zweifelhaft, ob die umkapselten Körper von den nicht streng begrenzten Theilen zu trennen sind; vorläufig liegt kein Grund dazu vor. Bei völlig analoger Struktur und Inhalt dieser Organe und der Alveolarsubstanz der Lymphdrüsen, scheint es zweifellos, dass auch in diesem Theil der Milz Lymphkörperchen gebildet werden. In einigen Vogelmilzen habe ich mit Bestimmtheit, wie erwähnt, geschlossene Follikel gesehen, die nur Blutgefässe durchtreten lassen, nicht mit Lymphgefässen in Verbindung stehen, und die Hypothese aufgestellt, dass die Elemente, aus diesen Follikeln durch Mündung der Gefässe innerhalb der Kapseln direct in den Kreislauf gelangen mögen; dann wäre die Nothwendigkeit eines Lymphgefässsystems nicht einzusehen; vielleicht fehlt ein solches bei vielen niedern Wirbelthieren und die s. g.



Excretionsdrüsen, besonders der Niere, wahrscheinlich auch der Leber, in abhängigem und innigstem Zusammenhange stehen; in dieser Hinsicht sind demnächst auch chemische Untersuchungen durch die gesammte Thierreihe erforderlich.

Auch die pathologische Histologie und Chemie muss hier weiter eingreifen, besonders sind Untersuchungen der Abdominallymphdrüsen bei Milzkrankheiten, zumal bei vermutheter Insufficienz der Milzthätigkeit aufzunehmen; demnächst genaue Harnanalysen bei Milzkrankheiten und Beachtung der Leberfunktion.

Ich veröffentliche diese Untersuchungen, wohl wissend, dass sie sehr unvollständig sind, doch in der Hoffnung, die Mussestunden, welche mir bei meiner praktisch chirurgischen Thätigkeit bleiben, nicht ohne Nutzen auf den besprochenen Gegenstand verwandt zu haben.

Berlin, im August 1856.

Wie ich aus neueren Versuchen ersehe, ist für die Milz der Säugethiere die langsame Erhärtung in dünner Chromsäure, und die Aufklärung der feinen Schnitte durch Glycerin besser als die oben erwähnte Untersuchungsmethode.

Berlin, im December 1856.

Erklärung der Abbildungen.

Vergrößerung ungefähr 500.

Fig. 1. A. Cavernöses Netz aus der Froschmilz durch Injection dargestellt. — B. Sternförmige Zellen dieses Netzes isolirt. —

Fig. 2. A. Cavernöses Netz aus der Salamandermilz. Liq. Ferri-Präparat. — B. Sternförmige Zellen dieses Netzes isolirt.

Fig. 3. a. b. c. Kapseln aus der Milz eines Wasserhuhns mit durchtretenden Blutgefässen. Liq. Ferri-Präparat mit nachträglichem Zusatz von verdünnter Essigsäure.

Fig. 4. a. Zusammengesetzte Kapsel aus der weissen Milzsubstanz einer Ohreule. b. cavernöses Netz aus derselben Milz. Präparat wie 3.


Fig. 5. Cavernöses Netz aus der Milz des Plötzen. Liq. Ferri Präparat.

Fig. 6. Cavernöses Nets aus der rothen Milzpulpe eines Kindes. Liq. Ferri-Präparat.

Fig. 7. Isolirte Spindeln aus einer sehr weichen menschlichen Milz. Liq. Ferri-Präparat.

Fig. 8. Blutkörperchen aus Salamanderembryonen nach Zusatz verdünnter Essigs., Theilungsformen simulirend.

Fig. 9. Verschiedene Entwicklungsstufen der Blutkörperchen aus denselben Embryonen ohne Zusatz. —



Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Neritina fluviatilis

von

EDOUARD CLAPARÈDE aus Genf.


(Hierzu Taf. IV – VIII.)

A. Anatomischer Theil.

Seit Cuvier seine klassischen Untersuchungen herausgegeben hatte, haben sich mit Ausnahme von Quoy und Gaimard, Souleyet, Leydig nur Wenige an die Anatomie der Ctenobranchier gemacht. Manche Gattungen unter diesen Mollusken wurden sogar ohne triftigen Grund hin und her geworfen, um bald zu den ächten Ctenobranchiern, bald zu den Scutibranchiern gezogen zu werden. Dieses betrifft namentlich die Gattungen *Turbo*, *Trochus*, *Dauphinula*, *Phasianella*, *Rotella*, welche nach Quoy und Gaimard's Angaben¹⁾ nicht getrennten Geschlechtes wie die genuinen Ctenobranchier, sondern Zwitter sein sollen, eine Angabe jedoch, welche auf keiner zuverlässigen Beobachtung zu fassen scheint, da diese Anatomen keine frischen Thiere, sondern bloss einige auf ihrer Weltumsegelung gesammelte Spiritusexemplare untersuchten. Man fühlt sich daher um so geneigter, einen von Quoy und Gaimard in der Deutung der inneren Organe begangenen Irrthum zu vermuthen, als sie bei jedem Individuum weibliche Geschlechtstheile er-

1) Voyage de la Corvette l'Astrolabe. Zoologie par Quoy et Gaimard. Tome III.

kannten, bei keinem einzigen aber selbst die geringsten Spuren eines männlichen Apparates entdecken konnten, eine Beobachtung, in Folge deren sie annahmen, dass genannte Gattungen, welche übrigens im Bau des Herzens eine gewisse Aehnlichkeit mit den Haliotiden, Fissurellen, Emarginulen u. s. w. darzubieten scheinen, den Scutibranchiaten anzureihen seien; welche bekanntlich von Cuvier für Zwitter erklärt wurden¹⁾. Seitdem wir aber durch die genauen und auf mikroskopischer Prüfung der Organe gestützten Untersuchungen verschiedener Anatomen, wie Rud. Wagner, Erdl, Milne Edwards, Lebert, Robin, erfahren haben, dass Cuvier's Angaben in Bezug auf die Geschlechter der Scutibranchiaten dadurch irrthümlich geworden sind, dass Cuvier sich mit einer makroskopischen Untersuchungsweise begnügte und selten andere Vergrößerungsgläser als eine gewöhnliche Lupe zu Hülfe nahm, so stehen die *Turbo*, *Trochus*, *Dauphinula*, und verwandten Gattungen vereinzelt da, und die Vermuthung dürfte wohl auftauchen, dass die von Quoy und Gaimard als weibliche Geschlechtstheile gedeuteten Organe, sich bei der mikroskopischen Prüfung des Inhaltes als wirklicher, weiblicher Apparat bei ge-



dass die hierher gehörigen Thiere getrennten Geschlechtes sind. Trotzdem aber scheint diese Beobachtung bis jetzt von vielen Malacologen übersehen worden, und die Annahme allmählig in die Wissenschaft eingedrungen zu sein, dass die Neriten hermaphroditisch sind. Noch im Jahre 1853 führt Philippi¹⁾ als Hauptunterschied zwischen Ctenobranchiaten und Scutibranchiaten an, dass letztere Zwitter sind, und er lässt dieselben aus den Haliotiden, Fissurellen, Emarginalen, Turbonen, Trochus und Neriten zusammengesetzt sein. Es war eigentlich kein Grund da, um die Neriten als hermaphroditisch anzusehen, da kein einziger Beobachter, so viel wir wissen, denselben Geschlechtsunterschiede mit Bestimmtheit abgesprochen hat. Der Ursprung des ganzen Irrthums scheint aus einer beiläufigen Bemerkung Souleyet's herzurühren²⁾, welcher meint, die Neriten hätten dem Anschein nach in dem anatomischen Bau viel mehr Aehnlichkeit mit den Turbonen und Trochus als mit den ächten Ctenobranchiaten. Dass eine solche Analogie wirklich existirt, erscheint höchst wahrscheinlich, um so mehr, als der zierliche, höchst zusammengesetzte Bau der Reibmembran bei *Neritina* eine grosse Aehnlichkeit in der Form und der Zusammensetzung mit demselben Organ bei *Trochus*, *Phasianella*, *Rotella* u. s. w. zeigt, wie ich aus Lovén's trefflichen Zeichnungen ersehe³⁾. Aber da die Neriten bestimmt getrennten Geschlechtes sind, so dürfte man in diesem Umstand einen neuen Grund finden, um daraus zu schliessen, nicht dass die Neritinen hermaphroditische Scutibranchiaten, sondern umgekehrt, dass alle Scutibranchiaten, deren geschlechtliche Verhältnisse noch zweifelhaft oder unerforscht sind, wahrscheinlich keine Zwitter sind⁴⁾.

1) Philippi. Handbuch der Malacozoologie. Halle 1853. p. 201.


2) Voyage autour du monde sur la corvette la Bonite. Zoologie par Rydoux et Souleyet. 1841. T. II. p. 587.

3) Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar. 1847. Tab. VI.

4) Gray hat eine kurze Anatomie der Gattung *Rotella* geliefert, (On the animal of *Rotella*. Annals and Mag. of nat. history.

Im vorigen Jahr erschien in Frankreich ein Werk von Moquin-Tandon¹⁾ über die Land- und Süsswassermolusken, worin auch eine kurze anatomische Beschreibung der *Neritina fluviatilis* zu finden ist. Leider hat der Verfasser zu oft die frühere Litteratur unberücksichtigt gelassen; und so auch hier, wo er Quoy und Gaimard's Untersuchungen ignorirt, und nicht zu ahnen scheint, dass Meinungsverschiedenheiten in Betreff der Geschlechtsverhältnisse bei den Neriten geherrscht haben.

Die Gattungen *Nerita* und *Neritina* sind so nahe verwandt, dass es wohl für Viele zweifelhaft erscheinen möchte, ob dieselben berechtigt sind als wirkliche Gattungen neben einander zu bestehen. Das mit grosser Mühe aufgetriebene Unterscheidungsmerkmal, die Zähnnchen nämlich, die sich bei den Neritinen, d. h. den süsswasserbewohnenden Species nicht finden sollen, fehlen auch bekanntlich bei vielen Seearten²⁾. Die Vermuthung lag also nahe, dass die Anatomie die vollkommenste Uebereinstimmung im inneren Bau der beiden fraglichen Gattungen nachweisen würde. Merkwürdiger Weise jedoch, weicht die anatomische Beschaffenheit der von Quoy und Gaimard im Voyage de l'Astrolabe untersuchten ächten



zergliederten Art, und die übrigen, d. h. die Neritinen mit unserer *Neritina* übereinstimmen sollten, mehr als gerechtfertigt erscheint.

Verschiedene Conchyliologen versuchten in der letzten Zeit die *Neritina fluviatilis* in mehrere Species zu zerspalteten und in derselben sogar zwölf bis dreizehn verschiedene Formen zu unterscheiden¹⁾, ein Versuch, den wir als einen gewagten bezeichnen möchten, so lange die aufgefundenen Unterschiede nur in geringen Gestaltverschiedenheiten oder in gewissen Abweichungen in der Zeichnung und Farbe der Schale bestehen. Moquin-Tandon's Beobachtungen aber, die ich erst als die meinigen beinahe zu Ende waren, kennen lernte, weichen in manchen Stellen, namentlich in Betreff des Verdauungskanales und ganz besonders des Nervensystemes so sehr von den weiter unten dargestellten Verhältnissen ab, dass man nothwendiger Weise, wenn sich die Angaben des französischen Anatomen bestätigen sollten, ganz verschiedene, früher unter dem alten Begriff *Neritina fluviatilis* verwechselte Species in der That unterscheiden müsste. Vorläufig aber wollen wir diese Speciesfrage dahin gestellt sein lassen.


Die von mir untersuchten Neritinen wurden ohne Ausnahme im Tegeler See zwei Meilen von Berlin gesammelt, wo sie auf Steinen und Holzpfählen in grosser Anzahl vorkommen. Sie gehören, wie überhaupt die in der Havel und in den Spree- und Havelseen vorkommenden Neritinen, — so weit es nur möglich gewesen ist, mich in diesem Wirrwarr von Species zurechtzufinden, der als ächte *Neritina fluviatilis* bezeichneten Form an, und wurden von Stein getreu abgebildet²⁾. Sie kriechen besonders gern auf den Schalen von *Tichogonia Chemnitzii* Fér. (*Dreissena polymorpha* Van Ben.) herum und scheinen ein zu ruhiges Wasser nicht

1) Recensement des Néritines de la France continentale par Recluz. Journ. d. Conchyl. 1852.

2) Friedrich Stein. Die lebenden Schnecken und Muscheln der Umgegend Berlins. Berlin 1850. Tab. III. fig. G

vertragen zu können, wesswegen sie wahrscheinlich in der Spree dicht bei Berlin, wo der Fluss sehr unrein ist und äusserst langsam fliesst, nicht vorkommen, während sie schon ein Paar Meilen oberhalb der Stadt (Dömmritzsee, Flackensee, Kalksee u. s. w.) und unterhalb derselben in der Havel ziemlich häufig gefunden werden. In der Gefangenschaft leben sie meistens, trotz eines häufigen Wechsels des Wassers nur eine sehr kurze Zeit. In den Seen sieht man, dass sie vorzugsweise die Stellen wählen, wo sie dem Wellenschlag ausgesetzt sind, und bleiben da ein wenig unterhalb der Wasserlinie, so dass sie beim Sturm leicht entblösst werden.

Eine genauere Beschreibung der anatomischen Verhältnisse bei *Neritina fluviatilis* möchte nach Moquin's Vorarbeiten wenigstens theilweise überflüssig erscheinen, aber wie gesagt weichen unsere Beobachtungen an manchen Stellen beträchtlich von einander ab, und ausserdem scheint Moquin-Tandon seine Zergliederung nach Cuvier'scher Art und Weise gemacht zu haben, so dass er im Allgemeinen die mikroskopische Prüfung der Organe vernachlässigte, wovon manche Irrthümer und Täuschungen entstanden sind. — Um das Thier unverletzt zum Seziren zu bekommen, erscheint




reiche Falten der häutigen Bedeckung derselben sich bilden, wodurch der ganze Fühler eine scheinbar gegliederte Beschaffenheit annimmt. Seitlich nach aussen gerichtet, trägt der Fühler das Auge auf einer besonderen, gesonderten Erhabenheit, die man als augentragenden Fortsatz, Ommatophor bezeichnen kann. Dieser Fortsatz flimmert ringsum bis auf den Scheitel, welcher der Bindehaut anderer Thiere entspricht und unbeflimmert ist. Nach Moquin-Tandon sollte der Fühler selbst auf seiner ganzen Oberfläche flimmern, nur wäre die Bewegung während der Zusammenziehung viel langsamer und träger, dennoch vermochten wir nicht bei wiederholter Untersuchung, dasselbe wahrzunehmen. Die äussere Hautfläche wurde immer zwar glatt und unbehaart, wohl aber mit spärlichen, längeren Stacheln oder Borsten besät gefunden, welche überall zerstreut, sich jedoch auf der äussersten Spitze zahlreicher zeigten (Fig. 8). Am meisten Aehnlichkeit schienen diese Gebilde mit der eigenthümlichen Bewaffnung zu haben, welche Max Schultze auf der Haut verschiedner Turbellarien (*Microstomeen*, *Macrostomum* u. s. w.) zuerst entdeckte. Es sind starre, spitzige Borsten, welche die Flimmercilien an Länge namhaft übertreffen, und manchmal an der Spitze wie zerfasert — ähnlich wie die oft zerfaserten Schleppfüsse bei Stylonychien — erscheinen. Diese Beschaffenheit führte auf die Vermuthung, ob nicht diese dicken, spitzen Borsten aus zusammengebackenen, dünneren Flimmercilien entstandene Truggebilde wären. Niemals aber konnte ein Bild gefunden werden, welches für diese Ansicht zu sprechen schien, und wir mussten daher annehmen, dass die mitunter zerzausten Spitzen gewisser Borsten irgend eine Verletzung erlitten hatten. Möglicherweise könnten diese Gebilde in einer gewissen Beziehung zu den Tastempfindungen stehen. Leydig¹⁾ führt im Embryonalleben der *Paludina vivipara* an, dass die Wimperhärchen am Fühler und vielleicht noch an anderen Hautgegenden stellenweise

1) Leydig. Ueber *Paludina vivipara*. Zeitschrift f. wiss. Zoologie. II. Band 1850. p. 151.

länger werden und wie auf Warzen stehen, was aber nur ein vorübergehender Zustand ist. Dies ist aber etwas ganz Anderes, denn während Leydig's längere Wimperhäärchen wahre Flimmercilien sind und in Uebereinstimmung mit dem übrigen Epithel schlagen, so sind die Borsten auf den Fühlern der Neritinen, für gewöhnlich wenigstens vollkommen starr und unbeweglich.


Der Mantel ist schwarz und färbt leicht beim Anfassen ab. Moquin-Tandon '1) bemerkt einfach in Bezug auf denselben, dass dessen Farbe einförmig kohlschwarz, ohne irgend einen Fleck oder Punkt ist. Indessen besteht, wie es von selbst verständlich ist, dieser gefärbte Ueberzug aus einem regelmässigen Pigmentpflaster. Das auf der freien Hautfläche des Thieres vorhandene Flimmerepithel wird nämlich an dem der Schale dicht anliegenden, schwarz gefärbten Manteltheil durch ein nicht flimmerndes Pflasterepithel ersetzt, dessen 0,0065 bis 0,013 Mm. breite Zellen, von den Pigmentkörnchen oft so angefüllt sind, dass weder die Zellkerne noch die Zellwände sichtbar sind. An den meisten Stellen jedoch erscheinen die Grenzen der vieleckigen Zellen als helle, durchsichtige, ein helles Netz bildende Linien, und hie und da



indem sie einen Durchmesser von 0,0039 bis 0,0052 Mm. nicht übertreffen, und es konnte kein Kern darin nachgewiesen werden. Das Epidermispflaster macht daher den Eindruck eines zierlichen Balkennetzes, um so mehr, als die Zellwände eine beträchtliche Dicke besitzen. — Zur Unterscheidung der Art und Weise, wie der Kalk in der Schale eingelagert ist, wurden Schliffe in mehrfachen Richtungen gemacht. Bei den Schliffen, die so weit wie möglich der Schale tangentiell geführt wurden (s. Fig. 5), kamen einander parallele Streifen zum Vorschein, welche dem Durchschnitt eben so vieler Zuwachsschichten entsprechen. Dieselben sind natürlich bald breiter, bald schmaler, je nachdem der Schliff die Schichten in einer mehr oder weniger schiefen Richtung traf. Die dünnsten Streifen, also diejenigen, wobei der Schliff sich am meisten der senkrechten Ebene näherte, besaßen noch immer eine Dicke von etwa 0,013 Mm. Diese Streifen sind meistens am Rande etwas gezackt, was wohl einfach daher rühren mag, dass beim Schleifen bald hier bald dort, etwas mehr von dem ungemein dünnen Rande weggenommen wurde, womit sich jede Schicht, in Folge der grösseren Neigung der Schliffebene, auf die nächstfolgende stützt. Eine helle Schicht alternirt stets regelmässig mit einer dunkleren, eine Erscheinung, welche einfach in einer überaus feinen Streifung ihren Grund hat, womit diese Schichtendurchschnitte ausgezeichnet sind, und deren Richtung in jeder Schicht immer eine andere als in der nächstfolgenden ist. Dadurch wird natürlich die Menge der durchgehenden Lichtstrahlen in jeder Schicht eine verschiedene. Die Richtung der parallelen Streifung ist in allen dunklen Schichten dieselbe und wiederum in allen hellen, so dass die Streifen der dunklern Schichten mit denjenigen der helleren immer denselben Winkel bilden. Die Streifung ist ohne Zweifel der optische Ausdruck sehr feiner, die Anwachsschichten zusammensetzender, und schräg gegen die Ebene derselben verlaufender Lamellen. Es tritt dieselbe nicht sehr leicht hervor und ist überhaupt nur bei sehr starken Vergrösserungen

sichtbar; bei Anwendung der schiefen Beleuchtung aber stellt sie sich immer heraus.

Die Betrachtung von Schliffen, die so weit wie thunlich senkrecht auf die Schalenoberfläche geführt worden sind, lässt zuerst eine grobe Unterscheidung in zwei Lagen, eine innere und eine äussere zu. Diese beiden Schichten waren übrigens auch, obgleich ungünstiger, am tangentiellen Schliff wahrzunehmen. Die äussere Lage (Fig. 6. A), welche eine Dicke von 0,03 bis 0,04 Mm. erreicht, lässt keine deutliche Struktur erkennen, der grösste Theil derselben wird übrigens dunkel und undurchsichtig dadurch gemacht, dass der Farbstoff, welchem die Schale ihre Färbung verdankt, darin eingelagert ist. Die innere bei weitem dickere Lage (gegen 0,17 – 0,20 Mm. in dem Rücken der Schale) ist farblos und sehr durchsichtig (Fig. 6. B). Man kann in derselben zweierlei Schichtungen und parallel laufende Streifungen, und noch ausserdem eine dritte, in einer anderen Richtung laufende Streifung unterscheiden. Sowohl die Schichten wie die mit ihnen parallelen Streifen sind stets sehr schön ausgeprägt; das dritte Streifungssystem tritt auch nicht selten scharf hervor. Die Schichten kreuzen einander unter einem sich gleich




schein kommen. Die feinen Linien, welche auf dem senkrechten Schliffe mit der Schalenoberfläche beinahe parallel laufen, wären dann die Anwachsstreifen und also mit den Begränzungslinien der helleren und dunkleren Streifen auf dem tangentiellen Schliff eines und dasselbe; nur sind dieselben auf dem ersten Schliff sehr nahe an einander gerückt, weil sie von der Schliffebene beinahe senkrecht durchschnitten werden, während sie auf dem anderen viel mehr von einander weichen, weil sie gegen die tangentielle Schliffebene viel stärker geneigt sind. Dabei würde allerdings unerklärt bleiben, warum auf dem tangentiellen Schliff immer nur das eine Streifungssystem zwischen je zwei Anwachsstreifen, und zwar alternirend bald das eine, bald das andere zum Vorschein kommt. Ebenfalls kann man sich nicht wohl darüber Rechenschaft geben, warum die Streifung allein und nicht zugleich auch die Schichtung des senkrechten Schliffes auf dem tangentiellen erscheint.

Die Brüche der Schale finden immer in den Richtungen der verschiedenen Streifungssysteme statt, so dass letztere der Ausdruck von drei Spaltungsebenen sind. Auch sind die Schalenbrüche, wenn sie nicht mit den Anwachsstreifen zusammenhalten, immer gezackt, weil sie alternativ dem einen und dem anderen Spaltungssysteme folgen.

Ausser den besprochenen Eigenthümlichkeiten zeigen die Schliffe aller Richtungen zierliche, etwa 0,0020 Mm. breite Kanäle (Fig. 5 und 6). Es nehmen dieselben mitunter die ganze Schalendicke ein, aber am zahlreichsten sind sie immer in der Gegend, welche der Oberfläche am nächsten liegt. Ihr Verlauf ist sehr complicirt; sie sind nicht selten verzweigt und meist vielfach gewunden, obgleich sie sich auch mitunter eine lange Strecke hindurch ganz gerade fortsetzen. Sie liegen in allen erdenklichen Ebenen, so dass man bei jedem Schliffe Kanäle trifft, welche sich in der Schliffebene befinden, während andere dieselbe unter allen möglichen Winkeln treffen, und einige sie senkrecht durchbohren, so dass man gerade ins Lumen des Kanales selbst hineinsieht. Wenn die Schale mit Essigsäure ausgezogen wird, so bleiben die Ka-

näle in der organischen Substanz zurück, und da jetzt die Schale in Folge des Schwundes der kalkigen Substanz zusammenfällt, so erscheint das Netz noch dichter. Man möchte dann glauben, es handelte sich um ein Netz Hygrocrocisfäden oder sonstiger kleiner Algen. Die Thatsache, dass diese Kanäle an manchen Stellen so zahlreich vorhanden sind; dass man vor lauter Kanälen gar nichts von der Schalenstruktur sehen kann; dass ferner an anderen Stellen die Kanäle nur spärlich erscheinen und oft ganz fehlen; dass namentlich der innere septumartige Processus der Schale, welcher zum Ansatz eines Muskels dient, gar nichts Aehnliches zeigt; dass endlich die Kanäle, wo sie vorhanden sind, immer in den Schichten sitzen, die der Oberfläche am nächsten gelegen sind, und dass sie namentlich in der äusseren, anscheinend strukturlosen Schalenschicht sehr zahlreich sind; das Alles führte uns auf die Vermuthung, dass diese Kanäle der Schale keinesweges angehören, sondern das Werk eines bohrenden Geschöpfes sein müssen. Freilich wer hätte daran gedacht, dass ein Bohrwurm (allerdings wahrscheinlich kein Wurm) 0,0020 Mm. breite Kanäle in einer Schneckenschale bohrt! – Das Thierchen muss sogar sich innerhalb der Kanäle eine Röhre bilden,




von Gattungen dienen können, wie Carpenter wollte. Diese Kanäle weichen jedoch von denjenigen der Neritinschale dadurch ab, dass sie ziemlich immer in derselben Schalenschicht bleiben sollen, und dass nur selten einige von der einen Schicht in die andere übergehen.

Diese Kanäle erinnern sehr an ähnliche, welche von Rosé¹⁾ in fossilen Schuppen von verschiedenen Ganoiden und Cycloiden gefunden und von ihm ebenfalls einem bohrenden Schmarotzer zugeschrieben wurden. Bei lebenden Fischen wurde vergeblich danach gesucht. Was für Organismen diese ungemein kleinen bohrenden Wesen sein können, kann kaum vermuthet werden. Man denkt dabei unwillkürlich an die Clionen, welche sich in der Dicke der Schale vieler Seemuscheln nach allen Richtungen ausbreiten, aber man kann sich kaum Spongien vorstellen, welche die kleinsten Monaden und selbst gewisse Vibrionen an Grösse nicht übertreffen. Falls diese Wesen eine harte Schale oder Spicula besitzen, so dürfte man hoffen, irgendwo denselben im Lumen der Kanäle zu begegnen; dies ist aber noch nicht vorgekommen, und die Kleinheit des Gegenstandes lässt kaum eine Hoffnung zu.

Der Deckel zeigt eine durchaus andere Beschaffenheit als die Schale, und es ist hier von den einander kreuzenden Schichtungs- und Streifungssystemen der letzteren keine Rede. Mit blossem Auge betrachtet zeigt bekanntlich dieser Deckel nahe an seinem hinteren Rande, eine auf der linken Thierseite gelegene Gegend, von wo aus deutliche Streifen gleichsam wie Radian ausgehen. Es sind dieselben etwas sinuös gestaltet. Der an der Columella angrenzende Deckelrand ist verdickt, während der entgegengesetzte, convex gebogene sich ganz ausserordentlich verdünnt, so dass man schon daraus schliessen könnte, dass das Wachsthum an diesem Rande stattfindet. So ist es auch in der That, und die Anwachsstreifen, die nicht besonders ausgesprochen sind, die sich aber auf Flächen-

1) On the Discovery of Parasitic Borings in Fossil Fish-scales. — Transactions of the microscopical society of London. Vol. III. 1854. p. 7. Plat. I.

schliffen zu erkennen geben, laufen mit dem Schalenrücken ziemlich parallel. Die Radialstreifen zeigen sich aber immer viel deutlicher als die Anwachslinien, daher der Irrthum Moquin-Tandon's, der die ersten für die letzteren hält und darauf eine ganz eigenthümliche Theorie über die Schnelligkeit des Schalenwachsthumes entwirft. Ausser diesen beiden Streifungen, die man geradezu als grob bezeichnen kann, kommt auf den Flächenschliffen eine andere, zierlichere, von ganz eigenthümlicher Art vor. Man möchte dieselbe noch lieber eine Faserung als eine Streifung nennen. Sie wird auf der ganzen Deckeloberfläche gefunden, nur am dünnen röthlichen Saume nicht, welcher dem Schalenrücken angrenzt. Dieser Saum ist der jüngst gebildete Schalentheil. Diese Anordnung wird mit einem Male klar, wenn man einen Querschliff des Deckels betrachtet (Fig. 2). Man kann nämlich in demselben zweierlei Schichten, eine äussere und eine innere unterscheiden. Die äussere Schicht (Fig. 2. a) erstreckt sich auf die ganze Schalenoberfläche, indem sie überall ziemlich gleich (etwa 0,0065 bis 0,0078 Mm.) breit bleibt, und nur dicht am vorderen, dem Schalenrücken angrenzenden Rande sich verdünnt. Die innere Schicht (Fig. 2. b) ist am hinteren




Deckelrande zu schreitet, von der Mittelebene entfernen. Ausserdem sind noch auf dem Querschnitt gebogene, bald dunklere, bald hellere Streifen sichtbar, deren Convexität nach dem convexen Deckelrande gerichtet ist, und welche wohl der Durchschnitt der Anwachsstreifen sein werden¹⁾. — Ganz eigenthümlich erscheint der Deckel, wenn er mit Säuren behandelt wird. Die organische zurückbleibende Substanz zeigt nämlich eine herrliche Faserung, deren Anordnung mit derjenigen der eben beschriebenen faserähnlichen Streifung des Schriffes übereinstimmt. Nur ist sie weit feiner, obgleich eben so scharf. Auf dem Schriff konnte man faserähnliche Streifen von 0,0040 bis 0,0052 Mm. Breite und darüber unterscheiden; andere waren auch viel dünner. Am ausgezogenen Deckel treten die Fasern viel herrlicher hervor, weil die anderen dem Kalke hauptsächlich angehörenden Streifen beinahe verschwunden sind, und dabei zeigt sich, dass die Fasern überall eine gleichmässige Dicke von etwa 0,0009 Mm. besitzen (Fig. 3). Es handelt sich hier um keine blosse Streifung, sondern um eine wirkliche Faserung, denn beim Zerzupfen der organischen Substanz des Deckels mit Nadeln bekommt man immer einige isolirte Fasern. Die Richtung der Fasern in der Deckelfläche lässt sich sehr leicht beobachten. In der Gegend der Längsachse des Deckels verlaufen sie ziemlich wie diese Längsachse selber, nur etwas gebogen, und zwar so, dass die Concavität nach dem hinteren geraden, der Columella angrenzenden Rande zu gerichtet ist. Von dieser mittleren Achse aus verändert sich die Richtung der Fasern allmählig nach beiden Seiten so, dass sie den vorderen convexen Rand unter einem ziemlich spitzen, und den hinteren geraden unter einem rechten Winkel trifft.

Es ist ein sehr interessantes und so viel wir wissen, bis jetzt nicht beobachtetes Faktum, dass eine Schale und der

1) Die von mir benutzten sowohl Deckel- wie Schalenschriffe wurden von Herrn Dr. Oschatz zu Berlin (Stallschreiberstrasse 33) mit grosser Sorgfalt angefertigt, und es können solche bei ihm vorrätzig gefunden werden.

ihr zukommende Deckel einen von einander so durchaus verschiedenen Bau darbieten. Die Verschiedenheiten sind so ungemein gross, dass man daraus auf eine ganz verschiedene Modalität der Bildung schliessen darf, denn nicht nur die Anordnung des Kalkes ist in beiden, der Schale und dem Deckel, eine ganz andere, sondern auch die Beschaffenheit der organischen Grundsubstanz, welche bei der einen mit der Ausnahme der Epidermis keine wahrnehmbare Struktur zeigt, bei dem anderen aber ein eigenthümliches faseriges Gewebe darstellt. Dies ist namentlich wichtig als ein triftiger Beweis gegen diejenigen, welche behaupten, der Deckel sei nichts anderes als die zweite Valve der Schale. Dieses Faktum allein spricht mehr gegen eine solche Ansicht, als die von Gray¹⁾ angestellten Betrachtungen über ein Paar verletzte und wieder ergänzte Deckel von *Fusus* und *Pleurotoma* haben dafür sprechen können. In diesem morphologischen Streite möchte Lovén's Ansicht²⁾, dass der Deckel das Analogon des bei den Lamellibranchiern vorkommenden Byssus sei, noch die wahrscheinlichere erscheinen. Indessen dürfte man wünschen, dass auch diese durch bessere Gründe, als bis jetzt geschehen, unterstützt würde.




kaum wahrscheinlich erscheint, dass zwei so verwandte vielleicht als Species oder gar als Racen nicht einmal zu unterscheidende Formen ein von einander so abweichendes Centralnervensystem besitzen sollten.

Nach Moquin-Tandon besteht der Schlundring aus zweien, durch eine dicke Commissur verbundenen Ganglien, woraus Schenkel hervorkommen, welche den Oesophagus umfassen und sich in eine unter demselben gelegene und einen Kreis bildende Ganglienmasse begeben. Solch eine Anordnung bietet nichts Befremdendes dar, da ganz ähnliche Verhältnisse bei *Physa*, *Planorbis*, *Lymnaeus* sowohl wie auch bei vielen Scutibranchiaten und auch bei gewissen Pteropoden vorkommen, und in der That verhalten sich die größeren Verhältnisse bei *Neritina* ebenfalls so; aber die feineren Specialitäten im Bau und der Anordnung des Nervencentrums, welche die bei Berlin vorkommende *Neritina* darbietet, stimmen mit Moquin's Darstellung nicht mehr überein. Nach diesem Forscher nämlich würde der Nervenring, welcher durch die untere Ganglienmasse gebildet wird, aus acht ziemlich gleich grossen Ganglien oder Anschwellungen bestehen. Diese Anschwellungen, welche so nahe an einander gerückt sein sollen, dass man dazwischen liegende Commissuren eigentlich nicht unterscheiden kann, theilt er folgendermassen ein: 1. dicht unter der Speiseröhre die beiden „Ganglions sous-oesophagiens antérieurs“; 2. diesen gegenüber die „Ganglions sous-oesophagiens postérieurs“; 3. den letzten zur Seite, links und rechts, die „Ganglions sous-oesophagiens moyens“; 4. endlich zwischen jedem Ganglion sous-oesophagien antérieur und dem Ganglion sous-oesophagien moyen derselben Seite ein Nebenganglion (Ganglion supplémentaire). Die diesen unteren Nervenring mit den oberen Ganglien verbindenden Schenkel bestehen jederseits aus einer langen einfachen Commissur, und aus jedem Knoten, sowohl aus den oberen, wie aus den unteren dem unter dem Oesophagus gelegenen Ring angehörnden Ganglien gehen Nerven ab, welche an Durchmesser ziemlich gleich sind. Die oberen Schlund-

ganglien übertreffen die einzelnen Knoten des unteren Ringes an Grösse beträchtlich.

Unsere beigegebene Figur (Fig. 7) gibt eine treue Darstellung des Nervensystemes der im Tegeler See vorkommenden *Neritina*, und dieses Bild entfernt sich, wie man gleich sehen wird, von Moquin's Beschreibung ganz ungemein. Die oberen Ganglien (a) liegen ziemlich weit von einander, nahe an der Basis des Fühlers, also unfern des augentragenden Fortsatzes, und werden durch eine verhältnissmässig dicke Commissur (b) verbunden, welche der oberen Schlundwand dicht anliegt. Aus der vorderen Seite jedes obern Ganglions gehen zwei Nerven schräg nach aussen ab, deren einer bedeutend dicker als der andere ist. Der dickere (c) versorgt den Fühler; der andere dünnere (d) ist der Sehnerv. Diese Ganglien, die man als eigentliche Hirnganglien bezeichnen kann, bilden eine Art Pyramide, oder vielmehr einen Kegel, dessen Spitze nach einwärts gerichtet ist. Mehrere kleinere Nervenäste gehen in der Nähe dieser Spitze ab und versorgen den Schlund und die verschiedenen Mundtheile, bis wohin sie jedoch nicht mit Bestimmtheit verfolgt werden konnten. Von der dicken nervösen Commissur ent-




sie sind ausserdem vier oder fünf Mal kleiner als die vorderen Ganglien. Die seitliche Commissur, welche jederseits ein vorderes mit einem hinteren Ganglion der Unterschlundringmasse verbindet, ist dick und kurz, doch bedeutend länger als die Quercommissur, wodurch die beiden vorderen unteren Nervenknoten mit einander verbunden sind. Aus jedem der letzterwähnten Ganglien gehen ein dicker und mehrere dünnere Nerven ab, welche den Fuss versorgen, so dass man diese Knoten als Ganglia pedalia bezeichnen könnte. Diese Benennung wäre jedoch ungenügend, insofern als diese vorderen Ganglien ein anderes Organ, und zwar ein Sinnesorgan, die Gehörbläschen nämlich, versorgen (h). Der Hörnerv entspringt an der Basis des Knotens und an der inneren Seite des Nervenringes, welcher durch die auf der Bauchseite gelegene untere Ganglienportion des Schlundringes gebildet wird, gerade an der Stelle, wo der Knoten in die seitliche Commissur übergeht. Diese Ursprungsstelle des Hörnerven befindet sich der Stelle gerade gegenüber, wo der entsprechende, aus dem oberen Hirnganglion kommende, doppelte Schenkel in die untere Ganglienmasse eindringt. — Was für Organe von den Nerven versorgt werden, welche aus den kleineren, unteren, hinteren Ganglien und aus der Eindringungsstelle der Schenkel in die vorderen unteren Ganglien entspringen, konnte nicht ermittelt werden. Möglicherweise begeben sich erstere in die seitlichen, das Thier an die Schale befestigenden Muskeln und in die untere Hautmuskelschicht. — Der unter dem Oesophagus gelegene kleinere Ganglienring liegt auf der Bauchfläche der Speiseröhre so an, dass er in eine wagerechte Ebene zu liegen kommt, indem die grossen birn- oder kolbenförmigen Ganglien nach vorn, und die kleineren dreieckigen nach hinten gerichtet sind.

Unsere Darstellung der Beschaffenheit des unteren, dicht an der Speiseröhre liegenden Ringes, hat, wie man sieht, mit der Moquin'schen Beschreibung soviel wie gar keine Aehnlichkeit. Als Bürgschaft aber der Richtigkeit der unserigen können wir sehr hübsch erhaltene Präparate aufweisen, wo keiner selbst die geringsten Spuren einer Eintheilung in

acht ziemlich gleich grosse Nervenknotten entdecken könnte. An diesen Präparaten sieht man nicht nur die beiden äusserst ungleichen Ganglienpaare, sondern auch deren Zusammenhang mit den Gehörbläschen, welche von Moquin-Tandon gänzlich übersehen wurden.

Von unserer Beschreibung noch weit abweichender haben Quoy und Gaimard¹⁾ das centrale Nervensystem einer grossen *Nerita* dargestellt. Leider unterliessen diese Schriftsteller die Art anzugeben, welche sie zum Gegenstand ihrer Untersuchungen nahmen. Möglich ist es zwar, dass die Anordnung des Nervensystemes bei den Neriten und Neritinen eine ganz verschiedene ist, jedoch hätte man kaum erwarten dürfen, dass die beiden fraglichen Gattungen in Bezug auf den Schlundring nicht die geringste Aehnlichkeit besitzen sollten. Dieses Organ stellt nach Quoy und Gaimard's Abbildung einen einfachen, hier und da kaum wahrnehmbare Anschwellungen zeigenden, mehr weniger ovalen Ring dar, woraus eine gewisse Anzahl dünner, gleich dicker Nervenäste entspringen. Von zwei grösseren Nervenknotten oberhalb der Speiseröhre ist gar keine Rede; ebenso wenig von einer unter derselben gelegenen, grösseren Ganglienmasse. Der an



grossen oberen Schlangganglien bei der von Quoy und Gaimard untersuchten *Nerita* gänzlich fehlen, denn ihre Zeichnung lässt keine Anschwellung, nicht einmal die geringste, in dieser Gegend merken. Ob alle ächten Neriten dasselbe Verhältniss zeigen werden, sollen hoffentlich spätere Beobachtungen lehren.


Bezüglich der feineren Struktur des centralen Nervensystemes wurde nichts Erwähnenswerthes beobachtet. Die Untersuchung ist hier keinesweges so leicht wie bei so vielen Gasteropoden, wo die Zusammensetzung der Hirnganglien aus schönen Nervenzellen gleich ins Auge springt. Bei den Neritinen zeigen sowohl die Nervenknotten, wie die Commissuren des Schlundringes eine gelbliche blasse Färbung und eine scheinbar homogene Beschaffenheit. Nur selten glückt es Einem, bei Sprengung oder Zerreißung des Neurilems ein paar sehr undeutliche Ganglien kugeln wahrzunehmen, und gewöhnlich verwandelt sich bei diesem Versuch die Nervenmasse in einen unförmlichen, unkenntlichen Teig. Die gelbliche Farbe rührt von kleinen Pigmentkörnchen her, welche auf dem ganzen centralen Nervensystem zerstreut sind, ohne in besonderen Zellen eingeschlossen zu sein. Diese gelbliche Färbung ist übrigens mitunter kaum vorhanden und jedenfalls niemals so intensiv, wie sie bei verschiedenen Planorben, Physen, Limnaeen u. s. w. gefunden wird, auch nicht wie die rothe Färbung beim Nervensystem der *Paludina vivipara*.

In Betreff des Eingeweidenervensystemes sind auch nur sehr unvollständige Beobachtungen vorhanden. Als dahin gehörig können wir nur einen sehr kleinen Knoten anführen, den wir beständig in der Basis der Kieme, neben der Kiemenvene gefunden haben, und welcher dasselbe, wie die von Moquin-Tandon gefundene, und von ihm für das Herz erklärte kleine Anschwellung der Kiemenvene, sehr wohl sein könnte. Mit Sicherheit können wir zwar nicht behaupten, dieses Organ sei nervöser Natur, da wir immer nur eine körnige Substanz darin fanden, und niemals so glücklich waren, Ganglienzellen in demselben ausfindig zu machen.

Dieser Knoten aber zeigt dieselben gelben Pigmentkörnchen an der Oberfläche, wie das centrale Nervensystem, und es gehen Ausläufer von ihm nach der Kieme und der Gegend des Schlundkopfes und der Speicheldrüse ab. Ein sympathisches Nervensystem aber, wie es bei so vielen Cephalophoren bekannt ist, konnte nicht gefunden werden, was wir einzig und allein der Kleinheit des Gegenstandes und unserer eigenen Ungeschicklichkeit zuschreiben wollen.

3. Von den Sinnesorganen.

Tastorgane. Als Tastorgane sind hier wie bei den meisten Gasteropoden zwei Fühler vorhanden. Dieselben sind nicht hohl oder wenigstens nicht auf die Weise, dass sie wie ein Handschuhfinger aus- und eingestülpt werden könnten, wie dies bei den Helicinen und Limacinen geschieht, wohl aber sind sie wie bei den übrigen Kammkiemern zusammenziehbar. Unter der Lupe erscheint der Fühler im Zustande der Contraction wie gegliedert (Fig. 8); wie schon angegeben wurde. Unter der dicken Fühlerhaut wird die Muskelschicht durch eine undeutliche Queer- und viel deutlichere Längsfaserung angedeutet. In der Mitte des Organes



welche zur Selbstverteidigung in Anwendung gebracht wird — was zwar ein ganz neues Faktum unter den Mollusken wäre —, oder um eine besondere, das feine Gefühl vermittelnde Vorrichtung, die von den meisten anderen Mollusken entbehrt wird. Letztere Hypothese möchte noch die wahrscheinlichere erscheinen.

Gehörwerkzeuge. In seiner Anatomie der *Neritina fluviatilis* erwähnt Moquin-Tandon kein Wort von den Gehörblasen. Dennoch sind sie bei dieser Schnecke sehr leicht zu finden. Krohn¹⁾ stellte schon die Norm auf, dass wo der Schlundring ausser den oberen Knoten noch mit unteren versehen ist, die beiden Hörbläschen immer auf den letzteren oder in deren Nähe zu finden sind, und demgemäss finden sich auch die Gehörwerkzeuge bei *Neritina* innerhalb des kleinen Nervenringes, welcher durch die unter der Speiseröhre gelegene Ganglienmasse gebildet wird.

Krohn zuerst hat den Zusammenhang der Gehörkapseln mit dem Nervensysteme, und zwar bei *Paludina vivipara* gefunden²⁾. Aus der dickeren Commissur nämlich, die jeden unteren Schlundringknoten mit dem oberen seiner Seite verbindet, und zwar nicht weit von dem unteren Knoten soll bei *Paludina* ein kurzer Nerv entspringen, der sich gegen das Bläschen herabsenkt, seine äussere zellige Membran durchbohrt und auf der innern sich in zwei Aeste zu theilen scheint. Leydig bestätigte dieses Verhältniss der Gehörkapseln zum Nervensystem bei *Paludina*, und verfolgte noch weiter die Theilung des Nerven in mehrere Aeste, ohne dessen Endverbreitung sehen zu können. Sonst erscheinen bei den meisten Cephalophoren die Gehörbläschen gänzlich ungestielt und sitzen den Ganglien dicht auf, oder wenigstens sind sie nur sehr kurzgestielt. Bei *Neritina* sind die Gehörbläschen (Fig. 7. h) durch einen mittelmässig langen Stiel mit der hinteren Seite des grossen birn- oder kolbenförmigen Nervenknötens des unteren Nervenringes verbunden, nahe an

1) Forriep's Neue Notizen. XIX. 1842. S. 311.

2) A. a. O.

der Stelle, wo dasselbe in die seitliche Commissur übergeht. Dieser Stiel kann aber nicht wie bei *Paludina* als ein Nerv, sondern nur als eine hohle, röhrenförmige Verlängerung der birnförmigen Kapsel aufgefasst werden. Beweise hiefür folgen weiter unten.

Die Hörbläschen sind auf der inneren Seite mit einem schönen, aus polygonalen Zellen bestehenden Epithel ausgekleidet. Dieses Epithel ist bei den ausgewachsenen Exemplaren meist sehr schwer zu sehen; nicht so aber bei den jungen Embryonen, wo dasselbe gleich in die Augen fällt, indem es ein sehr regelmässiges, die dicke Kapsel bekleidendes Pflaster bildet (Fig. 51). Jede Zelle ist mit einem deutlichen Kern versehen. Bekanntlich giebt schon Kölliker an, er hätte nicht bei allen Mollusken die Wimperhärcchen sehen können, die zuerst von ihm und Rud. Wagner in den Gehörkapseln der Cephalophoren entdeckt wurden. In Betreff der *Paludina vivipara* hat Leydig trotz der sorgfältigsten Untersuchungen keine Cilien wahrnehmen können, obgleich er selbst isolirte Epithelfetzen aus der Gehörkapsel soll vor den Augen gehabt haben. Nichts desto weniger erscheint es höchst wahrscheinlich, dass überall, wo zitternde Bewegung vorkommt, Flimmerhaare als Bewegungsursache vorhanden sind. Vielleicht gehörten die von Leydig unter-

einen ziemlich langen, nach aussen gerichteten, stets vorkommenden Fortsatz in Anspruch genommen, der sich bald als ein hohler Stiel zu erkennen gab. Das Flimmerepithel erstreckte sich in denselben hinein (Fig. 50); denn wenn die Zellen nicht sehr deutlich erschienen, so war doch die flimmernde Bewegung in demselben meist unverkennbar. Bei älteren, der Beobachtung weniger günstigen Embryonen, wurde wohl der Stiel stets wahrgenommen, dessen Lumen und Beflimmerung aber nicht mehr, so dass wir anfangs meinten, das Vorhandensein eines röhrenförmigen Stieles sei nur eine provisorische Larveneinrichtung. Wir hätten uns gern überzeugen mögen, dass das centrale Nervensystem ursprünglich eine Höhle enthält, und dass das Gehörbläschen eine einfache Ausstülpung dieser Höhle darstellt, wie dies etwa bei den höheren Thieren der Fall ist. Auf diese Weise hätte der Kanal eine ganz einfache Deutung gefunden. Der Stiel aber, an der Ursprungsstelle aus der Hörkapsel stets sehr deutlich, wird immer schwieriger wahrzunehmen, indem er weiter nach aussen tritt, und endlich verschimmt er ganz und gar zwischen den Parenchymzellen des Leibes. Bei keinem Embryo konnte selbst die leiseste Andeutung eines Nervensystemes entdeckt werden, so dass wir für diese Bildung der Hörbläschen durch Ausstülpung nichts Beweisendes anführen können. Wohl aber ist zu bemerken, dass man sich nur schwierig die Existenz eines Sinnesorganes ohne Nervensystem vorstellen kann. Wenn das Nervencentrum erst sehr spät, erst nach dem vollendeten Embryonalleben erscheinen sollte, warum würde sich das Gehörorgan schon in der frühesten Zeit bilden, zu einer Zeit, wo keine Empfindung zur Wahrnehmung gelangen kann? Wahrscheinlicher erscheint es, dass hier wie bei den höheren Thieren die erste Anlage des Nervensystemes schon bei der ersten Differenzirung des Embryos auftritt, dass wir aber dieselbe aus verschiedenen Ursachen nicht wahrnehmen können. Deshalb möchten wir nicht die Hypothese fahren lassen, dass die Ohrblasen sich wirklich durch Ausstülpung aus dem centralen Nervensystem zu einer Zeit bilden, wo letzteres zwischen den embryonalen

Parenchymzellen nicht deutlich hervortritt. Diese Ansicht wird schon von Siebold ausgesprochen¹⁾, indem er sagt, dass bei denjenigen Gasteropoden, deren untere Schlund-Ganglien zu einem Ring verbunden sind, z. B. *Limnaeus*, *Planorbis*, *Physa*, *Succinea*, *Bulinus*, *Ancylus*, die Gehörkapseln an der hinteren Seite der beiden vorderen grossen Ganglien zwei blasenförmige „Hervorstülpungen“ bilden. Diese Ausdrucksweise beruht aber wahrscheinlich mehr auf einer Vermuthung, als auf entwicklungsgeschichtlichen Beobachtungen. Auffallend genug hat Frey die Entwicklung der Gehörwerkzeuge bei *Limnaeus stagnalis*, *Physa fontinalis* und *Paludina impura* verfolgt²⁾, und das erste Auftreten derselben unter der Gestalt eines einfachen, anfangs otolithlosen Bläschens ohne die geringste Andeutung eines Stieles beobachtet. Gleichwohl existirt bei *Limnaeus auricularis* und mehreren anderen ein zwar kurzer, doch unverkennbarer Stiel. Ob derselbe hohl ist, steht freilich dahin.³⁾

1) Handbuch der vergleichenden Anatomie p. 216.

2) Archiv für Naturgeschichte. 1845. p. 217.

3) Dieser Aufsatz war schon vollendet, als unsere Aufmerksamkeit



In den erwachsenen Neritinen findet sich der Stiel wieder (Fig. 9), und ist bei jedem Exemplar gleich zu erkennen, obgleich die Existenz eines Kanales in demselben nicht so leicht hervortritt, da das Schlagen der Flimmerhärchen, ohne Zweifel der Undurchsichtigkeit allein wegen, nicht wahrgenommen wird. Jedoch ist die Höhle des Stieles noch immer vorhanden. Nicht selten nämlich trifft man einige der kleineren, weiter unten zu beschreibenden Hörsteinchen innerhalb des röhrenförmigen Stieles, und jedenfalls gelingt es fast stets, durch einen leisen vermittelst des Deckplättchens ausgeübten Druckes, den Inhalt der Hörkapsel in denselben theilweise hinüberzutreiben. An dem Perenniren der Höhle in dem Bläschenstiel ist also nicht zu zweifeln, und derselbe ist mithin mit dem bei *Paludina* nachgewiesenen mehrfach verzweigten Hörnerven nicht mehr direkt vergleichbar, oder vielleicht stellt der Ohrblasenstiel der *Neritina* im Vergleich zum Hörnerven der *Paludina* eine entwicklungsgeschichtlich niedrigere Stufe vor, etwa wie die ursprünglich hohlen Seh-, Riech- und Gebörnerven der Säugethierembryonen im Verhältniss zum definitiven Zustande derselben.


Die Ohrblasen der *Neritina* bestehen aus einer eigenen, ziemlich (etwa 0,0026 Mm.) dicken Kapsel, in welcher keine deutliche Struktur erkannt wurde, und deren innere Oberfläche, wie gesagt, mit dem Flimmerepithel bekleidet ist. Bei den Embryonen ist diese Membran in der Gegend, welche nach der Mittellinie des Thieres zu sieht, ziemlich dünn,

den Kanal sich quer über das Ganglion hinweg fortsetzen zu sehen, und selbst Steinchen in dieser Fortsetzung des Ganges wahrzunehmen. Schon damals hatten wir daran gedacht, ob dieser Kanal nicht mit der Aussenwelt zusammenhing; da wir jedoch kein solches Bild mehr trafen, so hatten wir diese Hypothese fahren lassen. Kölliker's Beobachtung macht uns die Sache wieder zweifelhaft. Künftige Beobachtungen werden uns hoffentlich darüber das Richtige lehren.

Bei den erwachsenen Tintenfischen und Loliginen konnte Kölliker keine Spur von einem von den Gehörkapseln ausgehenden Gange entdecken. — S. Kölliker's Entwicklungsgeschichte der Cephalopoden. Zürich 1844. p. 105 — 106.

nimmt aber nach aussen bis zu der Stelle, wo sie in den Stiel übergeht, an Dicke beträchtlich zu.

Was die Otolithen betrifft, so müssen wir die Embryonen und die erwachsenen Thiere auseinander halten. Bei den ersteren ist stets ein einziger, grosser, blasser, runder Otolith vorhanden (Fig. 60 und 61), welcher keinesweges, wie man erwarten dürfte, aus kohlensaurem Kalke besteht, denn er zeigt unter Einwirkung von Säuren kein Aufbrausen, sondern quillt nur auf und wird durchsichtiger, ohne sich selbst bei einem längeren Verbleiben in Essigsäure aufzulösen. Durch Druck wird er flacher, breiter und zerfällt allmählig in kleine, runde, sehr blasse Körperchen oder zähe Tröpfchen, welche bald zerfliessen und sich auflösen. Bei den erwachsenen Thieren ist oft dieser blasse, embryonale Otolith vorhanden (Fig. 9. a), oft aber auch nicht; stets indessen findet man in jeder Ohrblase eine gewisse Menge kleiner, unregelmässig eckiger, stark lichtbrechender Steinchen, deren Anzahl sehr verschieden und sogar oft fünf oder gar zehn Mal grösser in dem einen als in dem anderen Ohrbläschen eines und desselben Thieres ist. Man findet mitunter ihrer bis 180 oder gar 200 und darüber in einer Hörblase. Diese Un-




wie die Cysten der in diesen Schnecken vorkommenden Schmarotzer schön grün gefärbt sind. Dass mehrere Otolithenformen bei gewissen Schnecken vorkommen, wurde schon von Krohn¹⁾ erwähnt. Bei *Doris*, *Tritonia*, *Eolidia* z. B. findet man nach seinen Angaben ovale, an den Enden zugespitzte Steinchen, welche die Mehrzahl der Otolithen bilden, dann kommen andere von geringerer Grösse und in minder beträchtlicher Anzahl vor, die mehr weniger krystallinisch sind. Ausserdem aber giebt es noch zuweilen eine Uebersahl von ungemein kleinen krystallinischen Körnchen, die mit ihren Facetten an einander gefügt die Flächen der zweiten, selten der ersten Art, dicht bedecken. In Säuren lösen sie sich mit Aufbrausen auf und geben hiernach auch von Seiten ihrer chemischen Bestandtheile ihre Verwandtschaft mit den Otolithen zu erkennen. Nicht so aber bei *Neritina*. Die Steinchen bieten bei derselben keine deutliche krystallinische Zusammensetzung dar; ihre Grösse schwankt zwischen 0,01 und 0,001 Mm., manche sind noch bedeutend kleiner. In Essigsäure lösen sie sich nicht auf, so dass an kohlen-sauren Kalk nicht zu denken ist und ebenso wenig an klees- sauren Kalk, da Salzsäure sich ebenfalls wirkungslos erweist. Die Möglichkeit, dass diese unregelmässigen eckigen Körperchen aus Fett bestehen, war zwar vorhanden, der Versuch aber, dieselben in Alkohol oder in Aether aufzulösen, war vergeblich. Von der mikrochemischen Seite lässt sich also in Bezug auf diese räthselhaften Körperchen nichts Positives sagen.

Leydig beschreibt bei *Paludina* Muskeln, die auf den Spannungsgrad der ganzen Gehörblase einwirken können. Es konnte bei *Neritina* nichts Aehnliches gefunden werden, denn bei den Embryonen sind die Hörblasen mitten zwischen den Parenchymzellen eingebettet, und beim erwachsenen Thiere schienen sie ziemlich frei innerhalb des unteren Nervenringes zu liegen.

1) Froiep's Neue Notizen XIV. p. 310.

Gesichtswerkzeuge. Die Ommatophoren zeigen sich unter der Gestalt eines an der Seite und der Basis des Fühlers gelegenen ründlichen Höckers, in dessen Parenchym der Augapfel eingebettet liegt. Dieser Höcker flimmert an der Oberfläche, wie der freie Theil des Thieres überhaupt, nur auf dem Scheitel desselben ist die Haut unbeflimmert, sehr verdünnt und kann als Conjunctiva betrachtet werden. Der eigentliche Augapfel wird durch eine aus zwei Schichten bestehende Sclera (Fig. 8. a) eingehüllt, welche sich unter der Bindehaut ebenfalls sehr verdünnt, und eine Hornhaut darstellt. Die Cornea und Conjunctiva haben jedoch zusammen genommen eine ziemlich beträchtliche Dicke, so dass die Angabe von Moquin¹⁾, die Hornhaut sei bei *Neritina* kaum wahrnehmbar, nicht gerechtfertigt erscheint. Die innere Schicht der Sclera ist meistens etwas röthlich gefärbt. Beide Schichten werden nach der Eindringungsstelle des Sehnerven allmählig dünner und verlieren sich endlich in der äusseren Contour desselben, so dass sie ihm eine Art Neurilem bilden. Die Chorioidea ist kohlschwarz und erscheint bei starker Vergrösserung, wenn sie zerzupft wird, aus kleinen, runden, mit Pigmentkörnchen erfüllten und mit einem deutlichen Kern



dieser Ansicht angeschlossen, was ihn übrigens nicht davon abhält, auf seinen Tafeln das Auge einer *Neritina fluviatilis* mit einer deutlichen Krystalllinse abzubilden und dieselbe als solche in der Erklärung zu den Tafeln zu bezeichnen. Wenn Moquin-Tandon Lespès's Irrthum in seinen Text aufgenommen hat, so hat er indessen auf seinen Tafeln Recht, denn das Neritinenauge ist mit einer unverkennbaren Linse (Fig. 8. c) versehen. — Moquin erwähnt hinter dem Auge einen schwarzen Fleck von länglicher Gestalt, welcher wie ein zweites Auge aussehen soll. Die bei Berlin vorkommenden Neritinen bieten nichts Aehnliches.

4. Von dem Verdauungsapparat.


Der Mund der *Neritina fluviatilis* ist kieferlos, und der Eingang in die Mundhöhle wird durch eine einfache runde Oeffnung in einer wulstigen Lippe gebildet. Zwar bildet Moquin-Tandon zwei Kiefer ab, aber was er als zwei gezähnte und getrennte Kieferstücke aufgefasst hat, sind Theile einer weichen, chitinartigen, mit starken Längsfalten versehenen Membran, welche die Mundhöhle bekleidet und sich leicht abpräpariren lässt. Diese Längsfalten erscheinen von hellröthlich brauner Farbe und verleihen der Mundöffnung die Fähigkeit, sich sehr bedeutend zu erweitern. Moquin-Tandon hält mit St. Simon die vermeintlichen Kiefer von *Neritina* für knorpelig und beschreibt, wie der Oberkiefer gross, gebogen, an beiden Enden abgerundet und mit 6 oder 8 Rippen versehen sei, während der untere kleiner sein soll, u. s. w. Da jedoch Troschel's Vermuthung¹⁾, dass eine solche Membran wie die eben beschriebene zu finden sei, sich verwirklicht hat, so kann man mit ihm die ganze innere Wandung des Mundeinganges mit einem einzigen Kiefer vergleichen.

Die Bewegung dieses Mundapparates wird durch eine gewisse Anzahl von Muskeln vermittelt, die sich an die faltige

1) Ueber die Mundtheile einheimischer Schnecken. Archiv für Naturgeschichte. 1836.

Membran einerseits und an zwei Knorpelstücke andererseits ansetzen. Letztere sind zwei rundliche ovale Scheiben (Fig. 10), deren eine rechts und die andere links von der Mundtasche liegen und keinen anderen Zweck haben, als einen festen Ruhepunkt für die Bewegungen der Lippe abzugeben. Durch Verkürzung der sich zwischen der faltigen Mundmembran und den Lippenknorpeln ausspannenden Muskelfasern wird die Mundöffnung bedeutend erweitert, während bei Erschlaffung derselben die Zusammenziehung der Ringfasern der Lippe den Schluss der Mundöffnung herbeiführt. Bei erwachsenen Individuen sind diese Knorpelstücke gegen 0,23 Mm. lang und 0,17 Mm. breit. Ueber die mikroskopische Beschaffenheit derselben werden wir gleich bei Veranlassung der Zungenknorpel zurückkommen.

Die Reibmembran wurde schon von Troschel, Lovén und Moquin-Tandon untersucht. Sowohl die Abbildung, welche bei viel zu schwacher Vergrößerung und bei unrichtiger Auffassung der Verhältnisse der Chitinplatten zu einander gemacht wurde, wie die Beschreibung 'des letzteren, sind vollkommen unbrauchbar. Troschel¹⁾ hat eine sehr genaue Beschreibung und ziemlich gute Abbildung der Neri-




lassen, und nur beim hinteren Ende derselben längere Zeit verweilen, welches merkwürdiger Weise nicht nur von Moquin-Tandon, sondern auch von Troschel und selbst von Lovén übersehen wurde. Die Reibmembran ist bekanntlich in eine Scheide eingeschlossen, aber die verschiedenen Theile derselben, wie sie Lovén abbildet, liegen nicht in einer Ebene. Die sieben Chitinplattenreihen der Rhachis sitzen in Längslinien auf der oberen Fläche, so zwar, dass die unpaarige Mittelreihe (Fig. 26. a) tiefer und horizontal, und die beiden folgenden (c, d) jederseits nach der Seite zu allmählig in die Höhe steigen, während die vierte (e) schräg nach aussen und abwärts sieht; die zahlreichen Häkchen (Lovén's *Uncini*), welche Querreihen bilden, deren eine von jedem Glied der Rhachis wie eine Rippe abgeht, nehmen die Seiten und die untere Fläche der Zunge so ein (Fig. 26. f), dass nur der mittlere Theil der unteren Fläche davon frei bleibt. Die durch die Häkchenreihen gebildeten Rippen bilden also einen Bogen, welcher aber nicht gerade unterhalb des entsprechenden Rhachisgliedes zu liegen kommt, sondern schräg nach unten und hinten läuft, so dass er eine gewisse Anzahl Glieder unter einem ziemlich grossen Winkel schneidet. Diese Schrägheit wird um so bedeutender, als man weiter nach hinten gelegene Zungentheile betrachtet. Wenn also die Rhachis auf der oberen Fläche aufhört, d. h. wenn man das letzte Glied derselben erreicht hat, so hört die Radula auf der unteren Fläche noch keinesweges auf, da die schiefen nach unten stehenden Häkchenrippen sich schräg nach hinten noch eine ganze Strecke verlängern. Dadurch bleibt der letzte hinterste Theil der oberen Fläche der Zunge von der Radula entblösst, und an deren Stelle nimmt man nur eine fleischige, durch eine mittlere tiefe Furchen in zwei Längswülste getheilte Masse wahr (Fig. 27). Diese Wülste sind durch Pigmentkörnchen röthlich braun gefärbt, welche auf deren Oberfläche Querstreifen bilden. Letztere sind gegen die Achse nur wenig geneigt, und schneiden also die auf der Unterfläche der Zunge verlaufenden Häkchenrippen unter einem ziemlich grossen Winkel. Der vordere Theil der Wülste ist be-

deutend verdickt und stellt sich wie zwei ebenfalls röthlich gefärbte Höcker dar. In der Substanz des Organes konnten nur körnige Kügelchen unterschieden werden, wovon es sich nicht einmal sagen lässt, ob es Zellen oder Zellkerne sind.

Merkwürdig ist es, dass dieses hintere Ende der Zunge von den meisten Beobachtern gar nicht erwähnt wurde. Es möchte daher kommen, dass vielleicht dieselben, um die Reibmembran reiner zu bekommen, zu Reagentien ihre Zuflucht nahmen, wodurch die weichen, leicht vergänglichen Theile zerstört wurden. Nicht selten zerflossen beim Verdampfen des Wassers die beiden eben beschriebenen Zungenwülste unter dem Druck des Deckplättchens, und es bleibt nur ein unkenntlicher Teig übrig, und überhaupt ist das Organ sehr zart und vergänglich.

Die einzigen Beobachter, welche diesem Zungentheil ihre Aufmerksamkeit schenkten, sind Lebert ¹⁾ und Allmann ²⁾. Ersterer nannte denselben die hintere Zungenpapille und gab eine Beschreibung dieses Organes bei *Patella* ³⁾, wo es eine weissgrau gefärbte, halbdurchsichtige, an ihrem Ende leicht concave Papille darstellen soll. Nach Lebert gehört die „Endpapille der Hakensaite“ ganz der Scheide an, und das




und in dem Grade, wie sich vorn die Platten abnutzen, schiebe sich die Membran nach vorn vor, und bilden sich am Hinterende neue Glieder nach. Wie diese Bildung vor sich geht, davon erwähnt aber Troschel nichts. Die Reibmembran steckt in der That mit ihrem hinteren Ende in der Zungenscheide nicht vollkommen frei, sondern dieser hintere Theil ist in der Substanz selbst des eben beschriebenen Organes eingebettet. Andererseits geht dieses Organ nach hinten in die Zungenscheide über, wie Lebert bei *Patella* richtig angab. In dieser Lebert'schen Endpapille sehen wir die Matrix der Reibmembran. Auf deren vorderem und oberem Theil erscheinen die Reibplatten zuerst als kaum wahrnehmbare, farblose, höchst durchsichtige Plättchen. Von Anfang an haben diese Plättchen dieselbe Breite wie später und werden gleich auf ihrer ganzen Oberfläche abgesondert. Der vordere Theil der oberen Fläche der Endpapille bildet die Hauptplattenreihen (die Rhachis), die Seiten und die untere Fläche übernehmen die Bildung der Seitenhaken. Wozu aber die Spaltung der Papille, der Mittellinie nach, bei *Neritina* von Nutzen sein kann, das ist uns nicht klar geworden. Lebert soll nichts Aehnliches bei *Patella* gefunden haben, wie auch bei sonst keiner anderen Schnecke. Bei manchen Gattungen ist diese Papille in der Breite sehr entwickelt, so z. B. bei *Patella* nach Lebert, und bei *Pomatias* (*P. maculatum*), wie wir finden. Lebert hatte schon die Ansicht aufgestellt¹⁾, die Scheide der Chorda (Reibmembran) stehe mit der Bildung und der immer neuen Sekretion der Platten in näherer Beziehung; dass aber gerade diese hintere Papille die Matrix derselben sei, hatte er nicht geahnt. Allmann indessen, welcher dieses Organ bei *Actaeon* unter dem Namen „lingual sac“ beschrieb, vermuthete schon, dass die Zungenplatten von demselben gebildet werden.

Erwähnenswerth ist noch, dass die Chitinplatten der Reibmembran und namentlich die vorderen Stücke derselben mitunter wunderschön grün gefärbt sind.

1) A. a. O. p. 457.

Der Zungenapparat bei *Neritina* zeichnet sich durch vier Knorpelstücke aus, die ein die Reibmembran tragendes Gerüst bilden. Lovén scheint dieselben nicht gesehen zu haben, oder erwähnt wenigstens dieselben nicht, was Keinen Wunder nehmen darf, da er seine Aufmerksamkeit in der schon citirten Abhandlung der Reibmembran ausschliesslich schenkt. Auffallender ist der Umstand, dass Troschel bei seiner ausführlichen Beschreibung des ganzen Apparates unserer Schnecke diese Organe ganz verkannte und für Muskeln hielt.¹⁾ Indessen fallen die Zungenknorpelstücke, wenn man eine *Neritina* gleichviel von oben oder von unten aufschneidet, durch eine eigene blassere, bläuliche Farbe sogleich ins Auge. Moquin-Tandon hat sie zuerst als Knorpel aufgefasst, ohne sie jedoch genauer zu studiren. Er merkte nicht einmal, dass ihrer vier vorhanden waren, und prüfte sie mikroskopisch nicht, denn die histologische Beschaffenheit der Knorpel behandelt er sehr flüchtig, indem er nur sagt, diese Körper seien kaum „ponctués.“ Ueberhaupt giebt Moquin-Tandon nicht viel auf die Wahl solcher Bezeichnungen, da er die Reibmembran selbst „knorpelig“ und die Zähnen darauf „kreideartig“ nennt²⁾.




bietet die Gestalt eines länglichen Dreieckes dar, dessen Basis nach hinten und dessen Spitze nach vorn gerichtet ist; eine wellenförmige, der Quere nach verlaufende Scheidelinie trennt die beiden sehr ungleich grossen Knorpelstücke von einander. Das vordere, das hintere an Grösse weit übertreffende Stück (Fig. 11. a) bildet selbst wieder ein längliches Dreieck, dessen kleinste Seite nach hinten sieht, während die äussere, nach vorn etwas convex werdende die grösste Länge erreicht. Unweit von der vorderen Spitze erhebt sich ein Höcker (b), der sich kegelförmig zuspitzt und mit einer verhältnissmässig nicht sehr breiten Basis dem Knorpelstück aufsitzt. Dieser Höcker ragt nicht senkrecht über die Knorpeloberfläche hervor, sondern neigt sich gegen dieselbe hin, indem er sich schräg nach vorn und innen richtet. Die Gestalt des hinteren Knorpelstückes (Fig. 11. c) gleicht einem unregelmässigen Oval, dessen wellenförmig gebogene, nach vorn sehende Seite in die Basis des vorderen dreieitigen Stückes hineinpasst, während die Spitze der eiförmigen Figur nach aussen gerichtet ist.

Die beiden symmetrischen Knorpelstückcomplexe liegen im Grunde der Mundhöhle, und zwar so, dass deren hintere Theile ziemlich weit von einander abstehen, während die beiden Spitzen sich nach vorn zu einander nähern und sich fast berühren. Dadurch werden die beiden spitzigen Höcker so an einander gebracht, dass ein beinahe vertikaler, dreieckiger Raum entsteht, dessen Basis durch den vorderen Theil der Oberfläche der beiden Knorpelstücke und die beiden anderen Seiten durch die Innenseite der beiden nach vorn und innen geneigten Höcker gebildet werden. Dieser dreieckige Raum nimmt das vordere Ende der Reibmembran auf, deren Seitenflügel (Fig. 11. e) sich auf die Knorpelstücke stützen. Eine grosse Anzahl von Muskeln setzt sich an die beiden Knorpel fest und vermitteln die verschiedenen Bewegungen, wozu die Zunge befähigt ist. Leider wurden wir durch die Kleinheit des Gegenstandes verhindert, das Spiel dieser Muskeln genauer zu prüfen. Wir wollen noch erwähnen, dass ein breites Muskelband sich zwischen den

beiden Knorpelcomplexen erstreckt, indem es dieselben wie durch eine dichte Membran verbindet. Die Fasern verlaufen in diesem Muskelband einander genau parallel der Quere nach, d. h. also senkrecht auf die Richtung der Zungenachse. Die dadurch bezweckte Bewegung ist offenbar ein Aneinander-rücken der beiden Knorpelcomplexe und zugleich auch bis zu einem gewissen Grade ein Auseinanderweichen der beiden Höcker. Wozu aber eine derartige Bewegung dienlich sein könne, ist uns nicht klar geworden. Ebenso wenig ist der Zweck des Zerfallens der beiden Knorpelsysteme in je zwei Stücke recht begreiflich. Ob die Möglichkeit einer Bewegung oder Verschiebung beider Knorpelstücke aufeinander durch dieses Gelenk erreicht ist, steht dahin. Es stellt eine Art Synarthrosis dar, welche jedenfalls durch die Elasticität der Bandmasse allein eine Bewegung gestatten könnte.

Das vordere Zungenknorpelstück hat bei *Neritinen*-exemplaren mittlerer Grösse eine Länge von 0,915 Mm. und an der breitesten Stelle eine Breite von 0,476 Mm. Es nimmt allmählig nach vorn zu an Breite ab, und endigt mit einer stumpfen Spitze. Der Höcker dieses vorderen Stückes ist etwa 0,264 Mm. lang und an seiner Basis 0,159 Mm. breit. Das hintere Knorpelstück hat von vorn nach hinten einen Durchmesser von ungefähr 0,265 Mm., und misst in der Quere 0,476 Mm., wie



rita stimmen der Gestalt nach mit dem Zungenknorpelapparat der *Neritina* vollkommen überein. Jederseits sind auch hier zwei Knorpelstücke vorhanden, denn man kann das auch als Scheidelinie der beiden Stücke deuten, was zuerst in der Zeichnung als der perspektivische Ausdruck der Basis eines Knorpelstückes erscheinen möchte. Ob die beiden Höcker des vorderen Knorpelstückes auch bei *Nerita* vorhanden sind, kann man aus der Quoy - Gaimard'schen Zeichnung nicht ersehen. Eine zwischen den beiden Knorpelcomplexen gespannte Membran verbindet dieselben bei *Nerita*, der Darstellung der französischen Anatomen nach; jedoch hätte sich höchst wahrscheinlich diese angebliche Membran unter dem Mikroskop nicht als Knorpelsubstanz, sondern als ein dünner platter Muskel erwiesen. Es ist offenbar das straffe quere Muskelband, das wir eben auch bei *Neritina* erwähnten und welches wir auch der Straffheit wegen mit dem blossen Auge für Knorpel hielten.


Ueber das Vorhandensein von Zungenknorpeln bei anderen Schnecken finden sich in der Litteratur vielfache Angaben, welche jedoch meistens unbeachtet blieben, so dass Siebold in seinem Handbuch der vergleichenden Anatomie das Vorkommen von Knorpeln bei Cephalophoren nicht einmal erwähnt. Selbst Cuvier hat schon einigemal in seinen vor trefflichen Beobachtungen der Zungenknorpel Erwähnung gethan. So z. B. in Bezug auf *Buccinum undatum* ¹⁾ bemerkt er, dass die Zunge auf zwei längliche Knorpeln gespannt ist, die verschiedene Bewegungen auszuführen im Stande sind. Bei *Patella* ²⁾ fand er jederseits der Zunge einen knorpeligen aus zwei Stücken bestehenden Körper. Seitdem haben Delle Chiaje, Valenciennes, Quoy und Gaimard, Moquin-Tandon u. A. m. aber namentlich Osler und Lebert die Zungenknorpel verschiedener Schnecken mehrfach gesehen und abgebildet, so dass wir die Ansicht aufstellen dürfen, dass bei allen Cephalophoren die Zunge sich auf

1) Mémoire sur le grand Buccin de nos côtes, p. 9.

2) Mémoire sur l'Haliotide, le Sigaret, la Patelle etc. p. 17.

ein oder mehrere Knorpelstücke stützt, die zum Ansatz verschiedener Muskeln behufs der Bewegung derselben dienen.

Wenn wir flüchtig die verschiedenen Schneckengruppen durchmustern, so finden wir, dass die Zungenknorpel schon fast bei allen gefunden wurden. Unter den Ctenobranchiaten zuerst wurden die Knorpel von *Buccinum undatum* ausser von Cuvier noch von Souleyet¹⁾, Valenciennes²⁾ und Lebert³⁾ gesehen. Valenciennes namentlich hat eine schöne Abbildung derselben geliefert. Delle Chiaje⁴⁾ beschreibt sie bei *Buccinum (Dolium) Galea* als zwei bernsteinartige, hornartige Schüppchen, die eine halbmondförmige Gestalt besitzen. Ihr Verhältniss zur Zunge beweist, dass diese Organe wohl dasselbe sind wie die fraglichen Knorpel, nur würde Delle Chiaje's Beschreibung beinahe daran zweifeln lassen, dass sie aus Knorpelsubstanz bestehen, wenn nicht Troschel⁵⁾ dieselben wieder gesehen und als Knorpel bezeichnet hätte. Souleyet⁶⁾ fand die Zungenknorpel bei *Pyrula tuba*, und Leiblein⁷⁾ bei *Murex brandaris*, wo er dieselben als zwei runde kieferartige Gebilde bezeichnet. Unter den mit *Neritina* verwandten Gattungen wurden sie von Quoy und Gaimard⁸⁾ bei *Navicella* beob-



da die kleineren Knorpelstücke wohl die hintersten sind, wie bei *Neritina*. Bei *Turbo scaber* scheinen sie von Souleyet gesehen worden zu sein, ohne dass er besonderes Gewicht darauf legte. Sie sind nämlich in einer seiner Zeichnungen¹⁾ sehr kenntlich abgebildet, obgleich er nirgends im Texte davon spricht und dieselben nicht einmal mit einem Buchstaben auf seinen Tafeln bezeichnet. Troschel²⁾ bildet sie bei *Turbo Sarmaticus* ab, wir vermuthen aber, dass unter den noch am einzigen paarigen dargestellten Knorpelstücke hängenden Muskelfasern das hintere kleinere Knorpelstück verborgen blieb. Die Zungenknorpel von *Trochus* wurden von Osler³⁾ in seiner vortrefflichen Abhandlung beschrieben. Er hält dieselben für knorplige Kiefer, und giebt an, dass sie sich mittelst eines Ligaments wie ein Buch öffnen und schliessen. Es ist dieses Ligament nichts Anderes, als das quere Muskelband, das wir bei *Neritina* kennen lernten. Mit dem hinteren Theile jedes Knorpelstückes ist ein anderes kleineres durch ein Ligament verbunden, also gerade wie bei *Neritina*. Bei *Littorina littorea*, die ebenfalls von Osler⁴⁾ studirt wurde, ist die Uebereinstimmung mit *Neritina* noch schlagender: auf die Knorpel ist die Reibmembran gespannt. Die Knorpel selbst stecken in einer dicken Grundlage (in a thick base) gerade wie eine Eichel in ihrer Schale und von jedem geht ein Processus ab, der mit den Anderen wie ein Guckloch (loop) bildet, wodurch die Zunge durchgeht. Diese beiden Processus sind offenbar denen ganz ähnlich, die wir bei *Neritina* trafen und die Eichelschale ist ganz einfach das hintere Knorpelstück. Dass Osler dessen knorplige Natur nicht erkannte, muss nicht befremden, da er das Mikroskop

1) A. a. O. Atlas. Pl. 38. fig. 3 u. 4.

2) Das Gebiss der Schnecken. Tab. 1. Fig. 13.

3) Observations on the anatomy and habits of marine testaceous mollusca by Edw. Osler. — Trans. of the Roy. Soc. of London 1832. p. 497. Pl. XIV. Fig. 1, 2, 3 von *T. crassus*.

4) Ibid. p. 502. Pl. XIV. Fig. 7.

nicht zu Hülfe nahm. Bei *Janthina* hat Delle Chiaje ¹⁾ sehr grosse Zungenknorpel abgebildet und selbst den cellulösen Bau derselben auf den Tafeln angegeben. Trotzdem aber erkannte er ihre Beschaffenheit nicht, da er dieselben ganz einfach als zwei elliptische, etwas dicke Körper bezeichnet, welche mit den Cotyledonen einer Bohne Aehnlichkeit haben. Derselbe hat ebenfalls bei *Cypraea* (*C. pyrum*) ²⁾ die Zungenknorpel abgebildet. Er hat sich nur darin vergriffen, dass er meinte, diese Knorpel bildeten eine die Zunge einschliessende Kapsel. Bei *Paludina* wurden sie von Lebert ³⁾ und Moquin-Tandon ⁴⁾ beobachtet. Lebert giebt ihrer zwei an, während Moquin vier Stücke gefunden haben will und er hat wahrscheinlich darin Recht. Unter den Coriocyten wurden sie von Bergh ⁵⁾ bei *Onchidiopsis* und *Marsenina* gefunden und schon vorher hatte Delle Chiaje ⁶⁾ dieselben bei *Sigaretus* gekannt.

Auch bei den s. g. ächten Scutibranchiaten und zuerst bei *Haliotis tuberculata* wurden die Zungenknorpel von Delle Chiaje ⁷⁾ und Lebert ⁸⁾ beobachtet; ebenfalls bei *Parmophorus* von Quoy und Gaimard ⁹⁾; unter den Cyclo-

branchiaten bei *Chiton* von Osler ¹⁾ und Middendorff ²⁾ bei *Patella* von Cuvier ³⁾, Delle Chiaje ⁴⁾, Osler ⁵⁾ und Huxley ⁶⁾. Cuvier gab bei *Patella vulgata* zwei Systeme von je zwei Knorpelstücken an; den Abbildungen nach scheint Delle Chiaje im Ganzen nur zwei Knorpelstücke gesehen zu haben; Osler verzeichnet ihrer neun und Huxley wie Cuvier nur vier. Es sind in der That acht vorhanden (Fig. 18.). Dieselben vier Knorpelstücke wie bei *Neritina* existiren nämlich auch bei *Patella vulgata*, nur sind die hinteren (Fig. 18. a.) bedeutend dicker und mit einem stumpfen Fortsatz nach Aussen versehen. Der äussere Rand der vorderen Stücke (b.), die ausserdem verhältnissmässig viel länger als bei *Neritina* sind, ist sehr verdickt. Dabei kommen noch vier Knorpelstücke hinzu: zuerst auf dem vorderen Hauptstück (Osler's lateral jaw) zwei dünne dreieckige knorpelige Platten (c.), die etwa denselben Platz einnehmen, wie die beiden höckerigen Fortsätze bei *Neritina*. Es sind dies in der That nichts anderes als diese Höcker selber, da sie hier in Betreff der Radula gerade dieselbe Rolle wie bei *Neritina* spielen, nur sind sie bei letzterer dem vorderen Knorpelstück angewachsen, während sie bei *Patella* gesonderte Knorpelstücke bilden. Endlich sind noch zwei Knorpelstücke vorhanden (d.), deren jedes an der äusseren Seite des einen Hauptknorpelstückes und an dem vorderen Theil desselben ansitzt. Sie sind ziemlich genau kegelförmig. Die Basis des Kegels aber ist nach vorn und die Spitze nach hinten gerichtet. Osler will noch ausserdem ein neuntes Stück gefunden haben, welches vor den anderen zu finden

1) A. a. O. p. 506. Fig. 11—12.

2) Beiträge zu einer Malacozoologia Rossica. Petersburg 1847. p. 61. Tab. VIII. Fig. 2, und Tab. V., Fig. 5 und 6. — Es sind seine s. g. Bewegungsblasen.

3) Mémoire sur l'Haliotide, le Sigaret, la Patelle etc. s. 17.

4) Poli's Testacea utriusque Siciliae. T. III. Tab. LVI. Fig. 22. Ebenfalls nur nach der Abbildung.

5) A. a. O. p. 506. Pl. XIV.

6) On the Morphology of Cephalous Mollusca. Transact. of the Roy. Soc. of London. 1853. Part I. S. 29.

sein soll und von ihm der obere Kiefer (upper jaw) im Gegensatz zu seinen seitlichen Kiefern benannt wurde. Es ist dies aber der wirkliche Oberkiefer, welcher nicht aus Knorpel besteht, sondern eine hornartige Beschaffenheit (wahrscheinlich Chitin) darbietet. Es wird auch dieses Stück ein Mal von Osler als knöchern (bony) bezeichnet. Huxley hat leider Osler's Abhandlung nicht gekannt und machte aus den Knorpeln a und b (Fig. 18.) ein einziges Stück. Die beiden Knorpel c hat er dabei übersehen ¹⁾. Bei der zierlichen *Patella pellucida* finden wir die Zungenknorpel ganz gleich gestaltet.

Unter den Tectibranchiaten hat Delle Chiaje die Zungenknorpel bei *Pleurobranchus* und *Pleurobranchidium* abgebildet, aber verkannt, indem er dieselben *lobi ossei* oder *calcari* nennt ²⁾. Bei *Aplysia* ³⁾ dagegen erwähnt er zweier „Knorpel“, die aber ihrer Lage nach unmöglich Zungenknorpel sein können. Es sind wohl die Kiefer. – Unter den Gymnibranchiaten wurden die Zungenknorpel von Lebert ⁴⁾ bei *Doris* gefunden und von Delle Chiaje ⁵⁾ ebenfalls bei *Doris* und ausserdem bei *Tritonia* (er hielt sie aber für hornartig). Bei der letztgenannten Gattung wurden sie auch von Alder und Hancock ⁶⁾ als „semicartilaginous body“ erwähnt. Unter den Ap-

selben wiederum für hornartig erklärte. Hancock und Embleton ¹⁾ haben sie noch als „two corneous plates“ bei *Aeolis papillosa* beschrieben. Auffallend ist, dass bei *Tergipes Edwardsii* der einzige unpaarig vorhandene Zungenknorpel eine runde Scheibe darstellt, welche wie ein abgeflachtes Amylumkorn geschichtet ist. Leider theilt Nordmann über die histologische Beschaffenheit desselben nichts mit.

Ogleich die Pulmonaten so oft und von so verschiedenen Forschern untersucht worden sind, so ist doch die bei ihnen vorkommende Knorpelplatte beinahe allen entgangen. Nur bei Stiebel und Moquin-Tandon ²⁾ finden wir hierüber einige sehr mangelhafte Angaben. Bei *Testacella* ³⁾ hat letzterer eine ganz riesig grosse Knorpelplatte gefunden. Auch bei *Limax marginatus* ⁴⁾ und *Vitrina major* ⁵⁾ hat er die Knorpelplatte abgebildet, aber sehr ungenau, da er dieselbe verstümmelte und nur den kleinsten vorderen Theil derselben wahrnahm. Bei allen von uns untersuchten Pulmonaten ist ein einziges Knorpelstück vorhanden, welches aber nach hinten gegabelt ist, so z. B. bei *Clausilia parvula* (Fig. 20), *Pupa secale* (Fig. 21), *Limax agrestis* (Fig. 22), *Helix candidula*, *Helix carthusianella* (Fig. 23), *Helix hispida*, *Vitrina pelucida* (Fig. 24), *Ancylus fluviatilis* (Fig. 25), *Ancylus lacustris* ⁶⁾, *Succinea amphibia* etc. Die Gestalt dieser Knorpel-

1) On the anatomy of Eolis. — Annals and Magazine of Natural History. Vol. XV. 1845. p. 4. Pl. I. Fig. 4. a., 9. a. Pl. II. Fig. 5 und 7.

2) Troschel hat zwar schon früher die Knorpelplatte bei den Limacinen gekannt, aber ihre wahre Natur verkannt, indem er dieselbe mit dem Namen eines „trogähnlichen Muskels“ belegte. — S. Ueber die Mundtheile etc. a. a. O. p. 259. — Die „Cartilago hyoidea“, welche Stiebel bei *Limnaeus* erwähnt, wird aber wohl den Zungenknorpel bedeuten. — *Limnaei stagnalis anatome*. Göttingae 1815. p. 22.

3) A. a. O. Pl. V. Fig. 2. von *Testacella haliotidea*.


4) A. a. O. Pl. II. Fig. 7.

5) A. a. O. Pl. VI. Fig. 17.

6) Troschel hat ebenfalls der Knorpelplatte von *Ancylus lacustris* gedacht, aber ihre Natur wiederum verkannt, indem er darin zwei kugelige Muskeln sehen wollte, die der Zunge als Stütze dienen.

platte variirt je nach den Gattungen, jedoch unbedeutend, und man darf wohl vermuthen, dass bei allen ächten Pulmonaten diese Form herrschen wird.

Die *Pulmonata operculata*, wenigstens diejenigen, welche getrennten Geschlechtes sind (die Gattung *Ampullacera* Quoy ist bekanntlich Zwitter) weichen in Betreff der Zungenknorpel von den ächten Pulmonaten sehr ab, und nähern sich den Ctenobranchiaten an, wie dies zu erwarten war, da die ganze Anatomie dieser Thiere darauf hinweist, dass sie gar nichts mit den Pulmonaten zu schaffen haben. Die Knorpelstücke von *Cyclostoma elegans* wurden schon von Brard ¹⁾ gekannt, welcher dieselben als „knöchern“ bezeichnete. Moquin-Tandon ²⁾ hat sie wieder gesehen. Es sind ihrer nicht zwei, wie Brard wollte, sondern vier gerade wie bei *Neritina* und *Navicella*. Das vordere grössere Stück ist platt gedrückt und dessen äusserer Rand leistenartig verdickt. Die innere Seite ist mit einem spitzen Fortsatz versehen und die Platte läuft nach vorn zu ebenfalls in eine Spitze aus. Das hintere Stück ist sehr klein. Bei *Pomatias maculatum* sind gleichfalls vier Knorpelstücke vorhanden. Die vorderen grösseren Stücke (Fig. 19. a) sind stark nach innen gekrümmt



Ende der Knorpel jederseits noch zwei viereckige Scheiben mit abgerundeten Ecken liegen. Ob dieselben ebenfalls knorpeliger Natur sind, wird nicht angeführt. Schon früher hatte Cavolini ¹⁾ diese Knorpel der Carinarien gekannt, aber dieselben für fleischig gehalten. Huxley ²⁾ erwähnt auch zweier eiförmiger Knorpel bei *Firoloides Desmarestii* und bei *Atlanta* ³⁾ giebt er an, der Mechanismus der Zunge sei gerade derselbe wie bei *Firoloides*, so dass man daraus schliessen dürfte, dass die Zungenknorpel auch bei den Atlanten vorkommen.

Es blieben demnach beinahe nur die Pteropoden übrig, bei denen nichts von Zungenknorpeln nachgewiesen worden wäre. Vielleicht auch fehlen sie bei manchen derselben. Die Zunge bleibt ja bei den Hyalaceen nach Gegenbaur's Angaben ⁴⁾ auf einer niederen Stufe stehen, indem selbst kein muskulöser Apparat zum Hervorstrecken der Zunge vorhanden ist und bei den Cymbulien soll an der Stelle der Reibmembran nur noch ein leichter Vorsprung zu finden sein ⁵⁾, der anstatt der Zähne bloss verhornte Epidermiszellen trägt. Bei den Cliideen zwar ist die Reibmembran viel mehr entwickelt, aber Gegenbaur hat bei ihnen auch keinen Knorpel beobachtet.

Somit wäre also dargethan, dass die Anwesenheit von Zungenknorpeln bei den Cephalophoren ein ziemlich durchgreifendes Faktum ist, ein Satz, der schon neuerdings von Troschel aufgestellt wurde. Es würde noch zu wünschen sein, dass man nachweisen könnte, diese Knorpel seien ebenso gut zum Zweck der Klassifikation zu verwerthen, wie die Reibmembran selbst. Leider steht uns das Material nicht zu

1) „Corpora bina lateralia, carnosae, intra collum seu cavitatem oris locata, quae exerentibus maxillis valde conferunt.“ — Handschriftliche Bemerkung von Cavolini. S. Delle Chiaje's Memoria sulla storia etc. p. 69.


2) A. a. O. p. 31.

3) A. a. O. p. 37.

4) Untersuchungen über die Pteropoden und Heteropoden. Leipzig 1855. p. 7.

5) A. a. O. p. 47.

Gebote und wir müssen uns nur mit spärlichen Andeutungen begnügen. Bei *Neritina*, *Navicella*, *Littorina*, *Paludina*, *Cyclostoma*, *Pomatias* besteht der Zungenknorpelapparat aus einem paarigen Complex von je zwei Knorpelstücken, deren hinteres im Vergleich zu dem vorderen sehr klein ist. Bei *Trochus* ist der Apparat ganz derselbe, nur hat sich ein Processus des vorderen Knorpelstückes abgelöst und steht als eigener Knorpel da. Dieses Verhältniss wird wohl überall bei den Ctenobranchiaten und Pulmonata operculata dasselbe sein. Bei gewissen Cyclobranchiaten (Patellen) ist der Apparat ganz ebenso zusammengesetzt, nur kommen noch zwei seitliche Knorpel hinzu, und die beiden Processus bleiben getrennt wie bei *Trochus*. Zwar soll bei anderen (Chitonen) nach Middendorff der Apparat nur aus zwei Knorpeln zusammengesetzt sein, und in Uebereinstimmung mit dieser Angabe finden wir in der That bei einem kleinen Chiton (*C. marginatus* Penn.) von der norwegischen Küste jederseits nur ein Knorpelstück. — Bei den Pulmonaten verschmelzen nach vorn die beiden Hälften des Apparates und das hintere Knorpelstück verschwindet; dadurch entsteht eine unpaarige, mittlere, nach hinten gegabelte Knorpelplatte. Wir können leider



eine mikroskopische Untersuchung der Zungenknorpel einliess, war Lebert. Er erkannte, dass sie bei *Buccinum undatum*¹⁾ aus Zellen bestehen, die den Pflanzenzellen oder den kernhaltigen Zellen der Chorda dorsalis einiger Batrachierembryonen nicht unähnlich sind. Diese Zellen sollen gruppenweise zusammengestellt sein, und zwischen den einzelnen Gruppen soll sich die Intercellularsubstanz befinden. Bei *Haŕiotis* fand Lebert²⁾ die Knorpelplatte nicht aus wahren Knorpelgewebe, sondern vielmehr aus einer knorpelähnlichen Fasermasse, ähnlich wie das „von den Franzosen unpassend fibro-cartilage genannte Gewebe.“ Im Jahr 1844 beschrieb Valenciennes³⁾ bei Gelegenheit der bei den Cephalopoden vorkommenden Knorpel auch die Zungenknorpel von *Buccinum undatum*, deren Entdecker er zu sein glaubte, und gab eine Abbildung des Gewebes derselben bei 300maliger Vergrösserung. Huxley bei *Firoloïdes Desmaresti* giebt an, dass die eiförmigen Zungenknorpel aus hellen, dickwandigen, dem Knorpel etwas ähnelnden Zellen besteht⁴⁾. Bergh hat dieses Gewebe bei *Onchidiopsis* und *Marsenina* untersucht⁵⁾. Es soll dasselbe nach seinen Angaben an Faserknorpel beträchtlich erinnern, indem es aus ziemlich grossen, sich zertheilenden, netzförmig verbundenen und in einander geschlungenen Fasern bestehen soll. Die Maschen des Gewebes sollen mit einer feinkörnigen Masse erfüllt sein und ausserdem einige grössere Zellen enthalten, worüber die Fasern mehr angesammelt und zusammengedrängt sind. Der Abbildung Bergh's nach möchten wir beinahe vermuthen, diese netzförmig geschlungenen Fasern seien nichts Anderes, als die Wandungen

1) A. a. O. p. 442.

2) A. a. O. p. 450.

3) A. a. O. Pl. XXV. Fig. 7.


4) A. a. O. p. 31.

5) Bidrag til en Monographi af Marseniaderne af Rudolph Bergh. (Besonderer Abdruck aus kongl. Danske Videnskabernes Selskabs Afhandlinger. 5te Raekke. 3die Bind.) Kjöbenhavn 1853. — S. 54. Tab. III. Fig. 23.

der weiter unten bei *Neritina*, *Cyclostoma* u. s. w. zu beschreibenden Knorpelzellen.

Der Dürftigkeit dieser verschiedenen Angaben allein fällt es zur Last, dass der mikroskopische Bau der Zungenknorpel noch so wenig bekannt ist und dass Troschel in der eben erschienenen ersten Lieferung seines Werkes über das Gebiss der Schnecken den Satz ausspricht, dass bei allen Schnecken die Zungenknorpel aus demselben zellenähnlichen Gewebe bestehen. In der That muss man zwei bis drei Varietäten im Bau dieser Knorpel unterscheiden, deren wir die erste gleich an einem Beispiel, unserer *Neritina* nämlich, kennen lernen wollen.


Am meisten Aehnlichkeit hat die Knorpelsubstanz sowohl der Lippen- wie der Zungenknorpel der *Neritina* mit dem Froschknorpel, obgleich sie durch die grossen geräumigen Zellen und verhältnissmässige Grösse der Zellenhöhlen viel schöner und zierlicher erscheint. Es ist keine Intercellularsubstanz vorhanden, oder wenigstens ist dieselbe so spärlich vertreten, dass man kaum hie und da ein geringes Auseinanderweichen der Zellwände wahrnimmt. Betrachtet man ein fertiges, d. h. in der Vermehrung nicht mehr begriffenes Knor-



Die in der Vermehrung begriffenen Neritinenknorpelzellen sind sehr zierlich anzuschauen. Zuerst waren wir geneigt, eine gewöhnliche endogene Zellenbildung anzunehmen, aber die constant wahrgenommenen Bilder liessen sich kaum mit einer solchen Anschauungsweise in Einklang bringen. Viel wahrscheinlicher erscheint es, dass eine einfache Theilung durch Bildung von Scheidewänden innerhalb der Mutterzellen vor sich geht. Man sieht die erste Andeutung einer Zellentheilung als eine feine kaum sichtbare Linie auftreten, welche quer durch die Zelle läuft und die Wand derselben senkrecht trifft. Die zwischen den beiden so gebildeten Tochterzellen entstandene Scheidewand nimmt allmählig an Dicke zu und eine neue Theilung tritt bald hernach ein, indem sich eine feine Linie, welche die beiden neu entstandenen Tochterzellen in der Quere genau halbirt auf die Scheidewand senkrecht setzt. Dadurch bilden sich in den beiden Tochterzellen je zwei Enkelzellen. Dieser Prozess wiederholt sich noch ein paar Mal und man trifft nicht selten solche Urmutterzellen, welche durch eine vier Mal wiederholte Bildung von Scheidewänden in sechszehn Tochterzellen zerfallen sind. Der Anblick dieser getheilten Mutterzellen wird dadurch sehr merkwürdig, dass jede Wand eine ihrem Alter entsprechende Dicke besitzt. Die Wände der Mutterzellen, die wir abgebildet haben (Fig. 13.) erscheinen sehr dick, weil die Grenzlinie zwischen je zwei benachbarten Mutterzellen noch nicht sichtbar ist, und die Dicke der Membran deshalb doppelt erscheint. Die Mutterzelle, welche einen Durchmesser von 0,037 Mm. besitzt, wird von einer ziemlich dicken Scheidewand, worauf sich eine zweite, beinahe gleich dicke gesetzt hat, in vier gleiche Quadranten getheilt. In jedem so gebildeten Quadranten zeigt sich eine der zuerst erschienenen genau parallele Scheidewand, deren Dicke bedeutend geringer ist als die des Kreuzes, welches durch die beiden ersten Scheidewände gebildet wird. Endlich wird jede der auf diese Weise entstandenen acht Zellen durch eine neue, noch erheblich dünnere, oft kaum wahrnehmbare Scheidewand halbirt. Die durch die letzte Theilung gebildeten sechszehn Enkelzellen

besitzen einen Durchmesser von 0,0094 Mm., und sind ziemlich regelmässig viereckig. Eine jede zeigt aber in der Fokalebene des Mikroskopes vier ungleich dicke Seiten, denn die eine ihrer Wände gehört der ersten Generation, eine zweite der zweiten u. s. w. an. Da ausserdem jede Tochterzelle der letzten Generation einen rundlichen deutlichen Kern besitzt, so ähnelt die ganze Urmutterzelle einem Schachbrett mit den Schachfiguren auf den Rauten (Fig. 13). Das Verhalten der Kerne bei der Theilung konnte leider nicht belauscht werden. Das Bild bietet übrigens nicht immer eine solche Regelmässigkeit, doch sind die Störungen nicht beträchtlich, und wenn die Theilung in 16 Tochterzellen nicht sehr häufig, so sind die Beispiele eines Gitters von vier oder acht Tochterzellen in einer Mutterzelle immer zahlreich vorhanden. Mitunter theilt sich eine Tochterzelle erst später als die Zellen derselben Generation, und dadurch entstehen, wie begreiflich, leichte Störungen der Regelmässigkeit.

Wie schon angedeutet, so erscheinen die Scheidelinien zweier benachbarter Urmutterzellen nicht, so lange die Spuren der Theilung noch vorhanden sind. Dasselbe gilt von den in den Mutterzellen entstandenen Tochterzellen. Die Scheide-



Zur Untersuchung des Neritinenknorpels ist es sehr wichtig, sich sehr dünne Schnitte der Zungenknorpel verschaffen zu können. Dies wurde durch eine Methode erreicht, die wir zuerst von Herrn Sanio zur Durchschneidung von kleinen Pflanzentheilen in Anwendung bringen sahen. Der Knorpel wird auf einer kleinen Stearinstange durch Erhitzung derselben befestigt, und mittelst eines scharfen Rasirmessers werden dünne Schnitte durch die Stange geführt, bis man einen Schnitt durch den kleinen Knorpel bekommt. Stearin eignet sich ganz besonders zu diesem Zwecke, weil der Hitzegrad, wobei dasselbe schmilzt, dem Knorpel keinen Eintrag thut.


Ursprünglich besteht der Zungenknorpel bei den Neritinenembryonen aus 0,002 bis 0,003 Mm. grossen, dicht aneinander gedrängten Zellen, welche eine grosse Aehnlichkeit mit den Zellen haben, welche das ganze embryonale Mantelparenchym bilden, dieselben verwandeln sich allmählich in die charakterischen grossen Zellen des Neritinenknorpels.

Beiläufig wollen wir bemerken, dass einige in einer Mischung von Glycerin und Alkohol aufbewahrte Präparate sich trefflich erhalten haben, während sich bei anderen, welche in Chlorcalcium eingeschlossen wurden, die meisten Zellwände, vielleicht nur einer schlechten Zubereitung der Lösung wegen nach wenigen Monaten aufgelöst hatten. Merkwürdiger Weise haben sich bei den letzteren in jedem Stück die Höcker des vorderen Zungenknorpels ganz herrlich erhalten, während die übrigen Theile des Knorpelapparates gänzlich oder beinahe gänzlich verschwunden sind.

A priori kann man jedenfalls vermuthen, dass der Neritinenknorpel beim Kochen wenig oder gar keinen Leim geben werde, da neuere Untersuchungen gezeigt haben, dass die leimgebenden Gewebe nicht, wie man früher glaubte, durch Umwandlung ihrer Zellen, sondern durch Umbildung der Zwischenzellensubstanz den Leim erzeugen, und wir sahen eben, dass der Neritinenknorpel so zu sagen keine Interzellularsubstanz enthält.

Ganz ähnlich wie bei *Neritina* und vielleicht noch günstiger zur Beobachtung sind die Zungenknorpel bei *Cyclostoma*


elegans gebildet. Feine Durchschnitte derselben sind sehr leicht entweder auf Kork oder auf einer Stearinstante herzustellen, und man kommt ohne Schwierigkeit dazu, Schnitte zu bekommen, welche nur eine Zellschicht enthalten, was die Beobachtung sehr erleichtert. Diese Zellen sind bald ganz durchsichtig, bald wie mit grossen, hellen Körnern oder Tropfen erfüllt (Fig. 14. a), welche die Beobachtung stören; dagegen aber kann man sich durch Anwendung von Essigsäure helfen. Bei Essigsäurezusatz trübt sich zwar der Knorpelschnitt dadurch, dass eine wahrscheinlich eiweisshaltige Substanz in den Zellen niedergeschlagen wird. Dieser Niederschlag löst sich indessen allmählig in der Säure selbst wieder auf und die Präparate werden so durchsichtig wie man nur irgend wünschen kann. Dieses Verfahren ist namentlich sehr zweckmässig, wenn man keinen Schnitt, sondern ein ganzes unverletztes Knorpelstück untersuchen will. Noch besser gelangt man zum gewünschten Resultate durch Anwendung einer concentrirten Kochsalzlösung anstatt der Essigsäure. Dabei werden die Zellen so schön und klar, dass man glauben möchte, sie seien nur mit reinem Wasser erfüllt. Aber sobald man das Knorpelstück auswäscht und in destillirtes Wasser



sung der Zellmembran von der s. g. Kapsel herbeiführt, macht, wie gesagt, bei *Cyclostoma* die Zellen nur durchsichtiger und den Zellkern deutlicher. Durch Säuren wurde nichts mehr erreicht. Die Zellentheilung geht gerade wie bei *Neritina* vor sich, nur ist das Bild weniger regelmässig, indem sich zuerst eine mittlere Scheidewand in der Zelle bildet und andere mehrere sich in den verschiedensten Richtungen darauf setzen (Fig. 15). Das erste Zeichen der Theilung ist auch hier eine zarte Linie, die quer durch die Zelle läuft. Diese Linie wird allmählig dicker und scheint stets in die Substanz der Mutterzellwand selbst direkt überzugehen. Nicht selten werden Zellen mit mehreren Kernen getroffen. Ob das ein der Theilung vorangehendes Stadium ist, steht dahin. Die jungen Tochterzellen sind meist sehr unregelmässig, die einen drei-, die anderen vier- oder fünfeckig, aber dadurch, dass sie an Grösse zunehmen und dabei einen Druck auf einander ausüben und in den umgebenden Mutterzellen Widerstand finden, nehmen sie allmählig eine ziemlich regelmässig sechs- mitunter nur fünfseitige Gestalt an. Die Zellentheilung scheint im vorderen Theile des vorderen Knorpelstückes am lebhaftesten vor sich zu gehen, und wird überhaupt nur in der oberflächlichen Schicht angetroffen. Für die Annahme einer Zwischenzellensubstanz oder einer s. g. Knorpelkapsel scheint kein Grund vorhanden zu sein.

Bei *Pomatias maculatum* ist der Knorpelbau ganz derselbe. Die Zellen haben etwa den gleichen Durchmesser, nur erreicht die Dicke zweier benachbarter und mit einander verwachsener Zellwände kaum 0,0010 Mm., so dass hier noch weniger an die Möglichkeit einer Grundsubstanz zu denken ist. Bei *Patella vulgata* und *pellucida*, *Bythinia impura* und *similis* sind die Knorpel auch nach demselben Typus beschaffen, ebenso bei *Buccinum undatum* – wenn man nach Valenciennes Abbildung schliessen darf – und wahrscheinlich bei vielen anderen Ctenobranchiaten. Aber bei keiner von uns untersuchten Gattung zeigte sich der Zellenbau so ausgezeichnet schön, wie gerade bei *Cyclostoma* und *Neritina*.

Eine zweite Knorpelform finden wir bei gewissen Pulmonaten, namentlich bei *Vitrina* (Fig. 16). Es sind hier keine grossen Zellen wie bei den vorigen Gattungen vorhanden – ohne dass hierbei die Kleinheit des Thieres in Betracht kommt, da *Pomatias maculatum* nicht grösser als *Vitrina pelucida* ist, und dennoch eben so grosse Knorpelzellen besitzt wie *Cyclostoma elegans* – sondern kleine, polygonale, 0,0052 bis 0,010 Mm. breite, mit einem scharfen Kern versehene Zellen. Es haben dieselben keine Regelmässigkeit in der Gestalt: viele sind sechseckig, aber beinahe eben so viele fünf-, vier- oder dreieckig. Der Hauptunterschied zwischen dieser Form und der vorigen liegt ausser der Kleinheit der Zellen in der abgeflachten Gestalt derselben. Da ausserdem die benachbarten, mit einander verschmolzenen Zellwände nur eine unmessbare Dicke besitzen, so macht das Ganze vielmehr den Eindruck eines Epithelial- als eines Knorpelgebildes. Bei einigen Schnecken geht übrigens diese Knorpelform in die andere über, so z. B. bei *Ancylus*, wo der vordere Theil der Knorpelplatte und namentlich die Commissur zwischen den beiden Hälften derselben den gleichen Bau wie der Vitrirenknorpel darbietet, während die Knorpelzellen nach hinten zu



ist ein ovaler Kern zu sehen. Die grössten Knorpelkörperchen erreichen bei *Helix carthusianella* einen Durchmesser von etwa 0,03 Mm. Bei vielen anderen Helixarten, so z. B. bei der gewöhnlichen Gartenschnecke (*H. pomatia*) scheint die Grundsubstanz faserig zu sein, so auch bei *Pupa*, *Clausilia* u. s. w. Diese Knorpelform wird wahrscheinlich mit dem Gewebe übereinstimmen, was Lebert bei *Haliotis* mit einem Faserknorpel verglich. Wahrscheinlich herrscht sie mit der vorigen bei den Pulmonaten durchweg; dass sie aber auch bei anderen Ordnungen vorkommen kann, zeigt eben das Beispiel von *Haliotis*. Bemerkenswerth ist die That- sache, dass der schöne, einem Pflanzengewebe durchaus ähnelnde Knorpelbau nur bei den Gattungen gefunden wurde, die keine einfache Knorpelplatte wie die Pulmonaten, sondern einen Knorpelapparat von mehreren Knorpelstücken besitzen.

Bei vielen Pulmonaten scheint die eigentliche Knorpel- substanz nur die äussere Schicht der Zungenknorpel zu bil- den, während das Centrum jedes Knorpelstückes durch eine besondere Masse eingenommen wird, worin keine Knorpel- substanz zu erkennen ist. Bei manchen, so z. B. *Ancylus fluviatilis* und *Vitrina pellucida* ist sogar schwarzes Pigment in dieser Substanz eingelagert. Schon bei *Chiton* hatte Mid- dendorff¹⁾ die Knorpel hohl gefunden, daher auch der Name „Bewegungsblasen,“ den er denselben gab. Huxley²⁾ will ebenfalls eine Höhle im Knorpel von *Patella* gefunden haben und Troschel³⁾ stimmt ihm bei. Wir können je- doch dieselbe im Hauptknorpel nicht finden, wohl aber im seitlichen, vorderen Knorpelstück (Osler's lateral jaw). Da wir aber nur Spiritusexemplare untersuchten, so wollen wir kein grosses Gewicht darauf legen.

Bei *Chiton* (*C. marginatus* Penn.) bildet jedes Knorpelstück einen an beiden Enden abgerundeten, mit Flüssigkeit prall gefüllten Schlauch. Die Schlauchwandungen sind an und für

1) A. a. O. p. 61.

2) A. a. O. p. 59.

3) Das Gebiss der Schnecken, p. 18.

sich sehr dünn, aber an gewissen Stellen, den Ansatzstellen der Muskeln, bedeutend verdickt. Diese Verdickungen werden durch mehrere Schichten von, der erst beschriebenen Knorpelform angehörenden, Knorpelzellen gebildet. Es sind dieselben klein, unregelmässig und sehr dünnwandig. Der übrige Theil des Schlauches wird durch eine einzige, durchsichtige Zellschicht gebildet, deren Zellen ähnlich, aber etwas grösser, regelmässiger und mit einem sehr deutlich hervortretenden Kern versehen sind.

Das Vorkommen von ächtem Knorpel im Zungenapparat der Cephalophoren möchte wohl darauf hinweisen, dass dieses Gewebe auch anderswo bei diesen Thieren vorkommen kann. Bis jetzt ist es nicht bekannt. Die anscheinend knorpelige Lage in einer Magenabtheilung von *Paludina vivipara* soll nach Leydig ¹⁾ aus einer homogenen Substanz bestehen und dabei bemerkt derselbe, dass kein Gewebe bei *Paludina* vorkomme, welches mit Knorpel übereinstimme! Man muss auch hinzufügen, dass er in seiner Abhandlung die Zungenknorpel nicht erwähnt. Mit dem von Moquin-Tandon am Magen der *Bythinia* angegebenen Knorpelstreifen wird es sich wohl wie bei *Paludina* verhalten. Ob es auch bei den Aply-


beiden Drüsen wie zusammengewachsen erscheinen. Mit dem blossen Auge betrachtet, zeigen sie sich als ein schwammiges, graulich weisses Organ. Der Ausführungsgang der Drüse flimmert, wie das Epithel des Schlundkopfes selbst, und es dringt derselbe unter den Schlundring, bevor er die Wandungen des Schlundes durchbohrt.

Vom Schlundkopf an läuft die Speiseröhre ziemlich gerade von vorn nach hinten und mündet in einen grossen unter der Leber und der Geschlechtsdrüse gelegenen Magen. Letzterer stellt einen grossen geräumigen Sack dar, welcher sich schräg von hinten und rechts nach vorn und links erstreckt. Er zerfällt in zwei durch eine kaum wahrnehmbare Einschnürung von einander geschiedene Theile. Der hintere Theil (Fig. 28 h.) welcher *Fundus ventriculi* heissen mag, bildet einen breiten Blindsack, welcher nach vorn in den vorderen etwas engeren Theil (h') übergeht. Letzterer erreicht beinahe den hinteren Zungenknorpelkomplex, so dass die Speiseröhre (g.) der vorderen Abtheilung des Magens auf der rechten Seite dicht anliegt und sich in dieses Organ ebenfalls auf der rechten Seite in den Magen einsenkt, an der Stelle, wo die beiden Abtheilungen durch die leichte Einschnürung von einander geschieden sind. Ganz nach vorn und in der linken Thierhälfte befindet sich der Pylorus. Der aus dem Magen entspringende Darm biegt gleich nach hinten, klappt sich um, indem er eine grosse Schlinge (k., auf der Figur umgelegt) bildet, welche unter dem Magen und der Speiseröhre zu liegen kommt, geht nach links wieder um den Pfortner und die Leber herum, wendet sich nach oben, läuft über den vorderen Theil des Magens und der Leber nach rechts hinweg und befindet sich dann dicht unter dem Boden der Kiemenhöhle. Der an dieser Stelle zum Mastdarm werdende Darm (l.) läuft unter einer grossen, gelben, weiter zu beschreibenden Drüse (d.), neben der Ruthe beim Männchen und der Scheide beim Weibchen hinweg, und mündet auf der rechten Thierhälfte und an der inneren Seite der Geschlechtsöffnung nach aussen. Der After (m.) befindet sich demnach unter dem Dachrande der Kiemenhöhle, nahe an der Stelle, wo derselbe

auf der rechten Seite in den Boden der Kiemenhöhle übergeht. — Der Darm ist also, wie man sieht, vielfach gewunden und vier oder fünf Mal so lang wie die Speiseröhre oder gar noch mehr.

Moquin-Tandon hat ganz andere Längenverhältnisse der verschiedenen Abtheilungen des Speisekanals bei der von ihm untersuchten *Neritina* angetroffen. Er bildet nämlich die Speiseröhre eben so lang und selbst viel länger und dabei viel mehr gewunden als den Darm ab; er sagt sogar von derselben¹⁾, sie sei geschlängelt und bilde ziemlich verwickelte Windungen, während wir dieselbe stets ganz gerade gestreckt gefunden haben. Der Magen soll nach ihm sehr lang gestreckt und schmal sein und keinen Blindsack nach hinten bilden. Ob diese Verschiedenheiten in einem specifischen Unterschiede der untersuchten Thiere ihren Grund haben, lassen wir dahin gestellt sein. Da aber die Auseinanderwicklung des vielfach geschlängelten Speisekanals keine so leichte ist, so können wir nicht umhin zu vermuthen, dass Moquin-Tandon sich verführen liess, den Darm mit der Speiseröhre zu verwechseln.

Noch weit abweichender ist der Tractus intestinalis von




nur noch zu wissen, ob sich alle ächten *Neriten* in dieser Beziehung wie die von Quoy und Gaimard untersuchte Species verhalten.

Der Magen bei *Neritina* befindet sich ganz auf der untern Fläche des Thieres. Wenn man das Thier von unten aufschneidet, so trifft man unmittelbar unter der Haut und dem zugehörigen Muskellager die vorher beschriebene Darmschlinge (Fig. 28 k.) mit der in ihrer Scheide eingeschlossenen Reibmembran (f.) und beim Lüften derselben erblickt man sogleich den Magen und die an seiner rechten Seite gelegene aber etwas mehr in der Tiefe verborgene Speiseröhre. Die in der Scheide eingeschlossene Reibmembran liegt etwas nach rechts gebogen, zwischen der Leibeswandung einerseits und der Darmschlinge andererseits: nicht selten geht sie gerade durch die Schlinge durch. Nur sehr behutsam darf man den Magen anfassen und von der über ihm liegenden Leber- und Geschlechtsdrüse abpräpariren, da die Speiseröhre und das Darmrohr mit der grössten Leichtigkeit an der Stelle abreißen,* wo sie in den Magen übergehen, Der Magen fällt bei diesem Abreißen nicht zusammen, sondern die Oeffnung bleibt als ein klaffendes Loch zurück.

Merkwürdig sind die verschiedenen Zeichnungen, die sich auf der Magenoberfläche zeigen. Zuerst sieht man eine ziemlich breite Linie, die sich von der Cardia aus direct bis zum Pförtner erstreckt, und sich sogar eine ganze Strecke weit auf den Darm verlängert. Lange glaubten wir in derselben eine Höhlung wahrzunehmen, aber vergebens suchten wir auf sorgfältig gemachten Querschnitten des Magens nach dem Lumen derselben, und diese Raphe stellte sich als eine einfache gleichmässige Längsfalte heraus. Senkrecht auf diese Längsfalte setzen sich eine grosse Anzahl von regelmässigen, zu einander parallelen Querfalten, welche rings um den vorderen engeren Theil des Magens laufen. Diesen Falten entsprechen auf der äusseren Oberfläche regelmässige, durch ein schwarzes Pigment gebildete dunkle Streifen. Auf dem Fundus ventriculi oder Magenblindsack endlich befindet sich eine eigenthümliche Figur, die uns lange sehr räthselhaft

blieb und die wir noch nicht mit Bestimmtheit zu deuten wagen. Es ist dies ein schön weisses kammförmiges Organ (Fig. 28. i.), das sich von der Cardia aus auf der untern Magenfläche nach rechts und hinten bis zur Leber erstreckt. Sowohl die Raphe wie die Zähne des Kammes bilden auf der äusseren freien Oberfläche des Magens deutliche Erhabenheiten, die durch eine milchweisse Färbung gegen die schwarzbraune Farbe des Fundus ventriculi stark abstechen. Die Zähne des Kammes sind nach links gerichtet und sehr regelmässig gestaltet. Je näher man der Leber kommt, um so kürzer und schmaler werden die Zähne des sich mit der Curvatur des Magens krümmenden Kammes. Vergeblich versuchten wir mehrmals das Organ von dem Magen abzupräpariren, was sich übrigens durch die Lagenverhältnisse leicht erklären lässt. Wenn man nämlich den Magen vorsichtig aufschneidet, so sieht man, dass das kammförmige Organ auf der inneren Magenfläche ebenso hervorspringt, wie auf der äusseren und hier auch die gleiche milchweisse Färbung besitzt. Das Organ ist in der That in der Magenwand selbst eingebettet. Unter dem Mikroskop zeigen die entsprechenden Stellen der Magenwand eine drüsige Beschaffenheit, ohne dass



Ductus hepaticus nämlich. Dieselbe ist auf der oberen Magenfläche nicht sehr weit von der Cardia gelegen. Der verhältnissmässig ziemlich weite Lebergang reisst sehr leicht ab und seine Ansatzstelle an den Magen bleibt als ein rundes klaffendes Loch zurück. Nach Siebold's Angaben ¹⁾ sollen sich die aus den Leberlappen heraustretenden Gallengänge bei den meisten Cephalophoren zu zwei bis drei oder mehreren Ausführungsgängen vereinigen, welche in den Darmkanal münden; trotzdem aber konnte bei *Neritina* nicht mehr als ein einziger Lebergang aufgefunden werden.

Der Darm ist cylindrisch und zeigt in dem dem Pfortner angrenzenden Theile viele Längsfalten und durch Pigment kohlschwarz gefärbte Längsstreifen. Der Flimmerüberzug setzt sich im ganzen Darmrohre bis zum After fort. In der Nähe der Afteröffnung sind wiederum zahlreiche Längsfalten vorhanden, aber der ganze unterste Theil des Darmes ist wie die Speiseröhre vollkommen pigmentlos.


In dem Magen wurden nur selten Nahrungsstoffe angetroffen, vielleicht weil die in der Gefangenschaft aufbewahrten Neritinen nur ausnahmsweise fressen. Die vordere engere Magenabtheilung war fast stets mit einer dicklichen, zähen, durch die Galle bräunlich grün gefärbten Flüssigkeit erfüllt. Die Fäces bilden niemals Kothballen im Darne, sondern einen einförmigen, halbfüssigen Brei, worin fast ausschliesslich Diatomaceenschalen als feste Bestandtheile gefunden wurden, so dass die Neritinen vorzüglich von mikroskopischen Organismen zu leben scheinen.

Unter den dem Darmkanal angehörigen Drüsen haben wir schon die Speicheldrüsen abgehandelt. Als Galle absonderndes Organ ist eine Leber vorhanden, welche verhältnissmässig nicht so sehr entwickelt ist, wie bei den meisten anderen Cephalophoren. Sie liegt dem Magen auf und kann sogar nur schwierig von demselben abpräparirt werden. Andererseits greifen die Leber- und Geschlechtsdrüsenfollikeln so in einander, dass die beiden Drüsen ohne Zerreissung von

1) Handbuch der vergleichenden Anatomie. p. 326.

einander nicht getrennt werden können. Die Leber liegt so zu sagen zwischen dem Magen und der Geschlechtsdrüse und besteht aus zwei ungleich grossen Lappen. Die Gestalt des Gehäuses bei *Neritina* ist eine solche, dass das in der letzten Windung liegende Stück des Thieres wie ein Zapfen an der rechten Thierseite hängen bleibt. Dieser Zapfen wird durch einen Lappen (Fig. 28 b') der Geschlechtsdrüse gebildet, worunter ein Leberlappen (c'), als eine dünne, braune von der Geschlechtsdrüse nicht zu trennende Schicht zu sehen ist. Es ist dies der zweite kleinere Leberlappen; der erste grössere (c.) ist der dem Magen aufsitzende. Die Bildung der Galle in den Leberzellen findet nach dem von Meckel gegebenen Schema statt. Jedoch trifft man nicht bei *Neritina* wie bei vielen Planorben, Limnaeen u. s. w. gewisse Zellen, welche ausschliesslich Gallenfett und andere nur Gallenstoff enthalten. Es ist dies nur der seltenere Fall. Vielmehr schien es, als ob die beiden Stoffe zugleich mit wenigen Ausnahmen in jeder Zelle gebildet würden.


Noch eine andere Drüse findet man bei *Neritina*, worüber sich jedoch nur wenig sagen lässt. Diese Drüse zeigt je nach den Individuen die verschiedensten Entwicklungsstufen.



solche Rolle beanspruchen dürfte, nur ist auffallend, dass ein solches Verhalten der Niere bei keinem Cephalophoren bekannt ist. Bei keinem sieht man dieselbe bald eine fabelhafte Grösse annehmen, bald bis zum Verschwinden abnehmen. Sekretbläschen sind in den Drüsenzellen nicht vorhanden. Der Inhalt wurde zwar auf Harnsäure durch Murexidfärbung nicht geprüft, da die Kleinheit des Gegenstandes eine solche Prüfung kaum gestattete, dass aber die winzigen farblosen, in der Drüse vorhandenen Körnchen den abgesonderten Harn darstellen sollten, möchte nicht sehr wahrscheinlich erscheinen, wenn man dieselben mit den Harnconcrementen der Pulmonaten z. B. vergleicht.

Moquin-Tandon spricht bei seiner *Neritina* von einer Drüse, die er mit dem Namen Präcordialdrüse belegt, und welche Cuvier's Schleimdrüse und der Niere vieler anderen Schriftsteller entsprechen soll. Er wählt diesen Namen, weil die Function dieses Organes doch nicht mit Bestimmtheit erwiesen ist und der Name Präcordialdrüse zu allen Hypothesen die Thür offen lässt. Leider bezieht sich Moquin-Tandon fast nirgends in seinem Texte auf seine Abbildungen und er braucht oft eine ganz andere Terminologie im Texte selber und in den Erklärungen zu den Tafeln. So auch hier: nachdem er in dem Buche von der Präcordialdrüse gesprochen hat, ohne deren Lage näher zu beschreiben, erwähnt er kein Wort mehr davon in den Erklärungen zu den Tafeln. In den letzteren ist im Gegentheile von einer Schleimdrüse (*Organe de la glaire*) die Rede. Letztere soll am Magen liegen und könnte sehr wohl mit unserer fraglichen Niere ein und dasselbe Organ sein. Ob es auch Moquin's Präcordialdrüse ist, blieb freilich ungewiss, denn dieser Name passt für diese Drüse äusserst wenig, welche sich, — wenn sie nicht ganz besonders entwickelt ist — vom Herzen sehr weit entfernt befindet. Der Name würde viel besser für eine andere dem Geschlechtsapparat unzweifelhaft angehörige Drüse passen, welche in der Nähe des Afters und des Herzens liegt und auffallenderweise bezeichnet wiederum Moquin-Tandon auf der Tafel diese Drüse beim Weib-

chen als Schleimdrüse. Auf den Tafeln sind also zweierlei Schleimdrüsen vorhanden, obgleich keine einzige im Texte vorkommt, wodurch Einem die Sache nicht vollkommen klar wird. Freilich wäre es möglich, dass die letztere zwischen Herzen und After liegende Drüse allein von Moquin-Tandon gesehen und Schleimdrüse auf den Tafeln und Präcordialdrüse im Texte genannt worden wäre, denn bei der Abbildung des Tractus intestinalis, wo derselbe eine „Schleimdrüse“ neben dem Magen zeichnet, hat er die grosse gelbe Drüse zwischen dem Herzen und dem After nicht einmal angedeutet, und bei einer anderen die weiblichen Geschlechtstheile betreffenden Figur kommt diese grosse gelbe Drüse allein als „Schleimdrüse“ vor, während die andere ausgelassen ist. Es scheint aber kaum möglich, dass Moquin-Tandon diese gelbe neben dem Herzen und dem After liegende Drüse allein als Schleimdrüse aufgefasst und dieselbe einmal aus Versehen neben dem Magen gezeichnet habe, denn er hätte dann keine Schleimdrüse (d. h. Präcordialdrüse des Textes, wahrscheinliche Niere) beim Männchen gefunden, wo er die entsprechende Drüse als Prostata bezeichnet. — Nach Moquin-Tandon's Aussage soll Pouchet



und nicht durch eine innere, zwischen den Eingeweiden verborgen liegende Drüse abgesondert.

Quoy und Gaimard haben zwischen den Windungen des Darmkanals bei *Nerita* kein der bei *Neritina* beschriebenen Drüse entsprechendes Organ abgebildet, auch nicht besprochen.

5. Vom Circulations-System.

Ueber den Kreislauf von *Neritina* können wir leider beinahe gar keine Beobachtungen aufweisen. Die Kleinheit des Gegenstandes, welche das Präpariren sehr erschwert und andere ungünstige Verhältnisse setzen dem Beobachter fast unüberwindliche Hindernisse in den Weg. Lange Zeit wurde vergeblich nach dem Herzen gesucht, obgleich man a priori die Stelle hätte beinahe angeben können, wo es liegt, nämlich an der Basis der Kieme. Die Kieme liegt quer durch die Kiemenhöhle, die Spitze auf der rechten, die Basis auf der linken Seite. Dicht unter der Basis derselben und dem Boden der Kiemenhöhle liegt der hintere Theil der schon erwähnten, grossen, gelben, dem Geschlechtsapparat angehörigen Drüse und das unter derselben hinweglaufende Darmrohr. Kieme, Boden der Kiemenhöhle, Drüse und Darm sind so innig mit einander verbunden, dass sie ohne Verletzung von einander nicht wohl abpräparirt werden können. Da wurde natürlich das Herz gesucht, aber wie gesagt, nicht gefunden. Moquin-Tandon zeichnet das Herz als zwei sehr kleine Anschwellungen an der Kiemenvene, die er als Vorhof und Herzkammer deutet. Trotzdem konnten wir an der angegebenen Stelle nichts Aehnliches finden, wohl aber einen kleinen durch Pigment gelb gefärbten Knoten, den wir schon als ein möglicher Weise dem Eingeweidenervensystem angehöriges Ganglion besprachen.

Unsere Aufmerksamkeit wurde dann auf eine von Souleyet gegebene Abbildung vom Herzen des *Turbo scaber* ¹⁾

1) Voyage de la Bonite. Pl. XXXVIII. Fig. 14.

geleitet. Bei diesem Thiere bildet die Kiemenvene eine Anschwellung, deren Ränder wie gefranzt erscheinen: es wird diese Anschwellung durch eine leichte Einschnürung von einer zweiten beträchtlich grösseren geschieden, welche den Darm umfasst*), und von Souleyet als eigentlicher Herzvorhof gedeutet wird. Endlich grenzt diese Anschwellung an eine dritte längliche, welche in ein dünnes Gefäss übergeht. Es sind dies nach Souleyet die Herzkammer und die Aorta.

Da sonst eine gewisse Verwandschaft zwischen Turbonen und Neritinen nicht zu verkennen ist, so lag die Vermuthung nahe, ob nicht auch bei den letzteren ein ähnliches Verhältniss zu finden sei. In der That wird das Herz bei *Nerita* nach Quoy und Gaimard's Untersuchungen vom Darm durchbohrt. So scheint sich wenigstens die Sache aus ihrer Abbildung herauszustellen, denn sie sprechen diese Ansicht mit einer verdächtigen Vorsicht aus, indem sie im Texte sagen: das Herz sei einfach, hinten und nach links gelegen; dessen Kammer umgebe das Ende der Darmschlinge, welche den Anschein habe, als ob sie dieselbe durchbohrte (*son ventricule embrasse la fin de l'anse intestinale qui a l'air*

entsprechende Abtheilungen zu unterscheiden. Unter dem Mikroskop wurde die Beschaffenheit des Organs nicht viel deutlicher. Unverkennbare Muskelfasern waren hie und da darin vorhanden, doch nicht diese trabekelähnlichen Stränge und geflechtartig angeordneten Muskelbündel, die man in der Herzsubstanz erwarten durfte. Ausserdem waren im Parenchym des Organes deutliche Drüsenfollikel vorhanden, doch waren dieselben möglicher Weise vom Boden der Kiemenhöhle abgerissen worden.

Wir bedauern sehr, dass wir die zu untersuchenden Thiere nicht in kochendem Wasser tödteten, ein Verfahren, welches von Leydig bei *Paludina vivipara* sehr gerühmt wurde. Bei *Cyclostoma elegans*, wo die Struktur des Herzens beim frischen Thiere nicht im geringsten zu erkennen war, haben wir in der That diese Struktur gänzlich hervortreten sehen, sobald die Thiere in kochendes Wasser getaucht wurden. Dieses einfache Mittel hätte uns gewiss bei *Neritina* gleiche Dienste gethan.


Kein einziges Mal glückte es, das Herz beim ausgewachsenen Thiere schlagen zu sehen. Das Abbrechen der Schale und die Spaltung der Kiemenhöhle sind Verletzungen welche die Neritinen nicht zu überleben scheinen, wenigstens wurden niemals Lebenszeichen wahrgenommen, nachdem eine solche Operation vorgenommen worden war. Ein glückliches Ergebniss gewährte die Untersuchung junger, aus der Eierskapsel eben ausgeschlüpfter Individuen. Einige unter denselben besaßen ausnahmsweise eine ziemlich durchsichtige Schale, die das Beobachten des Thieres unter schwacher Vergrößerung ohne Abbrechen der Schale gestattete. Es zeigte sich dann, dass das pochende Herz gerade an der Stelle des eben besprochenen Organes lag und wir nehmen daher keinen Anstand, dasselbe als Centrum des Blutcirculationsapparates zu bezeichnen und zweifeln nicht daran, dass sowohl gewisse Reagentien, wie auch das Kochen einen tieferen Blick in die mikroskopische Struktur der Herzwandungen gestatten würden.

Vom Blutgefässsystem wurde, ausser den Kiemengefässen, nichts wahrgenommen. Die Kleinheit des Gegenstandes mag zur Entschuldigung dienen.

Dieses Durchbohrtsein des Herzens vom Mastdarm bei *Turbo*, *Nerita* und vielleicht *Neritina*, deutet wiederum auf eine Verwandtschaft hin, welche die überraschende Aehnlichkeit der Reibplatten schon vermuthen liess. Ausserdem erinnern dadurch diese Schnecken an die von Cuvier untersuchten Scutibranchiaten (*Haliotis*, *Fissurella*, *Emarginula*), bei welchen die Herzkammer ebenfalls vom Darm durchbohrt wird und an die Lamellibranchiaten, wo derselbe Fall eintritt. —

6. Vom Respirations-System.

Die Kiemenhöhle wird durch einen grossen, zwischen dem Mantel und dem Rücken des Thieres befindlichen Raum gebildet. Sie ist nicht beinahe vollkommen abgeschlossen, wie die Kiemenhöhle auf dem Vorderrücken der gewöhnlichen Ctenobranchiaten, sondern klafft in der ganzen Länge der zwischen dem Mantelrand und dem Rücken befindlichen Furche.



dem Vorderrücken verschmilzt, befindet sich die Geschlechtsöffnung und nach innen derselben der After. Nach Moquin's Angaben zwar wäre die Lage der Geschlechtsöffnung je nach den Geschlechtern eine verschiedene, indem die männliche an der Basis des Tentakels nach innen und nach vorn derselben, die weibliche aber unter dem Mantelrande (*sous le collier*) zu finden wäre. Nichtsdestoweniger war es nicht möglich, in der Lage der beiden Oeffnungen einen erheblichen Unterschied wahrzunehmen.

Die ganze Kiemenhöhle flimmert. Die unpaarige, dreieckige, gleichfalls beflimmerte Kieme läuft quer durch die Kiemenhöhle von links nach rechts, indem sie einen der Rückenkurve entsprechenden Bogen beschreibt. Die Basis der Kieme ist an der äussersten Grenze der Kiemenhöhle nach links angewachsen, an der Stelle, wo der Muskel entspringt, wodurch das Thier an der linken Schalenhälfte befestigt wird. Da jedoch die Basis der Kieme etwas schräg von vorn und aussen nach hinten und innen gerichtet, und die grosse gelbe, dreieckige, dem Geschlechtsapparat angehörige und weiter zu beschreibende Drüse, ebenfalls schräg, aber umgekehrt von rechts und vorn nach links und hinten gelegen ist, so kommen die Basis der Kieme und die Basis der Drüse in der Nähe der Mittellinie zusammen und werden nur noch durch den dazwischen liegenden Boden der Kiemenhöhle und durch den Darm von einander geschieden.


Das Gerüst der Kieme wird durch eine dreieckige Membran gebildet, deren beide Flächen die Kiemenblätter tragen. Letztere sind selbst mehr weniger dreieckige Lamellen, welche der Gerüstmembran mit einer verhältnissmässig sehr breiten Basis quer aufsitzen. Moquin-Tandon¹⁾ giebt an, dass er bei einer *Neritina* von mittelmässiger Grösse zwei und vierzig Kiemenblätter zählte. Das mag in der That die durchschnittliche Zahl sein. Selten haben wir ihrer sechs bis sieben und vierzig gefunden. Nur ist dabei zu bemerken, dass Moquin-Tandon den Bau der Kieme nicht beachtete

1) A. a. O. p. 77.

und dass in der That vier und achtzig anstatt zwei und vierzig Kiemenblätter vorhanden waren, da die beiden Flächen der mittleren Membran mit einer gleichen Anzahl Kiemenblätter besetzt sind. Das Minimum haben wir bei einer aus der Eierskapsel erst seit kurzer Zeit ausgeschlüpften *Neritina* angetroffen, bei welcher die Kieme auf jeder Fläche nur zwei Kiemenblätter besass. Die Anzahl der Kiemenblätter nimmt also mit dem Alter zu und ohne Zweifel erscheinen die neuen an der Basis des Organes, so dass die weniger breiten, der Kiemenspitze näher gelegenen die älteren sind.

7. Von den Fortpflanzungsorganen.

Wir erwähnten schon am Anfang dieses Aufsatzes, dass die Neritinen von gewissen Schriftstellern wie Souleyet und Philippi z. B., zu den angeblich hermaphroditischen Scutibranchiaten gerechnet wurden, obgleich sie eben so wenig Zwitter sind wie die anderen in der neuern Zeit als getrennten Geschlechtes erkannten ächten Scutibranchiaten (*Emarginula*, *Halotis* etc.). Philippi's Irrthum ist um so merkwürdiger, als Quoy und Gaimard schon einige Jahre




Leber aus zwei Lappen, von denen der kleinere (Fig. 28 c') in der letzten Schalenwindung liegt, und beim entblösten Thiere, wie ein Zapfen an der rechten Seite hängt und der andere grössere (c) dem grossen Leberlappen aufsitzt. Mitunter erreicht die Geschlechtsdrüse einen so grossen Umfang, dass sie beinahe ein Drittel des ganzen Thieres ausmacht. Im Verhältniss zur Leber ist sie also zur Brunstzeit, der einzigen Jahreszeit, wo wir das Thier untersuchten, ganz ungemein gross. Es scheint aber, dass, wenn die eine Drüse zunimmt, die andere dadurch zurückgedrängt wird, so dass der Umfang beider in umgekehrtem Verhältniss zu sein scheint. Wenigstens ist die Leber bei den Exemplaren, welche eine ungemein entwickelte Geschlechtsdrüse besitzen, sichtlich kleiner. Die dünne Schicht Lebersubstanz, welche sonst unter dem kleineren Geschlechtsdrüsenlappen in der letzten Schalenwindung liegt, verschwindet dann beinahe vollständig.

Der von Quoy und Gaimard bei *Nerita* abgebildete Eierstock liegt am rechten, von links nach rechts gekrümmten Leberrende und ist im Verhältniss zur Leber ganz ungemein klein (6 oder 7 Mal kleiner nämlich, und etwa der zwanzigste Theil des ganzen Körpers). Wir würden uns diesen Unterschied leicht dadurch erklären, dass Quoy und Gaimard ihre *Nerita* nicht zur Brunstzeit untersuchten, wenn sie nicht im Uterus eine grosse Anzahl weisse, rundliche, mit einer harten Schale („oeufs crétaçés“) versehene Eier gefunden hätten. Möglicher Weise jedoch sind es die letzten Eier der Jahreszeit gewesen und war der Eierstock schon zusammengefallen.

Schon mehrfach haben wir einer grossen gelben mehr weniger dreieckigen Drüse (Fig. 28 d., 29 d., 30 a.) Erwähnung gethan, die neben dem After (Fig. 29 g., 30 h.) zwischen demselben und dem Herzen liegt. Diese Drüse ist hohl und die ganze Höhle flimmert. Anfangs hielten wir dieselbe für eine Niere, um so mehr, als die Anwesenheit einer flimmernden Höhle im Inneren dafür zu sprechen schien. Beim Männchen war die mikroskopische Zusammensetzung folgende:


Die ganze Drüse besteht aus Zellen (Fig. 29 A. a.), welche meistens mit kleinen rundlichen, oft regelmässig dreieckigen, stark lichtbrechenden Körperchen (b) erfüllt sind. Diese Körperchen sind ausserdem in grosser Anzahl ganz frei, d. h. in keine Zellen eingeschlossen, vorhanden. Hin und wieder kommen einige mit diesen Körperchen weniger dicht erfüllte Zellen vor, bei welchen ein Kern durchschimmert. Manche sogar, aber im Ganzen ziemlich selten, enthalten nur ein einziges oder wenige grössere Körperchen; der Kern erreicht mitunter in denselben eine sehr ansehnliche Grösse (Fig. 29 A. c.) und ist mit einem Kernkörperchen versehen, so dass man gern beim ersten Anblick diese letzteren Zellen für Nierenzellen mit ihren Sekretbläschen halten möchte. Solche Zellen sind aber wie gesagt selten anzutreffen, da fast alle mit den Körperchen strotzend erfüllt sind. Die Zellen, welche die innere Höhle bekleiden und mit Flimmercilien versehen sind, enthalten auch meist ähnliche runde oder dreieckige Körperchen. Gern hätte man letztere für Harnconcremente gehalten, obgleich sie die gelbe Färbung nicht darboten, welche den Harnconcrementen meist eigen ist. Jedoch zeigte sich bald die Unzulässigkeit einer solchen Hy-



bildet einen erweiterten, gewundenen Schlauch (c), der sich, indem er sich schnell wieder verjüngt, in die Drüse senkt und in derselben verschwindet. Unter der Lupe lässt sich der an dieser verengten Stelle nur 0,034 Mm. breite Ausführungsgang noch eine kleine Strecke in der Substanz selbst der Drüse verfolgen, hört aber bald auf, indem er ohne Zweifel in die Höhle des Organes mündet. Auf dem vorderen Theil der Drüse sitzt die Ruthe (e), ein breiter, mit zahlreichen Längsfalten versehener Schlauch, der, so viel wir ermitteln konnten, mit der inneren Höhle der Drüse zusammenhängt. Diese Drüse, welche schon von Moquin-Tandon ganz richtig gesehen und einfach als ein eiförmiges feinkörniges Organ beschrieben wurde, wird von ihm als Prostata aufgefasst. — Man hat sich also den Ausführungsgang des Hodens so vorzustellen, dass der gewundene Ductus deferens seinen Inhalt in die Drüsenhöhle ergiesst, wo sich derselbe wahrscheinlich mit dem Drüsensekret vermischt und bei der Begattung aus dieser Höhle in die Scheide des Weibchens ejakulirt wird. Man darf jedoch nicht daraus schliessen, dass die Höhlung dieser s. g. Prostata die Function einer Samenblase übernimmt, denn kein einziges Mal wurden Zoospermien in derselben angetroffen. Der gewundene Hodenausführungsgang dagegen wurde stets strotzend voll Zoospermien gefunden. Der Same, welcher eine milchweisse zähe Flüssigkeit darstellt, sammelt sich namentlich in der schlauchartigen Erweiterung am unteren Theile des Ductus deferens an, weshalb man dieselbe wohl als Samenbehälter, Samenblase auffassen dürfte. Moquin-Tandon nennt dieselbe geradezu einen Nebenhoden. Er stellt übrigens nicht diesen s. g. Nebenhoden als eine einfache schlauchförmige Erweiterung des Ausführungsganges, sondern als ein besonderes, unregelmässig eiförmiges Organ dar, welches sich durch einen kurzen hakenförmigen Fortsatz an die Drüse ansetzt. Durch einfaches Auseinanderwickeln bemerkt man jedoch sogleich, dass die dieses eiförmige Organ zusammensetzenden Windungen nicht fester mit einander verbunden sind, als die übrigen Windungen des Ductus. — Der ganze Ausfüh-

rungsgang, bis zur Stelle wo er sich in Moquin's Prostata einsenkt, wird durch Pigmentkörnchen intensiv kohlschwarz gefärbt, obgleich die milchige Färbung des Inhaltes, namentlich im unteren Theile durchschimmert. Das Innere des Ganges flimmert durchweg.

Quoy und Gaimard haben die inneren Organe der weiblichen *Nerita* allein abgebildet. Jedoch geben sie an, dass die Hoden an derselben Stelle wie der Eierstock beim Weibchen liegt und dass der Ausführungsgang desselben, gleich wie bei *Neritina* sehr vielfach gewunden ist. Er soll einen dünnen, zarten Faden darstellen, welcher, nachdem er in Wasser auseinandergewickelt worden war, eine Länge von circa zwei Fuss erreichte. Es muss daher eine sehr grosse Species gewesen sein, welche diesen Forschern zu Gebote stand, denn der Ductus deferens erreicht bei unserer zwar sehr kleinen *Neritina* nur eine Länge von etwa 2,5 bis 3 Centimeter. Der Ausführungsgang erweitert sich bei *Nerita* nach unten ebenso wie bei *Neritina*; gleichwohl konnte derselbe von Quoy und Gaimard nicht bis zur Ruthe verfolgt werden. Letztere soll kurz sein und an der Basis des rechten Fühlers liegen.




beim Geschlechtsapparat des Weibchens gezeichnete Schleimdrüse dem weiblichen Geschlecht allein zukommt, da die entsprechende Drüse beim Männchen nach Moquin-Tandon als Prostata aufgefasst werden soll. Wie schon früher bemerkt wurde, findet man unter Moquin's Zeichnungen eine, wo eine „Schleimdrüse“ auch an der grossen Curvatur des Magens vorkommt, welche der Lage nach fast unmöglich dasselbe Organ sein kann, welches er unter demselben Namen an der Mündung des weiblichen Geschlechtsapparats angiebt. Die Bezeichnung „Schleimdrüse“ findet übrigens hier bei den weiblichen Geschlechtsorganen keine Rechtfertigung, da die Neritineier nicht wie so viele andere Cephalophoreneier in Schleim eingehüllt sind. Es könnte höchstens die Drüse sein, welche zur Absonderung der festwerdenden Eiersubstanz bestimmt ist.

Die Lage dieser Drüse ist beim weiblichen Geschlecht gerade dieselbe wie beim männlichen, denn sie ist an der gleichen Stelle in dem Leitungsapparat der Geschlechtsprodukte eingeschaltet, so dass man sie vielleicht je nach dem Geschlecht als männliche oder weibliche Nebendrüse des Geschlechtsapparates bezeichnen könnte. Eine derartige Bezeichnung hätte wenigstens den Vorzug, dass sie nichts über die noch räthselhafte Function dieser Organe entscheidet. — Die weibliche Drüse enthält eine flimmernde Höhlung, wie die männliche. Mikroskopisch untersucht erscheint sie aus ähnlichen Zellen wie die männliche zusammengesetzt, nur findet man in denselben anstatt der bald rundlichen, bald eiförmigen oder dreieckigen Körperchen nur äusserst kleine, nicht messbare, aber ebenfalls stark lichtbrechende Körperchen (Fig. 30 A.). Die chemischen Reactionen sind übrigens dieselben für diese winzigen Körperchen, wie für die grösseren Körperchen der männlichen Drüse. Sie lösen sich ebenfalls in Alkohol auf und bestehen wahrscheinlich aus einer fettartigen Substanz.

Ausser dieser Nebendrüse besteht der weibliche Leitungsapparat noch aus einem Eileiter, einer Gebärmutter und einer Samentasche.

Der Eileiter (Fig. 30 b.) ist ein dünnwandiger, schmaler, nicht sehr langer Schlauch, der aus dem Eierstock entspringt, zur Nebendrüse herabläuft und sich in dieselbe senkt. Dieser Schlauch ist schwer zu finden, da er ganz pigmentlos und durchsichtig ist und ausserdem sehr leicht zerreisst. Innerhalb der Nebendrüsensubstanz konnte der Eileiter nicht verfolgt werden, aber zweifelsohne hängt er mit der innern Höhle dieses Organs zusammen.

Der Darm läuft von links nach rechts schräg unter der Nebendrüse hinweg. Den Darm entlang, auf dessen Aussenseite, erstreckt sich die Gebärmutter, deren Grund an den hintersten Theil der Nebendrüse grenzt, während die Scheidenöffnung (Fig. 30 e) dicht neben dem After (h) und nach auswärts von demselben liegt. Der Grund der Gebärmutter schwillt zu einer Kugel (f) an, die zwischen der Nebendrüse, dem Eierstock und dem Herzen steckt. Nach unten geht dieselbe in einen dünnen Hals über, der sich allmählig zu einer weiten Scheide (d) erweitert, welche wiederum nach der Mündung zu an Durchmesser etwas abnimmt. Auf der Aussenseite der Scheide entspringt ein schmaler Gang, der nach rückwärts der Scheide eine Zeit lang parallel läuft und




in den vorderen Theil der Vagina eindringen, aber jedenfalls nicht die Mündung der Samentasche in dieselbe erreichen kann. Bei *Paludina* erwähnt schon Siebold ein ungestieltes Receptaculum seminis, welches mit breiter Oeffnung in den Gebärmuttergrund mündet, aber bei den übrigen weiblichen Kammkiemern und wie es scheint bei den übrigen Cephalophoren mit getrennten Geschlechtswerkzeugen wurde eine solche Samentasche nicht beobachtet.

Unter der Lupe bemerkt man in der Samentasche von *Neritina* regelmässig angeordnete, milchweisse Streifen, welche sehr wahrscheinlich in einer besonderen Anordnung der Samenelemente in derselben ihren Grund haben. Durch die Undurchsichtigkeit des Gegenstandes wurden wir behindert, die Samentasche selbst unverletzt unter das Mikroskop zu bringen. Beim Eröffnen derselben aber kamen immer die Zoospermien als eine dicke, weisse, unförmliche Wolke heraus, weil vielleicht die Berührung mit dem Messer der gedachten Ordnung Eintrag thut. Obgleich die Möglichkeit der Bildung von Spermatophoren bei *Neritina* dadurch noch nicht als unbegründet erwiesen schien, so wurde doch vergeblich in der erweiterten Stelle des Vas deferens beim Männchen danach gesucht. Es bliebe indessen immer möglich, dass die Spermatophoren erst in der männlichen Nebendrüse gebildet werden können. Wir werden sehen, dass eine Beobachtung von Quoy und Gaimard bei *Nerita*, das Vorhandensein von Samenmaschinen auch bei dieser Schnecke nicht unwahrscheinlich macht.

Die Anschwellung im hinteren Theile des Uterus ist der Gestalt nach eine regelmässige Kugel (Fig. 30 f.). Niemals wurden in derselben Eier, wohl aber immer eine eigenthümliche, braune, weiche Kapsel angetroffen. Dieselbe besass eine durchschnittliche Breite von etwa 0,54 Mm., und enthielt in vielen Fällen braungefärbte Kalkconcremente. In allen Exemplaren aber wurde entweder ausser den Kalkstücken oder ganz allein ein eigenthümlicher Stoff gefunden, welcher beim Zerreißen oder Zerdrücken der Uteruskapsel sogleich hervorquoll. Dieser Stoff war dadurch sehr merk-

würdig, dass er in den verschiedenartigst gestalteten Gebilden sich darstellte. Letztere waren immer durch eine dicke, doppelt contourirte Linie nach aussen begrenzt und boten ein mattglänzendes Ansehen dar. Es waren oft zellenartige Formen, worin aber die scheinbare Zellmembran eine beträchtliche Dicke erreichte. Inwendig zeigten sie meist mehrere, mitunter bis fünf oder sechs, bisweilen gar noch mehr andere zellenähnliche Scheinmembranen, die alle dieselben beiden Contouren zeigten, und zwar so, dass die äussere Contour viel schärfer als die innere hervortrat. Diese Scheinzellen waren in einander geschachtelt. Oft waren zwei oder mehrere solche Systeme von eingeschachtelten, scheinbar membranösen Gebilden von einer oder auch mehreren gemeinschaftlichen doppelt contourirten Membranen umgeben. Andere unter diesen Gebilden waren sehr in die Länge gezogen, so dass man der doppelten Contouren wegen eine mattglänzende Scheide mit einem durchsichtigen Inhalt hätte geglaubt zu sehen. Dieser scheinbare Schlauch aber war nicht an beiden Enden abgeschnitten, sondern die doppelt contourirten Wandungen der Scheide liefen in einander über. Dann und wann erweiterte sich das eine Ende des Schlan-



mer mit Endabschluss versehene Gestalten bildet. Dieser Stoff stimmt offenbar mit einer namentlich in der pathologischen Anatomie vielfach bekannten und von Virchow ¹⁾ Markstoff, Myelin benannten Substanz überein. Sowohl Virchow wie Meckel von Hemsbach ²⁾, der auch diesen Stoff beobachtete, vergleichen sehr treffend die schlauchartigen Gebilde mit Nervenröhren, die den Achsencylinder enthalten. Meckel rechnet das Myelin zu seinen Speckstoffen und will es „unter den abgedampften Speckstoffen verschiedener Extrakte und Personen“ gefunden haben. Virchow hat dasselbe in jeder Milz, sowohl vom Menschen wie von Thieren, in der Schilddrüse, in den Lungen, im frischen Eidotter vom Huhn, im Eiter, Dr. Siegmund ausserdem im Eierstock gefunden. Dieser Stoff soll mit dem Nervenmark chemisch vollkommen übereinstimmen.

Bei den meisten Organen der höheren Thiere, welche das Myelin enthalten, kann dasselbe erst nach einer besonderen Behandlung, namentlich durch Ausziehen mittelst heissen Alkohols, erhalten werden. Bei unserer *Neritina* quillt es aber sogleich heraus, wenn die Kapsel aus dem Grunde des Uterus eröffnet wird. Ausser im Nervenmark selber, wurde das Myelin, so viel uns bekannt ist, nur in kranken Geweben der höheren Thiere so ganz frei gefunden. Das Myelin von *Neritina* ist eine ganz überaus schöne Form, im Ganzen grösser als sonst.

Ueber die Bedeutung dieser Myelinanhäufung können wir kaum eine Vermuthung aufstellen. Ob diese Substanz den Eiern in dem Augenblick der Bildung der Eierkapsel beigegeben wird, steht dahin. Sie wurde niemals in den Eierkapseln bemerkt.


Beiläufig wollen wir bemerken, dass die Nervensubstanz der Ganglien bei den Neritinen ebenfalls sehr viel Myelin

1) Ueber das ausgebreitete Vorkommen einer dem Nervenmark analogen Substanz in den thierischen Geweben, von Rud. Virchow. Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie. Bd. VI. 1854. p. 563.

2) Annal. der Charité. Bd. IV. S. 269.

enthält, gerade wie das Nervensystem der Säugethiere. Bei Präparaten, welche in Alkohol und Glycerin aufbewahrt wurden, haben sich die sonderbarsten Gestalten dieses Stoffes sehr zahlreich vorgefunden. Es wird wohl diese Substanz dem Nervensystem aller Schnecken zukommen, da wir sie ebenfalls beim Schlundring von *Cyclostoma*, *Limnaeus*, *Physa* u. s. w., obgleich nicht so massenhaft wie bei *Neritina* wiederfinden.

Zwischen dem Uterus und dem Eileiter ist keine direkte Verbindung vorhanden, da letzterer in die Höhlung der Nebendrüse mündet und ersterer mit dieser Drüse nicht unmittelbar zusammenhängt. Es geht aber ein schmaler Gang — der schon von Moquin-Tandon ganz richtig gefunden wurde — von der Samentasche und zwar von der unteren Anschwellung derselben ab und senkt sich in die Substanz der Drüse, wo er ohne Zweifel in die Höhlung derselben mündet (Fig. 31 b.). Dieser Gang ist inwendig beflämmt. — Den von den Eiern zurückgelegten Weg vom Eierstock bis zur äusseren Geschlechtsöffnung hat man sich also folgendermaassen vorzustellen: Die reifen Eier gleiten im Eileiter herunter, bis in die Höhle der weiblichen Nebendrüse, von wo aus ein besonderer Gang dieselben in die untere




Wie der Hodenausführungsgang, so flimmert auch der Eileiter überall auf der inneren Fläche; der Uterus und, wie schon angedeutet, die Höhlung der Nebendrüse ebenfalls.

Die Tunica propria der Hodenfollikel erscheint strukturlos, und bekommt durch darauf zerstreute, mit Oeltröpfchen vergleichbare Pigmentkörnchen ein gelbes Aussehen. In den Follikeln findet man zuerst die Epithelzellen selbst (Fig. 32a) des Follikels, die mit einem grossen Kerne und Kernkörperchen versehen sind. Viele von denselben enthalten zwei Kerne, was wohl eine Andeutung einer bald zu Stande kommenden Theilung ist. Ausserdem trifft man zahlreiche 0,0068 bis 0,024 Mm. breite Zellen (c, d, e, f), die Bildungszellen der Zoospermien. Dieselben entwickeln sich schaarenweise in Mutterzellen (b), wie es uns schien durch Theilung des Mutterzellkernes. Dabei ist zu bemerken, dass wir niemals den Kern in denselben wahrnahmen, so lange sie in der Mutterzelle noch sassen. Wie bekannt sitzen bei den meisten Cephalophoren die Zoospermien zu Büscheln zusammen, eine Erscheinung, die nach Kolliker's Darstellung dadurch bedingt wird, dass ein einziger Samenfaden sich in jeder Tochterzelle bildet und sich beim Platzen derselben an der weichen Masse der aus der Mutterzelle zurückbleibenden centralen (Eiweiss-) Kugel befestigt. Bei *Neritina* dagegen werden niemals die Zoospermien zu einem schopfartigen Büschel vereinigt, weil nämlich die Mutterzellen sich auflösen und die Bildungszellen auseinandergehen, bevor die Zoospermien in den letzteren aufgetreten sind. Die frei herumliegenden Bildungszellen (c) besitzen einen deutlichen Kern, welcher sich bald nach einer Richtung hin verlängert und zu einem spiralig gewundenen Faden heranwächst (d, e, f). Desswegen kann man in den ein Spermatozoon enthaltenden Bildungszellen keinen Kern mehr darstellen. Wenn das wandständige Zoospermion einmal fertig ist, so durchbricht das eine Ende desselben die Zellmembran und sieht frei hervor (g), während das andere in der Zelle zurückbleibt. Allmählig wickelt sich die Spirale auseinander und die Bildungszellmembran sitzt nur noch wie eine Kappe auf dem einen

Ende des haarförmigen Zoospermions, um bald zusammenzufallen und hernach vollkommen zu verschwinden. Die fertigen Zoospermien sind einfach haarförmig, ohne Knopf, bilden bei Einwirkung des Wassers Oesen und Schlingen und besitzen eine mittlere Länge von 0,078 Mm. Dieser Bildungsvorgang stimmt, wie man sieht, mit Köl liker's Beobachtungen bei andern Thieren überein').

Die Tunica propria der Eierstocksfollikel erscheint wie beim Hoden strukturlos und ist inwendig mit einem Pflasterepithel bekleidet, dessen Zellen 0,0068 Mm. etwa breit sind und einen deutlichen Kern besitzen. Die Keimbläschen scheinen ursprünglich nichts Anderes als solche Epithelzellen zu sein, indem sich Dottersubstanz um dieselben ansammelt und sie von der Follikelmembran abhebt. Jedes Ei besteht ursprünglich aus einem der Follikelwandung dicht ansitzenden Hügelchen, welches durch keine eigene Membran begrenzt wird. Die dieses Hügelchen zusammensetzenden Fett- oder Dotterkörperchen sind sehr verschieden gross und bilden mitunter wie ganz grosse Tropfen. Die deutlich wahrnehmbaren Eierstockseieru angehörenden Keimbläschen besaßen einen Durchmesser von 0,010 bis 0,030 Mm. und waren im-




Ganz abweichend von den eben beschriebenen Verhältnissen ist die von Quoy und Gaimard gegebene Darstellung des Baues der Geschlechtsorgane bei den weiblichen Neriten. Sie sahen nämlich rechts vom Herzen das hintere Ende des Mastdarmes, dann weiter nach aussen einen birnförmigen, grossen Körper, der selbst von einer quergestreiften Drüse umgeben wird. Die äussere Mündung dieser Drüse liegt nach unten. Das birnförmige Organ soll hohl sein, und in dessen Höhle sollen sich mehrere kolbenartige an einander gedrängte Körper befinden, die jeder in einen Faden auslaufen. Diese Körper sind fest, anscheinend faserig, und bei Anwendung der Lupe erscheinen sie körnig. Noch weiter nach aussen befindet sich die Gebärmutter, woran man zwei Theile, eine birnförmige Tasche nämlich und eine daran grenzende Anschwellung unterscheiden kann, welche eine grosse Anzahl rundlicher weisser Eier enthält. Dieses Organ wird durch einen langen, dicken, gewundenen Eileiter mit dem Eierstock verbunden. Möglicherweise könnte man das birnförmige, die kolbenartigen Körper enthaltende Organ für das Analogon der Samentasche der Neritinen und die Körper darin für riesig grosse Spermatophoren halten, da wir gesehen haben, dass nicht unwahrscheinlich auch bei den Neritinen Samenmaschinen vorkommen. Auffallend würde dabei der Umstand bleiben, dass dieses Organ halb so lang wie das Thier ist und die Gebärmutter an Grösse weit übertrifft. Nach Quoy und Gaimard's Abbildung dürfte man ausserdem den Schluss ziehen, dass das fragliche Organ direkt nach aussen und nicht in die Vagina mündet. Die beiden Abtheilungen des Uterus sollen von einander vollständig getrennt sein und dürfen also kaum als Theile eines und desselben Organes betrachtet werden. Sonderbar erscheint dabei die Drüse, worauf die fragliche Samentasche ruht, und welche nach Quoy und Gaimard's Zeichnung beinahe wie eine federförmige Kieme aussieht. Wir könnten sie vielleicht für die Nebendrüse des weiblichen Geschlechtsapparates halten, wenn entweder der Eileiter oder die Gebärmutter in irgend einem Zusammenhange mit derselben stände, was aber nicht der

Fall ist: Beim Männchen sollen Quoy und Gaimard keine entsprechende Drüse wahrgenommen haben.

Wenn alle Neriten ähnliche Verhältnisse im Bau der Geschlechtsorgane besitzen sollten, so würde man in denselben sowohl wie in der Beschaffenheit des Darmkanals — und auch des Nervensystems, falls Quoy und Gaimard's Darstellung desselben richtig wäre, was zwar mehr als zweifelhaft erscheinen möchte — bessere Unterscheidungsmerkmale von den Neritinen finden, als in der Struktur des rechten Schalenrandes, der bei den Neriten gezähnt und bei den Neritinen zahnlos sein soll.

Entwicklungsgeschichtlicher Theil.


Die Kapseln, welche gewöhnlich für die Eier der Neritinen gehalten worden, sind runde, auf der einen Seite ein wenig abgeflachte, 0,7 bis 1 Mm. breite Kugeln. Sie sind mit einer harten Schale umschlossen, welche von französischen Conchyliologen, namentlich Moquin-Tandon als kreideähnlich (*crétacée*) bezeichnet wird, welche jedoch bei



Oberfläche mit kleinen napfförmigen Vertiefungen versehen bleibe, welche eben so vielen früher dagewesenen Eiern entsprechen. Von verschiedenen Seiten jedoch wurde schon diese letztere Behauptung widerlegt, denn diese Vertiefungen sind nur scheinbar und werden dadurch hervorgebracht, dass die Ränder der schüsselartigen, auf der Schale zurückgebliebenen unteren Kapselsegmente etwas erhaben sind. Dass die Kapseln auf dem Schalenrücken sitzen sollen, ist jedenfalls für die bei Berlin vorkommende *Neritina* irrig, ohne dass wir damit wollten gesagt haben, dass diese Angabe für andere Lokalitäten nicht genau zutrifft. Wir besitzen selbst Neritinen aus dem Var, auf deren Schale solche Kapseln in grosser Anzahl sitzen. Bei Berlin aber kommt unter zweihundert Kapseln kaum ein Stück auf eine Neritinschale. Die andern sitzen entweder auf *Tichogonia Chemnitzii* (*Dreissena polymorpha*) oder auf Steinen. Wo Steine vorhanden sind, da sitzen die meisten auf denselben, wo aber nur Sand vorkommt, da sind die Tichogonien fast ausschliesslich die Träger der Kapseln, welche jedoch auch dann und wann auf anderen Mollusken, Paludinen, Bythinien, Limnaeen u. s. w. vorkommen.

Die Kapselsegmente bestehen aus zweien, von einander nicht ganz leicht zu trennenden Membranen, deren innere, zartere, vollkommen farblos, durchsichtig und strukturlos erscheint, während die äussere dick, gelb und undurchsichtig ist. Am oberen Segmente zeigt mitunter beim ersten Anblick diese äussere Membran eine anscheinend zellenartige Struktur. Bei einer näheren Untersuchung jedoch stellt sich bald heraus, dass diese Beschaffenheit nur eine scheinbare ist, welche dadurch hervorgebracht wird, dass eine Anzahl von *Cocconema* dicht an einander auf der äusseren Oberfläche sitzen. Man kommt leicht zur Ueberzeugung, dass es so ist, wenn man Stellen trifft, wo das Cocconemapflaster durch ein Paar andere festsitzende Diatomaceenschalen unterbrochen wird. Uebrigens kommen Kapseln vor, welche keinen solchen Ueberzug besitzen, und bei diesen wurde keine erkennbare Struktur der äusseren Membran an dem

oberen Segment, wohl aber am unteren wahrgenommen. Am letzteren findet man nämlich stets eine netzartige Struktur, welche dadurch bedingt wird, dass mehr weniger runde oder eiförmige Räume neben einander zerstreut und durch dunklere Zwischenräume von einander getrennt sind. Beim ersten Anblick, besonders an den Stellen, wo diese Räume überall ziemlich gleich gross sind, möchte man beinahe glauben, man hätte es mit einem Epithel zu thun. Dies ist aber nicht der Fall: die rundlichen Räume (Fig. 35.) sind keine Zellen, sondern nur hellere, vielleicht dünnere Stellen in der Kapsel. Es bilden dieselben nicht selten Streifen, welche dadurch gegen einander abstechen, dass die Räume in dem einen Streifen kleiner und in dem angrenzenden grösser sind. Der Durchmesser dieser Räume schwankt zwischen 0,006 und 0,04 Mm. Da jedoch die untersuchten Kapseln auf Tichogonien gesammelt worden waren, so lag der Gedanke nahe, ob nicht diese Struktur vielleicht nur eine scheinbare, ein Abdruck der äusseren Oberfläche der Muschelschale sei. In der That zeigte die Epidermis der Tichogonien eine ganz ähnliche Zeichnung, indessen waren beständig die Räume auf derselben ungemein kleiner als auf den Eiekapseln der Ne-




Kugeln und darüber enthielten, welche den in Fig. 37. dargestellten Anblick darboten. Ob dies Furchungskugeln oder eben so viele gefurchte Eier waren, blieb lange ungewiss. Für die erste Ansicht sprach der Umstand, dass stets ein einziger Embryo sich in jeder Kapsel entwickelte, welcher, ursprünglich winzig klein, allmählig an Grösse zunahm, während die Dottermasse in demselben Verhältniss verschwand. Merkwürdig indessen blieb es immer, dass diese fraglichen Furchungskugeln gerade wie gefurchte Eier aussahen. Es waren gelbe durchsichtige, 0,12 bis 0,17 Mm. breite Kugeln, welche aus einer grossen Anzahl kleinerer zusammengesetzt erschienen. Letztere waren vollkommen durchsichtig und klar, indem ihre Oberfläche allein mit kleinen, stark lichtbrechenden, übrigens nur sparsam vorhandenen Dotterkörnchen bestreut war. Mit einem Worte boten diese Kugeln die grösstmögliche Aehnlichkeit mit einem in dem letzten Stadium der Furchung von Lovén abgebildeten Ei der *Modiolaria marmorata* ¹⁾, wo man die hellen Kerne, die Dotterkörnchen und die Dotterhaut allein wahrnehmen kann. Ob eine Haut bei diesen Kugeln vorhanden war, liess sich zwar nicht mit Bestimmtheit erkennen, obgleich eine deutliche Contour (Fig. 37. a) über die inneren kleineren Kugeln (Kerne) hinwegging. Beim Zerdrücken gelang es mitunter, eine Art leerer Hülle zu bekommen, welche aber gleich darauf zerfloss und etwa dieselbe Beschaffenheit wie die Kerne zu besitzen schien. Diese Kerne waren übrigens keine eigentlichen Zellen, enthielten keine Kernkörperchen und zerfielen beim Druck wie Klumpen einer gallert- oder talgartigen Substanz. Lovén erwähnt gerade dasselbe von den Kernen bei *Modiolaria*.

Ein anderer Umstand unterstützte noch die Ansicht, dass die in den Kapseln enthaltenen Kugeln vollkommene Eier waren: ihr Durchmesser stimmte nämlich mit demjenigen der

1) Bidrag til Kännedomen om Utvecklingen af Molluska lamelli-branchiata. Kongl. Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Stockholm 1848. Tab. X, Fig. 37.

reifen Eier aus dem oberen Theile des Eileiters ganz und gar überein: man konnte also kaum mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die Eier auf ihrer weiteren Wanderung bis zur Scheidenöffnung eine 50 bis 60fach grössere Masse erlangen würden. Wäre auf diesem Wege ein neues Nahrungsmaterial hinzugekommen, so hätte zweifelsohne dasselbe eine ganz andere Beschaffenheit, als der übrige Dotter gezeigt, während die vierzig bis sechszig Kugeln in jeder Kapsel alle einander vollkommen gleich waren. Deshalb neigten wir uns zur Ansicht, dass die Kapseln viele Eier enthielten.

Merkwürdig jedoch blieb dabei das Factum, dass unter den vielen in einer Kapsel enthaltenen Eiern stets ein einziges allein zur Entwicklung kam, oder wenigstens, dass nur ein einziger Embryo sich heranbildete. Wir dachten dann an die sonderbaren Beobachtungen Koren's und Danielssen's über die Entwicklung von *Buccinum undatum* und *Purpura lapillus*¹⁾. Diese Beobachter zeigten nämlich, wie sich in den Eierkapseln genannter Schnecken immer nur eine weit kleinere Anzahl von Embryonen entwickelt, als die Zahl der ursprünglich vorhandenen Dotter und sie glaubten sich zu über-




nach rechts und wiederum in einer mehr schrägen Richtung innerhalb der Dotterhaut (Fig. 38.). Es zeigte sich also dabei, dass die früher erwähnte, über die Dotterkerne hinweg laufende Contour, einer wirklichen, obgleich ziemlich weichen Membran entsprach. Der Inhalt des Embryos bestand nicht mehr aus den durchsichtigen Kugeln mit den feinen Dotterkörnchen darauf, sondern aus einer undurchsichtigen grobkörnigen Masse, einer Art Emulsion mehr oder weniger grosser fettähnlicher Tropfen, worin aber der Unterschied zwischen einer peripherischen und einer centralen Schicht, welchen man bei den Gasteropodeneiern zu finden pflegt, nicht klar hervortrat, oder wenigstens war die peripherische Schicht im Vergleich zur centralen ganz ungemein dünn. — Bei den meisten Mollusken, deren Larven bekannt sind, nimmt man gewöhnlich an, dass der rotirende Embryo sich mit Cilien bekleidet, welche entweder unter der Dotterhaut gebildet werden und dieselbe durchbrechen, oder einfache Auswüchse der Dotterhaut selbst darstellen; bei vielen auch ist eine solche Haut nicht einmal vorhanden. Bei *Neritina* ist im Gegentheil der Embryo innerhalb der Dottermembran mit einem Wimperüberzug versehen und dreht sich in der Membran selbst herum. Es ist übrigens keine ganz neue Thatsache, da Lovén dasselbe von *Cardium* z. B. abbildet¹⁾. Wie lange die Drehungsbewegungen dauern mögen, wurde nicht beobachtet, da der sorgfältig aufbewahrte Embryo dieselben etwa fünfzig Stunden lang vollführte und starb, ohne aus der Dotterhaut herauszukommen. Niemals waren wir glücklich genug, um einen zweiten in demselben Stadium zu treffen.

Ueber die Art und Weise des Dotterfurchungsprozesses wurde also nichts ermittelt. Die vortrefflichen Beobachtungen Karl Vogt's über die Dotterfurchung bei *Actaeon* weichen von denen, welche Lovén bei *Modiolaria*, *Cardium* u. s. w. anstellte, in mehreren Momenten beträchtlich ab, indessen möchte wohl der Prozess bei *Actaeon* unter das von

1) A. a. O. Tab. XII. Fig. 87- 91.

Lovén aufgestellte Schema unterzubringen sein, wenn man nur einige Abänderungen in Vogt's Darstellung vornimmt, welche um so gerechtfertigter erscheinen, als derselbe den ersten Ursprung der peripherischen Kugeln nicht ermitteln konnte. Ohne Zweifel würde der Furchungsprozess bei *Neritina* ein ganz ähnliches Bild abgeben.

Die Folge unserer Beobachtungen führte uns zu einem ganz anderen Resultate als das, welches sich nach Koren und Danielssens Untersuchungen herausstellte, da wir, wie es weiter unten ausgeführt werden wird, zur unumstößlichen Gewissheit kamen, dass der sich aus dem einem Ei entwickelnde Embryo die übrigen Eier auffrisst. Dadurch aber nähern sich unsere Beobachtungen denjenigen von Carpenter, welcher die Richtigkeit der Beobachtungen beider norwegischen Forscher bestreitet und behauptet, die Jungen von *Purpura lapillus* entstünden nicht durch Verschmelzung vieler Eier, sondern dass jeder aus einem einzigen Ei herangebildete Embryo eine beigegebene Dottermasse auffrisst¹⁾. Carpenter behandelt die Frage sehr weitläufig, ob die von Koren und Danielssen als Eier aufgefassten Körper wirkliche Eier sind, und kommt zum Schluss, dass unter den



Neritina, hat Carpenter bei *Purpura* einen ursprünglichen Unterschied zwischen den sich zu Embryonen entwickelnden Eiern — also seinen „true ova“ — und seinen eiähnlichen Körpern finden können. Er war jedoch darin glücklicher, dass er einen Unterschied in der Art und Weise der Furchung beider auffand, da während die einen und zwar seine eigentlichen eiähnlichen Körper eine gleichförmige Furchung durchmachen, die anderen sich im Gegentheil zuerst in zwei ungleiche Segmente theilen sollen, deren kleineres wahrscheinlich der Ursprung der s. g. peripherischen Schicht ist. Diese Beobachtung gehört übrigens Carpenter nicht, sondern Busk an, der die Entwicklung von *Purpura* auch studirte und zu demselben Resultate wie Carpenter gelangte und zur Abhandlung desselben mehrfach beitrug. Carpenter betrachtet nun die eiähnlichen Körper als von den Eiern verschiedene, blosse Dottersphären, aber der Unterschied zwischen beiden möchte wohl nicht so gross sein, und in der That lässt sich kein anderer angeben, als der des späteren Schicksales. Es erscheint nicht unwahrscheinlich, dass die Genesis beider Gebilde dieselbe ist, dass beide ganz auf dieselbe Weise im Eierstock gebildet werden. Die Furchung der eiähnlichen Körper spricht dafür, dass es wahre Eier sind, da ein solcher Prozess gerade dem Ei eigenthümlich ist, und selbst der von Busk aufgefundene Unterschied in der Furchungsweise möchte wohl nicht so erheblich erscheinen, da nur gesagt wird, dass manche unter den in der Kapsel enthaltenen eiähnlichen Körpern eine sehr ausgeprägte Ungleichheit der ersten Segmentation zeigen, was nicht die Möglichkeit ausschliesst, dass die anderen eine zwar weniger ausgeprägte aufzuweisen hätten und ausserdem wurde es nicht einmal mit Gewissheit nachgewiesen, dass die ersteren die s. g. wirklichen Eier wahrhaftig seien. Wir halten daher alle in der Kapsel sowohl von *Neritina* wie von *Purpura* enthaltenen Körper für genuine Eier; wodurch aber die meisten in ihrer Entwicklung gehemmt werden, das bleibt freilich ein Räthsel.

Das weitere Verhalten der sich nicht entwickelnden Eier

scheint bei *Purpura* und bei *Neritina* ein verschiedenes zu sein. Nachdem nämlich die unfruchtbaren Dottersphären in den Kapseln der erstgenannten Schnecke die Furchung durchgemacht haben¹⁾, so zeigen dieselben eine entschiedene Neigung zum Zusammenfliessen. Sie hängen dann mit Zähigkeit an einander, so dass man nur mit Schwierigkeit die einzelnen gefurchten Kugeln von einander trennen kann, endlich verschwinden die Begränzungslinien dieser verschiedenen Kugeln ganz und gar und es bleibt nur ein einförmiges Conglomerat von kleinen Dottersegmenten übrig. Ein solches Zusammenfliessen findet bei *Neritina* niemals statt. Zur Zeit, wo der Embryo auftritt, zerfallen die unfruchtbaren gefurchten Eier in Kugelgruppen, deren jede etwa ein halbes Mal so gross, wie ein ganzes Ei, mitunter jedoch auch kleiner ist. Diese Dottergruppen bestehen meistens aus einer grösseren und mehreren kleineren Dotterkugeln. Niemals aber zeigt sich selbst eine leichte Adhäsion dieser Kugelgruppen an einander und es bleiben dieselben getrennt, bis sie dadurch untergehen, dass sie vom Embryo verzehrt werden.

Ob wir gleich sehr viele Eier untersuchten, so fehlten uns doch einige Uebergangsstufen von dem einen Entwick-




werden können. Dies war aber nicht möglich, zuerst weil stets nur eine einzige Eierskapsel auf ein Mal gelegt wird und ausserdem weil die Neritiden in der Gefangenschaft niemals Eier legten. Es gelang nicht einmal, Eier im unteren Theile der Tuba oder in der Gebärmutter zu überraschen. Wahrscheinlich sagte den Thieren das Leben im ruhigen Wasser nicht zu, da sie in diesem Zustande kein einziges Mal frassen. Dadurch ist ein Bild des regelmässigen Entwicklungsganges nach Wochen und Stunden, wie Vogt und Sars bei anderen Mollusken thaten, unmöglich geworden. Diese Regelmässigkeit muss übrigens den äusseren Verhältnissen, Temperatur u. s. w. untergeordnet bleiben.

Die kleinsten wahrgenommenen Embryonen, welche das Wimperkleid schon vollkommen eingebüsst hatten, stellten einen unregelmässigen Cylinder dar, welcher durch eine leichte kreisförmige Einkerbung in zwei Theile zerfiel; letztere wollen wir mit den von Vogt bei *Actaeon* gebrauchten Benennungen Kopftheil (*partie céphalique*) und Unterleib oder eigentlicher Leib (*partie abdominale*) belegen. Der Kopftheil trägt auf der Rückenfläche eine Erhabenheit, die einen mehr oder weniger deutlich ovalen Wall darstellt und mit sehr zarten Wimpern besetzt ist. Es ist dies die erste Spur des Segels, worauf die Cilien ihrer Dünnhcit wegen anfangs kaum wahrnehmbar sind. Dicht vor diesem Segelrudiment an dem vorderen Ende des Thieres sieht man eine flache Vertiefung, den Mund. Auf der Bauchseite des Kopftheiles, dicht unter der Mundvertiefung, tritt dann bald ein scheibenartiges Organ auf, welches Anfangs sehr schmal und kurz, allmählig nach hinten an Grösse zunimmt. Dies ist die erste Andeutung des noch deckellofen Fusses. Zu dieser Zeit sind die inneren Organe in dem eigentlichen Leibe noch nicht wahrnehmbar. Sehr bald nimmt die das spätere Segel vorstellende Erhabenheit rasch zu, indem sie sich saumartig entwickelt und deren Rand sich mit längeren deutlicheren und zahlreicheren Wimpern besetzt. Dieser Rand wird im Verhältniss zur Segelmembran selber beträchtlich dicker (Fig. 39, 40). In dem Leib bildet sich eine geräumige Leibeshöhle (f), worin ein Haufen Bildungsmasse

als eine Anhäufung verschieden grosser, fettähnlicher Tröpfchen sich ansammelt (e). Der Fuss (d) stellt ein eiförmiges Organ dar, welches dicke Wandungen und eine innere Höhle besitzt. Letztere scheint mit der Leibeshöhle zusammenzuhängen. Der Fuss ist noch vollkommen unbewimpert. Die grubenförmige Aushöhlung am Vorderrande hat sich zu einer queren Mundöffnung (b) gestaltet, welche in einen röhrenförmigen Schlauch (c) den eben auftretenden Speisekanal führt. Der Eingang in die Mundhöhle ist ringsum bewimpert und das Speiserohr flimmert von Anfang an auf seiner ganzen Oberfläche, ähnlich wie Sars, Koren, Danielssen, Carpenter, Vogt u. a. m. bei vielen anderen Cephalophorenembryonen sahen.

Wie man sieht, tritt der Darmkanal beim Neritinenembryo gleich früh und selbst vielleicht noch früher wie der Fuss auf, was jedenfalls eine auffallende Erscheinung bleibt. Bei *Actaeon*¹⁾ zeigen sich nach Vogt's Beobachtungen die Verdauungs- und Assimilationsorgane erst sehr spät, viel später z. B. als die Otolithen und die Schale. Aehnliches wurde von Sars, Lovén, Koren und Danielssen u. A. namentlich bei Nudibranchiaten gesehen, und bei *Buccinum* soll




fen haben. Ähnlich erzählt Leydig ¹⁾ von den Paludinenembryonen, dass sie schon mit dem Munde, dem After und der Anlage des Schlundes und Darmes zu einer Zeit versehen sind, wo noch keine Spur von einem Ohr vorhanden ist.

Dieses schnelle Auftreten der Verdauungsorgane bei Neritinenembryonen ist für die weitere Ausbildung des Thieres höchst bedeutungsvoll. Von diesem Augenblicke an ist er nicht mehr ein blosser unreifer Embryo, sondern muss als eine in der Kapsel frei herumschwimmende Larve betrachtet werden, welche den übrigen Kapselinhalt, d. h. die Schwistereier, die nicht zur Entwicklung kamen, sich aneignet und auffrisst. Es ist dies keinesweges eine blosser Vermuthung – welche übrigens schon dadurch gerechtfertigt erscheinen dürfte, dass der anfangs winzig kleine Embryo allmählig an Grösse zunimmt und endlich die ganze Kapsel ausfüllt, während die übrigen Dotter zurücktreten und schwinden -- sondern eine durch die Beobachtung dargethane Thatsache. Schneidet man die Eierkapseln vorsichtig auf, so tritt der kleine Embryo heraus und schwimmt zwischen den zahlreichen Dotterklumpen frei herum. Es sind letztere die schon erwähnten durch das Zerfallen der unfruchtbaren Eier gebildeten Kugelgruppen, welche, sowohl die grösseren wie die kleineren, vollkommen klar und durchsichtig, nur schwach goldgelb gefärbt sind; sie bestehen aus einer homogenen, zähen, fettähnlichen Substanz. Diese Kugeln werden von einer dünnen, farblosen Schicht eines schleimartigen Stoffes eingehüllt (Fig. 40 A.), worin äusserst feine Dotterkörnchen stecken, die gewöhnlich so gruppiert erscheinen, dass, um so zu sagen, Körnerstrassen auf der Oberfläche der Kugeln entstehen. Dies ist das Nahrungsmaterial der jungen *Neritina*. Die Larve schwimmt im Wasser unter dem Mikroskop herum und bald sieht man, wie sie sich einer Dottergruppe nähert und dieselbe durch das Schlagen der Segelwimpern in drehende Bewegungen versetzt, während das Thier selbst stillsteht. Dadurch werden die Kugeln der Mundöffnung allmählig herangebracht, nicht um -- wie man gern

1) A. a. O.

glauben möchte, – mit einem Mal verschluckt, sondern bloss abgeleckt zu werden. Die Kugeln werden fortwährend vor der Mundöffnung gedreht, während das Thier vermittelt seiner Wimpern die Dotterkörnchen der farblosen äusseren Schicht abreisst und verzehrt. Man sieht dieselben in den trichterförmigen Schlund hineingezogen, wo sie durch den Wimperüberzug in zitternder Bewegung erhalten werden, bis sie die Leibeshöhle erreichen und sich zur Nahrungsmaterialansammlung hinzufügen, welche schon da vorhanden ist. Obgleich man die Dotterkörnchen einer Kugel in den Schlund beständig hineinwandern sieht, so nimmt doch ihre Anzahl nicht sichtlich ab, so dass man gezwungen wird anzunehmen, dass sich neue Körnchen – wahrscheinlich aus der durchsichtigen, goldgelben Dotterkugel, bilden, um die verschluckten zu ersetzen.

Dieses Fressen der jungen Neritinen innerhalb der Eierskapseln genügt, um ihre Volumenzunahme zu erklären, denn das Thier hat gegen das Ende des Embryonallebens ein 40- bis 60faches Volumen erreicht. Diese Erscheinung möchte wohl wiederum für Carpenter's Ansicht sprechen, welcher ebenfalls die Ingestion von Dotterkörnchen in den Oesophagus




das sich durch ein blosses Fressen nicht wohl erklären lässt. So soll man z. B. in der Leibeshöhle der jungen *Buccinum*- und *Purpura*embryonen eine Dotteransammlung treffen, welche aus lauter unverletzten Eiern besteht. Nun ist die Speiseröhre bei den Individuen, wo sie schon wahrgenommen wird, so eng, dass die Eier unverletzt unmöglich durchschlüpfen können. Auch findet man in der Leibeshöhle der *Neritinen*embryonen im entsprechenden Zustande keine Eier, sondern eine blosse Anhäufung mehr oder weniger grosser Körner oder Tropfen, deren Beschaffenheit und Farbe mit der Dottersubstanz übereinstimmen. So grosse Körper wie die Eier selbst würden natürlich die *Neritinen*embryonen niemals verschlingen können. Dabei jedoch ist bemerkenswerth, dass die aufgefressene Nahrung sich innerhalb des Embryos nicht ganz selten so zu Kugeln zusammenballt, dass die skandinavischen Naturforscher wohl hätten verführt werden können, ähnliche Gebilde im Magen der *Purpura*- und *Buccinum*embryonen für Eier zu erklären, was ein sehr begreiflicher Irrthum wäre. Koren und Danielssen sollen zwar auch beobachtet haben, dass die Eier der beiden fraglichen Schnecken sich innerhalb der Kapseln einander nähern und halb und halb zusammenschmelzen, während sie sich mit einer gemeinschaftlichen Hüllmembran bekleiden, zu einer Zeit, wo keine Spur, weder von der Speiseröhre noch von der Mundöffnung wahrgenommen wird. Dies lässt sich aber mit Carpenter's Darstellung unmöglich in Einklang bringen, und wegen der Analogie mit *Neritina* können wir nicht umhin zu glauben, letztere sei der Wahrheit näher geblieben. Auffallend bleibt jedenfalls Mehreres in der Entwicklungsweise der beiden von Koren und Danielssen beobachteten *Ctenobranchiaten*. So z. B. sollen die Eier von *Buccinum* gar keine Furchung eingehen, was bei *Purpura* jedoch nicht der Fall ist.

Nachdem der *Neritinen*embryo eine gewisse Grösse erreicht, eine Speiseröhre und einen Mund bekommen und fremde Dotter aufgefressen hat, erst dann tritt die Schale auf. Bald hernach zeigt sich der Deckel und die Sinnesorgane, Auge

und Hörkapsel zugleich. In dieser Zeit hat das Velum seine höchste Entwicklungsstufe erreicht (Fig. 42 und 43) und von nun an nimmt es allmählig ab und tritt stufenweise zurück (Fig. 44 und 45). Die Fühler erscheinen zuerst als kleine Höcker neben den Augen und nehmen allmählig zu, so dass sie sich zur Zeit, wo das Thier die Kapsel verlässt, als deutliche Fühler zu erkennen geben. Wenn das Segel vollkommen geschwunden, die Reibplatte gebildet und der Zungenknorpelapparat aufgetreten ist, dann erst springt die Eierkapsel auf, und die kleine *Neritina* tritt aus, um fortan als freie Schnecke zu leben. Sie kriecht auf der *Tichogonia* herum, deren Schale die Eierkapsel trug und findet darauf die mikroskopischen Organismen, welche ihr anstatt der schon verzehrten Schwesterdottern zur Nahrung dienen sollen.

Wir wollen jetzt auf die verschiedenen Organensysteme des Embryo näher eingehen und zuerst mit der histologischen Beschaffenheit der ursprünglichen Gewebe anfangen. Ein Embryo, der das Stadium des Fressens eben erreicht hat, besteht mit Ausnahme des Segels und des in der Leibeshöhle angehäuften Bildungsmaterials aus einem einzigen Gewebe: sowohl der Fuss, wie die Leibeswandungen werden durch deut-




sind dagegen auf der ganzen Leibesoberfläche bewimpert, wie z. B. bei *Paludina vivipara* ¹⁾).

Während die nackten Schnecken im Stadium des Embryonal-lebens mit einer Schale versehen sind, welche sie erst ziemlich spät verlassen, so führen die Neritinenembryonen in der Eier-kapsel ein schon ziemlich selbstständiges Leben, bevor sie eine Schale bekommen. Sie bewegen sich und fressen sogar zu einer Zeit, wo sie noch vollkommen nackt sind. Die erste Spur der Schale wird leicht übersehen, weil dieselbe ursprünglich eine vollkommen durchsichtige, dünne, farblose Membran darstellt. Sie sitzt wie eine Mütze dem hinteren Körperende auf und gleicht der Gestalt nach einem Napf. Bei einem circa 0,30 Mm. langen Embryo hatte dieser Napf (Fig. 41) eine Breite von 0,20 Mm. und liess schon eine grosse Anzahl von concentrischen Anwachsstreifen wahrnehmen, wonach man schliessen darf, dass die Schale schon lange bestand, aber der Durchsichtigkeit wegen übersehen wurde. Der Mittelpunkt dieser napfförmigen Schale wird von einem etwas confusen Theil eingenommen, wo keine Zuwachsstreifen, wohl aber mit Vacuolen vergleichbare hellere Stellen vorhanden sind. Dieser mittlere Theil ist wahrscheinlich seiner Zeit die erste auftretende Schale gewesen. Von demselben aus gehen radiäre, abwechselnd hellere und dunklere, wenig deutliche Streifen bis zum Schalenrande. Diese Schale enthielt noch keine Spur von Kalksalzen und gehörte einem noch augen- und otolithlosen Embryo an, welcher aber schon mit einem feinen Pflaster-epithel bekleidet war. Erst später tritt der Kalk in der Schale auf und zu derselben Zeit nimmt letztere eine eigene granulöse Struktur an, welche dadurch bedingt wird, dass dunklere, anscheinend dickere Stellen, durch schmale, durchsichtigere Streifen von einander getrennt sind (Fig. 64). Wie der complicirte Schalenbau des erwachsenen Thieres dadurch allmählig zu Stande kommt, ist nicht wohl einzusehen. Eine ähnliche Struktur wurde schon von Koren und Da-

1) Leydig, a. a. O. p. 137.

nielssen ¹⁾ bei der Embryonalschale von *Purpura lapillus* gesehen und abgebildet. – In der Schale, womit die Aplysien ähnlich wie die anderen Nudibranchiaten, während des Larvenlebens versehen sind, setzt sich nach Van Beneden's Beobachtungen ²⁾ kein Kalk ab. Vogt ³⁾ erzählt dasselbe von *Actaeon*. Bei *Neritina* aber zeigt sich der Kalk, wie gesagt, schon innerhalb der Eierkapsel, und zwar bald früher bald später. Oft giebt schon eine noch napfförmige Schale bei Zusatz von Essigsäure ein paar Kohlensäureblasen, während in anderen Fällen, eine die Neritinengestalt schon zeigende Schale keine Spur von kohlensaurem Kalk enthält. Bei *Buccinum* und *Purpura* tritt der Kalk in der Schale ebenfalls noch innerhalb der Eierkapsel auf, wie Koren und Danielssen angeben.

Die anfangs napfförmige Schale wächst auf der Rückenfläche schneller als nach dem Bauche zu und da sich der Embryo zu derselben Zeit nach vorn krümmt, und dadurch eine concave Bauch- und eine convexe Rückenfläche bekommt, so biegt sich die Schale, welche der sie ausschwitzenden Leibesoberfläche dicht anliegt, gleichfalls nach vorn. So entsteht die Schneckengestalt, welche anfangs zwar mehr an eine Nautilus-




deutlich auftreten, verschwinden beim weiteren Wachsthum allmählig ganz.

Beim noch jungen Embryo ist keine Mantelhöhle vorhanden. Die Schale liegt der äusseren Körperhaut dicht an und letztere bildet keine Falte. Der durchsichtige Schalenrand erhebt sich so wenig über die angrenzenden Hauttheile, dass er nur schwer wahrgenommen wird. Auch muss man, um die Schale zu studiren, den Embryo der Fäulniss überlassen, welche die Schale frei legt. Bald jedoch bildet sich auf dem Rücken des Embryo, dicht vor dem Schalenrande eine Vertiefung, eine Art Hohlkehle, welche bogenförmig diesen Schalenrand entlang quer über den Nacken läuft. Indessen wächst die Schale weiter, indem die Haut, wodurch dieselbe abge sondert wird, eine erhabene Falte hinter der Hohlkehle bildet, welche sich von hinten nach vorn über diese Hohlkehle hinwegwölbt. Dadurch entsteht eine Duplikatur der Haut, deren obere Fläche die Fortbildung der Schale übernimmt, während die untere Fläche die Decke eines Raumes bildet, dessen Boden der Nacken des Thieres ist. Dieser Raum, der durch die frühere Hohlkehle oder Hohlrinne, deren Ränder gewachsen sind, gebildet worden ist, stellt die Mantelhöhle vor. Die Kante, wo die obere Fläche der Hautduplikatur in die untere übergeht, ist der Mantelrand. Von diesem aus scheint die Schalenbildung am lebhaftesten vor sich zu gehen. Vogt bemerkt bei *Actaeon*, dass der Mantel gerade an dieser Stelle der Schale am stärksten anhaften soll, und da die Schale sich über diese Stelle ganz frei hinweg verlängert, so vergleicht er diesen freien Theil der Schale mit jedem freien Oberhautgebilde, z. B. dem freien Theil des Nagels; er ist sogar überzeugt, dass die Schalenbildung mit dem Nagelwachsthumprozess übereinstimmt.¹⁾ Indessen kann man sich schwer vorstellen, wie eine Schale ihren Zuwachs in der hinteren Gegend erhalten sollte, um so mehr, als die Schale in diesem Falle, nach der Mündung zu, an Durchmesser unmöglich zunehmen könnte.

1) A. u. O. p. 53.

Der auf die erklärte Weise gebildete Mantel besteht aus den früher beschriebenen 0,0026 bis 0,0039 Mm. grossen Zellen und dadurch weicht der Neritinenembryo von *Actaeon* ab, wo die eben gebildete Manteldecke, wie die übrige Haut, nach Vogt's Darstellung, aus einer homogenen Substanz bestehen soll, worin nur einige wenige, rundliche Körperchen eingestreut sind, welche an die Kerne der Embryonalzellen aus der peripherischen Schicht erinnern. Vogt nimmt bei *Actaeon* an, dass die Zellen dieser letzten Schicht einerseits die Schale und andererseits die Haut bilden, indem sie zu einem homogenen Gewebe zusammenschmelzen, welches nach aussen zu einer Schale erhärtet, während es nach innen gallertartig und kontraktile bleibt. Dagegen hat Leydig bei *Paludina*embryonen in Uebereinstimmung mit der Hautbeschaffenheit bei Neritinenlarven, die Haut aus klaren, sarten Zellen mit bläschenförmigem Kerne und einem Kernkörperchen gebildet gefunden. A. v. Nordmann fand auch bei den *Tergipes*embryonen den Mantel aus Zellen zusammengesetzt, welche aber nicht kuglig wie bei *Neritina*, sondern länglich und ohne deutlichen Kern waren.

Die Mantelhöhle des Embryo ist vollkommen unbe-



finden. Bei Embryonen, welche schon zwei Drittel der Eierskapsel erfüllten, bildete das Pigment gleichsam Maschen auf dem Mantel, ohne dass man hätte sehen können, ob diese Maschen wirklichen Zellen entsprechen oder nicht. Eine besondere Pigmentablagerung findet dicht unter dem Schalenrande statt und zeigt sich als ein schwarzer Streif rings um die Schalenöffnung herum. Der Mantelrand, welcher den Schalenrand umsäumt und gewissermassen überwuchert, erscheint unter dem Mikroskop schön weiss, aber dicht hinter demselben findet in den vorgeschrittenen Stadien des Embryonallebens diese Pigmentablagerung statt (Fig. 44 l'). Dieses Pigment besteht wie im übrigen Mantel aus feinen Körnchen, welche in keinen Zellen enthalten zu sein scheinen. Vogt erwähnt etwas Aehnliches bei den Larven des *Actaeon*. Auch er könnte keine Pigmentzellen wahrnehmen, vermuthet aber deren Anwesenheit. Bei *Actaeon* ging diese Pigmentbildung der Trennung der Schale vom Mantel unmittelbar voraus.

Der Fuss ist ursprünglich eine Art Scheibe (Fig. 39 d), die unter dem Munde sitzt. Er besteht aus denselben Zellen wie die Haut und bedeckt sich sehr bald mit einem feinen Flimmerüberzug. Dass der Fuss flimmert, während die übrigen Theile des Embryo wimperlos sind, muss wohl eine Bedeutung in der Oekonomie des Thieres haben und in der That erlangt der Fuss eine grosse Wichtigkeit als Greiforgan. Das Nahrungsmaterial, die zahlreichen Schwesterdottern des Embryos, liegen um denselben herum, müssen aber in den Schlund desselben hineingewimpert werden. Dies geschieht mittelst des Fusses, der sich rinnenförmig gestaltet und durch die Bewegung seiner Flimmercilien die Dotterkugeln dem Munde zuführt. Dotterkörnchen werden auf diesem Wege von den Kugeln abgerissen und hinuntergeschluckt. Während das Thierchen eine Kugel frisst, oder besser gesagt ableckt, so wird dieselbe in rotirender Bewegung erhalten, was sowohl durch die Segel- wie durch die Fusswimpern geschieht.

Zu derselben Zeit, wo die Sinnesorgane auftreten, erscheint zum ersten Mal auf der Rückenseite des Fusses eine

hornartige Platte, die erste Anlage des Deckels. Es ist übrigens keine Platte, sondern vielmehr ein Zahn, der zuerst auftritt. Es ist dies der Processus, wodurch der Deckel in die Schale eingreift. Dieser Processus erhebt sich nicht gerade senkrecht über die Ebene des späteren Deckels, sondern bildet mit derselben einen ziemlich grossen Winkel. Er schwillt nach oben zu etwas kolbenartig an (Fig. 59) und geht nach unten in einen Halbkreis über, der in der Deckelebene liegt und eine blosse Verdickung des Deckels ist. Von dem Zahn aus geht ein durchsichtiger, dünner Flügel nach der linken Deckelseite zu und verschmilzt dann mit dem flachen Theil des Deckels. Dieser embryonale Deckel zeigt keine Spur von der faserigen Struktur, die wir bei Gelegenheit des erwachsenen Thieres kennen lernten. Er enthält ursprünglich keinen Kalk, ist aber in der Nähe des Zahnes frühzeitig gelbbraun gefärbt, während der vordere Rand vollkommen blass ist. Die Ränder des Fusses sind gewulstet und überwuchern den Deckel nach dem Rücken zu, so dass in der Profilansicht der Deckel auf beiden Seiten von dem Parenchym des Fusses bekleidet zu sein scheint (Fig. 44).

Die Bewegungen des Fusses sind diejenigen des Thieres




Fuss und Leibeshöhle bei *Neritina* stattfindet, indessen konnten wir keine regelmässigen Expansionen und Zusammenziehungen des Fusses wahrnehmen.

Es ist hier die Stelle zweier eigenthümlicher Lappen Erwähnung zu thun, die bei Neritinenembryonen zwischen dem Fusse und dem Munde erscheinen (Fig. 42 p). Sie sind gerade wie der Fuss bewimpert, während der übrige Leib noch kein Wimperkleid besitzt, und setzen nach dem Munde zu die bewimperte Rinne fort, wozu sich der Fuss beim Fressen gestaltet. Dieselben werden durch den Brusttheil, d. h. den zwischen dem Kopfe und dem Fusse gelegenen Theil des Thieres gebildet, welcher sich während des Embryonallebens in zwei Flügel auszieht, offenbar um die Zufuhr des Nahrungsmaterials bis in den Mund zu erleichtern. In den letzten Entwicklungsstadien treten allmählig diese Flügel zurück und verschwinden vollkommen. Es sind diese Flügel offenbar dasselbe wie die Lappen, welche Vogt zuerst an einer Seeschneckenlarve entdeckte, die er deswegen für die Larve von *Pneumodermion* hielt ¹⁾, weil er dachte, diese Lappen seien die Anlage der Pteropodenflügel. Seitdem haben Gegenbaur's Beobachtungen dargethan, dass die fragliche Larve wahrscheinlich keinem Pteropoden angehört. Die Aehnlichkeit mit *Neritina* lässt ebenfalls vermuthen, es handle sich um eine Gasteropodenlarve, bei welcher diese Brustlappen freilich viel mehr entwickelt als bei den Neritinenembryonen sind.

Das Segel erscheint zuerst als ein wulstiger Wall, welcher ein mehr oder weniger regelmässiges Oval auf dem Kopftheil des Embryos bildet. Das Oval schnürt sich bald an der Stelle ein, welche der von vorn nach hinten gerichteten Achse entspricht und dadurch entsteht gewissermassen eine Biscuitform, oder wenn man lieber will, eine liegende Achtfigur. Allmählig erhebt sich der Wall und entfernt sich vom Kopf-

1) S. Vogt's Bilder aus dem Thierleben. Frankfurt a. M. 1852 p. 292—295, und Beitrag zur Entwicklungsgeschichte eines Cephalophoren. — Zeitschr. f. wiss. Zoologie. Bd. VIII. 1855. p. 162.

theil, womit er jedoch durch eine dünne durchsichtige Membran verbunden bleibt. Anfangs ist er ganz nackt und wimperlos, bald aber erscheinen dünne Cilien auf dessen Oberfläche, die langsam herumschlagen. Der Wimpersaum läuft also von dem einen Segellappen auf den anderen, wie schon Leydig bei *Paludina*¹⁾ und Gegenbaur bei den Pteropoden und Heteropoden angeben. Kurz darauf überschreiten die Wimpern die Länge der zur selbigen Zeit auftretenden Cilien des Fusses und des Schlundes und wachsen zu starken Haaren heran. Niemals jedoch erreichen sie eine Länge, die man mit derjenigen der von Vogt beim Segel von *Actaeon* abgebildeten Cirren vergleichen könnte. Uebrigens ist nicht bei allen Seeformen das Segel mit solchen ungeheuren Cirren ausgestattet: bei den meisten trägt der verdickte Saum des Organes, so viel man aus Lovén's, Sars's, Nordmann's und Anderer Abbildungen ersehen kann, nicht übermässig lange Wimpern, obgleich sie gewöhnlich länger als bei *Neritina* sein mögen. Bei *Buccinum* und *Purpura* sind sogar die Segelwimpern nach Koren und Danielssen's Figuren verhältnissmässig kaum so lang wie bei *Neritina*embryonen: sie sind aber nicht allein da, sondern wechseln mit



dem Munde zuführt. — Bei den frei im Wasser herumschwimmenden Schneckenembryonen kommt dem Segel eine andere wichtige Function, die Locomotion zu. Hier aber, wo das Thierchen nur einen sehr beschränkten Raum zur Verfügung hat, verschwindet dieser Zweck fast vollkommen. Die Neritinenembryonen können sich zwar mit Hülfe des Segels bewegen, da man dieselben nicht selten in einem Tropfen Wasser unter dem Mikroskop sich herumtummeln sieht. Dieses Schwimmen ist aber nicht sehr lebhaft, was Keinen Wunder nehmen wird, wenn man bedenkt, dass nicht einmal dieser Wassertropfen dem Embryo in der Kapsel zu Gebot steht und dass er sich nur schwer und langsam zwischen den zähen Dottermassen bewegen kann. Der Nutzen des Segels als Ingestionsorgan ist also wahrscheinlich viel bedeutender und es spielt dasselbe beim Akt des Fressens eine so wichtige Rolle wie der Fuss und die Brustlappen. Desswegen bedarf das Thier keiner so langen Segelcirren, wie gewisse sich frei herumtummelnde Seeformen. Wenn die Fühler und Ommatophoren sich heranbilden, so erheben sie sich aus dem Grunde der trichterförmigen, durch die Segelmembran gebildeten Vertiefung, und letztere sitzt um deren Wurzel, wie ein Kragen um den Hals. Das Segel ist übrigens sehr contractil, wird mit grosser Leichtigkeit nach vorn gespannt oder nach hinten zurückgebracht, oder endlich vollkommen zusammengeschlagen, während die junge Schnecke sich in ihr Gehäuse zurückzieht. Alle diese Bewegungen werden durch besondere Organe vermittelt, die wir gleich besprechen werden.

Der verdickte Segelrand besteht aus einer einzigen Zellenreihe, wie dies sich schon dadurch kund giebt, dass kleine Einkerbungen zwischen je zwei Zellen nicht selten vorhanden sind. Durch Zusatz von Essigsäure treten diese Zellen mit einem schönen deutlichen Kern leicht hervor (Fig. 53a). Es sind ovale prall gefüllte, etwa 0,012 Mm. breite Zellen, deren Kern circa 0,008 Mm. an Durchmesser misst. Sie enthalten feine Körperchen, die wohl von den Dotterkörnchen her stammen möchten, da sie mit denselben die grösste Aehnlichkeit

besitzen. Sie tragen auf ihrer der angewachsenen Seite entgegengesetzten Fläche eine grosse Anzahl Wimpern, die wohl als Auswüchse der Zelle zu betrachten sind. Dadurch würden also die Embryonen der *Neritina* von denen des *Tergipes Edwardsii* abweichen, bei welchen jede Zelle des Segelrandes eine einzige Wimper tragen soll ¹⁾. Auf der Segelmembran selbst erkennt man bei Essigsäurezusatz ein Pflaster von unregelmässigen, etwas länglichen Zellen (Fig. 53 b), deren Grösse diejenige der Randzellen sogar etwas überschreitet. Diese Zellen zeigen einen hellen, nicht scharf contourirten Kern, mit einem deutlichen Kernkörperchen. Gegenbaur fand übrigens ebenfalls bei Essigsäurezusatz im scheinbar homogenen Gewebe der Segellappen bei den Hyaleaceen ganz ähnliche, zarte Zellen ²⁾. — In der Dicke der Membran selbst erkennt man ohne Anwendung von Reagentien merkwürdige faserige Gebilde, welche sich bei näherer Betrachtung sehr bald als die Träger der Beweglichkeit des Segels herausstellen. Es sind dies spindelförmige Körper, deren eine Spitze bis zum Segelrande reicht, während die andere nach dem Kopftheil des Embryos zu gerichtet ist. Diese spindelförmigen Fasern sind in der Mitte etwas angeschwollen (Fig. 48) und kreuzen einander in den mannigfachsten Richtungen. Jeden Augenblick sieht man entweder die eine oder die an-

könnten ihrer Function wegen als embryonale Muskelfasern angesehen werden. — Eine faserige Struktur des Segels wurde schon bei gewissen Schneckenlarven angegeben, ohne dass man näher darauf einging. Vogt z. B. bemerkt bei *Actæon* ¹⁾, dass das membranöse, den verdickten Rand und die Cirren tragende Segel, unzweifelhaft fibrös, namentlich zur Zeit der vollkommenen Expansion erscheint; man sähe dann gerade, schwach markirte und mit der umgebenden Grundsubstanz verschmolzene Fasern, die sich vom der Basis bis zum Segelrande begeben, offenbar um denselben zu bewegen. Allein über die Zellennatur dieser Gebilde hat Vogt nichts angegeben. Gegenbaur's Darstellung der Beschaffenheit des Velums bei den Hyaleaceen ²⁾ hat aber mit den eben besprochenen Verhältnissen bei *Neritina* eine auffallende Aehnlichkeit. Nach innen zu fand er im Segel radiär verlaufende, oft verästelte und mit leichten Anschwellungen versehene Fasern, die sich gegen das Centrum des Velum zu verlieren sollen, und er vermuthet schon, dass die Anschwellungen Kerne enthalten könnten. Noch übereinstimmender mit den fraglichen Gebilden aus dem Segel von *Neritina* sind die Muskelzellen, welche von demselben Forscher in der Schwanz- und Nackenblase von *Limax* ³⁾ und Clausilienembryonen ⁴⁾ beobachtet wurden und schon früher von Oscar Schmidt ⁵⁾ gesehen worden waren.

Vergebens wurde im Segel von *Neritina*embryonen nach Gefässen oder sonstigen Kanälen gesucht, die zum Kreislauf einer blutähnlichen Flüssigkeit hätten dienen können. Koren und Danielssen übrigens, welche früher das Segel bei gewissen Schneckenembryonen als Athmungsorgan ansaphten

1) Embryologie de l'Actéon. A. a. O. p. 46.


2) A. a. O. p. 36.

3) Zur Entwicklungsgeschichte der Landgasteropoden, von Dr. C. Gegenbaur. Zeitschr. für wiss. Zoologie. Bd. III. 1851. p. 376 und 377. Tab. X. Fig. 3.

4) Ibid. p. 400. von *Clausilia similis* Charp. — Auch im Herzen derselben. p. 404.

5) Ueber die Entwicklung von *Limax agrestis*. Müller's Archiv 1851. p. 279.

und Gefässe in demselben wollten gefunden haben ¹⁾, sollen ihre Meinung dahin verändert haben, dass diese vermeintlichen Gefässe Bewegungsorgane sind, weil sie dieselben bei Buccinum- und Purpuralarven als deutliche Muskelfasern erkannten.¹⁾ Es sollen sich mehrere derselben an einander legen und hie und da verästeln. Die Verzweigungen sollen um so häufiger und dünner werden, je mehr die Muskelröhren sich der Segelperipherie nähern, und indem die feineren Aeste einander oft durchkreuzen, soll ein Muskelnetz zu Stande kommen, das dazu dient, die Segellappen nach allen Richtungen zu bewegen. Es sind also diese Muskelröhren gerade dasselbe, wie die embryonalen Muskelzellen der Neritinen-, Limax- und Clausilienembryonen, nur bemerken die norwegischen Forscher in Bezug auf die Beschaffenheit dieser Muskelröhren, sie seien im Stande, Leydig's Ansicht über die Muskelstruktur bei Mollusken zu bekräftigen und das Ergebniss ihrer Beobachtungen weiche von Lebert und Robin's Angaben ab — wie man schon aus dem Ausdruck „Muskelröhren“ selbst hätte erschliessen dürfen. Wir selbst können mit Leydig's Darstellung, bei vielen Mollusken wenigstens, überhaupt nicht vollständig einverstanden sein, da wir ausser der wirklich vorhandenen Leydig'schen Röhre noch eine Struktur des Röhreninhaltes, eine feine



Athmungsfunktion dem Segel zukommt, wie van Beneden¹⁾ schon vermuthete, steht dahin. Vogt will nichts davon wissen, weil er lieber dem Fusse eine solche Rolle zuschreiben zu müssen glaubt²⁾.

Von der Zeit an, wo die Fühler deutlich werden, nimmt das Segel allmählig an Umfang ab. Der mittlere Theil desselben schwindet am schnellsten und die beiden Lappen bleiben als kleine Kragen an der Basis der Fühler zurück (Fig. 45), um kurz darauf vollkommen einzugehen.

Die grosse Entwicklung des Segels bei *Neritina* ist eine höchst interessante Thatsache, da dies das erste Beispiel einer Larvenform bei einer Süsswasserschnecke ist. Zwar wurde schon Aehnliches von Lovén bei *Paludina* entdeckt, und später von Leydig wieder gefunden, aber das Segelrudiment erreicht bei diesem Ctenobranchier eine nur unbedeutende Grösse. Ausserdem durchläuft der *Paludina*embryo dieses Larvenstadium in den Eihüllen selbst, innerhalb des Mutterleibes, während die junge *Neritina* als eine vollkommene Larve zu betrachten ist, da sie das Ei schon verlassen hat und sich in der Eierskapsel, zwischen den zahlreichen Schwesterdottern frei herumbewegt.


Wir erwähnten schon, dass die Neritinenembryonen sich dadurch auszeichnen, dass der Verdauungsapparat beinahe gleichzeitig mit der Sonderung des Kopf- und Abdominaltheiles auftritt. Auf der vorderen Seite, in der zwischen den beiden Segellappen befindlichen Ausbuchtung bildet sich der Schlund als eine trichterförmige, bewimperte Vertiefung. Leydig³⁾ giebt bezüglich der *Paludina*embryonen an, dass bei ihnen die Mundöffnung in Bezug auf das Segel anders gelagert sei, als bei den mit einem Segel versehenen See-gasteropoden, bei welchen sich der Mund zwischen den Segellappen befindet, während er bei *Paludina* unter dem vorderen Rand des Velums liegt. Das Verhältniss wäre also

1) Recherches sur le développement des Aplysies, a. a. O. p. 339.

2) Embryogénie de l'Actéon, a. a. O. p. 60.

3) A. a. O. p. 148.


bei den Neritinen gerade wie bei den Paludinen und nicht wie bei den Meerschnecken. Indessen möchte wohl der Unterschied nicht so gross sein und wir finden nirgends die Angabe, dass der vordere Segelrand zwischen dem Munde und dem Fusse verlaufe, so dass der Mund in der Mitte des Segels gelagert sei. Vogt¹⁾ sagt zwar bei *Actæon*, der Mund liege zwischen den beiden Segellappen, das kann man aber gerade so auffassen, wie die Verhältnisse bei *Paludina* und *Neritina* sind. Gegenbaur giebt ausserdem ausdrücklich an, dass bei den Heteropoden²⁾ der Mund sich aus einer am vorderen Segelrand entstehenden Vertiefung bildet. Bei den Hyaleaceen³⁾ bemerkte er ebenfalls zwischen dem Fusse und der vorderen Einbuchtung des Velums das Auftreten der Mundöffnung und überhaupt bei allen Pteropoden⁴⁾ sah er das Segel oberhalb des Mundes. Damit übereinstimmend befindet sich der Mund der Lamellibranchierembryonen vor dem oberen Segelrand. Deshalb nehmen wir keinen Anstand, trotz Leydig's Bemerkung, eine völlige Uebereinstimmung zwischen den See- und Süsswasserspecies in Betreff des Mundes zu behaupten. — Aus der Embryonalmasse sondert sich die Speiseröhre als ein ge-



gehäuften Dottermasse in Verbindung, welche dadurch an Umfang zunimmt, dass die in den Schlund fortwährend hineingewimperten Dotterpartikelchen sich dem schon vorhandenen Haufen hinzugesellen. Letzterer stellt den künftigen Magen mit der Leber vor und in der That tritt bald eine Sonderung desselben in zwei kuglige Massen ein, deren eine dem Magen (Fig. 42 und 43 e') und die andere der Leber (e'') entspricht. Erstere allein bleibt mit der Speiseröhre in Verbindung. Anfangs nimmt man keine Membran um den rudimentären Magen herum wahr, indessen erscheint nach kurzer Zeit um die fettähnliche, stark lichtbrechende Dottermasse ein dünner, heller Saum, welcher dem Auftreten einer umhüllenden Haut zu entsprechen scheint, obgleich in derselben keine deutliche Struktur erkannt werden konnte. Von der Magen- und Leberperipherie gehen Stränge aus, wodurch dieselben an der Leibeswandung befestigt werden (Fig. 40). Die Leber besteht anfänglich aus verschiedenen grossen, gelben, fettähnlichen Tropfen, welche gegen das Ende des Embryonallebens sich in förmliche Leberzellen verwandeln. Niemals aber wurde im Inneren des Organes eine bewimperte Höhle wahrgenommen, wie die von Vogt bei *Actaeon*larven beschriebene. Man muss aber dabei nicht vergessen, dass diese Vorrichtung bei *Actaeon* vielleicht in einem gewissen Verhältniss zum merkwürdigen Bau der Verdauungsorgane bei den Apneusten steht, und bei anderen Cephalophorenabtheilungen nicht vorkommt.

Die Speiseröhre tritt bei den jungen Embryonen als ein dunkler Streif hervor (Fig. 42), weil die feinen, stark lichtbrechenden Dotterkörnchen, die vom Thierchen beständig verschluckt werden, das Lumen des Rohres erfüllen. Je weiter aber die junge Schnecke in ihrer Entwicklung fortschreitet, um so ungünstiger wird sie für die Beobachtung, und von der Zeit an, wo sie etwa zwei Drittel der Eierskapsel ausfüllt, kann man kaum noch den ersten Theil der Speiseröhre auf der Mittellinie mit den beiden Hörblasen zur Seite entdecken, ohne den weiteren Verlauf verfolgen zu können. Dadurch erklärt sich die Unvollständigkeit der

Beobachtungen. Niemals gelang es uns, den Darm aufzufinden. Anfangs ist bestimmt keiner da, und der Verdauungsapparat (Fig. 39 und 40) beschränkt sich auf den Schlund, die Speiseröhre und die Anlage des Magens mit der Leber, doch muss sich kurz darauf der übrige Theil des Darmkanales bilden, ob er sich gleich der Beobachtung entzieht. Nicht einmal der After konnte aufgefunden werden, wenn schon wir genau die Stelle hätten angeben können, wo die Öffnung sich hätte finden sollen. Die Anwendung von Druck ist nicht zulässig, weil die zarten Gewebe des Embryos gleich dadurch zerstört werden würden und es konnte kein befriedigendes Mittel zum Durchsichigmachen aufgefunden werden. — Bei *Actaeon* entdeckte Vogt den After erst gegen das Ende des Embryonallebens¹⁾, und ist überzeugt, dass derselbe sich erst eine kurze Zeit vor dem Ausschlüpfen bildet. Dies dürfte auch auf ein spätes Erscheinen des After bei Neritinenembryonen schliessen lassen. Indessen soll nach Leydig's Beobachtungen der After bei Paludinenembryonen gleichzeitig erscheinen mit dem übrigen Tractus intestinalis, und selbst früher als ein gewisser Theil desselben, da er anfänglich durch eine einfache Grube am hinteren



wicklung fortgeschritten ist, nach der Bildung der Augen und Gehörkapseln, zeigen sich die verschiedenen dem Schlundkopfe angehörigen Organe. Der Zungenknorpelapparat tritt zuerst auf als zwei diskrete Zellenanhäufungen zu beiden Seiten der Mittellinie und etwas hinter dem Munde. Von der späteren Knorpelstruktur ist noch keine Rede und die beiden Hälften des Apparates (Fig. 47) bestehen aus denselben kleinen Parenchymzellen, die wir bei Gelegenheit der Mantelbildung erwähnten, nur sind sie an der betreffenden Stelle näher an einander gedrängt ¹⁾. Diese anfangs undeutlichen und ziemlich rundlichen Zellenanhäufungen werden allmählig schärfer contourirt, spitzen sich nach vorn zu und bilden dann ein gleichschenkliges Dreieck. Zu dieser Zeit erscheinen die ersten Reibplatten der Zunge. Letztere ist anfangs sehr kurz, kaum so lang wie die Zungenknorpel selbst, und zeigt sich als ein dunkler, nicht scharf begrenzter Streif, worin man die Chitinplatten noch nicht wohl unterscheiden kann. Nach und nach nimmt die Zunge an Länge zu und zugleich treten die verschiedenen Chitinplattenreihen weniger confus hervor. Sogleich von Anfang an ist die Anzahl der Platten jedes Gliedes dieselbe, wie beim ausgewachsenen Thiere. Dabei sprechen wir zwar nur von den Hauptreihen und nicht von den zahlreichen kleinen Seitenhäkchen, die der Kleinheit wegen unmöglich gezählt werden können. Es ist ziemlich wahrscheinlich sogar, dass letztere Anfangs in kleinerer Anzahl vorhanden sind als später. Die Hauptreihen sind aber gleich alle da. Dies hat eine besondere Wichtigkeit in Bezug auf eine von Johannes Müller in Messina beobachtete Pteropodenlarve ²⁾. Dieselbe besass nur zwei Längsreihen von Zähnchen und es wird desshalb von Müller für wahrscheinlich gehalten, dass andere longi-

1) Nach Kölliker soll ebenfalls der Kopf-, Ohr- und Nackenknorpel der Cephalopodenembryonen zuerst aus länglichen Zellen, von 0,0045 bis 0,009'' Durchmesser bestehen, die abgesehen von ihrer Grösse, den Embryonalzellen auf ein Haar gleichen. — Kölliker's Entwicklungsgeschichte der Cephalopoden. Zürich 1844. p. 97.

2) Monatsbericht der Berl. Akademie der Wissensch. Oct. 1852.

tudinale Reihen später hinzukommen. Gegenbaur¹⁾ spricht zwar von neuen Hakenreihen, die sich den früher gebildeten bei Clausilienembryonen später hinzugesellen: es ist aber nicht ersichtlich, ob er von Längs- oder nur von Querreihen hat sprechen wollen. — Wenn der Neritinaembryo so **gross** geworden ist, dass er die ganze Eierkapsel ausfüllt und im Begriff ist, herauszuschlüpfen, so ist die Zunge (Fig. 45 r) verhältnissmässig fast so lang, wie beim ausgewachsenen Thiere, und deren Bau ganz scharf markirt. Die Zungenscheide konnte der Undurchsichtigkeit wegen nicht bemerkt werden. — Zu derselben Zeit, wo die ersten Reibplatten auftreten, erscheint die Sonderung des Zungenknorpelapparates jederseits in zwei Stücke, ein vorderes grösseres, und ein hinteres kleineres. Der kegelförmige Aufsatz, der beim erwachsenen Thiere an der vorderen Spitze des grossen dreieckigen Stückes vorhanden ist, wurde bei den Embryonen nicht erkannt. Die Knorpelstücke haben dann noch immer keine Knorpelstruktur (Fig. 47), sondern bestehen aus 0,002 bis 0,008 breiten, ovalen Zellen, mit einem körnigen Inhalt (Fig. 47 A), welche in einer nicht sehr reichlichen Intercellularsubstanz gelagert sind. Selbst bei jungen Neritinen, die

die Reibmembran stets vermißte, so lange wenigstens die provisorische Schale noch vorhanden war¹⁾. Erst bei einer freien Larve waren einige Zahnplättchen vorhanden²⁾. Bei einem eben ausgekrochenen Embryo eines anderen *Tergipes* (*T. lacinulatus*) fand zwar Max Schultze³⁾ eine schon achtgliederige Reibmembran, was auf ein etwas früheres Auftreten schliessen lässt. Leydig⁴⁾ zeigt an, dass die ersten Reibplatten der Zunge bei *Paludina* um dieselbe Zeit sichtbar werden, wo die ersten Hörsteine in der Ohrblase sich finden. Koren und Danielssen⁵⁾ geben nur kurz an, dass sie bei *Buccinum* und *Purpura* die Zungenbewaffnung beobachteten und zwar zu einer Zeit, die mit dem Erscheinen der Zunge bei *Neritina* ziemlich zusammenfällt. Endlich hat Johannes Müller die Reibplatte bei Pteropodenlarven beobachtet. Auffallender Weise hat Gegenbaur bei *Limax* und *Clausilia* die Zunge viel früher auftreten sehen, als man es aus der Analogie hätte vermuthen dürfen. Bei *Clausilia*⁶⁾ sah er eine Hervorstülpung des Schlundes für die Reibmembran (Scheide) schon vor der Bildung des Ohres und des Auges sich bilden, und bei *Limax*⁷⁾ zeigte sich die Radula selbst früher als der Darmkanal. Man sieht daraus, dass die Zeit, in welche die Bildung der Zunge fällt, je nach den Cephalophorengruppen, eine sehr verschiedene ist. — Ueber das Erscheinen der Zungenknorpel ist eine einzige Angabe Troscchel's⁸⁾ vorhanden, der dieselben bei einer der Gattung *Natica* wahrscheinlich angehörenden Schneckenlarve beobachtete.

Ein einziges Mal wurde bei einem dem Ausschlüpfen nahe

1) A. a. O. p. 92.

2) Ibid. p. 99.

3) Wiegmann's Archiv. 1849. I. p. 269.

4) A. a. O. p. 142.

5) Bidrag. p. 18.


6) Zur Entwicklungsgeschichte der Landgasteropoden. a. a. O. p. 400 und 402.

7) Ibid. p. 886.

8) Das Gebiss der Schnecken. p. 18.

gerückten Embryo jederseits der Mittellinie ein schmaler langer Schlauch beobachtet. Derselbe enthielt runde Zellen und stark lichtbrechende Körnchen und neigte sich nach vorn gegen die Zunge hin. Wir können diese Schläuche nur als die erste Anlage der Speicheldrüse deuten. Koren und Danielssen ¹⁾ sahen übrigens die Speichelorgane unter derselben Gestalt, obgleich verhältnissmässig viel früher bei *Buccinum* und *Purpura* erscheinen.

Hörblasen und Augen erscheinen etwa gleichzeitig, und zwar erst lange Zeit, nachdem der Darmkanal angelegt ist und sowohl der Deckel wie die Schale erschienen sind. Die ungünstigen Durchsichtigkeitsverhältnisse erlaubten nicht, die ersten Anfänge der Gehörorgane mit Bestimmtheit wahrzunehmen. Zwei Theorien über die Bildung derselben stehen einander gegenüber. Einerseits will Frey ²⁾ die Gehörbläschen beim Embryo von *Limnaeus stagnalis* zuerst ohne Otolith als einfache runde, nur Flüssigkeit enthaltende Kapseln gefunden haben. Leydig ³⁾ stimmt ihm bei, weil er sah, dass die Ohrblase bei *Paludina* zuerst eine lange Zeit eine einfache Blase mit dicken Wandungen darstellt, und dass man erst dann die Otolithen in den Gehörblasen krystallisiren sieht.



Auf der anderen Seite hätte fast unmöglich eine leere Kapsel, wie sie von Frey und Leydig bei *Limnaeus* und *Paludina* gesehen wurde, bei den undurchsichtigen Neritinenembryonen entdeckt werden können.


Wir hatten schon früher Gelegenheit, die Hauptzüge der Bildung der Gehörkapseln mitzuthemen. Sie zeigen sich rechts und links von der Mittellinie als rundliche, mit dicken Wandungen versehene Blasen, welche mit dem nach aussen gerichteten schon besprochenen Gang versehen sind. Die Kapselmembran erscheint strukturlos und erreicht namentlich an der nach aussen gewendeten Seite eine beträchtliche Dicke. Leydig¹⁾ bemerkt dagegen bei *Paludina vivipara*, dass die Wände vieler Ohrblasen sich nach einer Seite hin, und zwar immer gegen die Seite zu verdünnen, wo später der Hörnerv ansitzt. Bei Neritinenembryonen ist ganz bestimmt der Wandtheil verdickt, welcher den Ursprung des hohlen Stieles umgiebt, und nicht verdünnt. Beim ausgewachsenen Thiere aber verschwindet diese Verdickung vollständig. Der einzige blasse, in der flimmernden Höhle enthaltene Otolith zeigt wie schon angedeutet, bei Anwendung von Essigsäure kein Aufbrausen, sondern quillt nur auf und zerfliesst beim Druck. Selbst bei ziemlich grossen, schon seit langer Zeit aus den Eierkapseln ausgeschlüpfen Neritinen, ist dieser einzige Otolith in jeder Ohrblase vorhanden. Allein später bilden sich die schon früher erwähnten kleinen Steinchen, während der embryonale Otolith verschwindet. Die kleinen Steinchen erscheinen aber niemals vor dem Ausschlüpfen.

Erwähnenswerth möchte noch die Thatsache sein, dass wir einmal eine Missbildung trafen, wo drei Gehörkapseln vorhanden waren. Die linke Seite nämlich besass zwei otolithführende Bläschen, deren jede mit einem besonderen, nach aussen gerichteten Gang versehen war. Die zitternde Bewegung war in allen dreien die nämliche.

Was das Auge betrifft, so scheint die Zeit seines Auftretens bei den Mollusken nicht immer dieselbe zu sein. Bei

1) A. a. O. p. 139.

den Actaeonlarven, so lange Vogt ¹⁾ dieselben beobachtete, fehlten sie durchweg. Bei Paludinenembryonen erscheint das Auge nach Leydig ²⁾ unmittelbar nach dem Ohre, sobald nämlich die Fühler aus der Fläche des Velums hervorkommen. Bei *Buccinum* und *Purpura* ³⁾ zeigen sie sich gleichzeitig mit den Gehörblasen und den Speicheldrüsen. Bei Neritinenembryonen treten ebenfalls die Seh- und Hörorgane ziemlich zu derselben Zeit auf: bald erscheinen die einen früher bald die anderen. Sonderbarer Weise trifft man nicht so ganz selten einäugige Individuen, bei denen das eine Auge schon eine ziemliche Grösse erreicht hat und kohlschwarz pigmentirt ist, während noch nicht einmal die erste Spur des andern vorhanden ist. Kurz vor dem Erscheinen des Auges keimt eine warzenförmige Erhabenheit aus der trichterförmigen Conca- vität jedes Segellappens hervor, welche die erste Anlage sowohl des Fühlers, wie des augenführenden Fortsatzes ist. Das Auge ist anfangs — übereinstimmend mit den Angaben anderer Beobachter bei verschiedenen Cephalophoren — eine einfache, mit einer hellen Flüssigkeit erfüllte und mit dicken Wänden versehene Blase. In derselben lagert sich schwar- zes Pigment ab (Fig. 52), welches eine mehr oder weniger



Ohrpaar vor dem ersten aus. Derselbe hat ebenfalls eine Linse sehr früh bei *Limax* ¹⁾ und Leydig bei *Paludina* angetroffen. — Koren und Daniellassen ²⁾ führen eine höchst merkwürdige Beobachtung bei *Buccinum*larven an, in deren Auge sie keine Linse vorfanden. Die Augenblasenwand nämlich soll bei denselben auf der Innenfläche mit feinen Wimpern versehen sein, wodurch die lichtgelben Pigmentkörner in Bewegung versetzt werden. Bei *Purpura* wurden diese Wimpern vermisst. Man dürfte an eine blosse Brown'sche Bewegungserscheinung denken, wenn nicht die Wimpern selbst von den Beobachtern gesehen worden wären. Bei *Neritina* ist jedenfalls nichts Ähnliches vorhanden. Daraus sieht man wie die Bildung eines Organes bei ähnlichen Gruppen eine äusserst verschiedene sein kann.

Die warzenförmige Erhabenheit, in deren Substanz das Auge eingebettet liegt, nimmt mehr und mehr die Gestalt eines abgestutzten Kegels an, indem sie breiter wird. Allmählig nimmt sie an Durchmesser in der Richtung von innen und oben nach aussen und unten zu: die Augenblase bleibt an dem nach aussen gerichteten Ende der auf diese Weise verlängerten Erhabenheit und letztere zerfällt dann durch eine mittlere Einkerbung in zwei Hügelchen, von denen das äussere zum Ommatophoren, das innere zum Fühler heranwächst (Fig. 43). Die Augenblase eines Embryos, bei welchen die Sonderung der Anlagen des Fühlers und des Ommatophorons eben vor sich gegangen war, besass einen Durchmesser von 0,040 Mm. Der Fühler nimmt viel rascher als das Ommatophor an Länge zu, so dass er dasselbe bald überragt und sich beim auskriechenden Embryo als deutlicher Fühler zu erkennen giebt. Die Fühlerborsten wurden niemals bei Embryonen beobachtet.


Ueber die Bildung des Nervensystems konnten wir nichts ermitteln. Sars, Lovén, Vogt u. A. m. waren bei den von ihnen beobachteten Schneckenlarven nicht glücklicher. Daraus dürfte man jedoch nicht schliessen, dass das centrale

1) Zur Entwicklungsgeschichte der Landgasteropoden. a. a. O. p. 385.

2) Bidrag p. 12.

Nervensystem erst spät auftritt, denn die Schneckenlarven sind meistens der Undurchsichtigkeit wegen zur Beobachtung sehr ungünstig und das eben sich bildende Nervensystem dürfte sich also sehr leicht dem forschenden Auge entziehen. Deshalb glauben wir kein zu grosses Gewicht auf die Beobachtungen von Leydig, Koren und Danielssen u. A. legen zu müssen, die bei verschiedenen Schnecken erst in den letzten Entwicklungsstadien das Gehirn auftreten sahen. Schmidt¹⁾ und Gegenbaur²⁾ sahen übrigens bei *Limax* das Nervensystem schon sehr bald nach dem Ohrerscheinen, und Quatrefages will selbst bei gewissen Pulmonaten die Hirnganglien vor allen anderen Organen haben auftreten sehen³⁾.

Wie das Nervensystem, so wurde auch das Herz lange vermisst. Bei keinem Embryo gelang es, dasselbe aufzufinden. Hier kann kaum von der Undurchsichtigkeit als von einem hindernden Umstand gesprochen werden, weil sich das Herz sehr leicht durch die Pulsationen kund giebt, selbst wenn man seine Gestalt nicht unterscheiden sollte. Uebrigens stimmen alle Beobachtungen darin überein, dass das Herz bei den Gasteropoden und den Lamellibranchiern erst sehr spät auftritt. Es wurde dasselbe von Sars bei Nudibranchierlarven



und schon früher von Grant beobachtet, und Lovén¹⁾ will in seinen Untersuchungen über *Lacuna*, *Cerithium*, *Eulima*, *Bullaea*, *Bulla* das Herz gleichzeitig mit den Augen haben erscheinen sehen. Aber man muss dabei nicht vergessen, dass bei den letztgenannten Schnecken die Augen sich erst viel später als bei *Neritina* zeigen, nämlich erst zur Zeit, wo das Velum nahe am Verschwinden ist, und wenn Stiebel²⁾ das Herz bei *Limnaeus stagnalis* schon am fünfzehnten Tage³⁾, vor der Bildung der Schale pulsiren sah, so ist auch dabei zu bemerken, dass letztere sich bei der Teichhornschnecke viel später als sonst, nämlich lange nach den Eingeweiden bilden soll. Sonst geben alle Schriftsteller an, das Herz erscheine erst sehr spät. Nordmann⁴⁾ sah dasselbe erst bei einer freien Larve von *Tergipes* pulsiren, welche schon mit einer

schreiben, habe gewiss nicht diese Bedeutung; das wirkliche Herz bilde sich erst etwas später als diese Blase und sei tiefer in der Mantelhöhle gelegen; man könne sogar unter günstigen Verhältnissen beide Organe synchronisch pulsiren sehen. — Dabei erlauben wir uns zu bemerken, dass diese Angabe Carpenter's uns sehr wahrscheinlich dünkt, da die Existenz einer solchen contractilen Blase bei Ctenobranchierembryonen kein ganz neues Faktum ist. Es gebührt die Ehre der ersten Entdeckung derselben — und zwar bei *Buccinum undatum* — gerade Koren und Danielssen selber (Bidrag til Pectinibranchierens Udviklingshistorie, p. 17. Fig. 16 und 20), welche sie schon als contractile Blase (contractile Blaere) bezeichneten. Diese Blase hat muskulöse Wandungen und geht in einen Kanal über, der in der undurchsichtigen Dottermasse verschwindet. Die skandinavischen Naturforscher halten sie — ob mit Recht? — für die Niere. Da dieses Organ muskulös ist, so dürfte man es besser mit den contractilen Schwanz- und Nackenblasen vergleichen, die Van Beneden und Windischmann, O. Schmidt und Gegenbaur bei Pulmonatenembryonen beschrieben haben.

1) Bidrag till Kännedom af Molluskernas utveckling. Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Stockholm 1839. p. 237.


2) Ueber die Entwicklung der Teichhornschnecke. Meckel's deutsches Archiv für Physiologie. 1816. p. 557,

3) Carus soll sogar das Herz am 8. Tage bei *Limax* wahrgenommen haben. — Von den äusseren Lebensbedingungen der heiss- und kaltblütigen Thiere. Leipzig 1824.

4) A. a. O. p. 99.

Zange ausgerüstet war und bei einem andern *Tergipes* (*T. lacinulatus*) soll die Bildung des Herzens nach Max Schultze's¹⁾ Angaben, vier Wochen nach dem Auskriechen noch nicht angefangen haben. Erst bei einer schon etwa 1,5 Mm. grossen, also seit einiger Zeit ausgeschlüpften *Neritina* wurde das pulsirende Herz durch die Schale selbst wahrgenommen. Bei den meisten so weit entwickelten Individuen war die Schale zu undurchsichtig, als dass eine solche Beobachtung statthaft gewesen wäre und beim Abbrechen der Schale ging immer das Thier zu Grunde. Das Spiel des Herzens war sehr lebhaft und es schien also wahrscheinlich, dass die erste Anlage des Organes schon ziemlich viel früher erschienen sein mochte.

Bei Individuen, welche etwa dieselbe Grösse erreicht haben, wie die eben erwähnten, wurde zum ersten Mal die Kieme auf der linken Seite des Thieres wahrgenommen. Das erste Entwicklungsstadium dieses Organes zu sehen, waren wir nicht glücklich genug, denn die kleinste wahrgenommene Kieme zeigte schon zwei Lamellen jederseits. Diese Kieme besass schon eine lebhafte Contractilität, indem sie sich bald nach vorn, bald nach hinten bog, sich verlängerte und wiederum verkürzte, gerade wie bei den erwachsenen *Neritinen*. — So:



fages¹⁾ bei denselben beobachtete, dass sie erst nach dem Verlauf von 36 bis 48 Stunden nach dem Ausschlüpfen an die Oberfläche des Wassers kamen, um Luft in ihre Lunge aufzunehmen. — Bei den Larven von *Pterotrachaea* und *Atlantis* hat Gegenbaur auch keine Kieme gefunden und wenn die Athmungshöhle bei *Entoconcha mirabilis* verhältnissmässig sehr früh erscheint, so fehlen ihr dennoch die eigentlichen Kiemenblätter vollkommen²⁾.

Zur Zeit, wo die junge *Neritina* ihr freies Leben beginnt, ist noch keine Spur der dem Geschlechtsleben angehörigen Organe vorhanden. Die weitere Entwicklung schreitet noch lange fort bevor die ersten Spuren derselben auftreten. Bei Individuen, die eine Länge von 3 Mm. überschritten haben, erscheint die Nebendrüse des Geschlechtsapparates neben dem After, als ein Haufen gelblicher Substanz. Ueber die weitere Entwicklung des Geschlechtssystems wurde nichts ermittelt.

Zum Schluss wollen wir noch die Hauptmomente der Entwicklungsgeschichte von *Neritina fluviatilis* kurz zusammenfassen.

Die Eier von *Neritina* werden zu einer grossen Anzahl (zu 40 bis 60) in gemeinschaftlichen runden Kapseln gelegt.

Die Eier erleiden alle den Furchungsprozess; sie stehen aber dann mit Ausnahme eines einzigen in ihrer Entwicklung still und zerfallen in verschieden grosse Dotterklumpen.

Der einzige sich entwickelnde Embryo tritt in das Larvenleben zu einer Zeit ein, wo er noch fast keine differenzirte Organe besitzt und bildet sich zu einem Wesen heran, dessen Entwicklung die grösste Analogie mit derjenigen vieler Seeschneckenlarven besitzt. Die *Neritina fluviatilis* ist also die einzige bis jetzt bekannte Süsswasserschnecke, welche ein wirkliches Larvenstadium durchmacht. Dadurch wird also Lovéns Vermuthung widerlegt, dass *Neritina* sowohl wie die anderen Süsswasserformen keine Larve besitzen soll³⁾.

1) A. a. O. p. 113.


2) Joh. Müller; Ueber *Synapta digitata* und die Erzeugung von Schnecken in Holothurien, 1852 p. 20.

3) Bidrag till Kännedom om Utvecklingen af Mollusca lamelli-branchiata. p. 98.

Das Larvenleben beschränkt sich auf die Zeit, wo das Thier in der Eierkapsel weilt, d. h. die provisorischen Organe (die Segellappen), womit die Larve ausgerüstet ist, verschwinden noch bevor die Kapsel aufspringt.

Der junge Embryo oder vielmehr die Larve nimmt an Grösse zu, indem sie die Schwestereier verzehrt und assimiliert, so dass sie gegen das Ende des Larvenlebens den ganzen Raum der Eierkapsel ausfüllt. Dieser Umstand macht zur unumgänglichen Bedingung der Entwicklung, dass der Nahrungskanal sehr früh und zwar gleichzeitig mit dem Segel und dem Fuss auftritt.

Das Embryonal- und Larvenleben kann zur bequemeren Uebersicht in vier Stadien eingetheilt werden. 1. Im ersten Stadium stellt der Embryo eine rotirende, ringsum bewimperte Kugel dar. Er schlüpft wahrscheinlich in dieser Gestalt aus dem Ei heraus. – 2. Das zweite Stadium erstreckt sich bis zur Bildung der Schale. Die Sonderung eines Kopf- und Abdominaltheiles, die Bildung des Segels, des Fusses und des Speisekanales mit der Leber sind die Hauptmomente dieses Zeitraumes. – 3. Das dritte Stadium führt bis zur Entwicklung der Sinnesorgane und wird durch die Bildung einer an-



stattfinden möchte. In den letzten vierzehn Tagen des Juli's fand man schon nicht selten die jungen, eben ausgeschlüpfen auf Tichogonien herumkriechenden Neritinen. Ueber die Dauer der ganzen Entwicklung sowohl, wie der einzelnen Stadien, liess sich nichts ermitteln. Wir konnten nicht einmal die Kapseln isoliren, die gleichzeitig gelegt wurden, da sie nur vereinzelt und nicht zu Schnüren vereinigt vorkommen. Jedenfalls erfordert die ganze Entwicklung einen ziemlich langen Zeitraum, da wir unter mehreren, drei Wochen lang aufbewahrten Kapseln einige fanden, deren Eier die Furchung zwar durchgemacht hatten, aber noch keinen Embryo enthielten, und nach Verlauf eines ganzen Monats wurden noch die ersten Stadien der Entwicklung gefunden. Dies stimmt mit den Angaben verschiedener Schriftsteller über andere Mollusken überein. So z. B. erwähnt Sars¹⁾ von den Embryonen der *Tritonia Ascanii*, dass sie erst am 31—36. Tage so weit herangewachsen und so gross geworden sind, dass sie nur mit Mühe im Ei Platz finden. Bei *Doris muricata* trat derselbe Zustand ebenfalls erst gegen den 36. Tag ein. Koren und Danielssen sahen erst am 11. April das Segel bei *Buccinum*-embryonen²⁾ auftreten, die sie schon am 6. März bekommen hatten, und vor dem Ende der neunten oder zehnten Woche verliessen die *Purpura*-embryonen³⁾ die Eierskapsel nicht. Eine noch längere Zeit möchte wohl durch die Entwicklung der Neritinen in Anspruch genommen werden. Das Stadium der Furchung allein muss ein sehr rasch vorübergehendes sein, da wir viele vollkommen gefurchte, aber niemals angefurchte, auch nicht in der Furchung begriffene Eier in den Kapseln fanden.

Beim Ende dieses Aufsatzes angelangt, fühlen wir uns gedrungen, unserm hochverehrten Lehrer, Prof. Joh. Müller, der uns immer mit seinem Rath und sonstigen Hülfsmitteln beistand, unsern innigsten Dank hiermit auszusprechen.


1) Entwicklungsgeschichte der Mollusken und Zoophyten. — Archiv für Naturgeschichte. 1845.

2) Bidrag etc. p. 7.

3) Ibid. p. 31.

Nachschrift.

Vorliegender Aufsatz war schon im Druck begriffen, als wir die eben erschienene zweite Lieferung der *Fauna littoralis Norwegiae* zu Gesicht bekamen. Es ist in derselben eine Angabe von Koren und Danielssen zu finden, wonach Lindström beobachtet haben soll, dass *Neritina fluviatilis* sich gerade auf dieselbe Weise entwickelt, wie *Purpura* und *Buccinum* nach den Untersuchungen Koren und Danielssen's selbst sich entwickeln sollte. Es ist uns sehr angenehm, dass wir die uns bis jetzt unbekannt gebliebene Notiz von Lindström ¹⁾ dadurch kennen lernten; nachdem wir aber dieselbe durchgelesen haben, können wir nicht umhin zu denken, dass die geehrten norwegischen Forscher etwas zu sanguinisch zu Werke gegangen sind, wenn sie in Lindström's Angabe eine Bestätigung ihrer eigenen Untersuchungen wollen gefunden haben. Es wird zwar vom schwedischen Verfasser gesagt, er hätte manche Vorgänge bei *Neritina* beobachtet, die auf eine gewisse Verwandtschaft mit der Entwicklung von *Buccinum* und *Purpura* wohl



vielmehr, da er neben dem Embryo Ueberreste der gefurchten Eier stets vorfand, wirft er die Frage auf, ob nicht vielleicht diese Eier dem Embryo als Nahrung dienen (Tjena de möjliga till föda åt embryo?). Lindström's Vermuthung wird also durch unsere Beobachtungen vollständig bestätigt und an eine Bekräftigung der Ansicht Koren und Danielsen's ist hierbei nicht zu denken. — Nachträglich wollen wir noch bemerken, dass Lindström schon beobachtete, dass die Neritinenembryonen mit einem Segel ausgestattet sind, und dass die Eierschalen in der Ostsee sowohl auf Algen und Steinen, wie auf *Mytilus* und andern Schalthieren vorkommen.

Wir wollen diese Gelegenheit benutzen, um noch Einiges über eine Abhandlung von Dr. Carl Semper¹⁾ zu bemerken, die erst, als unser Aufsatz bereits im Druck war, erschienen ist. In dieser sonst so inhaltreichen Abhandlung bespricht der Verfasser den Bau des Schlundes und der Zunge bei den Pulmonaten und kommt dabei zu Resultaten, womit wir nicht einverstanden sein können. Nachdem Troschel die von ihm früher irrthümlich wegen Mangel an mikroskopischer Untersuchung als Muskeln (s. g. trogähnlicher Muskel) bezeichneten Zungenknorpel neulich ganz richtig für Knorpel erklärt hat, indem er die frühere irrige Ansicht zurücknahm, so verfällt wiederum Semper in den alten Irrthum, und erklärt die Zungenknorpel für wirkliche Muskeln²⁾. Er giebt an, Lebert hätte bereits den Zungenapparat beschrieben, doch seien sowohl seine Beschreibung wie seine Abbildung so wenig naturgetreu, dass eine neue Darstellung noch gerechtfertigt erscheinen dürfte. Nichtsdestoweniger möchten wir den Lebert'schen Abbildungen und Beschrei-

1) Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Pulmonaten, von Carl Semper, Dr. phil. aus Altona. Zeitschrift für wiss. Zoologie. Novemberheft 1856.

2) Neuerdings hat wiederum Lacaze-Duthiers die Zungenknorpel und zwar bei *Dentalium entalis* richtig erkannt und deren Bau mit Pflanzenzellen verglichen. — Comptes-rendus de l'Acad. des Sciences; Séance du 19. Janv. 1857.

bung eine viel grössere Genauigkeit vindiciren, als Semper geneigt ist und wir möchten sogar behaupten, dass Lebert's Darstellung uns naturgetreuer dünkt, als selbst die Semper'sche. Die von Lebert beschriebenen wahren Knorpelzellen sollen nach Semper nichts Anderes sein, als Querschnitte von Muskelfasern, deren körnige Achsenstränge ihm auf dem Querschnitt als Kerne dieser Zellen erschienen sind. Diess wäre in der That ein grober Missgriff, allein die Knorpelzellen sind wirklich da, und wenn Lebert selbst seine Beobachtung später zurückgenommen haben sollte, wie Semper angiebt, so würde es uns für Lebert Leid thun.¹⁾ Wenn Jemand die Zungenknorpel, sei es von *Neritina*, oder von *Cyclostoma*, *Pomatias*, *Buccinum*, *Patella*, *Chiton* u. s. w. einmal gesehen hat, dann kann er nicht begreifen, dass ein Streit über diesen Gegenstand entstehen kann. Semper's Irrthum rührt einfach davon her, dass derselbe sich auf die Untersuchung der Pulmonaten beschränkte und weder die Otenobranchier, noch andere Schneckenordnungen in den Kreis seiner Beobachtungen hineinzog. Wie wir nun schon andeuteten, eignen sich die Zungenknorpel der Pulmonaten viel weniger zur Untersuchung, als diejenigen vieler anderen

Blick in die histologische Natur der Zungenknorpel bei den Pulmonaten zu thun. Selbst einige Pulmonaten, wie z. B. *Vitrina pellucida* und sogar einige Helixarten, wie *Helix carthusianella*, lassen über die Knorpelnatur des fraglichen Organes keinen Zweifel zu. Was Semper die beiden seitlichen (Zungen-) Muskeln nennt, sind also die beiden Schenkel der rinnenartigen Knorpelplatte der Pulmonaten. Wie er sie aus einer Schicht senkrecht stehender Muskelfasern bestehen lässt, bleibt uns unbegreiflich. Er bemerkt zwar, dass bei den Wasserschnecken das Gewebe weniger dicht sei, indem sich hier häufig Binde-substanzzellen in der Substanz des Organes eingelagert finden sollen. Diese s. g. Binde-substanzzellen sind wahrscheinlich gerade die Knorpelzellen und man braucht nur *Cyclostoma elegans* zu untersuchen, um sich gleich zu überzeugen, dass die drei von Dr. Semper beschriebenen Formen des s. g. Bindegewebes bei dieser Schnecke reichlich vorhanden sind, dass aber die Zungenknorpel aus einem ganz anderen Gewebe, nämlich dem von uns geschilderten Knorpelgewebe bestehen. Eine Zellenvermehrung nach demselben Schema wie in den Zungenknorpeln, findet in dem s. g. Bindegewebe niemals statt. — Der dritte von Semper beschriebene (Zungen-) Muskel ist jedoch wirklich ein Muskel und zwar der die beiden Schenkel der Knorpelplatte der Pulmonaten verbindende Muskel, dessen wir schon früher Erwähnung thaten.

Die Darstellung des Fressens und der Speisezerkleinerung, wie wir sie den vortrefflichen Beobachtungen Troschel's verdanken, scheint uns noch richtiger als die neue von Semper. In Bezug auf die hintere Papille wollen wir insbesondere bemerken, dass wir nicht für wahrscheinlich halten, dass sie die ihr von Semper zugeschriebene Rolle spielt. Wir haben zwar die hintere Papille der Pulmonaten nicht näher untersucht, sie wird aber wohl ähnlich beschaffen sein und eine ähnliche Function haben, wie bei den Schnecken mit bandförmiger Zunge (wie z. B. *Pomatias*, *Cyclostoma*, *Neritina* u. s. w.), wo sie nicht zum Vorwärtsschieben der Zunge dient, sondern zur Bildung der neuen Plattenreihen. Tro-

sehel hat schon ganz richtig angegeben, dass beim Fressen nur der vordere kleinere Theil der Reibmembran in Betracht kommt, wie das auch nothwendig ist, wenn dieselbe die Länge des Thieres erreicht, wie bei *Pomatias maculatum*, oder noch bedeutend länger ist, wie bei den Patellen. Wo die Papille im hintersten Theile der Leibeshöhle zwischen den Darmwindungen steckt, da kann sie sich nicht bei der Zerkleinerung der Nahrungsmittel betheiligen. Semper's Vorwurf gegen Lebert, er habe die Papille nur oberflächlich erwähnt, dünkt uns etwas ungerecht und wir müssen unsere Ansicht dahin aussprechen, dass unter allen bisherigen Beobachtungen über die hintere Zungenpapille, die Semper'schen mitgerechnet, die Angaben von Lebert noch immer die naturgetreuesten sind. Lebert hatte wenigstens das Verhältniss der Papille zur Zungenscheide sehr richtig aufgefasst, während Semper dasselbe ganz übersehen zu haben scheint.

Ebenfalls während dieser Aufsatz gedruckt wurde, erschien eine Abhandlung von Adolf Schmidt¹⁾ über das Gehörorgan der Mollusken, wo der Verfasser denselben Gang an der Gehörkapsel von *Helix vermiculata*, *Limax variegatus* und *Physa fontinalis* beschreibt, den wir bei *Neritina* erwähn-

geführt, dass die Flimmercilien, selbst da, wo sie unzweifelhaft vorhanden sind, das Zittern der Otolithen nicht bewirken. Vielmehr meint er, dass letztere Körperchen, „welche einer so specifischen Lebensthätigkeit (Aufnahme von Schallwellen?) dienen,“ unter dem Einfluss „einer unsichtbaren Kraft des Organismus“ stehen müssen! Es ist wie ein Nachklang aus der schönsten Zeit der Naturphilosophie! — Erwähnenswerth ist auch, dass mehrere Ohrsteine, die Schmidt in Glycerin gelegt und in der warmen Stube aufbewahrt, sich aufgelöst haben. Der Verfasser versucht diese auffallende Erscheinung dadurch zu erklären, dass sich vielleicht eine Säure in dem Glycerin gebildet habe. Es möchte indessen noch wahrscheinlicher erscheinen, dass die betreffenden Otolithen, wie diejenigen von *Neritina*, nicht aus Kalk, sondern vielleicht aus einer fettähnlichen Substanz bestanden.

Zum Schluss wollen wir noch hinzusetzen, dass es uns neuerdings durch die Freigebigkeit des Direktors des Berliner zoologischen Museums, Herrn Geheimerath Lichtenstein, möglich wurde, eine ganze Anzahl Neriten aus den aussereuropäischen Meeren zu untersuchen. Es hat sich dabei herausgestellt, dass das Nervensystem der Neriten nicht so einfach gestaltet ist, wie Quoy und Gaimard behaupten, sondern mit demjenigen der Neritinen vollkommen übereinstimmt. Dieselbe Uebereinstimmung besteht in Betreff der Gehörkapseln und der Otolithen. Der Deckel zerfällt bei den Neriten, gleichwie bei den Neritinen, in zwei Schichten, deren äussere strukturlos und braun gefärbt ist, während die innere einen faserigen Bau besitzt und mit Kalk inkrustirt ist. Jene Schicht besteht nicht, wie man leicht glauben dürfte, aus Chitin, denn sie löst sich in caustischem Kali auf. — Dagegen weicht allerdings der Bau der weiblichen Geschlechtsorgane bei den Neriten von *Neritina* bedeutend ab und Quoy und Gaimard's Darstellung scheint in dieser Beziehung ziemlich genau zu sein. Einwärts von der Geschlechtsöffnung befindet sich links vom Darne und theilweise auch auf der Rückenseite desselben eine geräumige

Tasche, die zweifelsohne mit der Tasche zusammenfällt, welche von Quoy und Gaimard voll „kreideartige Eier“ gefunden wurde. Dieselbe enthält aber bei den untersuchten Neriten keine Eier, sondern grosse, feste, aus concentrischen Schichten bestehende Concremente. Beim ersten Anblick hielten wir dieselben entweder für Harnsäure, oder auch vielleicht für kleesauern Kalk, weil wir neuerdings ein Organ bei *Cyclostoma elegans* ausfindig machten, welches ganz ähnlich aussehende, aus oxalsauern Kalke bestehende Concremente enthält. Bei der näheren Untersuchung zeigte sich jedoch, dass jene Körper aus kohlenauern Kalke bestehen. Es zerfallen dieselben bei Anwendung von Druck in conische Nadeln, die nach dem Mittelpunkte zu convergiren. Sie stellen bei der *Nerita peloronta* Lin. aus St. Croix (Westindien) kreideweisse, regelmässig kuglige oder eiförmige Körper dar, deren Durchmesser bis 0,08 oder gar 0,12 Mm. beträgt. Bei der *Nerita atrata* Chemnitz aus Van Diemensinsel sind die Concremente ebenfalls kreideweiss und kuglig. Die grössten sind etwa 0,05 Mm. breit, aber es kommen noch mehr solche vor, die nur 0,01 bis 0,03 Mm. gross sind. —

Wir konnten auch eine ziemlich grosse Anzahl von *Nerita*



stimmtheit zu erkennen, ob die Tasche in den untern Theil der Vagina oder direct nach aussen mündet. Es erscheint nicht ganz unwahrscheinlich, dass die von Quoy und Gaimard erwähnten „kreideartigen Eier“ solche Concremente gewesen sind. Die Bedeutung des Organes ist höchst räthselhaft. Es ist kein Ersatz für die Nebendrüse des Geschlechtsapparates, denn diese ist ausserdem vorhanden. Eine ähnliche Abscheidung von Kalkconcrementen kommt sonst, so weit uns bekannt, bei anderen Mollusken nicht vor. Die Bezeichnung „Kalksäckchen“ oder „Kalkbeutel“ die Swammerdam für die Niere der Pulmonaten gebraucht, könnte hier richtiger angewendet werden. — Es wäre nicht undenkbar, dass zur Brunstzeit kalkhaltige Eierkapseln in der Tasche gebildet werden, während sonst der unverbrauchte Kalk unter der Gestalt von concentrisch geschichteten Concrementen abgeschieden werde. Jedenfalls bleibt diese Beobachtung höchst interessant, insofern als sie eine anatomische Unterscheidung der Gattungen *Nerita* und *Neritina* fortan gestatten wird.

Bei einer Trochusart (*T. turbinatus* Born.) aus dem Mittelmeer, die wir vergleichungshalber untersuchten, fand sich kein Kalkbeutel vor.

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1. Pigmentzellen aus dem Mantel.

Fig. 2. Längsschliff des Deckels: a. äussere, b. innere Schicht.

Fig. 3. Die faserige Schicht des Deckels mit Säuren behandelt.

Fig. 4. Oberhaut der Schale.

Fig. 5. Tangentieller Schalenschliff, mit Gängen des bohrenden Parasiten.

Fig. 6. Senkrechter Schliff mit eben solchen Gängen. A. äussere, B. innere Schicht.

Fig. 7. Schlundring. a. Obere Schlundganglien, b. obere Quercommissur, c. Fühlernerv, d. Sehnerv, e. die doppelten seitlichen Schenkel, f. untere vordere Schlundganglien, g. untere hintere Schlundganglien, h. Gehörbläschen.

Fig. 8. Fühler mit Ommatophor. a. Sclerotica (zwei Schichten).

b. Chorioidea, c. Linse, d. unbefimmerte Conjunctiva, f. Fühlernerv,
— Fig. 8. A. Zellen der Chorioidea.

Fig. 9. Gehörbläschen. a. der noch vorhandene embryonale Otolith, b. Kapsel, c. Epithelialschicht.

Fig. 10. Lippenknorpel.

Fig. 11. Zungenapparat, a. vorderes, c. hinteres Zungenknorpelstück, b. Aufsatz des vorderen Zungenknorpelstücks, d. Radula, e. deren Flügel.

Fig. 12. Ausgewachsene Knorpelzellen aus den Zungenknorpeln von *Neritina fluviatilis*.

Fig. 13. In der Proliferation begriffene Knorpelzellen von *Neritina fluviatilis*.

Fig. 14. Schnitt durch einen Zungenknorpel von *Cyclostoma elegans*.

Fig. 15. Schnitt durch einen in der Proliferation begriffenen Knorpel von *Cyclostoma elegans*.

Diese beiden Zeichnungen wurden mit Hilfe der Camera lucida skizzirt.

Fig. 16. Knorpelzellen aus der Zungenknorpelplatte von *Vitrina pellucida*.

Fig. 17. Durchschnitt der Zungenknorpelplatte von *Helix carthusianella* mit in der Proliferation begriffenen Knorpelkörperchen.

Fig. 18. Zungenknorpelapparat von *Patella vulgata*. a. hinteres, b. vorderes Hauptknorpelstück, c. der ein selbstständiges Knorpelstück vorstellende Aufsatz, d. vorderes seitliches Stück (Osler's lateral jaw).

Fig. 19. Zungenknorpelapparat von *Pomatias maculatum* a. Vor-

Fig. 29 A. Inhalt der männlichen Nebendrüse. a. gewöhnliche Drüsenzelle, b. Drüsensekret bei 400maliger Vergrößerung, c. die selteneren mit einem grossen Kern versehenen Drüsenzellen.

Fig. 30. Weiblicher Geschlechtsapparat. a. weibliche Nebendrüse, b. Eileiter, c. Samentasche, d. Scheide, e. Scheidenöffnung, f. kugelige Anschwellung der Gebärmutter, g. Darm, h. After. A. Drüsenzelle aus der weiblichen Nebendrüse.

Fig. 31. Die weibliche Samentasche, stärker vergrössert. a. Stiel der Samentasche, b. der sich in die Nebendrüsensenkende Gang.

Fig. 32. Inhalt des Hodens. a. Epithelzellen der Drüsenfollikel, b. Mutterzellen der Entwicklungszellen der Zoospermien, c—f. Entwicklungszellen der Zoospermien in verschiedenen Entwicklungsstadien, g—h. der aus der Zelle auskriechende Samenfaden.

Fig. 33. Ein Eierstockfollikel.

Fig. 34. a. reifes Eierstocksei, b. isolirtes Keimbläschen.

Fig. 35. Ein Stück des unteren Segmentes der Eierkapsel.

Fig. 36. Gestreifter Rand eines Kapselsegmentes.

Fig. 37. Gefurchtes Ei aus einer Eierkapsel.

Fig. 38. Ein in dem Ei rotirender Embryo.

Fig. 39—45. Verschiedene Entwicklungsstadien der Larve. Die Bezeichnungen sind für alle Figuren dieselben. a. Segel, b. Mund, c. Speiseröhre, d. Fuss, e. gemeinschaftliche Anlage des Magens und der Leber, e' Magen, e'' Leber, f. Leibeshöhle mit den Anheftungsträngen der Eingeweide, g. Auge, h. der zum Fühler werdende Höcker, i. Gehörbläschen, k. Schale, l. Mantelrand, l' Pigmentstreif an demselben, m. Mantelhöhle, n. Deckel, o. Pigmentmaschen des Mantels, p. die beiden Brustlappen, q. Zungenknorpel, r. Radula, y. in die Mantelhöhle zufällig hineingekommene Dotterkugeln.

Fig. 39—40. Zwei noch schalenlose Embryonen.

Fig. 40 A. Eine der Dotterkugelgruppen, die vom Embryo aufgefressen werden; a. die dünne, farblose Schicht, worin die Dotterkörnchenstrassen ihren Sitz haben.

Fig. 41. Eine noch napfförmige Embryonalschale.

Fig. 42. Ein weiter fortgeschrittener die Brustlappen zeigender Embryo.

Fig. 43. Ein Embryo mit Deckel und eintretender Sonderung von Fühler und Ommatophor.

Fig. 44. Ein Embryo im Stadium, wo die Rückbildung des Segels anfängt; der Mantel hat sich zufällig von der Schale abgelöst.

Fig. 45. Weitere Rückbildung des Segels, Auftreten des Zungenapparates.

Fig. 46. Embryonale Leibes- und Mantelparechynzellen.

Fig. 47. Embryonaler Zungenapparat. a. vorderes, b. hinteres Zun-

genknorpelstück, c. Radula. A. Die embryonalen Knorpelzellen stark vergrößert.

Fig. 48. Embryonale Muskelfasern aus dem Segel.

Fig. 49. Der embryonale Processus des Deckels.

Fig. 50. Gehörbläschen eines Embryos.

Fig. 51. Stark vergrößertes Embryonalgehörbläschen, um das Epithel zu zeigen. Der Otolith schimmert durch.

Fig. 52. Embryonales Auge. a. Das aus embryonalen Parenchymzellen bestehende Ommatophor, b. Augenblase. c. Fühler.

Fig. 53. Stück des Segels; a. Zellen des verdickten Segelrandes; b. die Zellen, womit die Segelmembran ausgekleidet ist.

Fig. 54. Stück der Embryonalschale stark vergrößert.

Ueber die Fische, welche Töne von sich geben und die Entstehung dieser Töne

von

JOH. MÜLLER.

(Nach einem in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin am
10. Januar 1856 gehaltenen Vortrag.)

Dass es Fische giebt, die Töne ausstossen, kann man an manchen Meeresküsten von den Fischern erfahren, welche diese Fische bezeichnen. Die Namen einiger Fische bei den Alten und Neuern, *κόκκυξ*, Knurrhahn, Grondin, Drumfish, Roncador weisen auch deutlich genug darauf hin. Wir dürfen uns daher nicht wundern, wenn diese Nachrichten frühzeitig aufgezeichnet worden sind. So alt aber diese Kunde ist, so beruht doch fast alles, was wir bisher darüber erfahren haben, auf Aussagen der Fischer und Schiffer.

Nur sehr selten ist ein Naturforscher in die Lage gekommen, selbst eine Beobachtung hierüber anzustellen. Daher ist man noch gänzlich über die Ursache dieser Töne im Dunkel geblieben. Ich habe diesen Gegenstand seit langer Zeit mit Aufmerksamkeit verfolgt, und da ich selbst in den Fall gekommen bin, an drei Gattungen von Fischen, nämlich an *Dactylopterus*, *Trigla* und *Cobitis* das Tönen zu beobachten, so habe ich mich entschlossen, die Nachrichten zusammen zu stellen und in wissenschaftlicher Form zu weiterer Anregung des Gegenstandes zu übergeben. Ich werde zuerst die Berichte der Alten aus der Zeit vor der systematischen

Kenntniss der Fische mittheilen und die *pisces vocales* des Alterthums, so gut es geht, zu bestimmen suchen; sodann werde ich ein systematisches Verzeichniss der bis jetzt bekannten *pisces vocales*, mit Angabe der Quellen folgen lassen und zuletzt mit den Beobachtungen über das Tönen der Fische und seine Ursachen schliessen.

I. Berichte aus dem Alterthum über *pisces vocales*.

Aristoteles berichtet in der Thiergeschichte ¹⁾ 4. 9. von 6 Fischen, welche diese Eigenschaft haben. Es sind *λύρα*, *χρόμις*, *κόκκυξ*, *κάπρος*, *χαλκεύς* und *χειδών*. Die ganze Stelle heisset also:

Auch die Fische sind stumm; denn sie haben weder Lunge noch Luftröhre und Kehlkopf. Doch geben diejenigen einige Töne und Geräusche von sich, von denen man sagt, dass sie Stimme haben, wie *Lyra* und *Chromis*, denn diese stossen eine Art Grunzen aus; auch *Kapros* im Flusse Acheloos; ferner *Chalkeus* und *Kokkyx*; nämlich jener giebt ein Geräusch wie ein Schnurren, dieser aber einen Ton, wie der *Kokkyx* (Kukuk), woher er auch den Namen hat. Alle geben die scheinbare Stimme theils durch das Reiben der Kiemen, denn

Bei zweien von diesen aristotelischen Fischen habe ich Gelegenheit gehabt, die Thatsache zu beobachten; es liegt aber daran, von allen, welche Aristoteles genannt hat, so weit es möglich ist, festzustellen, wer sie sind.

Ich verweile nur einen Augenblick bei dem, was von den Kammuscheln hier und Thiergeschichte 4. 4. 4. und wieder 9. 25. 7. gesagt wird. In der vorletzten Stelle heisset es: Einige behaupten, dass die Kammuscheln fliegen, indem sie auch aus dem Schleppnetz, womit sie gefangen werden, oft herausspringen. Die letzte Stelle sagt: von den Schalthieren und Fusslosen bewegt sich die Kammuschel am meisten und stärksten, indem sie von selbst fliehet.

Die Thatsache ist im Allgemeinen ganz richtig. Die schießende oder springende Bewegung zeichnet die Kammuschel vor andern Bivalven aus und erhebt sie leicht vom Boden. Plinius, nat. hist. 1. 9. 52 sagt: *Saliunt pectines et extra volitant seque et ipsi carinant*. Massarius hat schon einiges Nähere darüber. *Massarii Veneti in nomen Plinii librum castigationes et annotationes*. Basil. 1537. p. 223. Er erklärt sich gegen das Fliegen der Kammuscheln durch die Luft. *Et quoniam sua cuique potest esse sententia, ego non existimo pectines volare posse per aëra. Cum enim callo illo interiore ambae testae adeo connexae sint, ut difficile divelli queant, non possunt ita libere aperiri, ut volare valeant. Quam ob rem volare hoc in casu pro salire celeriter in modum volatus et discurrere de loco ad locum potius interpretarer. Pectines enim tanta velocitate dehiscunt, ut ex vehementi percussione saliant et superjacent ut quasi volare videantur*. Welches ziemlich richtig ist, wenn man verbessert, dass nicht die Dehiscenz der Schalen durch das elastische Schlossband, vielmehr das musculare Schliessen derselben den Impuls giebt. Diese Art des Schwimmens ist dem Schwimmen der Sepien durch Contraction des sackförmigen Mantels und Austreiben des Wassers zu vergleichen.

Olivieri hat in seiner *Zoologia adriatica* Bassano 1792 p.

120 ausführlicher von der Bewegung der Kammuscheln gehandelt und angegeben, dass sie aus einer Tiefe von 100 und mehr Fuss bis zur Oberfläche des Wassers sich erheben können, indem sie beständig das Oeffnen und Schliessen der Schalen wiederholen. Olivi sagt nichts von Tönen, die damit verbunden seien, solche könnten aber wohl von dem Zusammenschlagen der Schalen, wie bei den Castagnetten entstehen.

Chelidon.

Die Stelle von den rauschenden Meerschwalben ist die einzige, wo dieser Fisch von Aristoteles bezeichnet wird. *καὶ αἱ χελιδόνες αἱ θαλάττιαι. ὁμοίως γὰρ καὶ αὗται πείονται μετέωροι οὐχ ἀπτόμεναι τῆς θαλάττης. τὰ γὰρ πτερύγια ἔχουσι πλατέα καὶ μακρά.* Also ein fliegender Fisch mit breiten langen Flossfedern, der beim Fliegen einen Ton hervorbringt. Die folgende Stelle und der Vergleich mit den fliegenden Vögeln soll dann die Erklärung des Tons geben, den Aristoteles von der Bewegung der Flossen in der Luft ableitet. Im Mittelmeer giebt es zwei fliegende Fische, einen Stachelflosser aus der Familie der Panzerbacken *Cataphracti*

σπερδος, *χελιδών* und *σπάρον* als Fische mit Stacheln aufgeführt sind.

Einen entscheidenden Beweis für die Erklärung der Chelidon als *Dactylopterus volitans* würde man erst erlangen, wenn man beweisen könnte, dass dieser *Dactylopterus* überhaupt Töne hervorbringt, wie es Aristoteles von Chelidon aussagt. Und diese Thatsache haben wir im Jahre 1853 aus Sicilien mitgebracht, worüber im dritten Abschnitt zu berichten ist.

Kokkyx.

Vom Kokkyx wissen wir durch Numenius, dass er roth ist. Gyllius sagt, dass ihn die Marseiller Galline, die Neapolitaner Coechum, die Sicilianer Cochum nennen. Das ist eine *Trigla* L., deren Arten überall als knurrende Fische, Knurrhähne bekannt sind. Eine weitere Bestimmung einer der rothen Triglaarten auf den Kokkyx, wie sie Rondelet und Salviani versucht haben, ist aufzugeben. Gyllius erzählt, er habe die Fischer gefragt, ob der vorgenannte Fisch einen Ton habe und sie hätten geantwortet, wenn er sich im Netz gefangen fühle, so gebe er eine Art Ton von sich, weiter hätten sie nichts beobachtet. Ferner berichtet Duhamel traité des pêches II. sect. V. Cap. 4. p. 106 von dem Grunzen der Triglen, auch nach den Aussagen der Fischer, die nicht übereinstimmen, da diese Fische nach den einen schon unter dem Wasser, nach den andern nur an der Luft grunzen sollen.

Lyra.

Die Lyra des Aristoteles ist ganz unbestimmbar, da Aristoteles nichts weiter über diesen Fisch hat. Belon war der erste, der den Namen Lyra auf den Malarmat unter den Trigliden (*Peristedion malarmat*) anwandte. l'hist. nat. des estranges poissons marins. Paris 1551. p. 19. Rondelet hat eine *Trigla* so genannt wegen des Tönens und der getheilten Schnauze, die an die Hörner der antiken Lyra er-

innere. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass die Lyra unter den Triglen versteckt ist.

Bei Aelian 10. 11. grunzt die Saura, wird aber mit Chromis, Kapros, Chalkis und Kokkys genannt und die Saura steht offenbar an der Stelle der Lyra.

Chalkus.

Man muss mit Schneider und einigen älteren *χαλκός* welches Schmied bedeutet, nicht *χαλκίς* lesen, welcher letztere Name sich auf einen Flussfisch bezieht, während *χαλκίς* ein Seefisch ist. Vergl. Arist. Thiergeschichte 5. 9. 1. und 6. 13. 1., wo von beiden ganz verschiedenes in Beziehung auf die Zeugung angegeben ist. Auch ist schon im Athenaeus 7. 24. bemerkt, dass *χαλκίς* und *χαλκίς* verschieden seien. Es ist allein des Gyllius Verdienst, welches sich Rondelet und Salviani zu Nutz gemacht, ohne ihn hierbei zu nennen, dass er diesen Fisch mit Wahrscheinlichkeit aus den Namen bestimmt hat, welche er bei verschiedenen Nationen führt und das ist in diesem Fall ohne alle Abbildungen möglich gewesen. Gyllius hat nämlich den Chalkus der Griechen in dem so bestimmt gezeichneten Fisch erkannt, den man in

er bei den Liguriern Rota, zu Marseille Truëie¹⁾, in Spanien Gall heiße. Truëie d. i. Schwein, sagt Gyllius, heiße er, weil er, wenn er gefangen werde, nach dem Zeugnisse der Marseiller grunze. Derselbe Fisch wurde nach Gyllius Zeugnisse von den Dalmatiern Faber genannt. Als er sie fragte, warum sie ihn so nennen, antworteten sie, deswegen, weil er alle Schmiedewerkzeuge an sich trage; das habe er sogleich richtig gefunden. Es sind die Knochentuberkeln längs dem Rücken und Banche gemeint. Columella sowohl als Plinius behaupten, Zeus und Faber wäre eins und dasselbe. Auf diese Gründe hin sind die Namen Zeus, Faber, Chalceus auf den St. Petersfisch übertragen, dessen systematischer Name noch jetzt Zeus Faber ist.

Es verdient noch eine Bemerkung des Paulus Jovius zur Citula oder St. Petersfisch angeführt zu werden. Er sagt nämlich l. c. cap. 27. Quo autem nomine latini veteres graeci-que illum appellarint, pro constanti affirmare non possum. Quibusdam videtur esse Chalcis de genere Rhomborum apud Columellam. Dass Chalcis, der bei Columella de re rust. l. 8. c. 17 unter andern Fischnamen mit unterläuft, de genere Rhomborum d. h. der flachen Fische, wie sie Columella an einer andern Stelle bezeichnet, sei, ist dort nicht zu lesen. Dagegen rührt diese Deutung von Chalcis von Merula her, in dessen Priscarum vocum in libris de re rustica enarrationes die Erklärung steht: Chalcis piscis est de genere rhomborum. Es bleibt unerklärlich, wie Chalcis zu Jovius Zeit, also vor Gyllius bei dem St. Petersfisch angeführt werden konnte, wenn es nicht etwa Chalceus ist und wenn nicht etwa der dalmatische Name Faber oder Fabro damals noch eine weitere Verbreitung hatte. Es liegt wenig daran, des Jovius eigene Meinungen über die Deutung des Chalcis zu erfahren; denn er deutet ihn auf eine ganze Anzahl Fische zugleich. Daher denn auch Gyllius Grund hatte zu sagen: Quod autem quibusdam modo videatur Chalcis, modo Galeos, modo Colambus, modo Citharus et Situlus, possem

1) Truëie oder Truëne nach Belón.

amplissime confutare, nisi amarem eos, qui primi conati sunt huic parti lucem aliquam afferre.

Alle Spätern sind dem Gyllius gefolgt, Rondelet und Salviani thun es stillschweigend, obgleich Salviani bemerkt, dass der Fisch in Dalmatien Faber heisse. Rondelet und Salviani bringen auch den Namen Christopsaron an, ja sie führen sogar an, dass der Fisch, wenn er gefangen wird, grunze und es entsteht der Verdacht, dass sie auch dieses nicht direct beobachtet oder selbst von Fischern berichten gehört haben, dass es vielmehr auch nur ein Echo der Nachrichten ist, die Gyllius auf seiner ersten Reise gesammelt und in seinem Werke niedergelegt hat.

Chromis.

Salviani hat sich mit gutem Grund ganz enthalten, diesen Namen auf einen bestimmten Fisch anzuwenden, der Versuch von Rondelet aber, ihn auf den Castagno der Provençalen zu beziehen, ist gänzlich misslungen. Indess hat dieser Castagno dadurch die Namen *Sparus Chromis* L. und *Chromis castaneus* Cuv. davongetragen. Zu der von Cuvier gegründeten Gattung *Chromis* wurde von ihm auch ein Nilfisch

zumitteln und es gereicht Salviani und Rondelet zum Vorwurf, dass sie es nicht benutzt haben. In seiner Abhandlung p. 551 heisst es: de coracino sive corvulo: Cum piscem quem Massilienses vocant Castaneum a colore castaneae piscatori cuiquam ostendissem, dixit in Corsica, unde ille ortus esset, vocari Corvulum. Cum Neapolitano etiam piscatori demonstrassem, statim respondit, Coracinum Neapoli vulgo nominari, a quorum probando tam diu iudicio me sustinebo, quoad videro, magis similem quem Speusippus in libro similiarum melanuri dicit similitudinem gerere.

Hierdurch haben wir erfahren, dass vielmehr der *χορρακίνος* des Aristoteles, der nach Thiergeschichte 5. 9. 4. ein kleiner Fisch ist, auf den Castagno oder *Chromis castaneus* Cuv. (*Helias castaneus* Müll.) zu beziehen ist, es ist dies die Ansicht, welche auch von Cuvier angenommen ist.¹⁾

Das Verdienst, welches sich Gyllius durch sein kritisches und methodisches Verfahren verbunden mit hinreichender Sachkunde erworben, ist um so mehr hervorzuheben, als seine Methode original und ohne Vorgänger war; denn den Versuch des Paulus Jovius kann man kaum dafür ansehen. Die grossen Leistungen des Belon, Rondelet und Salviani, welche in der Mitte des 16. Jahrhunderts auf einmal fast gleichzeitig auftreten, würden auch unbegreiflich sein wenn nicht Gyllius 20 Jahre früher den Geschmack für die schärfere Erkennung der Naturkörper geweckt hätte. Die damalige Verbreitung der Griechischen Literatur war gewiss sehr wichtig für die Belebung der Geister, aber sie

1) Was den im Athenaeus, Strabo und Plinius erwähnten zweiten Coracinus, den Nilfisch betrifft, der nach Juba bei Plinius auch in einem mit dem Nil zusammenhängenden See des untern Mauritaniens nicht weit vom Meer vorkommt, so hat es Cuvier hist. nat. d. pois. T. V. p. 25 wahrscheinlich gemacht, dass es der Bolty, *Labrus niloticus* Hasselquist ist. Die Elemente dieser Bestimmung sind die schon geschehene Bestimmung des Castagno, die Aehnlichkeit des Korakinus und Melanurus nach Speusippus und die Aehnlichkeit des Castagno und Bolty, welche so gross ist, dass Cuvier noch die Gattungen und Familien beider verwechseln konnte.

Aelian hat auch Coracinen in der Donau. 14. 23.

konnten darin die naturhistorische kritische Methode nicht erkennen, weil sie darin noch nicht zu finden ist.

Unter den Ueberlieferungen der Alten über den Chromis des Aristoteles fallen nur 3 für unsern Zweck ins Gewicht, seine Stimme, dass er truppweise erscheint und gefangen wird, Arist. Thiergeschichte 5. 9. 1. und die Bemerkung des Epicharmus im Athenaeus, dass der Schwertfisch und Chromis im Frühling von allen Fischen die besten sind. Die letztere Stelle, welche Rondelet zwar anführt, woraus er aber keinen Nutzen gezogen, passt unter den Fischen des Mittelmeeres, die eine Stimme haben, *pisces vocales*, nur auf *Sciaena umbra* s. *aquila* Cuv., der einer der schmackhaftesten Fische und dadurch wie der Schwertfisch im Rufe ist, worüber die scherzhafte Geschichte vom Parasiten Tamisius bei Jovius zu lesen, die in seine Nachfolger übergegangen ist. Auch passt das truppweise Leben oder dass er zu den *χρῶι* gehört, durchaus auf *Sciaena umbra* s. *aquila* Cuv. Es bleiben nur die Zweifel über die verschiedenen Lesearten, ob *χρόμις* oder *χρέμις* bei Aristoteles zu lesen ist.

Es ist Cuviers Verdienst, dass er die Beziehung des aristotelischen Chromis zur Umbrina der Römer, *Sciaena*

setzungen von *σκλαίνα* zu sein scheinen. Die Namen Umbra, Umbrina werden aber in den Häfen bald auf *Sciaena umbra* s. *aquila* Cuv., bald auf *Umbrina vulgaris* Cuv. s. *cirrosa* angewandt. Von der Umbra, welche Gyllius leider nicht charakterisirt, sagt er, sie heiße bei den Griechen jetzt noch *Scion*, von der *Umbrina cirrosa* behauptet Rondelet eben dasselbe und er scheint es nicht bloss aus Gyllius zu haben, denn er sagt: die Neugriechen nennen den Fisch *σκλον* andere *μηλοπόποιον*. Der Name *σκλαίνα* erscheint schon bei Aristoteles Thiergesch. 8. 20.5. in einer nichts bedeutenden Aussage, dass sie Steine im Kopfe habe, denn das gilt von allen Knochenfischen; hier wird die *σκλαίνα* neben *χρόμις* genannt; was weiter von der *σκλαίνα* und *Sciaena* bei den Alten ausgesagt wird, ist von der Art, dass es hier nicht angeführt zu werden braucht. Halten wir uns an Aristoteles, so ist seine *σκλαίνα* kein Fisch, der Töne hervorbringt, wohl aber der *χρόμις*. Daher bleibt die Wahrscheinlichkeit auf der Seite, dass der aristotelische *χρόμις* *Sciaena umbra* s. *aquila* Cuv. ist. Ob aber die *σκλαίνα* des Aristoteles und der Sciaenoid mit Bartfäden (*Umbrina cirrosa*) auf einander fallen, ist nicht mehr auszumachen. Das auf die Töne der *Sciaena umbra* Bezügliche werde ich hernach besonders im Zusammenhange mit den andern vocalen Sciaenoiden anführen.

Kapros.

Der im Acheloos lebende Kapros ist gänzlich unbestimmbar. Was im Athenaeus 7. 15. aus Aristoteles angeführt wird, dass Kapros sehr hart und von rauher Haut sei, lässt sich bei Aristoteles nicht wiederfinden, und scheint eine Verwechslung mit einem andern Fisch, da gleich darauf eine Stelle aus Archestratus folgt, wo der Kapros in Ambrakia zu kaufen empfohlen wird; auch wird an einer andern Stelle der Kapriscus hart genannt.

Was Aristoteles vom Kapros sagt, dass er auf jeder Seite nur eine und zwar doppelte Kieme habe, Thiergesch. 2. 9. 4. hat niemals zur Bestimmung desselben dienen können

und sind die so bestimmten Angaben des Aristoteles über die Zahlen der Kiemen bei den Fischen überhaupt ganz unzuverlässig. Dies darf nicht abhalten, dass ein unternehmender Geist dereinst die Fische des Acheloos und ihre Lokalnamen nach der Methode des Gyllius sammle. Wir würden dann gewiss einige merkwürdige neue Flussfische erhalten, wie sie schon Dalmatien geliefert hat.

Dass Rondelet den Kapros des Aristoteles auf einen Seefisch bezogen, den *Capros aper* der Neuern, der davon den Namen behalten, ist gänzlich willkürlich.

Belon hat für den aristotelischen Kapros einen Fisch abgebildet und beschrieben, den er ausgestopft in Ragusa vecchia gesehen und der in einer Kapelle aufgehängt war, von dem er auch noch einige kleinere Exemplare gesehen hat. Dieser Fisch mit enger Kiemenspalte, dessen Haut nach Belon rauh, mit sich kreuzenden Linien durchzogen ist, ist insofern merkwürdig genug, als es nicht gelingen will, ihn auf eine bekannte Form zu bestimmen; die Beschreibung und zumal die Bemerkung, dass der Fisch Zähne wie ein Mensch habe, würde auf *Balistes capriscus* passen, womit jedoch die Abbildung wenig stimmt; warum er aber der Kapros des

Verfahren, welches für die so hoch stehenden Ichthyologen des 16. Jahrhunderts, für Belon, Salviani, Rondelet, charakteristisch ist und in welchen sie hinter dem anspruchstosen Gyllius zurückbleiben. Dieser handelt auch vom Aperi, der eine rauhe harte Haut hat und den er in Venedig auf dem Marcusplatz ausgestopft in opificis cujusdam officina hängen gesehen hat. Als er ihn einem Thracier zeigte, sagte dieser, er pflege von seinen Landsleuten Capriscus genannt zu werden und als er eine Abbildung dieses Fisches den Sicilischen Fischern zeigte, erklärten sie ihn für den Porcus. Gyllius aber hat sich wohl gehütet zu sagen, dass sein Aperi der Kapros des Aristoteles sei.

Die Poikilien des Pausanias.

Die Flüsse Arcadiens, Clitor und Aornos sollen nach den Angaben von Mnaseas und Philostephanus bei Athenaeus 8. 1. Fische enthalten, welche Töne von sich geben wie Drosseln. Die Fische heissen *ποικιλται*. Dasselbe behauptet Clearchus von den Fischen in dem Arcadischen Flusse Ladon. Vergl. Casaub. animadvers. in Athenaeum p. 576. Bei Pausanias heisst der Fluss, worin die *ποικιλται* mit Drosselstimmen, Aoraios. Pausanias erzählt L. 8. 21. er habe die Fische gefangen gesehen, er habe aber keine Stimme von ihnen vernommen, obgleich er bis Sonnenuntergang am Aoraios verweilt habe, zu welcher Zeit die Fische am meisten bei Stimme sein sollten. Plinius macht daraus seinen Exocoetus, miratur et Arcadia suum exocoetum, appellatum ex eo quod in siccum somni causa exeat. Circa Clitorium vocalis hic traditur et sine branchiis, idem aliquibus adonis dictus. Nach Massarius wurde der Exocoetus zu seiner Zeit, als er danach gefragt, in Arkadien Lychnon genannt. Massarius a. a. O. p. 116. Conrad Gesner vermuthete, dass es sich um den Schlammpeisker handle, der nach Georg Agricola de animantibus subterraneis einen feinen Ton (sonum acutum) von sich gebe. Gesner hist. anim. IV. p. 737. Seit Gesner sind die *ποικιλται* von Arkadien gänzlich in Vergessenheit gerathen, wenigstens haben

sich die Ichthyologen ihrer nicht mehr erinnert. Valenciennes hat in der hist. nat. d. poissons in dem reichen Artikel über *Cobitis* ihrer nicht gedacht. *Cobitis fossilis* würde durch seine Färbung dem Namen ποικίλαι wohl entsprechen können. Willugby hist. pisc. Oxonii 1686 p. 119 hat für diesen Fisch aus Nürnberg und Regensburg den Namen *Misgurn* oder *Fisgurn* und sagt aus Baltner's Manuscript: Cum nudi jacent aqua destituti sonum sibilum edunt. Marsigli (Danubius IV. Hagae 1726 p. 39.) nennt ihn nach den Deutschen an der Donau *Pissgurn* und bemerkt, dass ihn andere *Peisker* oder *Beiseker*, andere *Pfeifker* nennen, was er von Pfeifen ableitet, weil der Fisch, wenn man ihn berühre, sich windend, einen feinen Ton (sonum acutum) hören lasse. Der *Peisker Cobitis fossilis* ist ausser Deutschland auch in Ungarn und nach Pallas im südlichen Russland bis zum schwarzen Meer verbreitet. *Cobitis taenia*, der *Steinbisser* von Baltner, welcher nach Valenciennes (hist. nat. d. poiss. T. XVIII. p. 56) denselben Ton hören lässt, kommt in ganz Europa vor, auch in Spanien, Italien und nach Nordmann am schwarzen Meer.

II. Systematische Uebersicht der pisces vocales.

Die bis jetzt bekannten pisces vocales gehören theils den Fischen mit geschlossener Schwimmblase aus den Ordnungen der Acanthopteri, und Plectognathi, theils den Fischen mit offener Schwimmblase aus der Ordnung der Physostomi an. In der Ordnung der Acanthopteri gehören sie den Familien der Cataphracti, Sciaenoidi, Scomberoidei, Pediculati, unter den Plectognathen den Familien der Gymnodonten und Sclerodermen, unter den Physostomi den Familien der Siluroiden und Cyprinoiden an.

Cataphracti.

Gattung *Dactylopterus* Lac.

Dactylopterus volitans C., Chelidon des Aristoteles.
hist. anim. 4. 9. 4. Siehe oben p. 252.

Gattung *Trigla* L.

Duhamel, traité des pêches. II. sect. V. Cap. 4. p. 106. Siehe oben p. 253.

Gattung *Cottus* L.

Cottus scorpius L.

Cuvier sagt von ihm, dass er ein Geräusch von sich hören lasse, wenn man ihn anfasst oder in der Hand presst. Auch Krøyer erwähnt, dass er knarre, wenn er aus dem Wasser komme. Dieser Fisch, der nicht im mittelländischen Meere beobachtet ist, vielmehr dem Norden angehört, ist ohne Schwimmblase.

Sciaenoidi.

Gattung *Sciaena* C.

Sciaena aquila C.

Duhamel traité des pêches II. Sect. VI. p. 130. Cuv. Val. hist. nat. d. p. T. V. p. 42. Tönt unter Wasser.

Gattung *Corvina* C.

Corvina ronchus. C. V. T. V. p. 107 heisst zu Maracaibo el ronco und el roncador.

Corvina ocellata C. V. T. V. p. 134. Beardless Drum.

Sciaena imberbis Mitchill in Transact. lit. and phil. soc. of New-York T. I. p. 411.

Corvina dentex C. V. T. V. p. 140.

In Schomburgk fishes of Guiana p. II. p. 136 ist von der nicht hinreichend bestimmten *Corvina grunniens* bemerkt, dass sie unter Wasser ein Geräusch mache.

Gattung *Otokithus* C.

Otokithus regalis C. V. T. V. p. 71. Weak Fish Mitchell in Transact. lit. and phil. Soc. of New-York. T. I. p. 396. Mitchell führt an, dass er nach Aussagen der Fischer unter Wasser ein dumpfes rumpelndes oder trommelndes Geräusch macht.

Gattung *Pristipoma* C.

Pristipoma Jubelini C. V. T. V. p. 251.

Pristipoma crocro C. V. T. V. p. 264. Hat nach Plée seinen Namen von dem Geräusch, das er macht.

Pristipoma coro C. V. T. V. p. 267.

Pristipoma guoraca C. V. T. V. p. 257. (*Perca grunniens* Forster. Descriptiones animalium Berol. 1854 p. 294.) Forster sagt, dass der Fisch, wenn er gefangen auf den Strand geworfen wurde, einen grunzenden Ton von sich gab.

Gattung *Pogonias* Lac.



choides gangene von Buchanan, der ihn an den Mündungen des Ganges erhalten. Buchanan bestätigt, was der Holländische Name ausdrückte und sagt: wenn man den Fisch erschrecke, so gebe er ein merkwürdiges Kracken von sich. *Fishes of the ganges* p. 34.

Gymnodontes.

Gattung *Orthroragoriscus* Schn.

Orthroragoriscus mola Bl. Schn. *Rondelet de pisc. mar.* p. 426. 427. Siehe oben p. 262.

Gattung *Tetrodon* L. und *Diodon* L.

Nach Pappe *synopsis of the edible fishes at the cape of good hope.* Cape Town 1853 p. 8 blähen sich die *Tetrodon* auf, sobald sie aus dem Wasser gezogen werden und stossen ein Grunzen aus.

Sclerodermi.

Gattung *Balistes* L..

Lacepède hist. nat. d. poiss. I. p. 347. 348. *Dugès traité de physiol. comp. T. II.* Montpellier 1838. p. 236.

Siluroidei.

Gattung *Synodontis* C.

Tönende Fische im Nil und andern Flüssen Africa's. Geoffroy St. Hilaire in *Description de l'Egypte* ed. 2. T. XXIV. p. 318.

Cyprinoides.

Gattung *Cyprinus* L.

Cyprinus tinca L.

Fabricius ab Aquapendente in seiner Abhandlung de brutorum loquela op. omn. p. 326 sagt von den Fischen, welche Ausonius tinca nenne (gewiss die schlimmste Art einen Fisch zu bezeichnen), dass sie ein Geräusch machen, indem sie das Maul öffnend die aneinander liegenden Lippen trennen. Dass Tinca aus dem Wasser gezogen einen Ton von sich gebe, hat auch Cardanus de rer. var. l. VII. c. 38.

Cyprinus barbatus L. nach Valenciennes *hist. nat. d. poiss.* T. XV. p. 251.

Gattung *Cobitis* L.


Cobitis fossilis L. Agricola de animantibus subterraneis.
p. 74. Baltner in Willugby hist. pisc. Oxon. 1686
p. 119. Marsigli Danubius IV. Hagae 1726 p. 39.

Cobitis taenia L. nach Valenciennes hist. nat. d.
poiss. T. XVIII. p. 56. Siehe oben p. 262.

III. Beobachtungen über die Töne der Fische.

Die erste Frage bei der Feststellung der Thatsachen hinsichtlich der Töne eines Fisches kann nur diese sein, ob der Fisch seine Töne von sich giebt, nur wenn er aus dem Wasser gezogen ist, oder ob er auch unter Wasser töne, wie es z. B. von *Sciaena aquila*, *Otolithus regalis* und *Pogonias fasciatus* bekannt ist. Wenn aber ein Fisch unter Wasser tönt, so wird er ohne Zweifel auch aus dem Wasser gezogen an der Luft tönen; davon haben wir ein Beispiel an *Dactylopterus volitans*, bei dem das Tönen im Wasser und in der Luft von uns beobachtet wurde.

Die von Fischen abgegebenen Töne sind entweder Lufttöne oder Töne von festen Theilen, die durch Reibung derselben gegen einander entstehen.



der Höhle angebrachten engen Pass aus einem Theile der Schwimmblase in den andern durchgepresst würde. Dergleichen kommt aber an der Schwimmblase von *Sciaena*, *Corvina*, *Pogonias* und *Dactylopterus* gar nicht vor. Die Ursache der Töne dieser Fische unter Wasser kann daher nicht von der Luft und nur von harten Theilen herrühren, wie sich auch von *Dactylopterus* direct beweisen lässt.


Was die *pisces vocales* betrifft, die nur aus dem Wasser gezogen und nicht unter Wasser tönen, so kann die Erscheinung in diesem Fall kein so grosses Interesse, wie in dem andern Fall haben. Denn bei einem in der Luft befindlichen Thiere können die Ursachen zu Lufttönen im Munde sehr mannigfaltige sein. Schon die plötzliche Entfernung der an einander gelegten Lippen reicht bei dem Menschen zur Entstehung des schmatzenden Tones hin. So soll auch *Tinca* nach Fabricius ab Aquapendente Töne mit den Lippen hervorbringen. Eine ähnliche Art der Tonbildung scheint bei den narkotisirten Fischen in vergifteten Gewässern statt zu finden, nach dem was Spix und v. Martius in Brasilien beobachtet haben. Die Fische kamen zur Oberfläche, sprangen und gaben mit dem Maule ein Klatschen von sich. *Selecta gen. et spec. pisc. Monach. 1829. XIV.* Hieher gehört auch die Saugbewegung der Lippen.

Sodann kann es bei einem in der Luft befindlichen Fische die Austreibung geschluckter Luft sein, wie bei dem Rülpsen der Menschen. Bei einem der *Physostomi* kann auch die Austreibung von Luft aus der Schwimmblase Töne veranlassen.

Das bekannteste Beispiel vom Tönen an der Luft geben die Schlammpeisker und überhaupt die Arten der Gattung *Cobitis*. Niemals hört man die Töne des Schlammpeiskers aus dem Wasser, aber sehr leicht, wenn man das Thier in der Luft mit den Händen hält. Sie klingen sehr hoch, so dass ich es ganz richtig finde, wenn schon Agricola und Marsigli den Laut als *sonum acutum*, Baltner als *sonum sibilum* bezeichneten. Siehe oben p. 261. 262. Es ist so etwas zwischen dem Ton eines lautbaren Kusses und dem Quiken einer Maus.

Bei der Beweglichkeit der Thiere und bei der Bedeckung des Mauls durch die Bartfäden hat es mir nicht gelingen wollen, zu beobachten, ob das Maul und was überhaupt bei der Tonbildung theilhaftig ist. Vielleicht rührt der Ton von einer Saugbewegung des Mundes her. Unser Wärter beim anatomischen Museum, Graff, der die Schlammpeisker seit vielen Jahren täglich um sich hat, versichert, dass sie im Wasser die Gewohnheit haben, sich mit dem Maul an Steinen festzusetzen und dass er dies oft bei solchen, die in Gläsern aufbewahrt werden, gesehen habe. Da der Peisker Luft verschluckt, so fragt es sich auch, ob die Töne durch Ausstossen verschluckter Luft entstehen.

Valenciennes T. XV. p. 251 behauptet, *Cyprinus barbus* lasse einen Ton unter Wasser hören, wenn man ihn in einem Gefäss eingeschlossen halte und ihn beunruhige und besonders, wenn man ihn ein wenig stark in den Händen drücke. Er erklärt das Tönen von dem Entweichen der Luft aus der Schwimmblase. Aber der Luftgang ist bei den Cyprinoiden so eng, dass eine plötzliche Austreibung von Luft aus der Schwimmblase bei diesen Fischen schwerlich Ursache von Tönen werden kann. Man bringt auch keine Töne hervor, wenn man die mit dem Schlund ausgeschnittene Schwimmblase eines *Cyprinus* unter Wasser zusammendrückt. Bei



Mozambique wiederholt hat knurren gehört, als sie aus dem Wasser hervorgezogen waren.

Isid. Geoffroy St. Hilaire sagt in der Description de l'Egypte ed. 2. T. XXIV. p. 318 zu *Synodontis*, dass auf den *Synodontis clarias* wahrscheinlich der *porcus* der Alten zu beziehen, weil sie sagen, dass der *porcus* wie ein Schwein grunze. Da aber der griechische Flussfisch Kapros das Schwein ist, welches grunzet, vom *χοῖρος* des Nils bei Strabo lib. XVII. c. 2. §. 5 aber nichts der Art ausgesagt ist und überdies mit dem Namen *χοῖρος* gar verschiedene Fische in verschiedenen Flüssen von den Alten bezeichnet wurden, wie z. B. Aelian 14. 23 auch unter den Donaufischen die *χοῖροι* erwähnt, so kann ich die Frage von der Identität des Nil-*χοῖρος* bei Strabo mit *Synodontis* ganz bei Seite lassen und in dieser Hinsicht auf die Description de l'Egypte und Valenciennes gelehrte Bemerkungen in seiner hist. nat. d. poiss. T. XV. p. 251 hierüber verweisen.

Viel wichtiger sind die Bemerkungen Isid. Geoffroy's über das Tönen selbst aus den Nachrichten seines Vaters. Er sagt: die Thatsache von einem Fisch, der Töne unter Wasser hören lasse und ähnliche, von neuern Naturforschern gesammelte Beobachtungen, die in Zweifel gezogen und als unbegreiflich fast verworfen worden, seien gleichwohl genau, wie sein Vater constatirt habe. In der That seien diese Töne nicht vergleichlich der Stimme der Luft athmenden Thiere und sie seien allein das Product der Stacheln der Rücken- und Brustflosse in ihren Gelenkgruben.

Valenciennes bemerkt zu *Synodontis*, dass die Erklärung von I. Geoffroy St. H. sehr wenig glücklich sei und von allen physiologischen Principien der Production der Töne bei den Fischen entfernt sei. Die Bewegung der Stacheln geschehe ohne alles Geräusch. Alle, welche die Naturgeschichte der Fische kennen, wüssten, dass die Töne, welche diese hören lassen, von der Bewegung herrühre, die sie der Luft ihrer Schwimmblase geben können, indem sie einen mehr oder weniger starken Druck auf dieses Organ ausüben. Die Fische, die er dann anführt (solche mit geschlossener Schwimm-

blase) *Sciaena*, *Trigla*, die keine knöchernen Strahlen besitzen, die hiezu geeignet wären, hätten meines Erachtens eben so gut als Beispiele angeführt werden können, dass ihre Töne nicht von der Luft der Schwimmblase herrühren können, da die Luft völlig eingeschlossen ist und unter keinen Umständen in einem geschlossenen mit Luft gefüllten Balge durch mehr oder weniger starkes Zusammendrücken Töne entstehen können, wenn die Luft nicht im Innern der Blase durch eine enge Passage durchgepresst wird, wozu in den Schwimmblasen jener Sciaenoiden und Cataphracten durchaus keine Gelegenheit ist.

Als ich mit den Herren Lepsius und Peters die *Synodontis* im anatomischen Museum auf diese Frage ansah, so erstaunten wir, dass sogleich bei dem Versuch, den grossen Stachel der Brustflosse zu bewegen, starke knarrende Töne entstanden, welche ihren Sitz in dem Gelenk haben und dadurch entstehen, dass die Gelenkfläche des Stachels auf der Gelenkgrube vibrirend hingleitet, sobald man diesen Stachel adduciren oder abduciren will, welches ohne gleichzeitige leichte drehende Bewegung des Stachels nicht gut geschehen kann. Diese Erscheinung stimmt also gänzlich mit den

noch ungewiss, ob sie auch unter Wasser Töne von sich abgeben.

Gyllius erzählt von der Galline der Marseiller, die eine *Trigla* ist, dass sie nach Aussage der Fischer eine Art Ton von sich gebe, wenn sie sich im Netz gefangen fühle. Duhamel traité des pêches II. sect. V. Cap. 4. p. 106 berichtet auch nach Fischern von dem Grunzen der Triglen. Die einen sagten, die Töne höre man schon, wenn die Fische noch im Wasser, die andern, man höre sie nur, wenn die Fische schon herausgezogen sind. Alle neuern Ichthyologen bemerken bei den Triglen, dass sie grunzen, wenn sie aus dem Wasser herausgezogen werden, so z. B. Cuvier, Yarrell, Kroyer, v. Martens, Risso. Niemand aber sagt, dass der Fisch unter Wasser töne, wie wir es vom *Dactylopterus* erfahren werden. Diese Angaben beruhen übrigens wahrscheinlich überall nicht auf eigener Beobachtung, sondern auf den Aeusserungen der Fischer.

Es ist durchaus nöthig, dass ein Naturforschér Gelegenheit erhalte, Triglen unter Wasser zu beobachten. Ich selbst bin nur Ohrenzeuge des Knurrens in der Luft gewesen. Die Blankeneser Fischer, deren Bote im Sommer und Herbst oft bei Helgoland liegen, besitzen in ihren Schiffen einen mit der See communicirenden Behälter (vivarium), in dem sie die Fische bis zum Verkaufe lebend erhalten, so dass man bei ihnen Rochen, Zungen und verschiedene andere Fische lebendig erhalten kann. Da ich bei einer der Excursionen auf der See an einem dieser Schiffe vorbeikommend, dort eine lebende *Trigla* (*gurnardus*) vorfand, so kaufte ich sie und bedauerte nur, dass ich ein Gefäss, sie im Seewasser lebend heim zu bringen, nicht bei mir hatte. Ich muss es noch mehr beklagen, dass ich die Gelegenheit zur Beobachtung der *Trigla* in dem Vivarium der Fischer damals nicht benutzt habe. Die lebende *Trigla* lag in meinem Boote und ich hörte sie mehrmal laut in der Luft knurren. Jedesmal beim Knurren schwoh der Vorderbauch seitlich hinter dem Schultergürtel an und ich fühlte dort mit dem hinter dem Schultergürtel angelegten Finger beim Knurren einen Druck. Ich

konnte durch die Bewegung der Kiemendeckel keinen Ton hervorbringen, weder an dem lebenden Fisch, noch an dem todtten. Bei der Section fand ich in der Schwimmblase nichts vor, was die Entstehung von Tönen erklären könnte.

Dugès hat in seinem traité de physiologie comparée T. II. Montpellier 1838 einen Artikel über die Töne der Fische ohne eigene Beobachtungen an lebenden Fischen und zum Theil mehr fragend als beantwortend. Die Frage, ob der Fisch schon unter Wasser töne oder nachdem er schon in die Luft gezogen ist, wird gestellt, aber^o sie ist ohne Antwort. Beim Zusammen schnüren der Schwimmblase der *Trigla hirundo* habe^r er eine Art Krächzen, das unter Wasser vernehmbar gewesen, erhalten und zuletzt die Schwimmblase zum Bersten gebracht. Er bezweifelt, dass die Schwimmblase Antheil habe, die ohnehin dem knurrenden *Cottus scorpius* fehlt. Viel eher müsse man die Wirkung beim Karpfen erhalten, wegen der Einschnürung zwischen den beiden Schwimmblasen des Karpfen, wo man aber kein Grunzen zu Stande bringe^o). Dugès leitet das Grunzen in der Luft bei *Trigla hirundo* vom Austreiben der Luft aus der Kiemenhöhle bei geschlossenem Kiemendeckel am obern Theil der Kiemen-

der Kiemenspalte andrückte und dann den Kiemendeckel plötzlich abzog. Hier entstand ein Ton in dem Augenblick, als die an der Wand der Kiemenspalte adhärende Kiemenhaut sich davon entfernte. Ich war aber verwundert, diesmal auch aus dem Unterkiefergelenk durch Bewegung des Unterkiefers mit Andrücken an die Gelenkfacette zuweilen ein Knarren zu erhalten.

Gyllius macht den Fischern an einer launigen Stelle im Allgemeinen den Vorwurf, dass sie nur für den Erwerb der Fische Ohren haben, für die Stimmen der Fische aber taub seien. Dies kann man von den Fischerjungen in Messina nicht sagen; denn diese verstehen es, aus den Stimmen der Fische Geld zu machen. Die Naturforscher, welche in Messina gewesen sind, kennen das Geschick und die Anstelligkeit der Knaben an der Marine, Naturgegenstände aus dem Meere herbeizuschaffen, wozu ihnen ihr scharfes Gesicht und ihr geschicktes Tauchen und Schwimmen nützlich sind. Sobald die zweimal täglich wiederkehrende Strömung des Faro eine Fülle von Meeresthiergehörigen in den Hafen von Messina führt, so fahren sie in den Boten und schöpfen die schwer sichtbaren kristallklaren hydrostatischen Medusen und andere Acalephen und so viele andere pelagische Thiere; sie belagern dann die Treppen der Locanda mit ihren Gläsern und Töpfen, und selbst die kleinsten lernen das Gewerbe, dass sie irgend einen kleinen Fisch aufreiben und sich damit vor den Fenstern derjenigen aufstellen, die für die messinische Jugend eine so glückliche Erscheinung sind und durch Fisch, Fisch! Rufen ihre Aufmerksamkeit zu erregen suchen. Da trifft es sich wohl, dass uns einer dieser Jungen mit einem tönenden Fisch in den Strassen begegnet und uns damit verfolgt. Er hält ihn an den langen Stacheln der Kiemendeckel mit beiden Händen schwebend in der Luft und entlockt ihm laute knarrende Töne, indem er jedesmal die Kiemendeckel aufsperrt. Dies ist die *Cheilodon* des Aristoteles, *Dactylopterus volitans*, der nicht, wie Aristoteles glaubte, mit den Flügeln, sondern vermöge der Gelenke der Kiemendeckel tönt. Einer von unserer Gesellschaft, Hr. Althaus hatte einen solchen Fisch

gekauft und brachte ihn lebend in unser Arbeitszimmer. Dieser Fisch gab, als er frei auf der Hand gehalten wurde, das Knarren von sich, indem er dabei jedesmal die Kiemen-
deckel weit aufsperrte; gerade in dem Augenblick, als er diese Bewegung machte, erfolgte der Ton. Ich war sehr glücklich, dass der Fisch noch so lebenskräftig war und war sehr gespannt, ihn im Wasser zu beobachten. Wir brachten ihn in ein Waschbecken, das mit Seewasser angefüllt war und wurden nicht wenig überrascht, als er ganz unter Wasser auch hier freiwillig seinen Ton auf dieselbe Weise jedesmal durch aufsperrende Bewegung der Kiemendeckel hören liess und dies von Zeit zu Zeit wiederholte, so dass es gewiss ist, dass die Luft nicht dabei mitspielt. Der Ton ist sehr laut und entspricht dem Ausdruck und Vocal in dem Wort Knarren. Ich bin nicht zweifelhaft, dass der Ton aus dem Gelenk des Schläfenbeins am Schädel kommt.

Auch wenn ich einen *Dactylopterus orientalis*, der in Weingeist aufbewahrt, nach dem Beispiel der Messineser handhabe, so gelingt es mir noch ähnliche Töne zu entlocken. Die Töne scheinen durch ein intermittirendes Gleiten der Gelenkflächen auf einander zu entstehen: wie wenn man mit

terus ist nichts, was Töne hervorbringen kann. Man kann ihre Beschreibung bei Cuvier und Valenciennes lesen. Sie ist vorn getheilt und ihre beiden Hörner verlängern sich bis unter das Dach des Hinterhaupts.

Einige der merkwürdigsten und berühmtesten *pisces vocales* gehören der Familie der Sciaenoiden und den Gattungen *Sciaena*, *Otolithus*, *Corvina* und *Pogonias* an; und von diesen scheint es gewiss zu sein, dass sie nicht bloß tönen, wenn sie aus dem Wassergezogen werden, sondern dass sie wie *Dactylopterus volitans* auch unter Wasser ihre Töne von sich geben. Einer der grössten darunter ist der im atlantischen und mittelländischen Meer vorkommende Maigre der Franzosen, *Sciaena umbra* s. *aquila* Cuv. Er erscheint auch zuweilen in der Nordsee, aber ungewöhnlich; das grosse Skelet der *Sciaena umbra* im anatomischen Museum zu Berlin ist von einem Exemplar, das bei Helgoland gefangen worden.

Dubamel traité des pêches II. Sect. VI. p. 138 sagt von den Maigres, dass sie den Fischern ihre Ankunft durch einen starken Ton ankündigen. Nach Cuvier lassen sie, wenn sie im Trupp schwimmen, ein Grunzen, stärker als die Triglen, hören; es sei gekommen, dass 3 Fischer durch dieses Geräusch geleitet, 20 Maigres mit einem Fischzug gefangen hätten. Die Fischer sagen, das Geräusch sei stark genug, um 20 Klafter unter Wasser gehört zu werden und sie legen von Zeit zu Zeit das Ohr an den Rand des Schiffes, um sich nach diesem Geräusch zu richten. Die einen sagen, es sei ein dumpfes Brummen, die andern, es sei vielmehr ein scharfes Pfeifen (*sifflement aigu*). In der Gegend von La Rochelle nenne man es seiller, so wie man braire von der Stimme des Esels und aboyer von der des Hundes sage. Einige Fischer behaupten, die Männchen machten allein das Geräusch zur Zeit der Brunst und man könne die Fische anlocken durch Pfeifen und ohne Lockspeise. Cuv. Val. hist. nat. d. p. T. V. p. 42.

Vom *Otolithus regalis* sagen die Fischer nach Mitchill, dass er unter Wasser ein dumpfes rumpelndes oder trommelndes Geräusch mache. Von der *Corvina grunniens* bei

Schomburgk fishes of Guiana wird berichtet, sie mache ein sonderbares Geräusch unter einem Boot, wenn es in der Nähe ihres Aufenthaltes anhält.

Die Drummische in Nordamerika sind *Pogonias chromis* et *fasciatus*. Ein Drum oder Drummisch wurde von Dr. Garden aus Carolina an Linné gesandt, der ihn unter dem Namen *Labrus chromis* aufführt. Die Gattung *Pogonias* ist von Lacepède aufgestellt, der einen Drummisch *Pogonias fasciatus* nannte. Die Verwandtschaft des *Labrus chromis* L. mit den Sciaenen wurde zuerst von Bloch und Schneider erkannt, welche diesen Fisch im systema ichthyologicum Berol. 1801 als *Sciaena chromis* anführten. *Pogonias chromis* Cuv. (*Labrus chromis* L., *Sciaena fusca* et *gigas* Mitchill) ist ein grosser Fisch, der gegen $3\frac{1}{2}$ Fuss lang wird. Zum *Pogonias fasciatus* Lac. gehört *Mugil grunniens* oder *Labrus grunniens* Mitch. als Synonym. Die *Pogonias* kommen auch in Südamerika vor. Wir besitzen ihn aus Montevideo von Sello eingesandt, den gebänderten Exemplaren aus Nordamerika gleichend, die man *P. fasciatus* genannt und deren Eigenheit als Art noch nicht sicher festgestellt ist.

Nachrichten über die Töne der Drummische haben Schöpf,

ren. Dies ist auch die Meinung von Duvernoy in Cuvier leq. d'anat. comp. 2. ed. T. 8. Paris 1846 p. 818. Beim *Dactylopterus volitans* und *Sciaena aquila* sind jedoch die Schlangknochen nur mit Hechelzähnen versehen. Bei Untersuchung mehrerer in Weingeist aufbewahrter Exemplare des *Pogonias fasciatus* war es mir nicht möglich, durch Bewegung der Kiemendeckel Töne hervorzubringen. Die Schwimmblase des *Pogonias*, welche Cuvier beschrieben, ist wie bei allen Stachelflossern geschlossen und hat nichts an sich, woraus man die Entstehung eines Tons erklären könnte.


Cuvier neigte sich schon zu der Ansicht von Schöpfung, welche seitdem durch die Angaben von Dekay vollständig bestätigt worden, und er berief sich auf ein Begegniss, welches dem Schiffslientenant John White auf seiner Reise nach Cochinchina vorgekommen. J. White voy. to Cochinchina London 1824 p. 187. Es war während der Fahrt auf dem Flusse Donnai in Cochinchina und in dem Becken des Flusses, welches Ngabay oder Siete bocas genannt wird. Unsere Ohren, sagt J. White, wurden durch ein Gemisch von Tönen begrüßt, welche dem tiefen Bass der Orgel, begleitet von dem hohlen Geschrei des Bullfrosches, dem dumpfen Dröhnen einer Glocke und Tönen glichen, welche die Einbildung einer ungeheuren Maultrommel¹⁾ zuschreiben würde. Begierig die Ursache dieses freiwilligen Concerts zu entdecken, kam ich in die Cajüte, und fand den Lärm, von dem ich mich bald überzeugte, dass er aus dem Boden des Schiffes kam, gewachsen zu einem vollen und ununterbrochenen Chorus. In wenigen Minuten wurden die Töne, die an Steuer des Schiffes begonnen hatten, allgemein durch die ganze Länge des Bodens. Der Dolmetsch, ein christlicher Cochinchinese, erklärte das Geräusch von einer Truppe von Fischen von flach ovaler Gestalt wie Flunder, die durch eine gewisse Conformation des Mundes das Vermögen besitzen, an andern Gegenständen in einem wunderbaren Grade anzuhängen und dem Gewässer der Siete bocas eigen seien. In

1) Cuvier übersetzt Harfe; im Original steht aber Jew's Harpe.

dem Maasse, als man den Fluss hinauf fuhr, verminderten sich die Töne und verschwanden zuletzt ganz.

Cuvier ist geneigt, auf diese Weise ein Begegniss zu erklären, welches A. v. Humboldt in der Südsee am 20 Febr. 1803 gegen 7 Uhr Abends erlebte. Alle, so berichtet Cuvier, waren von einem ausserordentlichen Lärm erschreckt, wie von Trommeln. Man schrieb es verborgenen Klippen zu. Bald hörte man es im Schiff und besonders im Hinterheil, es war wie das Aufkochen einer Flüssigkeit. Man hörte es successiv an allen Theilen des Schiffes, gegen 9 Uhr hörte alles auf.

Es scheint, dass das Ereigniss dasselbe ist, welches A. v. Humboldt in seiner Reise in die Aequinoctialgegenden des neuen Continents im 5. Buch Cap. 14 berührt, welches aber von ihm nicht so ausgelegt wird, wie es von Cuvier geschieht. Es heisst dort: Auf der Südsee während der Ueberfahrt von Guayaquil nach den Küsten von Mexiko kamen Hr. Bonpland und ich an Stellen, wo unsere sämtlichen Matrosen von einem dumpfen, aus der Tiefe des Oceans aufsteigenden und durch das Wasser mitgetheilten Getöse geschreckt wurden. Es geschah dies zur Zeit eines




Experimentators direct in leitende Verbindung durch einen festen Körper zu setzen, in der Weise, die ich zur Prüfung der akustischen Verhältnisse künstlicher Gehörorgane, nämlich der Trommelhöhlenapparate, anwandte, wobei man die Kette der homologen Schalleiter auch an dem Fisch im Wasser anlegen kann. Das Stethoskop ist wie bei der Prüfung der akustischen Apparate durch einen Stab ersetzt, der bei verstopften beiden Ohren, die durch einen Stopfen von gekautem Papier geschlossen sind, mit dem einen Ende an das Ohr, mit dem andern an den im Wasser oder in der Luft befindlichen Fisch und successiv an die verschiedenen Theile seines Kopfes angelegt wird. Die Kette der festen Theile kann auch zu grösserer Bequemlichkeit gegliedert sein, d. h. aus mehreren durch Gelenke anschliessend verbundenen Gliedern bestehen.

Physiologische Bemerkungen über den Scheintod

von

DR. F. T. KUNDE.

Wenn wir, nach dem Vorgange Bichat's, drei Organe als die Lebensheerde im Organismus des Wirbelthieres ansehen, das Gehirn, die Lungen und das Herz, so nennen wir „Scheintod“ denjenigen Zustand, in welchem genannte Organe keine sichtlichen Lebensäusserungen mehr erkennen lassen, und in Folge davon die übrigen Organe in denselben Zustand hineingezogen haben. Wir sagen dann auch wohl: das Leben eines solchen Organismus ist latent. Kehrt eines der genannten Organe zur Norm zurück, so kann die Func-



Einen lokalen Tod des Herzens hat nun Bichat beobachten wollen in Folge eines grossen Schreckes, welcher einen Menschen plötzlich tödtete, in andern Fällen glaubte er diese Todesart supponiren zu dürfen, wenn Stichwunden die Aorta getroffen oder ein Aneurysma geborsten war. Die Syncope zählte er ebenfalls hierher, indem er annahm, dass dieselbe ihren ersten Ursprung in einem Stillstande des Herzens habe.

So begründete denn dieser Autor seine Behauptung, dass es nur drei Todesarten gebe: Tod durch Apoplexie, Asphyxie und Syncope.

Wir würden nicht auf diese, wie es vielleicht scheinen mag, veralteten Ansichten eingehen, wenn wir nicht der Ueberzeugung wären, dass dieselben, wie Alles, was von dem grossen Anatomen ausgegangen, noch heute einen grossen Werth haben, und zwar, worauf das profanum vulgus ein grosses Gewicht zu legen pflegt, einen sogenannten praktischen Werth.

Schon wir nämlich die Berichte der Sectionsbefunde bei den pathologischen Anatomen nach, so finden wir folgende Ausdrücke: Gehirn blutleer, Gehirn sehr hyperämisch, Lungen, Leber, Nieren hyperämisch, dieselben blutleer, Herz schlaff, Herz contrahirt, Herz mit Blut gefüllt, Herz blutleer u. s. w. Wir müssen aber gestehen, dass alle diese Ausdrücke im höchsten Grade vage sind, und dass Tausende derartiger Beobachtungen keine Beobachtung an das Licht fördern, wie denn tausend graue Pferde keinen einzigen Schimmel machen.


Um in diese alljährlich mit so vieler Mühe und Aufopferung unternommenen Beobachtungen einiges Licht zu werfen, ist es nöthig, den von Bichat eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen, und es ist dazu erforderlich, den Zustand der Organe bei den verschiedenen Todesarten genau festzustellen. Wir werden dann die Frage zu lösen haben: Wie verhält sich die Blutvertheilung, wenn der deletäre Einfluss primär auf die medulla oblongata, wenn primär auf die Lungen, wenn primär auf das Herz wirkte.

Diese Fragen wird man im Stande sein zu beantworten,

sobald man Thieren die medulla zerstört oder lähmt, die Trachea zubindet oder das Herz anhält.

In Folgendem soll nun gezeigt werden, dass man im Stande ist, diesen Anforderungen zu genügen. Die Untersuchungen über die Blutvertheilung, welche sich hier anschliessen sollten, muss Verfasser auf eine günstigere Zeit versparen, da dieselben sehr complicirter Natur und zeitraubend sind. Verfasser veröffentlicht daher nachstehende Versuche nur in der Absicht, eine Methode an die Hand zu geben, welche, wie er glaubt, bei physiologischen Versuchen sehr oft wird in Anwendung gebracht werden können, und seiner Unzulänglichkeit sich vollkommen bewusst, wünscht derselbe nur die Mutter des Socrates nachzuahmen, welche, selbst nicht mehr gebärend, dennoch Kunstgriffe zu finden bemüht war, wodurch sie anderen ihre Geburten zur Welt bringen half. Man kann ein Säugethier, Hund, Katze oder Kaninchen auf folgende Weise scheinotdt machen: 1) durch einen heftigen Schlag auf den Kopf, 2) durch Zuschuüren der Trachea, 3) durch Compression des Herzens.

Erstere Methode ist sehr roh, und führt im günstigsten Falle doch nur dahin, dass das Herz nur wenige Secunden stillsteht.



rend; die Muskeln waren in diesen Fällen nicht starr. Bei Fröschen, welche man eine Zeit lang sehr intensiver Sonnenwärme (30–35 Grad C.) aussetzte, beobachtete man dasselbe. Du Bois fand, dass in einem Nerven, welcher den Strahlen eines stark glühenden Körpers ausgesetzt war, der Strom des Nerven sich umkehrte, und dass die normale Strömung wieder eintrat, wenn der Nerv, in Muskelfleisch gebettet, der Ruhe überlassen wurde. Es bestände demnach der Scheintod der Nerven in diesem Falle in einer verschiedenen Anordnung der Moleküle, ganz wie wir uns dies bei einem magnetischen und einem nicht magnetischen Eisen denken. Ich habe nun nicht gewagt, bei Säugethieren die Wärme auf die medulla oblong. zu appliciren, wohl aber beim Frosche, und hier fand sich denn, dass die Wärme, welche auf Gehirn und medulla eine Zeit lang einwirkte, das Thier in Scheintod versetzte, aus welchem es, in Wasser gesetzt, nach wenigen Minuten wieder erwachte.

Zu dem Ende wurde das Thier in ein feuchtes Tuch gehüllt und auf die freigelassene Schädeldecke ein ebenfalls angefeuchteter Leinwandbausch gelegt. Auf letzteren wurde dann ein mit heissem Sande angefülltes Probirgläschen gehalten. Letzteres wurde gewechselt, sobald es sich abgekühlt hatte. Nach längerer oder kürzerer Zeit schwindet nun bei einem solchen Thiere die Sensibilität der Haut, willkürliche wie Reflexbewegung, Pulsation des Herzens und der Lymphherzen. Setzt man es aber noch zeitig genug in Wasser, so kehrt es in unverhältnissmässig kurzer Zeit vollkommen zur Norm zurück.


Der Scheintod durch Zuschnüren der Trachea ist bekannt; ich gehe daher zu dem Scheintod durch Anhalten des Herzens über. Es ist durch Ed. Weber bekannt, dass man das Herz einmal durch Reizung der Vagi, ferner durch Compression der Brust zum Stillstande bringen kann; Donders ferner wies nach, dass eine sehr starke Inspiration allein schon genüge, um diesen Effect hervorzurufen. Bei Reizung der N. vagi ist nur der grosse Uebelstand, dass die Wirkung derselben schnell vorübergehend ist, und bei Sistirung des Her-

zens nach den anderen angegebenen Methoden hat man ein complicirtes Phänomen vor sich, da man Athmungsbewegung und Herzbewegung nur zu gleicher Zeit unterbrechen kann.

Es gelingt nun aber bei jungen Katzen, Hunden, Kaninchen, und ferner beim Frosche, durch Compression des Herzens mittelst der Finger, bei unverletztem Thorax und ohne Beeinträchtigung der Athembewegungen dies Organ zum Stillstand zu bringen.

Das Experiment lässt sich am besten ausführen bei den Katzen, da deren Thorax so gebaut ist, dass man ihr Herz vollkommen isoliren kann, sobald das Thier noch jung und die Rippen sehr nachgiebig sind.

Comprimirt man einer Katze mittelst der Finger der rechten Hand das Herz, so sieht man, dass im Anfange die Respirationsbewegungen vor sich gehen, das Zwerchfell zieht sich zusammen und das Thier schreit. Man beobachtet dann alsbald bedeutende Cyanose der Mund- und Nasenschleimhaut, welche schnell einer vollständigen Blässe Platz macht. Die Athembewegungen hören dann auf, die Pupille erweitert sich. Es verschwinden alle willkürlichen und Reflexionsbewegungen. Auscultirt man jetzt das Herz, welches



Es ist in sehr vieler Beziehung interessant, dass sich auch bei dem Hiob der Physiologie, dem Frosche, dasselbe wiederholen lässt. Zu dem Ende hülle man denselben in ein Tuch, drücke mit dem Daumen der linken Hand auf das Sternum, um das Herz hervorzuschieben und fasse dann das leicht zu fühlende Organ zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand. Man unterscheidet bei einiger Uebung leicht die einzelnen Theile des Herzens und halte nun nicht die Kammern zwischen den Fingern, sondern mehr die Vorkammern und Gefässe ¹⁾. Im Sommer, wo die Frösche nicht sehr lebhaft waren, trat meist nach 15 Minuten bereits Scheintod ein. Später, im September, musste man aber seine ganze Geduld zusammennehmen, um dasselbe Resultat zu erzielen, und that man dann besser, das Herz nach durchschnittenem Sternum zu unterbinden.

Es schwindet nun, bei sorgfältiger Beobachtung, die Sensibilität stets zuerst an den Zehen der hintern Extremitäten und sind dieselben nicht mehr im Stande, Reflexbewegungen einzuleiten, wenngleich die Reizung der Cornea noch Reflexe an den Angenliedern hervorruft. Die Lymphherzen hören sehr spät auf zu pulsiren und kann man ihre Bewegung noch wahrnehmen, wenn das Thier selbst auf Application des electrischen Reizes auf die Haut nicht mehr reagirt. Dennoch aber schwindet auch diese Bewegung, und das Thier giebt kein Lebenszeichen von sich. In der Schwimmhaut ist keine Spur von Circulation wahrzunehmen, die Capillaren sind nur sparsam mit an einander geballten Blutkörperchen gefüllt, die Arterien sind fast leer, die Venen zeigen den meisten Inhalt.

Lässt man nun das Herz frei, so bemerkt man, wie allmählig sich der Strom in der Schwimmhaut wieder herstellt, wie Arterien und Capillaren sich wieder füllen, wie der anfangs ganz langsame Strom immer schneller und schneller wird und endlich zur Norm zurückkehrt. Unter der Zeit ist

1) Durch langes Halten der Kammern zwischen den Fingern der Hand wurde in einigen Fällen Wärmestarre erzeugt.

Dr. Kunde:

aber auch der Frosch vollkommen wieder zu sich gekommen und hüpfte, wie vordem, herum.

Dieses Wiedererwachen des Thieres gehört zu den interessantesten Phänomenen die man beobachten kann, und geht oft mit überraschender Schnelligkeit vor sich. Hat man so lange gewartet, bis die Action der Lymphherzen verschwunden war, so dauert es längere Zeit, ehe das Thier wieder zu sich kommt.

Ich führe zur Erläuterung zwei Versuche an.

Versuch I. Um 11 Uhr 55' Herz comprimirt.

„ 12 „ 12' Keine Reflexe mehr.

„ 12 „ 25' Lymphherzen nicht mehr pulsirend. Herz freigelassen.

„ 1 „ 5' Herz und Lymphherzen wieder pulsirend.

„ 3 „ — Status normalis.

Versuch II. Um 11 Uhr 35' Herz unterbunden.

„ 12 „ 15' Scheintod. Ligatur gelöst.

„ 12 „ 20' Beginnende Reflexthätigkeit.

„ 12 „ 50' Status normalis.

Setzt man die Compression länger fort, oder löst man



fortleben kann, und setze dieser Erfahrung die meinige entgegen, dass nämlich dies niemals beobachtet wird, wenn man dem Frosche das Herz unterbindet oder comprimirt.

Forschen wir nun nach der Erklärung dieser schnellen Wirkung der Herzcompression, so bedarf es beim Säugethiere wohl nicht vieler Worte, da es an sich klar genug ist, dass das Thier zu Grunde gehen muss, sobald in Folge des Stillstandes des Herzens eine der Hauptbedingungen des Lebens fortfällt. Wir können daher mit Recht auf Bichat verweisen, welcher die verschiedenen Momente des allmählig eintretenden Todes in ihrer Reihenfolge zusammengestellt hat, und bemerken, dass allerdings, wie Bichat supponirt, aber durchaus nicht bewiesen hat, der Tod durch Stillstand des Herzens sich wesentlich in seinen Erscheinungen von dem durch Asphyxie unterscheidet. Der Sectionsbefund ist nach diesen beiden Todesarten ein total verschiedener, wie sich dies a priori schon denken lässt.

Schwieriger wird aber die Lösung der Frage: Weshalb stirbt der Frosch in kürzerer Zeit, wenn ihm das Herz comprimirt, als wenn ihm das Herz ausgeschnitten wurde? – Wir sollten glauben, der Blutverlust, verbunden mit der Eröffnung der Brusthöhle, müsste gerade umgekehrt, einen schnellen Tod herbeiführen. Diese Meinung wird noch mehr bestätigt durch die von Kilian ermittelte Thatsache, dass nämlich Nerven, welche sich in bluthaltenden Theilen verzweigen, ihre Erregbarkeit länger behalten als diejenigen, die sich in blutarmen oder blutleeren Theilen verbreiten. Derselbe Autor zeigte, dass ein Nerv, welcher seine Erregbarkeit eingebüsst hatte, sich in dem bluthaltenden Gewebe in kurzer Zeit wieder erholte, während der andre Nerv, der von blutarmen Theilen umgeben war, im todtten Zustande verharrte. Bei der Unterbindung des Herzens findet sich aber mehr Blut in den Theilen angehäuft, als bei dem Ausschneiden des Herzens. Wir haben demnach den nutritiven Effect des Blutes von vorn herein auszuschliessen, und werfen die Frage auf, ob nicht eine veränderte Spannung in den Gefässen einen grossen Einfluss auf die Functionen des Nervensystemes ausübe. Bei den

Säugethieren lässt sich diese Frage wohl schwer entscheiden, da man nicht im Stande ist, die Spannung im Gefäßsystem zu ändern, ohne gleichzeitig bedeutende Störungen in der Nutrition hervorzurufen. Man kann ferner durch Entziehung von Blut oder durch Injection desselben, durch Unterbindung von Venen und Arterien, eine verschiedene Spannung allerdings hervorrufen. Im Organismus des Säugethieres sind aber so viele compensatorische Momente in Betracht zu ziehen, dass wir dort unmöglich reine Resultate erwarten können.

Anders verhält es sich nun beim Frosche, an welchem wir, nach gänzlicher Elimination der Wirkungen des Blutgefäßsystems, in so fern die Spannungen in diesem Röhrenapparate in Betracht kommen, d. h. nach Ausschneidung des Herzens, noch im Stande sind, Untersuchungen über die Function der Nerven anzustellen. Ein vortreffliches Mittel besitzen wir dabei im Strychnin.

Schneiden wir einem Frosche das Herz aus und bringen ihm dann einige Tropfen einer salpetersauren Strychninlösung (gr. IV. auf aq. dest. 3 II.) auf das Rückenmark, so geräth das Thier, wie bekannt, nach kurzer Zeit in Tetanus.

Öffnet man einem Frosche die Wirbelsäule, tröpfelt



Versuch I: Ein Froscherhält durch den Mund 2 Tropfen der salpeters. Strychninlösung, um 10 Uhr 20'. Vollständiger Tetanus nach 2 Minuten. Das Herz wird comprimirt.

10 Uhr 40' Scheintod. Herz freigelassen.

10 „ 50' Tetanus.

3 „ 40' Tetanus noch immer fortbestehend. Herz comprimirt.

3 „ 55' Tetanus verschwunden. Herz freigelassen.

4 „ 12' Tetanus. Herz comprimirt.

4 „ 30' Tetanus verschwunden. Herz freigelassen.

4 „ 40' Tetanus, der bis um 7 Uhr beobachtet wurde.

Ich verstehe in diesen Fällen unter Tetanus den Zustand, in welchem ein Frosch bei der leisesten Berührung zusammenzuckt, und brauche ich wohl nicht zu erwähnen, dass dieser Tetanus sehr verschiedene Grade haben kann, deshalb aber doch nicht minder als Tetanus aufgefasst wird, wenn auch keine bedeutende Starre, noch bedeutender Krampf vorhanden sind. Im Anfange der Vergiftung trat nun immer sogenannter Starrkrampf ein, d. h. die Muskeln zogen sich so stark zusammen, dass sie sich hart anfühlten, später habe ich aber stets die gesteigerte Reflexthätigkeit oder besser die erhöhte Sensibilität in ihrer Erscheinung als tonische Zuckung mit dem Namen Tetanus bezeichnet. Die Frösche sind unfähig, sich willkürlich zu bewegen, denn jeder Versuch ruft allgemeine Zuckung hervor, und ein leichtes Klopfen auf den Tisch bewirkt dasselbe. Ich erwähne dies, um Missverständnissen vorzubeugen.

Versuch II. Ein Frosch erhält zwei Tropfen Strychninlösung durch den Mund. Sobald sich die ersten Spuren der Wirkung zeigen, wird das Herz comprimirt, und das Thier möglichst still gehalten. Es treten keine ferneren tetanischen Zuckungen ein während 5 Minuten. Das Herz wird nun losgelassen. Allgemeiner Tetanus nach 20 Sekunden. Herz comprimirt während 20 Minuten. Scheintod. Herz freigelassen. Nach 4 Minuten Zucken der Hinterzehen bei Kneipen des Unterkiefers. Nach 10 Minuten Zucken der Hinterzehen bei Kneipen der Arme. Nach 15 Minuten Zusammenfahren

des Körpers bei Berührung einer beliebigen Hautstelle. Nach 2 Stunden hat das Thier noch immer Tetanus.


Versuch III. Ein Frosch erhält einen Tropfen der Strychninlösung in die geöffnete Wirbelsäule. Dann wird ihm das Herz comprimirt. Nur selten ganz leise Zuckungen des Frosches. Scheintod nach 25 Minuten. Das Herz wird freigelassen. Vollständiger Tetanus nach 15 Minuten, welcher mehrere Stunden lang fortbesteht.

Dieser Versuch wurde jedesmal mit demselben Resultate wiederholt.

Versuch IV. Einem Frosche das Herz comprimirt bis zum Scheintode. Eröffnung der Wirbelsäule und Einträufelung von Strychninlösung. Ausschneidung des Herzens. Kein Tetanus.

Alle genannten Versuche wurden oft wiederholt.

Der Tetanus, welcher durch Harnstoff producirt worden (S. meine Arbeit über Wasserentziehung), verschwand, bei-
läufig gesagt, ebenfalls durch Herzcompression, um dann wieder zu erscheinen, wenn das Herz wieder zu schlagen anfang.
— Man wird aus dem Vorhergehenden nicht ohne Grund den Schluss machen, dass die Lähmung der Nerven, durch



siren fortfährt. Das Thier geräth in Scheintod, während das Herz noch stundenlang seine Pulsationen bewahrt. Da nun im Froschherzen kein Klappenapparat vorhanden ist, welcher den Einfluss der Herzcontraction auf den venösen Strom zu paralysiren im Stande ist, so schliessen wir, dass der Druck der elastischen Wände der Arterien ein ziemlich bedeutender sein müsse.

Es liegt ein Experiment von Fodéra vor, welcher sagt: Bei einem mit Strychnin narkotisirten Thiere kann man nach Willen die Convulsionen in diesem oder jenem Theile aufhören machen, wenn man das blossgelegte Rückenmark an der entsprechenden Stelle comprimirt.

Es wäre danach also möglich, dass eine vermehrte Spannung im Venensysteme dasselbe Resultat zur Folge haben könnte, so unwahrscheinlich dies auch auf den ersten Augenblick scheinen mag. Wenn diese Hypothese richtig wäre, dann müsste die Oeffnung des Rückenmarkkanales nebst seinen Gefässen offenbar diesen Druck aufheben. Man schneide nun aber einem Frosch den Kopf ab, vor oder hinter der Medulla oblongata und comprimire ihm dann das Herz, er wird dennoch die Sensibilität verlieren, die Lymphherzen werden aufhören zu pulsiren, er wird nicht mehr springen, und Alles wird wiederkehren, sobald man das Herz wieder pulsiren lässt.

Man mache folgenden Versuch:

Das Rückenmark eines Frosches wird ohne Verletzung der Wirbelkörper und bei möglichst geringer Blutung durchschnitten, und die Enden auseinander geschoben, so dass ein Zwischenraum von 1 Mm. zwischen ihnen bleibt. Es finden sogenannte Reflexbewegungen bei Kneipen der vorderen wie hinteren Extremität statt. Nun wird das Herz comprimirt, und die Bewegungen schwinden vorn wie hinten. Das Herz wird freigelassen und der Frosch geräth wieder in den Zustand wie vorher. So oft man das Experiment wiederholt, erhält man dasselbe Resultat. Hat man aber einen solchen Frosch scheinotdt gemacht und trennt die Wirbelsäule, oder trennt gänzlich die obere von der unteren Körperhälfte, so


kehren mit den Herzschlägen auch die Reflexbewegungen in der oberen Körperhälfte wieder. —

Ogleiches nach den Pflüger'schen Aufklärungen, die ich in jeder Hinsicht zu bestätigen im Stande bin, grausam ist, selbst an enthaupteten Fröschen zu experimentiren; so haben wir uns doch nicht enthalten können (Angesichts der Jäger, Fischer und Austernesser, welche Beine zerbrechen, Unterkiefer luxiren und lebendige Thiere zermalmen, Angesichts der Aalliebhaber und der bei lebendigem Leibe in siedendes Wasser geworfenen Crustaceen), diese Experimente fortzusetzen.

Ich erwähne daher, dass ein Frosch, welchen man während des Scheintodes nach Herzcompression in zwei Hälften theilt, in der oberen Hälfte, in welcher das Herz sich befindet, wieder in Kurzem Bewegungen zeigt, willkürliche und unwillkürliche, Athem- wie Augenliderbewegung, und dass man selbst in diesem verstümmelten Thiere Scheintod und Lösung desselben durch Compression des Herzens noch hervorzurufen im Stande ist. Ob das Gehirn vorhanden, ist hierbei ganz gleich.

Zur Erläuterung vorhergenannter Thatsachen diene noch folgender Versuch.

Einem Frosche wird der Kopf abgeschnitten bis hinter die




aber auf der andern Seite unmöglich diese Spannung als den einzigen Grund der schnellen Wirkung bei Anhalten des Herzens ansehen können. Wenn uns daher die Experimente am blutleeren Thiere bewiesen, dass die Strychninwirkung eintrete bei ausgeschnittenem Herzen, dagegen ausbleibe beim bluthaltigen Thiere mit comprimirtem Herzen, wenn ferner bewiesen wurde, dass die Compression des Herzens ihre Wirkung noch ausübe bei grossem Blutverluste, Eröffnung der Schädel- und Wirbelhöhle und wir somit nicht mit den bisherigen Erklärungen ausreichen, um die schnelle Wirkung der unterbrochenen Herzaction zu verstehen, so sei es mir erlaubt, einer Hypothese das Wort zu reden, welche von Bichat bereits mit folgenden Worten angedeutet wurde, und welche vielleicht im Stande ist, das Augenmerk auf ein nicht recht beachtetes Gebiet zu lenken; B. sagt, nachdem er über die Wirkungen des Austrittes von Flüssigkeit in die Hirnhöhle gesprochen; „Nach allem diesen kann man die Behauptung aufstellen, dass eins der Mittel, durch welches das Herz die Erscheinungen am Gehirn unter seiner Abhängigkeit erhält, in der fortwährenden Bewegung (*mouvement habituel*) besteht, welche diesem durch jenes mitgetheilt wird.“

Wenn wir nun bedenken, dass der Impuls der Blutwelle auf das Gehirn so bedeutend ist, dass er selbst dem Auge sichtbar wird, wenn wir bedenken, dass sich dieser Impuls auf das Centralnervensystem bei den Säugethieren 90–180,000Mal und öfter, innerhalb 24 Stunden wiederholt, so können wir unmöglich dies Moment als ein gleichgültiges ansehen. Sind es doch nur von aussen kommende Erschütterungen, welche die höheren Sinnesorgane anregen. Wir erinnern nur an die sehr sinnreiche Erzählung *Do v'e's*, welcher einen Menschen in ein dunkles Zimmer stellt, in welchem sich ein schwingender Körper befindet. Im Anfange kann nur das Gefühl erkennen, dass der Körper schwingt, bis die Schwingungen auf 33 in der Sekunde steigen. Jetzt beginnt das Ohr Kenntniss zu nehmen von der Anwesenheit des schwingenden Körpers; die Schwingungen nehmen zu; der Mensch beginnt zu sehen, die Farben des Prisma werden sich in seinem Auge verdrängen, zuletzt

wird er eine angenehme Wärme empfinden. Wir erinnern ferner an Thatsachen, wo durch grob mechanische Bewegungen der Aggregatzustand der Materie wesentlich verändert wird. Hierher gehört das von Liebig eruirte Factum, dass das Schmiedeeisen; aus welchem die Achsen der Eisenbahnen bestehen, durch die fortgesetzte Erschütterung in Guss-eisen verwandelt wird. Hierher gehört die Erscheinung, dass wenn eine verstöpselte, mit schwarzem Zinnober halb angefüllte Flasche an eine Säge gebunden wird, welche sich in der Minute mehrere hundert Male auf und abbewegt, innerhalb einer Stunde Alles in rothen (crystallisirten) Zinnober verwandelt ist.

Hierher gehört aber vor Allem die schöne und wichtige Entdeckung von Heidenhain, dass ein Nerv durch fortgesetzte mechanische Erschütterung in Tetanus versetzt werden könne.

Heidenhain ¹⁾ liess ein Elfenbeinhämmerchen die Nerven eines Froschschenkels hämmern, und versetzte denselben dadurch in den heftigsten Tetanus und bemerkt: „Es scheint nicht unwahrscheinlich, dass in den Primitivfasern mit jedem Hammerschlage eine Welle erzeugt wird, welche die zur Ent-



chen mit Gewalt durch die engsten Capillaren hindurchgetrieben werden. Man kann, je nachdem man das Herz functioniren lässt, dieses gewaltsame Durchtreten leicht sichtbar machen. Da wir nun bei allen Wirbelthieren Blutkörperchen vorfinden und das Centralnervensystem von Capillaren durchzogen ist, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass dies Hindurchpressen der Blutscheiben, zumal wenn es schnell geschieht, einen sog. integrierenden Reiz abgibt, der von Bedeutung sein möchte. Denn da die Kraft durch das Product der Masse in die Geschwindigkeit ausgedrückt wird, die Geschwindigkeit in den Capillaren aber nach den Wahrscheinlichkeitsrechnungen immerhin eine sehr bedeutende ist, so muss auch die Kraft, welche ein jedes Blutkörperchen beim Durchtritt durch ein Capillargefäss, dessen Durchmesser den seinigen nicht übertrifft, verliert, an die an das Capillarrohr grenzende Nervenmasse abgegeben werden. Die Blutscheiben wären demnach als Kraftträger des Herzimpulses anzusehen, welche den Choc des Herzens bis zu den innersten Theilen des Nervensystems zur Wirkung zu bringen im Stande sind.

Ich erwähne schliesslich noch einer Erscheinung, welche sich an die Beobachtungen von Kussmaul über das Verhalten der Iris bei gehemmter oder vermehrter Blutzufuhr anschliessen. Bei vortheilhaftem Thoraxbaue junger Kaninchen und Katzen gelingt es nämlich, bei einiger Uebung, das Herz plötzlich ganz vollständig zu comprimiren. In diesem Falle bemerkt man dann zuerst eine Verengerung der Iris. Dann treten (bei Kaninchen) bald stärkere, bald schwächere Rotationsbewegungen des Bulbus ein, die Gefässe der Iris werden blutleer, das Innere des Auges blass, nach wenigen Secunden beginnt aber schon die Iris sich zu dilatiren. Sobald die Dilatation eintritt, pflegen leichte Convulsionen sich einzustellen. Die Dilatation der Iris erreicht ihren höchsten Grad, der Bulbus tritt hervor bis zum vollständigen Exophthalmos, wenn man die Augenlider ein wenig aus einander hält. Unterbricht man die Compression des Herzens, so kann die Iris 15–20 Secunden lang in ihrer äussersten Dilatation verharren, und beginnt erst nach dieser Zeit, wenn das Herz wieder zu

pulsiren anfängt, sich zu contrahiren, um mit dem Erwachen des Thieres aus dem Scheintode zur Norm zurückzukehren. Ich erwähne nun aber ausdrücklich, dass ich als constantes Phänomen nur die Dilatation der Iris angeben kann, alle übrigen Erscheinungen lassen sich nicht immer mit Sicherheit hervorrufen und verweise ich daher auf Kussmaul's Untersuchungen. Es sei mir aber gestattet, ein paar Worte hinzuzufügen, welche bei Beobachtungen über Irisbewegungen zu berücksichtigen sein möchten:

Der Effect der Herzcompression ist eine sogenannte Ischaemie, und es ist klar, dass bei jeder Verminderung des Herzdruckes eine vermehrte Contraction der Arterien eintreten müsse. Da nun, wie Kussmaul zuerst gezeigt, eine Contraction der Arterien sich schliesslich in einer Erweiterung der Iris kund giebt, so muss ein jeder Einfluss, welcher die Herzbewegung herabstimmt, in den Bewegungsphänomenen der Iris seinen Ausdruck finden. Tiefe Inspiration wie Expiration vermindern die Druckkraft des Herzens. Es ist daher klar, dass in Folge derselben auch eine Erweiterung der Iris stattfinden müsse. Diese Erscheinung kann man in der That auch an sich selber beobachten. Bei jeder tiefen Inspi-

noch genug physiologisches Bewusstsein behielt, um sich selber zu beobachten, wird diese Bemerkung bestätigen können.

Aus allem Genannten geht hervor, dass man bei Versuchen über den Einfluss der verschiedenen Nerven auf die Bewegung der Iris, welche man an lebenden Thieren anstellt, sehr vorsichtig sein müsse, und dass die Fälle, in welchen man einen Einfluss des Willens auf die Iribewegungen beobachtet haben will, mit grossem Bedenken aufgenommen werden müssen.


Ueber die Elasticität feuchter organischer Gewebe

von

DR. WILHELM WUNDT.

In dem Nachfolgenden theile ich einige Ergebnisse einer Reihe von Versuchen mit über die Elasticität der thierischen Gewebe, insbesondere der Muskeln, die ich im Sommer 1856 in dem physiologischen Laboratorium des Herrn Prof. du Bois-Reymond, von demselben freundlichst mit Rath und That unterstützt, begonnen habe.

Bei seinen ähnlichen Untersuchungen ist Wertheim¹⁾ zu dem Resultat gelangt, dass die thierischen Gewebe sich von den starren unorganischen Körpern wesentlich darin unterscheiden, dass die Dehnung, die sie durch Gewichte erfahren




suchungen keinesweges als geschlossen betrachtet werden dürfe. Es lassen sich zunächst gegen die Untersuchungsmethode von Wertheim einige Einwände erheben. Erstens hat derselbe seine Versuche an den Geweben schon vor längerer Zeit gestorbener Individuen angestellt, ein Umstand, der namentlich bei der Muskelsubstanz ins Gewicht fällt, die während des Eintretens und der Lösung der Todtenstarre bedeutende Aenderungen in ihrer Elasticität erfährt. Zweitens hat Wertheim, wie es scheint, der Verdunstung nicht vorgebeugt; diese, die, wenn man allmählig von kleineren zu grösseren Belastungen übergeht, die späteren Dehnungen nothwendig verringert, ist selbst bei einer kürzeren Versuchszeit für die wasserreicheren Gewebe nicht zu vernachlässigen, da sie bedeutend zunimmt unter dem Einfluss grösserer Gewichte, indem diese die Flüssigkeit aus dem Gewebe herauspressen. Drittens hat vielleicht Wertheim der besondern Art, in der die Dehnung gespannter Muskeln erfolgt, und die von der durch Gewichte bewirkten Verlängerung starrer Körper sehr verschieden ist, zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die feuchten organischen Gewebe zeigen nämlich die Eigenthümlichkeit, dass sie nicht momentan mit der Einwirkung eines Gewichtes sich verlängern und dann in dieser neuen Form verbleiben, sondern sie dehnen sich, wenn die Belastung fortdauert, allmählig noch eine lange Zeit hindurch weiter aus. Es ist dieses Phänomen dieser sogenannten elastischen Nachwirkung bis jetzt nur von Wilh. Weber ¹⁾ bei Gelegenheit der Untersuchung der Seide genauer studirt worden.

Ausserdem, dass durch die nachträglichen Dehnungen leicht Fehler in der Messung entstehen können, da man ja nie absolut genau die momentan gesetzte Dehnung, sondern immer nur irgend eine der ersten Ordinaten der ganzen Dehnungskurve bestimmen wird, könnte man die Frage aufwerfen, ob überhaupt eine momentane Verlängerung von einer weitem Verlängerung strenge abzugrenzen sei, wenn, wie es

1) Poggendorff's Annalen, Bd. XXXIV. 1835 und LIV. 1841.

hier der Fall ist, die erstere in die letztere unmittelbar übergeht. Wo eine momentane Bewegung in eine kontinuierliche Bewegung übergeht, da kann, vorausgesetzt, dass beide durch dieselbe Ursache veranlasst sind, überhaupt von einer momentanen Bewegung nicht die Rede sein und die Messung der Grösse der Bewegung nach dem ersten Moment hat keine grössere Bedeutung als die Messung jeder beliebigen andern Ordinate der Curve der Bewegung ausser der letzten. Es liesse sich daher nur ein Fall denken, in welchem eine solche strenge Scheidung vollkommen gerechtfertigt wäre, wenn nämlich die spätere Verlängerung durch eine Abnahme des Elasticitätscoefficienten der untersuchten Substanz bedingt wäre, wenn also, wie schon angedeutet, die zweite Bewegung einer andern Ursache ihre Entstehung verdankt, als die erste. Dies wird dadurch widerlegt, dass der gedehnte Körper nach der Entlastung wieder zu derselben Länge zurückkehrt, die er hatte; dabei ist bemerkenswerth, dass, wie W. Weber für die Seide nachgewiesen hat, die zeitlichen Verkürzungen nach der Entlastung in derselben Reihenfolge auftreten, wie die zeitlichen Dehnungen nach der Belastung, so dass der betreffende Körper zur Verkürzung dieselbe Zeit braucht, die



begann deshalb die Untersuchung damit, erstens die endliche Grösse der Dehnung bei einer gewissen Belastung festzustellen und zweitens die zeitlichen Dehnungen in bestimmten Zeitzwischenräumen zu messen. — Bevor ich jedoch zur Mittheilung der hier erhaltenen Resultate übergehe, glaube ich die Methode der Messung, die ich angewandt habe, in der Kürze angeben zu müssen, damit beurtheilt werden könne, in wiefern überhaupt diesen Messungen Zutrauen zu schenken sei.


Bei Muskeln kleinerer Thiere (wie der Frösche) war der zur Befestigung und zur Belastung des Muskels dienende Apparat ein ähnlicher, wie ihn bereits R. Heidenhain¹⁾ zu seinen Versuchen über Muskeltonus angewandt und a. a. O. beschrieben hat. Die zwei grossen Vorzüge, durch welche dieser Apparat sich auszeichnet, sind: erstens die äusserst sichere Befestigung des Muskels mittelst eines stählernen Spiesses, der quer durch das obere Knochenstück gestossen wird, welches man, sowie das untere Knochenstück, an dem der Muskel sich ansetzt, erhält; zweitens die Vermeidung einer jeden Pendelschwankung an der Messungsvorrichtung, ohne dass dadurch ein der Ausdehnung des Gewebes sich widersetzender Reibungswiderstand veranlasst wird, was durch Glimmerflügel erzielt ist, die am unteren Ende des mittelst eines scharfen Hakens am unteren Knochenstück befestigten Stahlstabes befindlich sind und in Oel laufen. In der Nähe seines oberen Endes trägt der Stahlstab eine feine Skala.

Dieser Apparat, der gegen 7 Gramme wog, gab für viele der anzustellenden Versuche bereits an und für sich eine zu grosse Belastung ab. Ich verfertigte mir daher für diese folgende Vorrichtung: ein etwa $\frac{1}{2}$ Millim. dicker, oben und unten etwas umgebogener Schellackfaden wurde oben in einen kleinen S-förmigen Haken, welcher unverrückbar am Muskel befestigt war, eingehängt, und unten war mit demselben mittelst Seidenfäden eine kleine Wagschale verbunden; an der

1) Heidenhain, physiologische Studien. I. pag. 37 u. ff. (Taf. I.) Berlin, 1856.

Mitte des Bodens dieser letztern waren wieder einige Seidenfäden befestigt, welche die in einem Oelgefäss schwebenden Glimmerflügel trugen.

Für andere Gewebe, die keine so bequeme Befestigungspunkte darbieten, und für Muskelstücke grösserer Thiere nahm ich zwei Korkscheiben, auf deren sich zugekehrten Flächen die Querschnitte des zu untersuchenden Gewebstückes sorgfältig mit Siegellack oder Schellack angeheftet wurden. Die obere Korkscheibe war befestigt, die untere trug eine Oese aus Metalldraht, in welche der sonst angewandte Messungsapparat eingehängt wurde. Diese Befestigungsweise der Gewebe ist natürlich nur für geringe Belastungen berechnet, hier aber ist sie wohl jeder andern vorzuziehen, weil jede Vorrichtung, die einen Theil des zu befestigenden Stücks zugleich zusammenpresst, weichere Gewebe in einen nachgiebigen Brei verwandelt. Davon, dass die gemessene Verlängerung nicht von einem Losspringen des Lacks herrührt (was übrigens bei einiger Sorgfalt niemals begegnet), überzeugt man sich im Verlaufe der Versuche dadurch, dass die Verkürzung nach der Entlastung wieder dieselbe Grösse haben muss, wie die Verlängerung.



Belastungen nicht mehr messbar und machte also keine Correction in dieser Hinsicht nothwendig.


Ein unumgängliches Erforderniss ist, das dem Versuch unterworfenen Gewebe vor jeder Verdunstung zu schützen. Ich umgab dasselbe zu diesem Zweck mit einer dicken Lage feuchten Filtrirpapiers, die im ganzen Umfang etwa $\frac{1}{2}$ Zoll von ihm abstand, und die oben durch einen Bausch von dem gleichen Papier bedeckt war, so dass nur unten eine Oeffnung zum Durchlassen des Belastungsapparates blieb. Diese Vorrichtung konnte durch zeitweises Benetzen mit der Spritzflasche beliebig lange feucht erhalten werden, und die Gewebe erhielten sich darin mehrere Tage lang völlig unverändert.

Rücksichtlich der zeitlichen Dehnungen hat die vorliegende Untersuchung zu keinem für die Kenntniss der elastischen Nachwirkung hemerkenswerthen Resultat geführt, aus dem Grunde, weil die thierischen Gewebe in Hinsicht ihrer Elasticität allzu variable Gebilde sind, so dass die etwaige Gesetzmässigkeit, die in der Grösse der nachträglichen Dehnungen herrscht, bei der Kleinheit derselben überwogen wird von den geringen Schwankungen, die das Gewebe selbst immerwährend in seiner Elasticität erleidet. Ausser diesen geringen elastischen Schwankungen machen aber alle Gewebe nach dem Tode beträchtlichere Elasticitätsveränderungen durch. Diese Veränderungen folgen sich in längeren Zwischenräumen, es kann daher nur innerhalb einer gewissen Zeit die Elasticität als annähernd konstant betrachtet werden. Da nun die Dauer der elastischen Nachwirkung wächst mit der Grösse des betreffenden Gewichtes, so ist es klar, dass wir, um die Grösse der endlichen Dehnungen bestimmen zu können, auf kleine Gewichte beschränkt sind. Die in dieser Hinsicht angestellten Messungen haben das Resultat geliefert, dass die endliche Verlängerung der Gewebe proportional ist dem dehnenden Gewichte.

Zugleich geht aus den Versuchen hervor, dass, wenn man ein Gewebe successiv mit gleichen Gewichten belastet, bei jeder spätern Belastung eine grössere Zeit verfliesst bis die

endliche Verlängerung erreicht ist, und dass daher die ersten Verlängerungen bei grösseren Gewichten immer verhältnissmässig kleiner ausfallen.

Wenn wir also z. B. von der Curve der endlichen Dehnungen AB (s. die Figur), in der 2 Abscissentheile = 1 Gramm



sind, die drei Ordinaten, welche successiv = 0,272 Millim. = 0,254 Millim. und = 0,242 Millim. gefunden wurden, auf eine neue Ordinatenaxe BC projiciren und die Projectionslinien verlängern, so erhalten wir ein Coordinatensystem, in welchem die Ordinaten der Länge auf neue Abscissen, die jetzt die Zeiten bedeuten (1 Abscissentheil = 10 Minuten), bezogen

wurde, sondern nur bis sie in einer längeren Zeit (in einer Stunde) keine messbare Grösse mehr betrug oder zwischen Zu- und Abnahme schwankte. Ein hierdurch entstandener Fehler kann aber nur sehr klein sein, da die Dehnungen in der Zeit immer mehr abnehmen. Es schliessen sich wahrscheinlich die von der Ordinatenaxe BC nach rechts liegenden Curven asymptotisch den Abscissenachsen an und machen dabei geringe Biegungen nach auf- und abwärts von denselben.¹⁾

Da nach dem Gesagten die Grösse der bereits bestehenden Belastung von Einfluss ist auf die Grösse der momentanen Dehnung, so lässt sich diesem leicht vorbeugen, wenn man das Gewebe nicht successiv belastet, sondern vor jeder neuen Belastung wieder zu seiner vorigen Länge zurückkehren lässt. Es giebt dies zugleich ein Mittel an die Hand, die Elasticitätscoefficienten der verschiedenen Gewebe mit Leichtigkeit zu bestimmen, eine Bestimmung, die natürlich sehr langwierig und wegen der äusserst veränderlichen Beschaffenheit thierischer Theile sehr mühsam sein würde, wenn man immer das Ende der ganzen Dehnung abwarten müsste. Denn es ist klar, dass, wenn die nach einer unendlich kleinen Zeit gemessene Verlängerung der endlichen Verlängerung proportional ist, man ohne Rücksicht auf die etwaige Bedeutung der letztern, jedenfalls die erstere zur vergleichbaren Bestimmung des Elasticitätscoefficienten verwenden kann. Es zeigt sich nun in der That, dass innerhalb gewisser Grenzen der Belastung und von einer und derselben Länge aus bestimmt, auch die momentane Dehnung feuchter Gewebe dem Gewicht proportional ist. Von einigen, dem frisch geschlachteten Thier entnommenen Geweben folgt hier der für eine Belastung zwischen 1 und 10 Grammen und bei einer Temperatur zwischen 10 und 15 Grad C. bestimmte Elasticitäts-

1) Am schlagendsten wird der Beweis, dass die Abweichung der oben erhaltenen Zahlen von einander und von der seit dem Beginn des Versuchs verflossenen Zeit abhängt, dadurch geführt, dass wenn man umgekehrt von hohen zu niedrigen Belastungen übergeht, nun die Abweichungen ebenfalls sich umkehren.

modulus. Der letztere ist als dasjenige Gewicht in Grammen, welches die Länge eines Gewebstückes von 1 Quadratmillimeter Querschnitt verdoppeln würde, angenommen worden. Der Querschnitt ist aus der Länge, aus dem absoluten und dem auf 0 Grad reducirten specifischen Gewicht (zu dessen Bestimmung das Gewebe selbst unmittelbar nach dem Versuch verwandt wurde) berechnet worden:

Arterie 72,6.

Muskel 273,4.

Nerv 1090,5.

Sehne 1669,3.

Es ist schon bemerkt worden, dass das Gesetz der Proportionalität allerdings nur innerhalb enger Grenzen der Belastung gültig ist. Da nun jedes sehr kleine Stück einer Curve einer geraden Linie gleicht, so könnte man die gemessenen Werthe für die sich sehr nahe gelegenen Ordinaten irgend einer von der geraden Linie abweichenden Curve halten. Wollte man dies gelten lassen, so würde man übrigens keine regelmässige, etwa einer Hyperbel ähnliche Curve, sondern eine Curve mit mehreren Krümmungen erhalten. Dagegen ist es sehr zu beachten, dass die Grenzen innerhalb

Ich theile hier aus einer grossen Anzahl ähnlicher Versuche mit gleichem Resultate einige mit über die durch aufgelegte Gewichte an verschiedenen Geweben bewirkten momentanen Dehnungen; die Richtigkeit des Angegebenen wird daraus genugsam hervortreten. Nach jeder einzelnen Messung wurde rasch wieder entlastet, so dass der Körper immer zur selben Länge zurückkehrte.

1. Arterie (vom Kalb).

Länge 36,8 Millim. Temperatur 12° C.

Nr.	Belastung in gr.	Dehnung in Millim.	Nr.	Belastung in gr.	Dehnung in Millim.
1	1	0,120	6	2	0,240
2	2	0,244	7	1	0,120
3	5	0,660	8	2	0,236
4	1	0,110	9	5	0,640
5	10	1,340	10	2	0,260

2. Muskel (vom Rind).

Länge 49,5 Millim. Temperatur 12,5° C.

Nr.	Belastung in gr.	Dehnung in Millim.	Nr.	Belastung in gr.	Dehnung in Millim.
1	1	0,072	5	5	0,332
2	2	0,118	6	10	0,580
3	1	0,060	7	2	0,080
4	2	0,106	8	5	0,250

3. Muskel (vom Frosch) ¹⁾.

Länge 32,9 Millim. Temperatur 8° C.

Nr.	Belastung in gr.	Dehnung in Millim.	Nr.	Belastung in gr.	Dehnung in Millim.
1	1	0,101	7	10	0,860
2	2	0,180	8	1	0,060
3	1	0,090	9	2	0,160
4	2	0,160	10	5	0,440
5	1	0,080	11	1	0,060
6	5	0,460	12	20	1,360

1) Muskelgruppe des *Adductor magnus* und *Semimembranosus* Cuv.

4. Nerv (vom Kalb).

Länge 61,4 Millim. Temperatur 12,5° C.

Nr.	Belastung in gr.	Dehnung in Millim.	Nr.	Belastung in gr.	Dehnung in Millim.
1	1	0,058	5	2	0,092
2	2	0,108	6	10	0,440
3	5	0,260	7	1	0,040
4	1	0,044	8	5	0,222

5. Sehne (vom Kalb).

Länge 62,6 Millim. Temperatur 12,5° C.

Nr.	Belastung in gr.	Dehnung in Millim.	Nr.	Belastung in gr.	Dehnung in Millim.
1	1	0,020	5	10	0,260
2	2	0,040	6	1	0,020
3	5	0,120	7	2	0,040
4	2	0,040			

Zu den Veränderungen, die durch die öfteren Belastungen in der Elasticität hervorgebracht werden, die also in der Untersuchung selber begründet liegen, kommen bei den organischen Geweben noch andere, die diesen eigenthümlich

Bemerkungen über *Trachelius ovum* E.

von

PROF. GEGENBAUR in Jena.


(Aus brieflicher Mittheilung an den Herausgeber.)

Jena, den 14. Januar 1857.

Im verflossenen November kam mir ein Infusorium zu Gesicht, welches ich bei der ersten Betrachtung auf *Trachelius ovum* beziehen zu müssen glaubte, woran ich jedoch bald wieder Zweifel hegte, ohne aber eine bekannte Form auffinden zu können, mit der eine Uebereinstimmung existirte. Ich konnte dabei nur Ehrenberg und Dujardin zu Rathe ziehen. Die Umrisse stimmten mit *Trach. ovum*, auch die Gestalt des „Darmes“ verhielt sich im Allgemeinen so wie bei jenem. Die Längsreihen der Cilien sind aber viel zahlreicher als bei jenem, und unter der Cuticula, in der Körperwandung liegen zahlreiche, in regelmässigen Entfernungen angeordnete Bläschen eingebettet, die bei mittleren Vergrösserungen fast wie Kerne sich ausnehmen, in der That aber contractile Organe sind. Ihre Zahl schätze ich auf 50 bis 60. Sie sind nicht sphärisch, sondern scheibenförmig, contrahiren sich sehr langsam und von etwa 10, die man gleichzeitig überwachen konnte, fand ich immer nur 1–2 in Thätigkeit. In der Ehrenberg'schen Zeichnung von *Trach. ovum* findet sich etwas angegeben, was auf diese Organe bezogen werden kann. Etwas über der Mitte der Körperlänge liegt eine grosse, reich bewimperte Spalte, welche ich für den Mund ansehe. Sie führt mit einer taschenförmigen, gleichfalls wimpernden Verlängerung in ein feinkörniges, ziemlich die Länge des Thierchens durchziehendes Organ, welches bei den verschiedenen Exemplaren auch eine sehr

verschiedene Gestalt besitzt. Es liegt dieser Theil nie in der Mitte des Leibes, sondern immer einer Seite, da wo die Mundspalte sich findet, näher, zum Theil daselbst auch mit der Körperwandung verschmolzen. Zahlreiche Fortsätze aus hyaliner oder auch feinkörniger Substanz durchziehen von dem besagten „darmartigen“ Organe ausgehend die Leibeshöhle, und verschmelzen mit der hin und wieder beträchtlich verdickten Körperwand. Es sind diese Trabekel contractil. In der Hauptmasse des vom Munde ausgehenden und mit einem „Darme“ verglichenen Gebildes finde ich nicht selten Nahrungsballen eingeschlossen, und zwar stets in der hintern Körperhälfte, nie in der vorderen, wie denn auch die Richtung der taschenartigen Spalte nach abwärts geht. Zuweilen waren die Nahrungsballen im stumpfen Körperende angehäuft. Sie scheinen auch durch dünnere Trabekel passiren zu können, denn nicht selten umschloss ein solcher in der Mitte seiner Länge einen oft beträchtlich grossen Ballen.

Ich habe die balkenartige vom Munde aus den Körper durchziehende Substanz „Darm“ genannt, eben weil sich die Nahrung stets in ihr eingeschlossen findet, sonst sei aber kein weiterer Begriff damit verknüpft. Es besteht übrigens zwi-



lichen „Rüssels“; dort ist auch die Körperwand stärker verdickt, und verlängert sich in einen Trabekel, der entweder mit dem übrigen Trabekelsysteme nur mit einem sehr dünnen Aestchen in Verbindung steht, oder mit seinem Ende an der gegenüberstehenden Körperwand sich irgendwo inserirt. Die Oeffnung fand ich immer von gleichem Durchmesser, die sie umgebenden Cilien schlagen gegen sie. Sie führt in eine anfänglich etwas erweiterte und da starrwandige, dann trichterförmig zugespitzte, überall wimperlose Röhre, welche häufig zarte Längsfaltungen aufweist; die Röhre setzt sich in den erwähnten Trabekel fort.

Es hat diese Oeffnung und ihre Fortsetzung mit der von Ehrenberg bei *Trach. ovum* angegebenen Mündung nichts gemein als die Lage. Ich habe sehr viele Individuen und lange Zeit unter dem Mikroskop beobachtet, aber nie eine Erweiterung der Oeffnung gesehen; dagegen sah ich, obwohl selten, eine Erweiterung des trichterförmigen Kanalendes, so dass das Lumen der Oeffnung nach aussen an Weite gleichkam. Ich glaube dabei auch eine Oeffnung am Ende des Kanales gesehen zu haben, es schien eine Längsspalte, die sich nach einem Momente wieder schloss, und nachdem auch die Wände des Kanalendes sich an einander gelegt, keine Andeutung hinterliess. Die Verbindung des betreffenden Trabekelendes oft mit der gegenüberstehenden Körperwand, seine Zartheit, die es oft nur wie einen feinen Faden erscheinen lässt, die Beständigkeit der Grösse der äusseren Oeffnung, sowie der Umstand, dass in der Nähe, überhaupt im vordern Körperabschnitte niemals Nahrungsballen zu sehen waren, liess mich schliessen, dass diese vordere Oeffnung mit der Nahrungsaufnahme nichts zu schaffen habe.

Schon bei der Schilderung der Mundöffnung, des „Darmes“ und des Trabekelsystemes ist erwähnt worden, dass eine „Leibeshöhle“ vorhanden ist, und das halte ich nicht unwichtig zur Beurtheilung des Werthes dieses Geschöpfes. Die Leibeshöhle enthält niemals Nahrungsstoffe, und wenn diese auch von dem sog. „Darme“ und den Trabekeln aus in erstere hineinragen, so sind sie doch immer von einer

deutlich wahrnehmbaren Schicht fein molekulärer Leibessubstanz umhüllt. Die Leibeshöhle wird von einer klaren Flüssigkeit erfüllt, die niemals geformte Theile einschliesst. Ich halte diese Flüssigkeit für Wasser, und muss annehmen, dass dies durch den schon erwähnten Kanal eingelassen wurde. Ich habe solches nicht gesehen, und Fütterungsversuche mit Pigmenten waren ohne Erfolg, da wahrscheinlich die zarten um die kleine Oeffnung stehenden Cilien Molekeln den Eintritt verwehren. Dagegen bin ich zur Ueberzeugung gekommen, dass dennoch Wasser eingelassen wird.

Wenn ich nämlich längere Zeit hindurch ein in engem ~~Raum~~ eingesperrtes Thierchen beobachtet hatte, so traf es sich fast jedesmal, wenn ich es abwarten konnte, dass es plötzlich sich stark zusammenzog; die Trabekel verkürzten sich und die ursprünglich volle, pralle Form schrumpfte zu einer unförmig buchtigen und faltigen Masse ein. Ich glaubte nun die Itio in partes erfolgen zu sehen, fand aber bei fortgesetzter Beobachtung, dass nicht nur kein Theilchen sich von dem geschrumpften, offenbar weit unter die Hälfte verkleinerten Körper abtrennte, sondern dass die Thierchen auch fernerhin munter umherschwammen. Wie wenig ein solches

Die Nervi spheno-ethmoidales

von


PROF. H. LUSCHKA in Tübingen.

(Hierzu Taf. IX. Fig. 1—5.)

Einer aufmerksamen Nachforschung ist es ohne Zweifel nicht entgangen, dass die Auskleidung der Keilbeinhöhlen und der Siebbeinszellen der Nerven eben so wenig entbehre, als die Haut der Stirnbein- und der Oberkieferhöhlen. Allein die Quellen, wenigstens einzelner jener Nerven, haben sich der Beobachtung nicht minder entzogen, als die Bahnen, auf welchen sie an die Orte ihrer Bestimmung gelangen. Wenn man die sehr bedeutenden Schwierigkeiten einer allseitigen objectiven Darlegung der hier in Betrachtung kommenden Verhältnisse aus eigener Erfahrung kennen gelernt hat, dann kann es mindestens nicht befremden, dass über diesen Gegenstand bisher so wenig ermittelt worden ist. Da ich nicht glauben kann, dass sich viele Fachgenossen der zeitraubenden Arbeit unterziehen werden, welche zur eigenen Erzielung des vollen Resultates erforderlich ist, so will ich es nicht unterlassen, zum Behufe einer raschen und leichten Controlirung der wichtigsten Thatsachen das Nöthige vor auszuschicken.

Nach der bis jetzt geläufig gewesenen Ansicht, geht durch das Foramen ethmoidale posterius nur die Arterie gleichen Namens, ein dünnes Aestchen der Arteria ophthalmica, welches meist unter dem oberen schiefen Augenmuskel an jene Stelle seinen Weg nimmt. Nach den bisherigen, ganz allgemein gehaltenen Angaben gelangen Zweige des Gefässes in den vordersten Theil der Schädelhöhle zur Dura mater und zum obersten Theile der Nasenscheidewand, sowie in Zellen des Siebbeines. An gut injicirten Köpfen vermag man sich leicht davon zu überzeugen, dass einige feine Gefässchen der

genannten Arterie vom Foramen ethmoidale postic. aus unter den Seitentheil desjenigen Abschnittes vom Keilbeine ziehen, welcher an das hintere Ende der horizontalen Platte des Siebbeines angrenzt. Durch das hintere Siebbeinsloch treten aber von der Augenhöhle aus auch höchst feine Nervenfädchen, welche mit den bezüglichlichen Gefässen in starke fibröse Scheiden eingeschlossen, nachdem sie jene Lücke passiert haben, von der Dura mater gedeckt, unter den genannten Knochentheil verlaufen, um von dort aus in die Keilbeinhöhle und in hintere Siebbeinszellen einzutreten. Nach Ablösung der harten Hirnhaut wird man sofort überrascht werden durch verhältnissmässig starke, fibrös erscheinende Fortsätze, welche von dem Foramen ethmoidale post. an unter jenen Theil des Keilbeines treten und mit dessen Abtragung in weiterer Ausdehnung freigelegt werden. Behandelt man diese Fortsätze mit Essigsäure, dann wird das Mikroskop über ihren Gehalt an Nerven die bestimmtesten Aufschlüsse ertheilen. In vielen Fällen wird man sich auch an dem von der Orbita aus hervorgezogenen, gesammten Inhalt des Foramen ethmoidale post. über die Existenz von durchziehenden Nerven durch das Mikroskop in kürzester Zeit



hat. Mag diese Oeffnung inzwischen wie immer angebracht sein, stets führt sie in die Schädelhöhle und unter den seitlichen Theil desjenigen Abschnittes vom Keilbeine, welcher in der Incisura ethmoidalis des Stirnbeines, an das hintere Ende der Lamina cribrosa angrenzt.

Jener Seitentheil des vorderen Endes der oberen Fläche des Keilbeinskörpers ist nicht gleich dem mittleren Abschnitte desselben — der sog. Spina ethmoidalis — mit der Lamina cribrosa durch eine Naht verbunden, wie allgemein irrig gelehrt wird; sondern derselbe besitzt bei allen Menschen einen vorderen freien Rand und hat, in seiner Totalität betrachtet, häufig eine so exquisit flügelähnliche Gestalt, dass ich¹⁾ geglaubt habe, ihn als „ala minima“ des Keilbeines aufführen zu müssen.

Ofters werden von jenem freien Rande noch einige, dem Durchtritte der hintersten Riechnervenfäden dienenden Poren der Lamina cribrosa überlagert. Während der mittlere Theil des hinteren Randes der Siebplatte mit der sog. Spina ethmoidalis meist durch eine Naht in Verbindung, seltener in knöcherner Continuität steht, ist es der seitliche Theil jenes hinteren Randes, welcher sich an der Herstellung der oberen Wand einer Cella sphenoidalis des Siebbeines theilnimmt.


Ohne Ausnahme finden sich mehrere, höchst feine Oeffnungen unter jenem Seitentheile des Keilbeinskörpers, welche zu Knochenkanälchen führen, die in die Keilbeinhöhle und in hintere Zellen des Siebbeines ausmünden und durch Einführen von Schweinsborsten an jedem sauberen Kopfskelete bezeichnet werden können. In der Siebbeinhöhle trifft man es nicht selten, dass sie am Dache oder an der oberen Grenze der seitlichen Wand eine Strecke weit nach hinten ziehen, ohne jedoch im ganzen Verlaufe eine vollständige knöcherne Wandung zu besitzen.

Die Oeffnung, welche bei dem übrigens äusserst seltenen Mangel des Foramen ethmoidale posticum, dieses ersetzt, ist in einer sehr wechselnden Weise jedoch immer so placirt,

1) Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie.

dass die dasselbe durchsetzenden Bestandtheile unter jenen seitlichen Abschnitt des vorderen Randes der oberen Fläche des Keilbeinkörpers gelangen können. Meist findet sich die Ersatzöffnung mehr oder weniger tief unter dem oberen Rande der Papierplatte, in deren hinterster Region, oder liegt in der Sutura, welche durch den Zusammenstoss der Lamina papyracea und des Keilbeinkörpers gebildet wird. Diese beiderlei Oeffnungen oder auch nur eine derselben, pflegen indessen nicht selten auch neben der Existenz eines Foramen ethmoid. postic. vorzukommen, und dem Eintritte des einen oder andern Nervenfädchens in die Keilbeinhöhle dienlich zu sein.

Viel häufiger als der Mangel des hinteren Siebbeinloches kommt eine Uebersahl von Foramina ethmoidalia vor, in welchen Fällen dann meist drei vorhanden sind, von welchen das mittlere gewöhnlich ganz nahe an dem hinteren liegt. Wie ich der Betrachtung einer grossen Anzahl von Schädeln entnehme, kommen vier Foramina ethmoidalia nur äusserst selten vor. In einem dieser Fälle traf ich die hinterste Oeffnung im oberen Ende einer Naht, welche der sehr grosse Orbitalfortsatz des Gaumenbeines mit einer zwickelförmigen




er dreimal einen starken Nervenfasern gesehen habe, „der aus dem Meckel'schen Knoten seinen Ursprung nahm, senkrecht durch die untere Augenhöhlenspalte in die Augenhöhle trat, längs der inneren Wand und am hintersten Theile derselben, bedeckt vom inneren geraden Augenmuskel, in gerader Richtung aufwärts stieg und sich mit der Scheide des Sehnerven, nach seinem Eintritte in die Augenhöhle verband“: ist diese Entdeckung von mehreren Zergliederern zum Gegenstande näherer Prüfung gemacht worden. Die weitere Mittheilung Hirzel's, dass es ihm einmal selbst gelungen sei, diesen Nervenfasern bis in die Substanz des Sehnerven zu verfolgen, hat einer spätern Verwendung zum Aufbaue einer physiologischen Hypothese nicht entgehen können. Fr. Arnold¹⁾ nämlich meint: dass, da das Ganglion rhinicum durch Nervenfasern mit den Sehnerven in Zusammenhang stehe, wohl am naturgemässesten durch diese Verbindung das Niesen bei stark auf den Sehnerven und dessen Ausbreitung wirkendem Lichte gedeutet werde. Da nun aber, wie gezeigt werden soll, die Ergebnisse einer genauen anatomischen Untersuchung nicht zu Gunsten dieser Erklärungsweise der erfahrungsgemäss bei manchen Menschen wirklich vorkommenden Erscheinung sprechen, so wird man sich nothwendig zu einer andern Deutung des Vorganges bequemen und namentlich an die Möglichkeit einer Reflexwirkung vom Hirne aus denken müssen.

Nach dem Zeugnisse der überaus sparsamen Literatur, welche über die in Rede stehende Entdeckung vorliegt, vermochten einige Forscher sich von der Existenz jenes Nervenfadens überhaupt nicht zu überzeugen, während Andere, die seiner ansichtig wurden, sowohl über den Ursprung, als auch in Betreff der Endausbreitung getheilte Meinung sind. F. Arnold²⁾, welcher den Hirzel'schen Fasern nunmehr als „Orbitalfilamente des Nasenknotens“ aufführt, schildert diese

1) Lehrbuch der Physiologie der Menschen. 2. Thl. Abthl. 1. S. 228.

2) Handbuch der Anatomie des Menschen. Bd. II. Abthl. 2. S. 898.

als zahlreiche, sehr zarte Fäden, welche aus dem oberen Theile des Nasenknotens kommen, durch die untere Augenhöhlenspalte in die Orbita dringen und sich zur Scheide der Sehnerven und zur Periorbita, sowie vielleicht auch in's Keilbein begeben. Jener physiologischen Verwerthung zum Trotze hebt Arnold (a. a. O.) in einer Anmerkung hervor, dass er keine Verbindung mit dem Sehnerven selbst, sondern nur mit dessen Scheide habe nachweisen können. Nach Valentin's ¹⁾ Erfahrungen ist der Ursprung aus dem Nasenknoten mindestens nicht constant, sondern es finden sich in der Regel ein bis zwei Fädchen, welche von der äusseren Seite des Stammes des Oberkieferastes, meist nahe dem Ursprunge des Wangenhautnerven, oder aus diesem zum Theile selbst hervortreten. Die Fäden begeben sich an den Sehnerven, bald nach seinem Eintritte in die Augenhöhle, und zu dem denselben umgebenden Geflechte. Wenn Valentin in Rücksicht auf die letzteren Angaben in einer Note bemerkt: „Wie weit sich jene Fädchen ausdehnen, scheint mir variabel, da sie sich bisweilen ihrer äussersten Feinheit wegen schon bald nach ihrem Durchtritte durch die untere



Endigung jener Nerven in der Haut der Keilbeinshöhlen bekannt geworden sei.


Nicht allein die Differenzen in den Angaben über einen überhaupt noch wenig erforschten Punkt der Neurologie, haben mich zu einer sorgfältigen Prüfung desselben aufgefordert, sondern ganz besonders jene Entdeckung von Nervenröhrchen, welche ohne Ausnahme mit Gefässzweigen ihren Weg unter dem Seitentheil desjenigen Abschnittes vom Keilbeine nehmen, welcher an das hintere Ende der horizontalen Platte des Siebbeines angrenzt.

Nach Feststellung der letzteren Thatsache wurde die Untersuchung auf den Ursprung und auf die Endausbreitung der überaus feinen, mit blossem Auge kaum erkennbaren, mit dem Messer nur schwer isolirbaren Nervenfädchen hingelenkt. Meine gleich anfangs gehegte Vermuthung, dass es zum grössten Theile die so sehr controversen Hirzel'schen Filamente sein möchten, wurde im Verlaufe der Untersuchung auf das Vollkommenste bestätigt.

Anlangend ihren Ursprung, so konnte ich mich in Uebereinstimmung mit der Mehrzahl selbstständiger Beobachter davon überzeugen, dass nicht, wie Hirzel fand, nur ein, sondern mehrere, zwei bis drei, feinste, blendend weiss aussehende Fädchen vom obersten Theile des Nasenknotens ausgehen, und senkrecht emporsteigend, durch den innersten Theil der Fissura orbitalis inferior ihren Weg in die Augenhöhle nehmen. Die Nervenfädchen sind auch an höchst abgemagerten Leichen so sehr von fetthaltigem Zellstoffe und capillaren Blutgefässen umhüllt, dass man viele Mühe hat, sie rein darzustellen, mitunter sich auch nur unter Anwendung von Essigsäure von ihrer Existenz überzeugen kann. Bei der äussersten Feinheit der Nerven wird man vergeblich darnach forschen, einen wie grossen Antheil der Nasenknoten an ihrer Bildung habe, und in wie weit unmittelbare Elemente vom zweiten Aste des Quintus in sie eintreten. Genug, sie stehen unter allen Umständen, soweit meine jetzigen Beobachtungen reichen, mit dem Nasenknoten im Zusammenhange.

In der Augenhöhle verlaufen die Fädchen in der hintersten Region von deren innerer Wand meist in der Richtung der Sutura, welche den Zusammenstoss des hinteren Randes der Lamina papyracea des Siebbeines mit dem Keilbeine bezeichnet. Sie liegen gewöhnlich nicht auf der Periorbita, sondern sind von deren Gewebe umhüllt, und werden zunächst gedeckt vom hinteren Ende des oberen schiefen und des inneren geraden Augenmuskels, sowie durch den eben erst in die Augenhöhle getretenen Theil des Sehnerven resp. dessen Scheide. Mitunter durchsetzen die Nervchen das Gewebe dieser Gebilde so, dass man nur mit der grössten Mühe, und nachdem man den regelmässigen Verlauf und die gesetzmässige Endausbreitung derselben bereits kennen gelernt hat, vor der Täuschung bewahrt bleibt, als finden sie in diesen Gebilden, oder auch im Gewebe der Periorbita ihre Endigung.

Die Rami sphenothmoidales treten in der Regel nicht ausschliesslich durch das hintere Siebbeinsloch hindurch, sondern gelangen meist durch mehrere Oeffnungen in die bezüglichen Höhlen. In der Mehrzahl der Fälle sieht man ein Fädchen durch das Foramen ethmoidale posterius, ein zwei-




an einander liegenden Primitivröhrchen zusammengesetzt erscheinen. Welches ihre wahre Endigung im Gewebe der Schleimhaut ist, habe ich bis jetzt noch nicht ermitteln können.

2. Der Ramus spheno-ethmoidalis des Augennasennerven.

Vom Nerv. nasociliaris geht, aber nicht immer an der gleichen Stelle, ein meist nur 0,1 Mm. dickes, kaum 30 Primitivröhrchen enthaltendes Fädchen ab, welches zum Theil in die Keilbeinhöhle, zum Theil in eine der hinteren Siebbeinzellen dringt, um sich in deren Auskleidung zu verlieren. Das Nervchen ist meist in der Augenhöhle so sehr in Fett eingebettet, dass ich stets viele Mühe hatte, über seinen Ursprung und Verlauf Gewissheit zu erhalten. In den meisten Fällen entspringt das Nervenfädchen vom inneren Umfange des Nasociliaris da, wo dieser Ast des Quintus unter dem hinteren Abschnitte des oberen schiefen Augenmuskels hinwegzieht. Seinen Lauf nimmt das Fädchen im Zellstoffe unter diesem Muskel und gelangt dann über dem Ursprunge des inneren geraden Augenmuskels zum Foramen ethmoidale posterius. Bisweilen geschieht es, dass das Fädchen das Gewebe des einen oder anderen oder beider genannten Muskeln durchsetzt, um gleichwohl an seinen Bestimmungsort zu gelangen. Auf eine derlei Anomalie des Verlaufes ist wohl die paradoxe Angabe einiger Schriftsteller zu beziehen, derzufolge der Augennasennerv dem inneren geraden Augenmuskel Elemente ertheilt. Seltener entspringt das Nervchen vom Stamme des Nasociliaris kurz vor seiner Abgabe des Nerv. ethmoidalis, oder aus dem Anfange des letzteren Zweiges selbst. Es zieht in diesen Fällen entlang dem oberen Rande der Lamina papyracea des Siebbeines zum Foramen ethmoidale posticum oder zu einem stellvertretenden Loche in der hinteren Region der inneren Orbitalwand. Unter allen Umständen gelangt das Fädchen in Begleitung sehr zarter Blutgefäße und von einer dicken fibrösen Scheide umhüllt in die Schädelhöhle, wo es, von der Dura mater gedeckt, unter jenen Seitentheil des vorderen Randes

der oberen Fläche des Keilbeinkörpers zieht, um von da aus, ein- oder mehrmal sich spaltend, in die Haut hinterer Siebbeinzellen und der Keilbeinhöhle einzutreten.

Man darf dieses, der Beobachtung bisher gänzlich entgangene gesetzmässige Zweigchen der Nasenaugenerven nicht verwechseln mit einer zufälligen, in seltenen Fällen vorkommenden Nervenabweichung, der meines Wissens A. C. Bock ¹⁾ zuerst gedacht hat. Es findet sich, so berichtete der genannte Zergliederer, der Ethmoidalnerv bei manchen Subjecten doppelt. In diesen Fällen sind immer mehrere Ethmoidallöcher vorhanden und es tritt dann der überzählige Ethmoidalnerv durch das zweite Foramen ethmoidale ein, hat anfangs denselben Verlauf wie der gewöhnliche Ethmoidalis, bleibt aber in seiner weiteren Verbreitung bloss innerhalb der Nasenhöhle. Aus dieser Schilderung wird man leicht entnehmen können, dass es sich hier nicht um die Kenntniss des von mir soeben beschriebenen Zweiges handelt, sondern nur um zufällige Erfunde eines anomalen Laufes eines Nervenfadens, über dessen Endausbreitung ohnehin nichts Näheres angemerkt worden ist. Wenn ferner Valentin ²⁾ bei Gelegenheit der Beschreibung des Laufes des



menden Drüsen hingeführt, über welche näheren Bericht zu erstatten ich hier um so weniger unterlassen will, als von anderer Seite her so viel als Nichts über diesen Gegenstand in Erfahrung gebracht worden ist. Nach den Angaben fast aller Schriftsteller fehlen die Drüsen in den genannten Räumlichkeiten gänzlich. Es lehrt namentlich Sappey ¹⁾, welcher sich nächst Bowman am angelegentlichsten mit den Drüsen der inneren Nase beschäftigt hat: „Dans les cellules de l'ethmoïde on n'en trouve plus aucun vestige. C'est vainement que j'ai cherché les glandes dans les sinus sphénoïdaux etc.“ Krause ²⁾ führt dagegen von der Schleimhaut der Keilbeinhöhlen ganz im Allgemeinen an: die Schleimdrüsen seien vereinzelt und sehr klein — glandulae mucosae simplices von $\frac{1}{46}$ — $\frac{1}{7}$ ''' Dm. Nach der im allgemeinen Theile seines Werkes (S. 159) von Krause gegebenen Beschreibung sind jene Glandulae mucosae simplices einfache, kurze, kolbige Säckchen. Sie sind in ihrem mittleren Theile und Fundus ungefähr gleich lang als breit, jedenfalls nur sehr wenig länglich.

Solche Gebilde aber kommen nach meinen Beobachtungen in den bezeichneten Räumen nicht vor, wohl aber theils mannigfaltig verästelte Drüsenschläuche, theils Formen, welche sich dem Typus der traubenförmigen Drüsen annähern.

Die Drüsen sind in der Haut jener Höhlen äusserst sparsam und meist gruppenweise auf nur wenige Stellen vertheilt, so dass es leicht kommen mag, dass sie, wenn man nicht jeweils die ganze Auskleidung des bezüglichen Raumes durchforscht, ganz vermisst werden. Nur dadurch kann man auf den Ort ihres Vorkommens, der übrigens sehr wechselt, aufmerksam werden, dass man die gesammte Haut mit Essigsäure durchscheinend macht. Die Drüsen erscheinen jetzt als kleine, $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ Millim. breite, gelblich weisse Punkte, welche im Gewebe der Knochenhaut jener Höhlen ihren Sitz haben. Von ihnen hat man andere, beim erwachsenen Men-


1) Traité d'anatomie descriptive. Tome III. p. 744.

2) Handbuch der Anatomie. 2. Aufl. S. 555.

schen niemals fehlende, öfter in collossaler Anzahl vorhandene, jedoch unregelmässig weissliche Flecken zu unterscheiden, welche aus einer dichten Gruppierung mehr oder weniger deutlich geschichteter Körperchen bestehen, die mit der organischen Grundlage der Hirnsandkörnchen oft nach der morphotischen und chemischen Seite hin die grösste Aehnlichkeit zu erkennen geben.

Als einfachste Formen jener Drüsen finden sich Schläuche, die jedoch niemals einfach sind, sondern kolbig beginnend, da und dort meist alternirend gestellte, theils rundliche, knospenartige, theils mehr in die Länge gezogene Ausläufer besitzen, nicht selten aber auch ausgezeichnet verästigt sind. Oefter begegnet man zweitens Formen, welche an die Gestalt sehr zusammengesetzter Talgdrüsen erinnern und längliche, an ihren Anfängen dicke, kolbige, aber nur lose an einander hängende Acini zeigen, welche durch mehr oder weniger verjüngte Enden, zu einem langen, gemeinschaftlichen Ausführungsgange zusammenfliessen. In diesen münden nicht selten während seines Verlaufes da und dort knospenähnliche Schläuche ein.

Als die zusammengesetzteste Form fand ich Drüsen, die



scheiden, welche bei älteren Personen mitunter die bedeutende Dicke von 0,004 Mm. erreicht, und dabei glashell und gegen Aetzkali und Essigsäure nur wenig empfindlich ist. Als Inhalt dieser Drüsen konnte ich bis jetzt nur eine dunkle moleculare Masse mit einzelnen Zellen, nicht aber ein bestimmt ausgeprägtes Epithelium wahrnehmen.

Bemerkenswerth sind auch an diesen Drüsen, gleichwie an jenen in der Oberkieferhöhle, die, wie es scheint, nicht seltenen Umwandlungen derselben in Cysten, sei es durch nur stellenweise Ausbuchtungen bedingt, oder durch Ausdehnung einer ganzen Drüse nach Verschluss ihres Ausführungsganges. Zwei in letzterer Weise entstandene Cysten habe ich jüngst in der Keilbeinhöhle der linken Seite eines 21jährigen, übrigens ganz gesund gewesenen Selbstmörders vorgefunden. Die Blasen hatten die Grösse eines Hanfsaamens und enthielten eine schleimartige Substanz. Bei einem 60jährigen Manne sah ich in der Keilbeinhöhle der rechten Seite eine etwas grössere Cyste mit käseartiger Masse angefüllt, und nebstdem einen von der hinteren Wand der Höhle ausgegangenen polypenartigen Auswuchs. Er war weich, saftig, abgerundet, mit breiter Basis aufsitzend, vom Umfange einer mittleren Bohne. Der manchen sog. Schleimpolypen der Hauptnasenhöhle ähnliche Auswuchs zeigte im Inneren ein sehr lockeres Bindegewebsgerüste, dessen weite Maschenräume von einer wie gallertartigen Substanz durchsetzt waren.

Erklärung der Abbildungen.


Fig. 1. Senkrechter Durchschnitt der rechten Oberkinnlade und Augenhöhle im geraden Durchmesser. Die bildliche Darlegung der hier in Rede stehenden Nervenfädchen kann nur durch Uebertragung der bezüglichen Nerven von noch mit anderweitigen Weichtheilen versehenen Präparaten auf das entsprechende, in geeigneter Weise hergestellte Skeletstück zum schnellen und leichten Verständnisse gebracht werden.

In der Tiefe der Flügelgaumengrube sieht man hier den Nasen-

3. knoten (a). Von dessen oberem Ende gehen zwei Rami sphenothmoidales ab, von welchem der eine (b) bei dem der Abbildung zu Grunde gelegten Präparate, ungetheilt durch das Foramen ethmoidale post. getreten ist; der andere (c) aber sich in zwei Fädchen getheilt hat, von welchen eines durch eine feinste Oeffnung am hintersten Ende der Papierplatte in eine hintere Siebbeinzelle eingetreten ist, das zweite dagegen durch die Naht zwischen Keilbeinskörper und Lamina papyracea seinen Weg direkt in die Keilbeinschöhle genommen hat. Mit dem hinteren Ende des Nasenknotens steht der durch die Eröffnung des bezüglichen Knochenkanals freigelegte Vidische Nerve (d) im Zusammenhange, während an seinem unteren Ende Gaumnennerven (e) zum Vorscheine kommen. Nach vorn erkennt man den Zusammenhang des Knotens mit dem zweiten Aste (f) an der Stelle, an welcher im vorliegenden Falle die Theilung in den N. maxillaris sup. (g) und in den Nervus pterygo-palat. (h) unter Bildung des Plexus sphenopalatinus statthatte.

Der Nervus oculonasalis (i) entsendet aus seinem hinteren Abschnitte den überaus feinen Ramus sphenothmoidalis (k), welcher sich durch das Foramen ethmoidale posticum in die Schädelhöhle und von da, unter dem Seitentheile des vorderen Randes der oberen Fläche des Keilbeinskörpers in den Sinus sphenoidalis und in eine hintere Siebbeinzelle begiebt.

Fig. 2. stellt einen Theil des Daches der Augenhöhle, der Siebplatte und des Keilbeinskörpers der linken Seite dar. Die Abbildung soll das Verhältnisse des vorderen Endes des oberen



Ueber eine gegliederte Verbindung des Knorpels mit dem Knochen der ersten Rippe

von

PROF. H. LUSCHKA in Tübingen.

(Hierzu Taf. IX. Fig. 6.)

Wenn ich die folgende, unter allen Umständen höchst beachtenswerthe Anomalie zur Kenntniss bringe, so geschieht es nicht sowohl der Seltenheit ihres Vorkommens wegen, als vielmehr in Rücksicht auf die festere Begründung eines Gesetzes bei der Bildung der wahren Rippen, welches noch nicht allerwärts richtig erfasst worden ist.

Man hat sich völlig daran gewöhnt, die Knorpel nicht nur der falschen, sondern auch jene der wahren, d. i. mit dem Brustbeine in direkter Verbindung stehenden Rippen, als unverknöcherte, vergrößerte Reste der primordialen Knorpelrippen, d. h. als colossal entwickelte Gelenksknorpel der Rippen anzusehen. Und doch ist nichts irriger als diese Ansicht. Bruch ¹⁾ hat es, wie es scheint, zuerst genau erkannt und bestimmt ausgesprochen, dass die Knorpel der wahren Rippen beim Foetus als gesonderte Knorpelkerne auftreten. Erst beim zwei Zoll langen Rindsfoetus stossen sie nach Bruch's Wahrnehmungen einerseits mit dem Brustbeine, andererseits mit den Rippenkörpern zusammen, während dagegen die Knorpel der falschen Rippen dieses Verhalten nicht zu erkennen geben, sondern von vorn herein in der Bedeutung von Apophysen auftreten.

Die Substanz, welche die Uranlage der Knorpel der wahren Rippen mit dem Brustbeine und mit den Rippenkörpern

1) Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Knochensystems S. 15.

verbindet, ist dasselbe allgemeine Bildungsgewebe, d. h. Bildungszellen, welche überall zwischen diejenigen primordialen Skeletstücke eingelagert erscheint, welche auch nach der Verknöcherung gesondert, theils in ungegliederter, theils in gegliederter Verbindung fortbestehen. Bei ihrem ersten Auftreten sind die Knorpel der wahren Rippen durch eine deutlich von ihnen unterscheidbare Zellenmasse nicht weniger von den knorpelig vorgebildeten Rippenkörpern abgegrenzt, als diese durch eine eben solche Masse von den Wirbelkörpern geschieden werden. Mit der letzteren Wahrnehmung steht Rathke's¹⁾ Angabe insofern im Widerspruche, als dieser Beobachter lehrt: die Rippen wachsen aus der Masse, welche zunächst für die Wirbel als Grundlage dient, strahlenförmig hervor, und sie gliedern sich später erst in der Weise ab, dass eine Unterbrechung der Knorpelmasse entstehe und sich Bandmasse ausbilde. Wie schliesslich eine Gelenkhöhle zu Stande komme, darüber wird von Rathke nichts berichtet. Als eine bemerkenswerthe Ausnahme wird es von Rathke bezeichnet, dass bei den Schildkröten keine Abgliederung der Rippen von den Wirbeln erfolge, sondern dass bei diesen Thieren für immer die Rippen mit den Wir-

ihr Knorpel unter völligem Schwunde der an seinen Enden ursprünglich angelagert gewesenen Bildungszellen, mit dem Handgriffe des Brustbeines und mit dem Rippenkörper in einen festen Verband gelangt. In Ausnahmefällen aber kann es geschehen, dass entweder schon sehr frühe, durch theilweise Schmelzung von Bildungszellen eine Gelenkhöhle entsteht, oder erst später, nachdem dieselben vorher eine Umgestaltung in eine Bandmasse erfahren haben, welche sodann von der Mitte aus zu einer synovialen, von faserknorpeligem Gewebe umschlossenen Flüssigkeit zerfällt.

So sehr es mit der Bildungsgeschichte im Einklange stünde, dass die Knorpel aller wahren Rippen unter Umständen nicht nur mit ihrem inneren, sondern auch mit ihrem äusseren Ende in eine gegliederte Verbindung treten, so liegen Wahrnehmungen dieser zweierlei Articulation nur für die erste Rippe vor.

Ueber gegliederte Verbindung des Knorpels der ersten Rippe mit dem Brustbeine hat in jüngerer Zeit W. Gruber¹⁾ einen Fall mitgetheilt. Bei einem weiblichen Individuum aus dem vorgerückteren Alter war auf beiden Seiten der Knorpel der ersten Rippe gegen das Brustbeinende hin viel breiter und nahm fast den ganzen Seitenrand des Manubrii sterni ein. Der Handgriff des Brustbeines besass rechterseits eine einfache, linkerseits eine doppelte, durch ein Lig. interarticulare getrennte Gelenkzelle. Die Knorpel des ersten Rippenpaares waren durch eine sehr deutliche Kapselmembran mit dem Brustbeine in Verbindung gesetzt.

Ueber gegliederte Verbindung des Knorpels mit dem Knochen der ersten Rippe ist bis jetzt, meines Wissens, noch keinerlei Wahrnehmung in der Literatur niedergelegt, und dürfte schon deshalb unsere Beobachtung der Mittheilung werth befunden werden.

An der Leiche eines 55 Jahre alten, kräftigen, durchaus regelmässig gebauten Mannes, war auf beiden Seiten der in feste Knochensubstanz übergegangene Knorpel

1) Neue Anomalien. Leipzig 1849. S. 5

der ersten Rippe durch sein äusseres Ende mit dem legitimen Rippenknochen durch ein wahres Gelenk verbunden, mit dem Handgriffe des Brustbeines aber durch eine Art von Synchronrose fester vereinigt. Bei der ersten Betrachtung des seltsamen Erfundes wurde ich nicht sofort auf den Gedanken geleitet, in ihm eine auf die Entwicklungsgeschichte zurückführbare Gelenkbildung zu erkennen, sondern glaubte eine Pseudarthrose als Folge eines Rippenbruches vor Augen zu haben. Diese Ansicht konnte jedoch nicht als stichhaltig befunden werden, nachdem ich mich von der auf beiden Seiten völlig übereinstimmenden Lage und Beschaffenheit des Gelenkes und davon überzeugt hatte, dass auch der beiderseitige Zusammenhang mit dem Brustbeine in ganz gleicher Weise hergestellt war, abgesehen von der kaum denkbaren Einwirkung einer Gewalt, welche den Zusammenhang auf beiden Seiten an ganz entsprechenden Stellen hätte aufheben können.

Die Gelenksverbindung zeigte, obgleich eine nur sehr geringe Beweglichkeit nachzuweisen war, in sehr scharfer Ausprägung die wesentlichsten Attribute einer Articulation, eine Höhle nämlich, Knorpelüberzüge der an einander gren-

nen die Knorpelplatten unter einander verwachsen und waren überdies ausser durch das Gewebe des gewöhnlichen Periosteum noch durch einzelne, deutlicher hervortretende Faserzüge fester verbunden. Von einer Synovialmembran oder in die Höhle hereinragenden gefässhaltigen Zellen vermochte ich keine Andeutung zu erkennen, und muss demgemäss die ganze Formation als ein auf halbem Wege der Entwicklung stehen gebliebenes d. h. als ein Halbgelenk bezeichnen.

An der Stelle des Zusammenstosses des Knorpels mit dem Handgriffe des Brustbeines liess sich nach vollständiger Entfernung der Knochenhaut eine unregelmässig wellenförmige, durch ein weisses Fasergewebe bezeichnete Grenzlinie erkennen. Es besteht auch hier kein Continuitätsverhältniss zwischen Handgriff des Brustbeines und erster Rippe, während sich dieses in gewöhnlichen Fällen um so deutlicher ausgesprochen zeigt, je weiter im Rippenknorpel die Verknöcherung vorgeschritten ist. Jenes Fasergewebe, welches übrigens eine sehr feste, ganz und gar unbewegliche Verbindung vermittelte, besass kaum eine Dicke von 1 Millim. und enthielt in einem Fasergerüste von sehr verworrenem Verlaufe seiner Elemente eine bedeutende Anzahl Knorpelzellen von sehr wechselnder Grösse und namentlich ausserordentlich verschiedener Dicke der Wandungen.


Nach den obigen Erörterungen wird es wohl nicht angezweifelt werden können, dass die letztere Verbindungsweise das Aequivalent jener zwischen dem äusseren Ende des Knorpels und Knochens der Rippe vorfindlichen darstellt, und dass sie als diejenige Stufe der Gelenksbildung erscheint, in welcher es noch zu keinerlei Verflüssigung gekommen ist.

Erklärung der Abbildung.

Handgriff des Brustbeines mit den vorderen Abschnitten des ersten Rippenpaares, von einem 55 Jahre alten Manne. Die Knochenhaut ist abgelöst und von den Stellen der Verbindungen des verknöcherten Knorpels (a. a) soviel durch die Feile entfernt worden, als zur ge-

neuen Erforschung aller Verhältnisse derselben nöthig erschien. Das zwischen Knochen und Knorpel der Rippe jederseits befindliche Gelenk besitzt eine spaltförmige Höhle (b. b); Gelenksknorpel (c. c. c. c) und Faserbänder, von welchen hier das am stärksten ausgeprägte, am oberen Umfange befindliche (d. d) dargestellt ist.

Der Zusammenstoss des Knorpels der ersten Rippe mit dem Handgriffe des Brustbeines geschieht durch eine Synchronrose durch Vermittelung einer dünnen, aus dichtem Faserknorpelgewebe bestehenden Substanz, welche sich auf beiden Seiten an der gleichen Stelle in Form einer unregelmässig wellenförmigen, weissen Linie (e. e) präsentirt.



Ueber den Rippenursprung des Zwerchfelles

von


PROF. H. LUSCHKA in Tübingen.

(Hiezu Taf. X.)

Es besteht zwischen dem Rippentheile des Zwerchfelles und dem queren Bauchmuskel eine so innige Beziehung, dass das Verständniss des einen Muskels ohne Berücksichtigung des andern schlechterdings nicht möglich ist. Wenn wir daher die sog. Pars costalis des Zwerchfelles zum Gegenstande einer besonderen Untersuchung machen, so werden wir es nur bei steter Rücksicht auf den Ursprung des queren Bauchmuskels mit Erfolg thun können. Die bei den meisten Schriftstellern überaus mangelhafte Beschreibung des Ursprunges der Pars costalis hat ohne Zweifel in der ungenügenden, nur ganz allgemein gehaltenen Betrachtung dieser Beziehungen hauptsächlich ihren Grund. Folgt man der unsern Gegenstand betreffenden Literatur, dann erscheint es auffallend genug, dass seit Albin's noch am meisten mit der Natur übereinstimmender Schilderung, die Angaben der Schriftsteller, mit wenigen Ausnahmen, theils von der Wahrheit immer mehr abgewichen, theils so unvollständig sind, dass sie keineswegs eine zureichende Vorstellung von den bestehenden Verhältnissen gewähren können. Wenige Beispiele werden Angesichts der späteren Erörterungen genügen die Richtigkeit dieser Behauptung festzustellen. Bei J. Fr. Meckel ¹⁾ beschränkte sich die ganze Beschreibung auf die Angabe: „der Rippentheil heftet sich immer mit rundlichen,

1) Handbuch der menschl. Anatomie. 1816. Bd. II. S. 460.

mehr oder weniger deutlich getrennten, bisweilen gespaltenen Zipfeln an die innere Fläche der Knorpel der siebenten bis elften Rippe, die innere Fläche der ganzen zwölften und fließt gewöhnlich ununterbrochen mit dem ihm von vorn entgegenkommenden hinteren Rande des queren Bauchmuskels zusammen.“ Nach Hildebrandt-Weber¹⁾ ist der Rippentheil an jeder Seite mit vier fleischigen Enden an der inneren Fläche der sechs unteren Rippen theils ihres Knorpels, theils des angrenzenden vorderen Endes ihres Knochens befestigt. Ohne alle weiteren Details wird ferner bemerkt: „es hänge an den vier unteren Rippen die Pars costalis mit dem Transversus abdominis zusammen.“ Krause's²⁾ Angaben zufolge entspringt der Rippentheil des Zwerchfelles fleischig und dick von der inneren Fläche der 12. Rippe, vom Arcus tendineus fasciae lumbodorsalis, von der inneren Fläche der Knorpel der sechs untersten Rippen vermittelt mehrerer Zacken, die mit denen der MM. transversus abdominis und triangularis sterni zusammenhängen. Nicht förderlicher ist Arnolds³⁾ Schilderung, wenn er lehrt: „der Rippentheil entstehe von der Innenfläche der Knorpel der sechs unteren Rippen, des Körpers der 12. Rippe und des Lendenrippen-



1. Die Pars costalis der 7., 8., 9. Rippe.

Es ist bezeichnend für diesen Abschnitt des Zwerchfelles, dass er mit drei, an ihrem Ursprunge gesonderten, breiten, platten, fast durchgreifend fleischig angehefteten Portionen von den genannten Rippen abgeht und normalmässig nirgends mit Elementen des queren Bauchmuskels in Continuität steht, sondern von einer wechselnden Anzahl von Fleischbündeln desselben, gleichwie von Zähnen eines Kammes durchsetzt wird. Die drei Portionen stehen an ihrer unteren Grenze nicht in einer fortlaufenden Linie, sondern erheben sich terrassenförmig über einander, jedoch so, dass jede einzelne im Wesentlichen mit ihrem unteren Rande der Biegung des bezüglichen Rippenstückes folgt.


Zum näheren Verständnisse der ganzen Anordnung müssen wir zuerst eine jede Portion besonders betrachten, sodann die Gesamtheit in ihrem Verhältnisse zur Nachbarschaft untersuchen.

Die Zwerchfellsportion der 7. Rippe hat beim erwachsenen Menschen eine durchschnittliche Breite von vier Querfingern und ist, wenn man den Knorpel der siebenten Rippe in vier gleiche Theile theilt, an den zwei mittleren desselben befestigt. Die Insertion geschieht rein fleischig mit vier platten Bündeln, die am Ursprunge durch drei Spältchen von einander getrennt sind, welche dem Durchtritte von Zacken des queren Bauchmuskels dienen. Das oberste jener Bündel ist das breiteste und läuft in seinem Ursprunge allmähig an der inneren Seite des Knorpels, vom unteren Rande desselben gegen den oberen zurück. Die übrigen Bündel liegen an der inneren Fläche des Knorpels dem unteren Rande näher als dem oberen. Sehr häufig treten einzelne dünne Fleischbündelchen über den inneren Umfang der zwischen dem Knorpel der 7. und 8. Rippe befindlichen Gelenksverbindung herab, um sich am oberen Rande des Knorpels der letzteren Rippe zu befestigen. Die Faserung daselbst hat dann meist eine von jener der übrigen Portion etwas verschiedene Rich-

tung, wodurch der Anschein von zweierlei Muskelschichten begründet werden kann.

Die Zwerchfellsportion der 8. Rippe ist meist nur drei Querfinger breit und zerfällt an der Stelle ihres Ursprunges in vier platte Fleischbündel, deren Sonderung ebenfalls vom Durchtritte von Zacken des queren Bauchmuskels herrührt. Ziemlich genau entspricht in der Regel die Anheftung dieser Portion der hinteren Hälfte des Knorpels der achten Rippe, an deren innerer Fläche sich die Fleischfasern bis hart an die Grenze zwischen Knorpel und Knochen erstrecken.

Die Zwerchfellsportion der 9. Rippe bietet durchschnittlich die Breite der vorigen dar und zerfällt auch gewöhnlich am Ursprunge in vier durch Spalten für Zacken des Transversus abdominis von einander geschiedene Bündel. Sehr wesentlich unterscheidet sich aber dieselbe ausnahmslos dadurch, dass sie nicht bloss mit dem Knorpel, sondern auch mit dem Knochen der Rippe zusammenhängt. Sie entspringt nämlich einerseits von der inneren Fläche der hinteren Hälfte des Knorpels dieser Rippe und zwar in der Nähe ihrer oberen Grenze; andererseits vom Knochen der-



Beziehungen desselben zur Pars sternalis diaphrag., zum dreieckigen Brustmuskel und zum queren Bauchmuskel.


Das oberste vom Knorpel der siebenten Rippe abgehende Fleischbündel zieht in schwacher Biegung gegen die Mittellinie, um sich, mit dem Brustbeintheile des Zwerchfelles zusammenfliessend, im vorderen Ende des Centr. tendineum zu verlieren. Beide Theile begrenzen mit den einander zugekehrten Rändern eine dreiseitige, schief von vorn nach hinten und oben ansteigende Spalte, deren Basis der vorderen Brustwand, deren Spitze der sehnigen Mitte des Zwerchfelles zugekehrt ist. Die Grösse dieser, von lockerem Zellstoffe eingenommenen Lücke, durch welche Vasa mammaria ihren Weg nehmen, wechselt sehr und ist vor allem vom Grade der Entwicklung der Pars sternalis abhängig. Diese stellt in der Mehrzahl der Fälle einen conischen, beim Erwachsenen in maximo zollbreiten Fleischzipfel dar, welcher an der inneren Fläche des Schwertfortsatzes in der Nähe seines unteren Randes entspringt und in den vordersten Theil des Centrum tendineum übergeht. Oefter, zumal bei der Spaltung des Proc. xiphoideus seiner ganzen Länge nach, finden sich zwei deutlich gesonderte, aber nahe an einander liegende Bündel. Nicht selten fehlt aber die Sternalportion gänzlich, und es besteht an ihrer Stelle eine grössere oder kleinere von fetthaltigem Zellgewebe erfüllte Lücke.

Ich muss bei dieser Gelegenheit einer sehr bemerkenswerthen Bildung gedenken, welche ich zwischen Schwertfortsatz und Centrum tendineum bisher schon öfter in ausgezeichneter Stärke und vielmal in unzweifelhafter Andeutung gefunden habe. Es ist ein sehniger, mitunter $\frac{1}{4}$ Zoll breiter Streifen, welchen ich einstweilen Ligamentum sterno-diaphragmaticum nennen will, welcher aus der Faserung des Centrum tendineum hervorgeht und sich im Periost des oberen Endes der hinteren Fläche des Proc. xiphoid. verliert.

Der dreiseitige Brustmuskel verdient nicht allein als Vorbild des hier in nähere Betrachtung kommenden Transversus abdominis eine besondere Berücksichtigung, sondern

auch deshalb, weil seine unterste Zacke mit dem Zwerchfelle in einigen Rapport tritt.

Bei allem Wechsel im Verhalten bietet der Triangularis-
sterni einige constante, aber nicht genügend gewürdigte Eigen-
thümlichkeiten dar, welche die Beziehungen seiner Zacken be-
treffen. Diese sind meist in der Zahl von 5 vorhanden und
gehen vom Rande des Brustbeines aus zur 2. bis (incl.) 6.
Rippe. Die erste Zacke setzt sich an den unteren Rand des
äusseren Endes vom Knorpel der 2. Rippe an; die zweite
Zacke an den unteren Rand des Knorpels und Knochens der
3. Rippe, da, wo beide Theile zusammenstossen; die 3. und 4.
treten an die innere Oberfläche des Knorpels der vierten und
fünften Rippe; die 5., eine fast horizontale Richtung verfol-
gende Zacke setzt sich an den oberen Rand des Knorpels
und eines kleinen Stückes des Knochens, da, wo beide an ein-
ander grenzen, der sechsten Rippe an. Nicht allein durch
ihre Richtung und zum Theil ihren Ansatz bildet diese un-
terste Zacke den Uebergang zum queren Bauchmuskel, son-
dern auch dadurch, dass sie an der Stelle ihres Ursprunges,
von der inneren Fläche des Schwertfortsatzes hart an dessen
seitlichem Rande, in der Regel mit der Sehnensubstanz der



nommen wurden. So kommt es denn, dass man nach sauberer Präparation der Stellen des Zusammenstosses beider Muskeltheile ein wie durchflochtenes Ansehen des Ganzen darzulegen im Stande ist.

Dieses Verhältniss der beiden Muskeln zu einander war schon B. S. Albin¹⁾ bekannt und ist auch von Theile²⁾ namhaft gemacht worden, ohne dass jedoch der Bezirk dieser Anordnung näher angegeben ist.

2. Die Pars costalis der 10., 11., 12. Rippe.

Die augenfälligste Verschiedenheit dieses Zwerchfellsabschnittes von dem vorigen giebt sich darin zu erkennen, dass er mit dem Transversus abdominis zum Theil in Continuität steht. Beide Muskeln haben an den bezeichneten Rippen selbstständige, nahe an einander grenzende Insertionen, aber diese sind da, wo sie an einander stossen, durch eine Anzahl theils paralleler, theils gekreuzter Sehnenfäden unter einander so in Verbindung gesetzt, dass das Ansehen von Inscriptiones tendineae bedingt wird. Die meisten dieser Sehnenfäden hängen an der inneren Oberfläche der bezüglichen Rippenstellen mit dem Periost und Perichondrium so fest zusammen, dass der theilweise Sehnenverband der Fleischbündel beider Muskeln nur mit Hülfe des Messers isolirt dargestellt werden kann.


Im Näheren betrachtet ergeben sich folgende, im Wesentlichen gleichbleibende Verhältnisse. An der 10. Rippe geschieht der Ursprung in der Regel nur von dem Knochen. Das $1\frac{1}{2}$ bis 2 Querfinger breite Bündel hängt fleischig-sehnig mit dem Knochen der Rippe, hart hinter seiner Verbindung mit dem Knorpel zusammen, indem er an dessen innerer Fläche schief in der Richtung nach hinten, von dem unteren nach dem oberen Rande emporsteigt. Die Zwerchfellsportion der 11. Rippe hat beim erwachsenen Menschen eine durchschnittliche Breite von drei Querfingern und entspringt zum grössten Theile von der inneren Fläche des Knochens;

1) Historia musculorum. Edit. Hartenkeil 1796. p. 270.

2) Muskellehre 1841. S. 210.

nahe an seinem oberen Rande, während meist nur wenige Bündel von der inneren Seite des Knorpels ihren Ursprung nehmen. Das Verhalten des Zwerchfelles zur 12. Rippe ist ausserordentlich variabel. In der grösseren Mehrzahl der Fälle geschieht der Ursprung sehnig mit einem zwei Querfinger breiten Bündel vom oberen Rande des Rippenknochens; häufig auch nur von der inneren Seite des Knorpels mit einem kaum fingerbreiten Streifen. Es gehört zu den selteneren Vorkommnissen, wenn die vordere Hälfte des Knochens der zwölften Rippe der in diesem Falle sehr breiten Zwerchfellsportion zum Ursprunge dient.

Der mit diesen Ursprüngen des Zwerchfelles in Beziehung tretende quere Bauchmuskel setzt sich fleischig-sehnig nach vorn und unten von denjenigen Stellen an der inneren Fläche der genannten Rippen an, von welchen jenes seinen Ausgang genommen hat. Es bleibt zwischen beiderlei Insertionen eine $\frac{1}{2}$ Zoll lange, der Breite der Rippe entsprechende, von Muskelfasern freie Stelle übrig, welche ein sehnenartig-glänzendes, exquisit gefasertes Ansehen besitzt und welche den Ort des continuirlichen, durch Sehnenbündel vermittelten Zusammenhanges beider Muskeln darstellt. Diese Sehnensubstanz



grösste Aufmerksamkeit verdient, sondern auch über den queren Bauchmuskel neue Gesichtspunkte eröffnet.


In den rein ausgeprägten Fällen befindet sich in der Nähe der vorderen Grenze eines jeden der drei untersten Zwischenrippenräume ein sehniger Bogen, dessen Convexität der Wirbelsäule zugekehrt ist. Dieser bildet die Stelle des Ursprunges für eine grosse Summe von Fleischbündeln des Zwerchfelles, welche von den genannten Intercostalräumen ausgehen. Die Anordnung der Bögen unterliegt in der Art einigem Wechsel, dass jener im elften Intercostalraume nur angedeutet ist, andere Male, aber höchst selten, ein vierter Bogen, im achten Rippeninterstitium nämlich, angetroffen wird. Die schönste Ausbildung desselben finde ich immer zwischen dem Knorpel der 11. und 10. Rippe und will ich daher die Beschreibung desselben dieser Lokalität entnehmen.

Der bogige Sehnenstreifen besitzt eine nur schwache Krümmung und eine durchschnittliche Höhe von 3 Millimetres. Er besteht, von der äusseren Seite her gesehen, aus rundlichen, mehr oder weniger dicht gelagerten Bündelchen, welche ihm ein gestreiftes Ansehen verleihen. Im Uebrigen erinnert seine Substanz nach Farbe und Consistenz noch am meisten an Faserknorpel. Er enthält inzwischen nur dicht gelagerte, wellenförmige Bindegewebsfibrillen und zahllose feine, meist isolirte elastische Fasern. Von der inneren Seite her betrachtet erscheint der Bogen, nach sorgfältiger Präparation, als sehr niederer Saum, an welchen Muskelfasern des Zwerchfelles anstossen, und vor welchem in der Richtung nach aussen, Sehnen- und Fleischbündel des Transversus abdominis verlaufen. Ausgezeichnet deutlich erkennt man den Ursprung von Zwerchfellefleisch am hinteren Rande seiner äusseren Seite, an welchen zahlreiche Bündelchen theils unmittelbar, theils durch feine Sehnenfädchen an ihn geheftet sind.

Seine Befestigung gewinnt der Bogen des zehnten Intercostalraumes einerseits an die innere Fläche der Spitze des Knorpels der 11., andererseits an die innere Fläche des hinteren Endes vom Knorpel der 10. Rippe.

Das Verhalten des queren Bauchmuskels zu dieser For-

mation ist sehr überraschend. Je näher die Bündel dieses Muskels gegen den Bogen herantreten, um so mehr gewinnen sie eine sehnige Beschaffenheit. Diese Sehnensubstanz stellt in Wahrheit eine Fortsetzung des vorderen Endes der hinteren Aponeurose des Transversus dar und steht mit der Sehnenfaserung im Zusammenhange, welche an der inneren Seite der drei untersten Rippen Zwerchfell und Transversus abd. in Continuität setzen. Die Sehnenbündel aber, welche zu jenem Bogen gelangen, treten zum grössten Theile über dessen äussere Fläche hinweg und machen ihn auf diese Weise unkenntlich; zum kleineren Theile durchsetzen sie die Bündel desselben und stellen so mit ihm eine Art von Strickwerk dar. Fast alle Sehnenbündel des Transversus treten aber schliesslich an die äussere Fläche des dem Interstitium entsprechenden Zwerchfellsabschnittes und in weiterer Folge über die äussere Fläche des Rippenfelles, wo sie als wichtiges Verstärkungsmittel der Fascia endothoracica (Hyr tl) ihre endliche Verwendung finden. Daraus aber ergibt sich die merkwürdige Thatsache, dass der Transversus abdominis auch einen Zug auf diejenigen Abschnitte des Rippenfelles auszuüben vermag, welche an die drei untersten Intercostalräume angrenzen.




reiche vom queren Bauchmuskel herrührende Sehnenbündel Ursprungspunkte ab für Fleischfasern des Zwerchfelles. Oft genug kommt es vor, dass alle im letzten Zwischenrippenraume entspringende Fleischbündel des Zwerchfelles, ausschliesslich von dem daselbst befindlichen sehnigen Ende des Transversus ausgehen, über dessen äussere Fläche dann öfters nur andeutungsweise bogige Sehnenbündel gelagert sind.

In manchen Fällen, zumal in denjenigen, in welchen der Zwerchfellsursprung der 12. Rippe sehr schmal ist, entspringt ein verschieden breites Fleischbündel des Diaphragma auch von der vorderen Fläche des sog. Lig. lumbocostale meist nahe am unteren Rand des Knochens der zwölften Rippe, über dessen innere Fläche aufwärts steigend, sich dasselbe dann gewöhnlich genau an die unterste Costalportion anschliesst. Es lässt sich dieses Bündel ganz ungezwungen als unterste Intercostalportion erklären, wenn man das Wesen des sog. Lendenrippenbandes näher ins Auge fasst. Um dieses aber thun zu können, müssen wir vor Allem die hintere Aponeurose des queren Bauchmuskels einer genauen Betrachtung unterwerfen. Diese stellt ein Sehnenblatt von sehr verworrenem Faserverlaufe dar, welches zwischen dem unteren Rande der zwölften Rippe, der Darmbeinleiste und den Querfortsätzen der fünf Lendenwirbel ausgespannt ist, nach vorn aber unter einer sanften, mit der Convexität nach rückwärts gekehrten Bogenlinie in Fleischbündel übergeht. Wenn man die Analogie zwischen *Triangularis sterni* und *Transvers. abd.* aufrecht erhalten wollte, dann müsste man in die weisse Linie, dem Analogon des Brustbeines, den Ursprung des letzteren Muskels verlegen, und den Ansatz dagegen an die Rippen und an die ihnen morphologisch verwandten Querfortsätze der Lendenwirbel. Nach dieser Anschauungsweise liesse sich der Transversus als Fixator der sechs unteren Rippen bei der Contraction des Zwerchfelles betrachten.

Ueber die hintere Aponeurose des Transversus werden mehrfach irrthümliche Ansichten gehegt. Manche Schriftsteller lassen sie in zwei Lamellen zerfallen, von welchen die eine an den Querfortsätzen ihre Befestigung finden, die andere an

die hintere Seite des *Musc. extensor dorsi communis* gelangen soll, die *Fascia lumbodorsalis* verstärkend. Diese Ansicht beruht ohne Zweifel auf der Wahrnehmung von Sehnenbündelchen, welche am äusseren Rande des *Musc. iliocostalis* aus der Faserung der sog. *Fascia lumbodorsalis* hervortretend daselbst an das Gewebe der hinteren Aponeurose fest angelöthet sind. Man trifft aber auch von dort herrührende Sehnenbündel, welche nicht an die hintere Aponeurose des *Transversus* treten, sondern an der äusseren Fläche der zwölften Rippe, nach vorn von der untersten Zacke des *Musc. serrat. postic. inf.*, ihre Befestigung finden. Noch viel irriger ist die Meinung von einer Zerspaltung jener Aponeurose in drei Blätter, wobei die an der vorderen Seite des *Musc. quadr. lumborum* befindliche, häufig sehnenartig feste Lamelle als von ihr abstammend betrachtet wird, während diese in Wahrheit nichts anderes ist, als ein Theil der queren Bauchbinde.

Diejenigen Bündel jener Aponeurose, welche mit den Querfortsätzen der Lendenwirbel in Verbindung stehen, strahlen fast alle pinselartig auseinander, in Folge dessen, bei der gegenseitigen Durchsetzung, eine sehr vielfach gekreuzte Anordnung der Faserbündel herbeigeführt wird.



felles aufzufassen. In rein ausgesprochenen Fällen geht dieser ganz kurze Schenkel fleischig-sehnig vom seitlichen Umfange des Annulus fibrosus zwischen dem ersten und zweiten Lendenwirbel ab. Sein innerer, rein fleischiger Rand steigt fast perpendicular in die Höhe, sein äusserer dagegen stellt einen sehnigen Bogen dar, welcher, mit der Convexität aufwärts gekehrt, über den Psoas und Quadratus lumborum, zwischen beiden häufig einen Fortsatz in die Tiefe sendend, gegen die Spitze der zwölften Rippe hin seinen Weg nimmt und hier mit der Faserung zusammenfliesst, welche dem äusseren Rande des Ligamentum lumbocostale angehört. In Rücksicht auf den letzteren Umstand und weil auch dieser Sehnenstreifen zwischen dem Lendenwirbel und der zwölften Rippe ausgespannt ist, möchte ich die von ihm abgehende Fleischmasse als Inter-costalportion betrachtet wissen. Die von seiner Convexität abgehenden Fleischbündel steigen über die innere Fläche der hinteren Hälfte des Knochens der 12. Rippe aufwärts, stossen aber sehr häufig nicht unmittelbar an die nach aussen von ihr liegende Zwerchfellsparthie an, sondern es bleibt zwischen beiden eine grössere oder kleinere, dreiseitige, von Muskelfaserung freie Lücke übrig, die mitunter zur Pforte von Zwerchfells-hernien wird.

In Ausnahmefällen kommt anstatt des dreiseitigen Zwischenraumes ein bogenförmiges Muskelbündel vor, welches mit seiner Concavität über der inneren Fläche der zwölften Rippe liegt, nach aussen mit der untersten Rippenportion zusammenhängt, nach innen aber an dem seitlichen Umfange des ersten Lendenwirbels durch Sehnensubstanz angeheftet und daselbst vom äusseren Lendenschenkel des Zwerchfelles überlagert ist. M. J. Weber ¹⁾ hat dieses Bündel als „Portio lumbo-costalis“ aufgeführt.


Unter zahlreichen, auf die Erforschung des Zwerchfelles gerichteten Untersuchungen ist mir bis jetzt zweimal in ganz übereinstimmender Weise die folgende, sehr bemerkenswerthe

1) Handbuch der Anatomie des menschl. Körpers. Bonn 1839. Bd. I. S. 580.

Anomalie vorgekommen. Die sonst dem Knorpel der 7. Rippe angehörige Ursprungsportion zerfällt in zwei Theile, von welchen der innere mit dem Knorpel jener Rippe gar nicht in Berührung kommt, sondern von der *Fascia transversa* da entspringt, wo diese neben dem Schwertfortsatze vom oberen Ende des queren Bauchmuskels bedeckt wird, während der äussere Theil an der äusseren Hälfte des Knorpels der siebenten Rippe inserirt.

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1. Die vordere Brustwand und ein Theil der vorderen Bauchwand von hinten gesehen. A. Brustbein; I.—XII. die Rippen. a. a. a. a. a. a. a. a. Zacken des *Musc. triangularis sterni*. b. *Pars sternalis* des Zwerchfelles. c. Vordere Aponeurose des queren Bauchmuskels. d. d. d. d. Fleischzacken des *Transversus abdominis*, welche sich an die 7., 8., 9. Rippe gesondert ansetzen. e. e. Mit dem Zwerchfelle in Continuität stehende Abschnitte des *Transversus abdominis*. f. f. f. Sehnenbögen in den drei letzten Intercostalräumen. g. g. g. Von den Zacken des *Transversus* durchsetzte Zwerchfellsportion der 7., 8., 9. Rippe. h. h. h. mit dem *Transversus* continuirliche Zwerch-



Zur Lehre von der Verknöcherung des primordialen Knorpels

von

ALBERT BAUR in Tübingen.


Eine mikroskopische Analyse der bei der Verknöcherung des Knorpels vor sich gehenden Veränderungen hat zwei Fragen zu beantworten. Erstens: wie entsteht die eigenthümliche Struktur der Knochensubstanz aus dem so differenten Baue des Knorpels, und zweitens: wie verhalten sich dabei die Elemente des Knorpels zu denen des Knochens. Letztere Frage zumal hat, seit man eine Entstehung des Knochens auch ohne vorangehenden Knorpel kennt, ein doppeltes Interesse gewonnen. Allein trotz zahlreicher über diesen Gegenstand vorliegender Untersuchungen ist die Lehre von der Ossifikation des primordialen Knorpels noch keineswegs als eine abgeschlossene zu betrachten.

In der Hoffnung zur Entscheidung der noch streitigen Punkte etwas beitragen zu können, veröffentliche ich in folgendem, aufgefordert von meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor Luschka, die Resultate eigener über die Verknöcherung des Knorpels, vorzugsweise mit Rücksicht auf die Bindegewebsfrage angestellter Untersuchungen.

Die Entstehung aller nicht knorpelig präformirten Knochensubstanz ist zurück zu führen auf die Verknöcherung eines Blastems, das nach den meisten Beobachtern als ein bindegewebiges anzusehen ist. Es besteht nämlich aus einer noch undeutlich fibrillären Grundsubstanz, in welcher sich einfache runde Zellen, entsprechend den primären Bildungszellen des

Bindegewebs, den späteren Bindegewebskörperchen, eingestreut finden. Es ist leicht, sich zu überzeugen, dass die Verknöcherung dieses Blastems in der Art erfolgt, dass seine Inter-cellularsubstanz einfach durch Aufnahme von Kalksalzen allmählig, ohne scharfe Grenze, die Eigenschaften der Knochen-grundsubstanz annimmt, während die Zellen zu zackigen Knochenkörperchen auswachsen. Eine Vermittelung durch Knorpel-elemente findet hier entschieden nicht statt; auch ist von einer vorangehenden Trübung durch abgelagerte Kalkkrümel nichts zu bemerken. Man wird daher diesen Prozess nicht anders, denn als eine directe Verknöcherung des Bindegewebs bezeichnen können. Complicirter ist der Ossifikationsprozess im Knorpel; es findet hier nicht eine einfache Umwandlung der Substanz, sondern gleichzeitig eine totale Umgestaltung der Struktur statt und dies ist es, was eine genaue Verfolgung der histologischen Veränderungen erschwert. Als Objekte dazu eignen sich wohl am besten feine Durchschnitte, welche in verschiedenen Richtungen durch den Verknöcherungsrand der Diaphyse eines möglichst frischen fötalen Röhrenknochens geführt werden.


Die zum Theil längst bekannten Vorgänge, welche man



Grenze zwischen Knorpel und Knochen, man vermisst aber noch die mikroskopischen Charaktere der Knochensubstanz, nämlich Knochenkörperchen und eine homogene Grundsubstanz. Die Knorpelzellen sind noch unverändert in den mit Kalk incrustirten Knorpelkapseln enthalten, deren undurchsichtige Beschaffenheit eben die Verfolgung ihrer weiteren Metamorphose schwierig macht. Diese besteht aber zunächst darin, dass jede Knorpelzelle zum Sitz einer endogenen Zellenproduction wird. Statt des einen blasenförmigen Nucleus, der sich schon als Tochterzelle betrachten lässt, treten nämlich mehrere, ihm gleiche Bläschen auf, welche die Mutterzelle erfüllen und nach ihrem Verschwinden frei werden. Diese demnach dem Kern der Knorpelzellen entsprechende Zellenbrut ist es, welche den Inhalt der verkalkten Knorpelhöhlen ausmacht und den Ausgangspunkt aller folgenden Veränderungen bildet. Die Thatsache, dass bei der Verknöcherung des Knorpels in den Knorpelzellen eine endogene Zellenbildung auftritt, — ein Prozess, der wesentlich von der Vermehrung der Knorpelzellen durch Theilung, wie sie beim Wachsthum des Knorpels vor der Verknöcherung angenommen wird, zu unterscheiden ist — wurde bisher von allen Beobachtern ausschliesslich zur Bildung der Markbestandtheile des Knochens in Beziehung gebracht, ohne dass ihre Bedeutung für die Entstehung der Knochensubstanz selbst erkannt worden wäre. Während nämlich in der That ein Theil dieser neuen Zellengeneration sich in Blutgefässe, Fettzellen oder indifferente Markzellen umwandelt, findet man immer die peripherischen der verkalkten Knorpelkapsel anliegenden Zellen mit einer Schicht weicher streifiger Zwischensubstanz umgeben, welche die innere Wand der Knorpelhöhlen auskleidet. Von ächter Knochensubstanz war bis jetzt noch nichts zu sehen: sie bildet sich erst jetzt durch direkte Verknöcherung dieses Blastems, das heisst, durch Verwandlung seiner Zellen in Knochenkörperchen, seiner Intercellularsubstanz in homogene, nicht körnige Knochengrundsubstanz. Hieraus ergibt sich, dass die erste Knochensubstanz in Form einer jede verkalkte Knorpelhöhle auskleidenden Röhre aufzutreten muss, welche auf dem Querschnitt als ein mit einer ein-

fachen Reihe Knochenzellen besetzter Ring sich darstellt. Dieser Knochenzylinder verdickt sich nun von innen aus durch successive Verknöcherung in derselben Weise sich neu auflagernder Blastenschichten, so dass jedes Knorpelkanälchen allmählig durch ein System concentrischer Knochenlamellen mehr oder weniger ausgefüllt wird. Der durchaus gleichmässig concentrisch lamellöse Bau der Röhrenknochen erklärt sich also daraus, dass im Innern jedes Markkanälchens eine Schichtenbildung und successive Verknöcherung vom Centrum aus gerade so vor sich geht, wie bei der Bildung der Rindensubstanz aus dem Periost von der Peripherie aus.

Dem Besagten zufolge müssen die einzelnen Röhren neugebildeter Knochensubstanz anfangs noch von verkalkter Knorpelsubstanz umgeben und von einander getrennt sein. Es wird nun allgemein angenommen, wie es auch den Anschein hat, dass die verkalkte Grundsubstanz des Knorpels selbst allmählig in homogene Knochensubstanz übergehe, sei es dadurch, dass die einzelnen Kalkkrümel in eine homogene Masse zusammenfliessen, oder dass sie, als eine nur provisorische Kalkniederlage, vorher wieder resorbirt werden. Darauf ist nun zu sagen, dass die körnige Kälkeinlagerung allerdings verschwindet, aber



und geschichteten Knochenringe einander immer näher, bis sie nach vollständigem Schwinden der sie trennenden Knorpelschicht unmittelbar an einander grenzen. Daraus folgt, dass die Grundsubstanz des primordialen Knorpels an der Bildung der Knochensubstanz keinen Antheil hat, vielmehr trotz der Verkalkung der Resorption anheimfällt. Dieses der Beobachtung entnommene Resultat ist von chemischer Seite längst postuliert, da die Verschiedenheit in der chemischen Constitution zwischen Knochenknorpel und der hyalinen Knorpelsubstanz der Annahme einer Persistenz der letzteren im Knochen im Wege stand. Man musste daher zur Erklärung des Ossifikationsprozesses entweder eine chemische Umwandlung oder einen molekulären Ersatz der einen Substanz durch die andere zu Hülfe nehmen. Dieser Ersatz aber ist Obigem zufolge nicht ein bloss chemischer, molekulärer, sondern ein histologisch nachweisbarer. Die organische Grundlage des Knochens ist anatomisch so wenig als chemisch mit der Grundsubstanz des hyalinen Knorpels identisch. Letztere ist einer wahren Verknöcherung unfähig: ihre Verkalkung ist ein die Ossifikation zwar meist begleitender, aber wesentlich von ihr verschiedener Prozess.

Die im Knorpel auftretende Knochensubstanz ist in den Knorpelhöhlen neugebildet, sie tritt jedoch nicht sogleich als solche auf, sondern es geht ihr die Bildung eines aus einfachen Zellen und weicher Intercellularsubstanz bestehenden Blastemes voraus. Dieses Blastem nun stimmt in jeder Beziehung mit der verknöchernden Schicht des Periosts und wie diese, mit unreifem Bindegewebe überein, es muss daher als ein bindegewebiges bezeichnet werden. Seine Ossifikation erfolgt durch Kalkaufnahme der homogen bleibenden Zwischensubstanz, durch Verwandlung seiner Zellen in Knochenkörperchen.

Auch im Knorpel geht also der Ossifikation eine — hier durch die Knorpelzelle vermittelte — Bindegewebsbildung voran. Bindegewebe ist also die einzige Grundlage der Knochenbildung. Hiermit ist für die chemische Uebereinstimmung des sogenannten Knochenknorpels mit collagenem Ge-

webe der histogenetische Nachweis geliefert und überhaupt die bisher vermisste Einheit in die Genese des Knochengewebs hergestellt, sofern die Bildung der primären und secundären Knochensubstanz auf einen und denselben Prozess zurückgeführt ist.

Der Antheil der Knorpelzelle an dem Verknöcherungsprozesse besteht darin, dass sie die Mutterzelle derjenigen Zellen ist, welche nachher von verknöchernder Bindesubstanz umgeben und strahlenförmig ausgewachsen die Knochenkörperchen darstellen. Niemals also verwandeln sich die Zellen des primordialen Knorpels als solche in Knochenzellen. Zahl, Grösse und Anordnung beider ist daher auch keineswegs dieselbe; vielmehr entsprechen einer einfachen Reihe Knorpelzellen im Knochen alle Knochenkörperchen eines Lamellensystemes. Letztere treten auch erst auf, nachdem die Knorpelzellen in der Production von Tochterzellen untergegangen sind, so dass man nach einem Uebergang der einen in die andern vergebens sich umsieht.

An Objecten dagegen, welche langsam und unvollständig verknöcherndem Knorpel entnommen sind, stösst man häufig auf Bilder, wo innerhalb der noch sichtbaren Contouren einer



tität der Knorpel gelten und Knochenkörperchen überhaupt sich nicht vertragen.

Der Verknöcherungsprozess des primordialen Knorpels hat einerseits gezeigt, dass die Knochensubstanz, wie sie chemisch mit der Substanz des Bindegewebs übereinstimmt, so auch histogenetisch einzig auf die Elemente des Bindegewebs zurückzuführen ist; andererseits, dass dem Gewebe des hyalinen Knorpels die Fähigkeit einer directen Verknöcherung abgesprochen werden muss, weil nachgewiesenermassen weder seine Grundsubstanz noch seine Zellen als solche in den gleichnamigen Elementen des Knochens persistiren. Der Satz, dass eine Knochenbildung in gleicher Weise aus Knorpel, wie aus Bindegewebe durch Absatz von Kalksalzen in ihre Grundsubstanz, Verwandlung ihrer Formelemente in Knochenkörperchen möglich sei, ist hiordurch widerlegt und somit der Lehre von der Identität des Knorpels mit Knochen und Bindegewebe eine ihrer wichtigsten Stützen genommen.

Ueber *Dicyema* Kolliker

von

G. R. WAGENER, Dr. med.

Mitgetheilt in der Sitzung der naturforschenden Freunde am
18. November 1856¹⁾.

(Hierzu Tafel XI.—XIV.)

In der Niere oder den s. g. Venenanhängen der Cephalopoden, theils in die Oberfläche des Organes eingesenkt, theils frei in der die Anhänge umspülenden Flüssigkeit fand Krohn (s. Frorieps Notizen 1830) eigenthümliche infusorienartige Körper, welche später von Erdl wiedergefunden, abgebildet und beschrieben wurden. (Wiegmann's Archiv 1843. pag. 162. Bd. I.)

Kolliker bestätigte theils die von Erdl gemachten Angaben, theils erweiterte und berichtigte er sie (2ter Bericht

Diese Formen unterscheiden sich in einigen Beziehungen von den von Kölliker gefundenen, so z. B. durch längere Wimpern, etwas anders geformten Kopf etc. Ich kann nicht angeben, ob diese Verschiedenheiten wirkliche Speciesunterschiede sind.

Dicyema ist bis jetzt in folgenden Cephalopoden gefunden worden:

Eledone moschata.

„ *cirrosa* ¹⁾.

Octopus vulgaris.

„ *macropus*.

Sepiolo macrosoma.

Sepia officinalis.

Loligo sagittata.

In letzterem Cephalopoden fand ich es nicht in Triest, wohl aber Kölliker in Messina. —

Die Formen aus *Eledone*, *Sepiolo* und *Octopus* haben grosse Aehnlichkeit mit einander. Die Form aus *Sepia* indess weicht von ihnen sehr ab, wie später anzugeben ist.

Dicyema Eledones.

Den Kopf dieses *Dicyema* bildet ein starkes, dicht mit grossen Wimpern besetztes Polster. Mit diesem Organe ist es meist fest in die Oberfläche des Venenanhanges eingesenkt, dessen Zellen das Polster umfassen, indess der Leib frei in der serösen Flüssigkeit der Nierenkapsel flottirt.

Bei grossen Thieren ist der Kopf in 4 Felder getheilt, deren Grenzfurchen gerade im Scheitel des *Dicyema* sich rechtwinklig schneiden.

Man sieht häufig in jedem dieser Felder einen kernartigen Körper. Auch sieht man doppelte Contouren an ihren Grenzen. Man kann somit das Kopfpolster als aus 4 Zellen zusammengesetzt ansehen. —

Der Leib senkt sich mitten in das Polster ein, mit sanft

1) Ueber diese *Dicyema* species, welche ich nicht gesehen habe, hat Herr Claparède einige Notizen diesem Aufsatze hinzugefügt.

sich abrundender Spitze. Wird der Kopf durch Zufall isolirt, so erscheint er als ein dicker Napf, in dessen Höhlung man deutlich die Furchen sich fortsetzen und kreuzen sieht.

Der Inhalt der Zellen besteht meist aus sehr feinkörniger, selten mit einzelnen gröberen Bläschen versehener Masse. —

Der Leib des Thieres ist mit langen, aber weitläufig gestellten Wimpern besetzt.


Köl liker unterscheidet einfach an ihm eine Leibeshöhle und eine Leibeswand.

Nach meinen Untersuchungen muss ich die Leibeswand als aus 3 verschiedenen Schichten zusammengesetzt ansehen.

Die äusserste sah ich in den meisten Fällen als eine deutlich doppelt contourirte Haut. Unter dieser liegt als mittlere Schicht eine dickere oder dünnere Lage von einer bald fein- bald grobkörnigen, zuweilen gelb gefärbten Masse. In einigen Fällen bestand diese sogar aus grossen gelben, zellenartigen Körpern.

Diese Masse sammelt sich an einzelnen Stellen an. Sie bildet dann Knospen (Warzen), wie sie Köl liker nennt.

Diese stielen sich und fallen leicht in der Weise ab, dass



sie Knospen. Das bis jetzt von ihnen Bekanntgewordene lässt noch die Frage zu, ob sie nicht vielmehr Excrete seien.

Ueber das Verhältniss dieser Schicht zum Kopfpolster lässt sich angeben, dass bei kleinen schmalen Exemplaren sich keine Grenzlinie zwischen beiden auffinden liess. Bei diesen grenzte eine seichte Furche den dünneren Leib vom Kopfe ab.

Bei grösseren längeren, also wohl älteren Dicyemen, welche besonders deutlich die zellige Struktur des Kopfpolsters zeigten, erschien die Schicht deutlich abgegrenzt. Die Halsfurche liess eine bis zur Wand der Leibeshöhle durchgehende doppelte Contour wahrnehmen.

Es fanden sich häufig Thiere, denen die Warzenknospen bildende Körnerschicht fast ganz fehlte. In diesen Fällen lag eine doppelte Contour dicht einer andern auf, welche die Leibeshöhle begrenzte.

Hatte die äusserste Doppelcontour durch die knospenartigen Warzen einen unregelmässig welligen Verlauf, so zeigt die innerste eine glatte Oberfläche.

Beim Zerreißen und Zerdrücken der Thiere lässt sich letztere als eine Haut darstellen. Bei der äussersten Doppelcontour war dies bis jetzt nicht möglich.

Die innerste Schicht reicht bis tief in das Kopfpolster hinein, von dem sie die Leibeshöhle vollkommen abschliesst.

Der Inhalt der Leibeshöhle ist bei den verschiedenen Individuen verschieden.

In einigen findet man kürzere oder längere bewimperte Wesen, welche dem Mutterthiere in allen Theilen sehr ähnlich sehen. Nur das Kopfpolster erscheint verhältnissmässig kleiner. Köl liker nennt diese „wurm förmige Embryonen.“

In anderen findet man aber wesentlich anders gestaltete Junge. Diese nennt Köl liker infusorienartige Embryonen. — Hier werden diese Bezeichnungen beibehalten.

Köl liker hob schon hervor, dass beide Arten Embryonen nie in ein und demselben Thiere vorkommen.

In Dicyemen, welche keine Embryonen enthalten, findet

man sehr helle durchsichtige Kugeln (welche Kölliker wohl mit Recht in die Entwicklungsreihe der Embryonen aufnahm). Dieselben Körper finden sich auch mit Embryonen, die eine oder andre Art, untermischt vor.

Kommen diese Kugeln ohne Embryonen in spärlicher Anzahl vor, so sieht man an derartigen Dicyemen eine zähe durchsichtige Masse der Wunde entquellen, welche zufällig beim Präpariren durch Querdurchreißen des Thieres entstand.


Diese Masse hat die cylindrische Gestalt des Thieres. Auf ihrer Oberfläche kleben die durchsichtigen Kugeln.

In den wurmförmigen Embryonen sieht man, wie Kölliker schon angiebt, die Leibeshöhle in Zellen abgetheilt. Er fasste diese Erscheinung als ein Entwicklungsstadium auf.

Diese Zellen liegen aber in einem Gebilde, dass ich mit „Kern“ bezeichnen will.

Dieser Kern kommt in den meisten Dicyemen vor.

Er ist zuweilen leicht wellenförmig gebogen. Seine Oberfläche liegt der Leibeswand, namentlich im Schwanze meist eng an. Manchmal erstreckt er sich, wie bei den wurmförmigen Embryonen, so auch bei den erwachsenen Thieren.



den Keimkugeln vergrössern sich; ihr traubenförmiges Ansehen hört auf.

Auf diese Weise erhält man oft in einem Dicyema eine vollständige Entwicklungsreihe der Embryonen aus dem Kerne.

Gelingt es durch Druck den Kern zu isoliren, so sitzen ihm häufig noch die Keimkugeln traubenförmig an. Es ist in solchen Fällen unmöglich, das Ende des Kernes und den Anfang der Keimkugelconglomerate anzugeben, indem die doppelten Contouren der Kernabtheilungen ganz allmählig schwächer werden und bei den offenbaren Keimkugeln ganz verschwinden.

Je mehr Keimkugeln vorhanden, um so kürzer ist der Kern.

Füllen die Keimkugeln das ganze Thier, so sucht man den Kern vergeblich.

Der Kern bricht das Licht sehr schwach, weshalb er leicht übersehen wird.

Die infusorienartigen Embryonen.

Kölliker giebt an, dass die Entwicklungsreihe dieser Embryonen mit einer deutlich gekernten Zelle beginnt.

Bei der von mir untersuchten Species aus *Eledone moschata* und *Sepia* habe ich vergeblich danach gesucht, obwohl mir die Thatsache während der Untersuchung mitgetheilt wurde.

Wie in der Kölliker'schen Species, so geht auch bei der hier in Rede stehenden die Entwicklung durch eine Art von Furchung der Keimkugel vor sich.

2 dunkle Punkte werden allmählig zu den 2 auf dem Rücken des Embryo liegenden Kalkkörnern. (Kölliker.)

Beim vollständig entwickelten Jungen ist die Zahl derselben nicht beständig. Sie kann selbst an zwölf betragen. In diesen Fällen ist ihre Grösse sehr ungleich.


Innerhalb des sich bildenden Embryo macht sich bald ein kernartiges Gebilde bemerklich. Dies erscheint später als schalenförmiges Organ.

Man findet häufig Embryonen in *Dicyema*, welche ein durchsichtiger Hof umgiebt. Es bildet sich dieser zuweilen unter dem Auge des Beobachters. Mit seiner Entstehung fängt der Embryo an, die Wimpern zu bewegen.

Es gelang mir einige Male, die Geburt der Jungen zu beobachten.

Das junge Thier macht es erst nach vielen Bemühungen möglich, seinen Körper in leise Schwingungen zu versetzen; je stärker diese werden, um so thätiger werden die Cilien. Es rückt der Leibeswand näher und berührt sie, es treibt die innerste Schicht vor sich her, deren Contour immer dünner und dünner wird. Schliesslich verschwindet sie ganz auf dem Embryo. Das Junge befindet sich bald in der Rindenschicht, die es in derselben Weise durchbohrt. An seiner, der Körperaxe zugewandten Seite stellt sich dabei die Leibeswand in derselben unmerklichen Weise wieder her, je mehr er sich von ihr abhebt und entfernt.

Der Embryo gelangt schliesslich ins Freie, nachdem er in den letzten Momenten seines Austrittes gleichsam seine Wimpern frei fühlend, eine grössere Thätigkeit derselben entfaltet.



Oeffnung nach der entgegengesetzten Seite sieht, hier das schalenförmige Organ genannt.

Beim Tode des Embryo zerfällt die Schale in 4 gleiche Theile. An lebenden Jungen bemerkt man an ihr, ganz wie bei dem Kopfpolster der erwachsenen Dicyemen sich rechtwinklig in der Mitte des Schalenbodens schneidende Linien.

An den Seiten dieser Schale sind 2 kleine seitliche Erhabenheiten.

In der die Schalenöffnung bedeckenden äusseren Haut des Thieres befindet sich eine feine Grube oder Oeffnung, deren Rand entsprechend den Theilen der Schale vierlappig erscheint.

Frei schwimmende Embryonen verloren zuweilen während der Beobachtung die Kalkkörner, indem der sie enthaltende Kopftheil sich allmählig als ein Kügelchen abschnürte, loslöste, liegen blieb und zerfiel. Die Embryonen hatten dabei nichts von ihrer Leibeswand verloren.

Die Kalkkörner zeigten sich dann als etwas abgeplattete Körper, deren convexe Fläche dem Rücken des Thieres zugewandt war.

Die wurmförmigen Embryonen.

Das Verhalten des Kernes zu der Bildung dieser Embryonenart scheint durchaus dasselbe zu sein, wie zu der der infusorienähnlichen.

Die Keimkugeln beider zeigten eben so wenig Unterschiede. Doch schienen sich unter denen der wurmförmigen mehr kleinere zu finden.

Auch hier fanden sich Keimkugeln, welche wie gefurcht erschienen. Der Mangel der Kalkkörner indess liess auch die Annahme zu, dass hier noch eine secundäre Bildung von Keimkugeln stattfindet.

Sind die Schwankungen in der Grösse der infusorienartigen Embryonen nur unbedeutend, so sind die der wurmförmigen desto grösser.


Die grossen Embryonen liegen sämmtlich zusammengerollt in dem Mutterthiere. Ihre Wimpern sind meist unbeweglich.

Die kleineren Embryonen dagegen zeigten sich öfters von einem hellen Hof umgeben, lebhaft wimpernd.

Grosse Embryonen sah ich mehrere Male in der Rindenschicht ihrer Mutter liegen, mit regungslosen Wimpern. Die oben schon angeführte Ausknickung der Leibeswand deutete auf eine stattgehabte Geburt hin.

Die Gestalt der wurmförmigen grösseren Jungen ist genau die der Mutter, das verhältnissmässig kleine Kopfpolster derselben nicht in Rechnung gebracht. Sie sind am ganzen Körper bewimpert. In ihrem Leibe sieht man schon sehr früh den Kern mit seinen Quertheilungen. — Die kleineren Embryonen haben noch keine Kopfpolster.

Die durch die Präparation zufällig frei gewordenen Jungen hatten häufig keine andere Bewegung als die ihrer Wimpern. War das Thier gebogen und seine Cilien lebhaft bewegt, so fuhr es in einer Kreislinie unaufhörlich umher, bis ein grösseres Thier oder etwas anderes seinen Weg kreuzte. Dann hing es an ihm wimpernd. Nach Beseitigung des Hindernisses aber setzte es den alten Kreislauf fort im ursprünglichen Ungestüm.



Bei jedem *Dicyema* bemerkt man zu beiden Seiten des Leibes zwei helle durchsichtige Streifen, welche keine Verbindungen unter einander zeigten und am Kopfe und Schwanze sich nicht weiter verfolgen liessen.

Einige Abweichungen ihres Verlaufes abgerechnet gehen sie mit der Längsaxe ihres Thieres genau parallel.

Contractionen waren an ihnen nicht zu bemerken.

Ihr Durchmesser blieb sich bei allen gleich, nur schien er bei einigen Individuen bedeutend und gleichmässig erweitert.

Anmerkung.

Es erinnern diese gefässartigen Streifen an ein ähnliches Organ bei den Nematoden. Zerdrückt man z. B. einen *Strongylus auricularis*, so dass alle Eingeweide heraustreten, so sieht man neben den beiden, in etwas körnige Masse eingehüllten platten hohlen Bändern der beiden Seitenlinien zwei helle, leicht geschlängelte Streifen, welche mit eignen Wandungen versehen in sehr weiten Abständen hie und da einen gefässartig verlaufenden Zweig aufnehmen, der sich in den benachbarten Geweben bald den Blicken entzieht.

Dicyema gracile mihi

aus *Sepia officinalis* unterscheidet sich von dem aus *Eledone moschata* durch die Gestalt seiner infusorienähnlichen Embryonen, durch das kleine, nur aus einem Körnchenhaufen bestehende Kopfpolster und durch seinen dünnen Leib.

Die Rindensubstanz zeigte stets die grösseren Körner in der Mehrzahl und die doppelten Contouren der äussersten Schicht fehlten. Warzenförmige Erhebungen derselben fanden sich selten. Die Rindenschicht bildete nur flache Hügel.

Auch hier giebt es 2 Arten von Embryonen. Die wurmförmigen boten nichts Bemerkenswerthes.

Die infusorienförmigen hingegen besaßen keine Kalkkörner, kein schalenförmiges Organ. Sie waren am gan-

zen Leibe mit gleich langen Cilien bekleidet. Der Leib war kurz und stak in einem stark entwickelten Kopfpolster¹⁾.

In ihnen glaube ich einen Kern erkannt zu haben. In denen des *Dicyema Eledones* sah ich nie einen Kern.

Zusatz von Ed. Claparède aus Genf.

Im Sommer 1855 wurde ein *Dicyema* in Valløe am Christianiafjord von Prof. Johannes Müller, Dr. Joh. Lachmann und mir beobachtet. Dasselbe fand sich an den Venenanhängen der *Eledone cirrosa* sehr zahlreich vor und zeichnete sich durch manche Merkwürdigkeiten aus. Die Zeichnungen von Prof. Müller, der sich besonders mit diesem Thier beschäftigt hatte, gingen leider, als das Schiff Norge in der Nähe von Christiansand verunglückte, verloren. So ist es gekommen, dass meine ziemlich unvollständigen Skizzen allein übrig geblieben sind.

Diese Dicyemen zeichneten sich dadurch aus, dass ihr vorderer Theil wie getäfelt erschien; indem sich gleichsam zwei



thümlich sind, sondern dicht dahinter befindet sich ausserdem eine zweite Felderreihe. Das Kopfpolster war niemals bedeutend breiter als der Körper selbst.

In der Leibeshöhle wurde niemals das kernartige Gebilde wahrgenommen, welches Dr. Wagener eben beschrieb, ohne dass ich damit wollte gesagt haben, dass dasselbe nicht vorhanden gewesen sei; dagegen wurden entweder Embryonen oder die Anlage zu denselben ziemlich in allen Exemplaren angetroffen. Es treten diese Embryonen zuerst als durchsichtige, helle, runde Körper auf, wie bei den andern Dicyemen, und es ist nicht schwer, die Uebergänge von diesen zellenartigen Gebilden bis zu den infusorienartigen Embryonen aufzufinden. Im Innern der letzteren wurden stets zweierlei Organe wahrgenommen: zuerst ein Haufen runder, stark lichtbrechender Körper, die wie Fett aussahen (ob Kalkkörner wie bei *Dicyema Eledones moschatae*?), dann ein rundes, auch ziemlich stark lichtbrechendes Gebilde, welches selbst in einer sphärischen durchsichtigen Hülle eingeschlossen war. Dass letzteres Gebilde ein Saugnapf oder ein Magen, wie Kölliker angiebt, oder ein mit einer Oeffnung versehenes schalenförmiges Organ sei, wie in den von Wagener beobachteten Dicyemen, wurde damals nicht einmal vermuthet. — Sowohl die Embryonen, wie die zellenartigen Körper waren, jedes Stück für sich, mit einer Membran umgeben. Was ich aber für eine Membran hielt, ist vielleicht nur der optische Ausdruck einer Höhle im Wagener'schen Kerne.

In gewissen Individuen kamen anstatt der Embryonen andere Körper vor. Es waren dieselben wurmförmig, oft gekrümmt, und liefen nach dem einen Ende zu in eine Spitze aus, während das andere abgerundet war. Diese Körper werden wohl der zweiten Art Embryonen, die von Kölliker und Wagener gesehen worden ist, entsprechen, jedoch waren sie immer vollkommen starr und unbeweglich und niemals bewimpert. Ihr Inhalt war gleichmässig und zeigte niemals stark lichtbrechende Körner. Bei starker Vergrösserung schienen sie in eine eigene, dicht anliegende Membran eingeschlossen zu sein. Die wurmförmigen Körper waren stets

in anderen Individuen enthalten, als die infusorienartigen Embryonen. Neben ihnen kamen aber immer die runden, zellenartigen Gebilde vor. Ob sie sich jedoch aus letzteren entwickeln, steht dahin. Manchmal waren sie zu fünf oder sechs in einem Individuum enthalten, oft auch war ein einziger vorhanden, der dann nicht selten zwei Drittel der ganzen Länge des sie enthaltenden *Dicyema*'s erreichte. — Jedenfalls zeichnen sich diese Körper durch ihre zugespitzte Gestalt aus, welche von derjenigen der von Dr. Wagener beobachteten wurmförmigen Embryonen ziemlich abweicht.

Da dieses *Dicyema* sich durch die Art des s. g. Kopfpolsters von den bisher beobachteten namhaft unterscheidet, so glauben wir ihm einen eigenen Namen geben zu dürfen und zwar *Dicyema Mülleri*, Cl. et Lachm., da Prof. Müller die Felder an demselben zuerst entdeckte.

Figuren-Erklärung.

Fig. 1—15 sind sämtlich 450 Mal vergrößert.

Fig. 1. *Dicyema Eledone maculata*.



zerfallen und statt hinter einer kleinen Oeffnung sieht man es frei im Grunde eines Napfes liegen.

Fig. 4—6. Normale infusorienartige Embryonen von verschiedenen Seiten gesehn.

y. Die der Oeffnung des schalenförmigen Organes k. entsprechende klappige Grube oder Oeffnung. Ansicht von der Bauchseite.

Fig. 5. von oben gesehn.

Fig. 6. von der Seite.

Fig. 7. *Dicyema Eledones* mit wurmförmigen Embryonen. Bezeichnung wie in Figur I. Man sieht bei diesem besonders deutlich die Doppelcontouren der innersten und äussersten Schicht des Leibes.

Die Kopfform dieser Thiere variirt ungemein. Bald ist sie rund, bald pfeilförmig, bald wie aus 4 langen Lappen bestehend.

Bei einigen Thieren war das Kopfpolster sehr dünn und die hineinragende Leibeshöhle ungemein erweitert.

Fig. 8. Stück eines isolirten Kernes mit daran haftenden Trauben von Keimkugeln.

Fig. 9. Wurmformige Embryonen. An dem einen hat sich noch nicht das Kopfpolster a. gebildet, man sieht die Abtheilungen des die Leibeshöhle ganz ausfüllenden Kernes f.

Fig. 10. Stück aus dem Leibe eines *Dicyema* mit wurmförmigen Embryonen.

d. grosse, gelb gefärbte, zellige Gebilde in der Rindenschicht liegend.

o. Warzenförmige, mit gelben runden Körnchen gefüllte Erhebungen eben daher.

d. Ein sich bildender Embryo.

Fig. 11. Stück aus dem Halstheile eines *Dicyema*, mit wurmförmigen Embryonen, ohne Rindenschicht, mit dünnem Kopfpolster, das das sehr ausgedehnte Leibeshöhlenende bedeckte.

c. Rindensubstanz.

e. Doppelte Leibeshöhlencontour.

q. Farblose, die Leibeshöhle ausfüllende Masse, auf der die Keimkugeln g. aufsitzen.

Fig. 12. Kopfpolster von unten gesehn mit seinen Wimpern w. Der Leib ist aus ihm entfernt.

e''. Das Loch in dem der Leib eingesenkt war.

r. Die doppelten Contouren der Zellengrenzen.

x. Die kernartigen Gebilde in den 4 Zellen.

Fig. 13. *Dicyema gracile mihi* aus *Sepia officinalis*.

Bezeichnung wie in Fig. I.

1. Ein grosser, zusammengerollter Embryo.

f. Der Kern liegt frei in der Leibeshöhle und verschwindet nach

oben und unten in die farblose, zähe, die Leibeshöhle ausfüllende Substanz q.


Fig. 14. Wurmformige Embryonen.

Fig. 15. Infusorienartige Embryonen.

Fig. 16. 17. *Dicyema Mülleri* aus *Eledone cirrosa*.

Die Buchstaben wie in der I. Fig.

NB. Die letzten beiden Figuren hatte Herr Claparède die Güte, den meinigen hinzuzufügen.



Ueber einen neuen Entwicklungsmodus der Ophiuren

von

DR. A. KROHN.

(Hierzu Tafel XIV. B.)

Die Beobachtungen, die ich hier mittheile, sind im Winter von 1855 auf 56, während meines Aufenthaltes in Funchal, angestellt worden. Sie betreffen eine eigenthümliche Entwicklungsweise zweier Arten Ophiuren, die sich im Wesentlichen dadurch auszeichnet, dass der Embryo nicht zu einer pluteusförmigen Larve auswächst, vielmehr schon bald nach dem Abstreifen der Eihülle, zur Umbildung in die radiale Gestalt sich anschickt.

Von beiden Arten wurden an einzelnen Tagen, im Laufe des November, December und Januar, sowohl reife, in den Eihüllen eingeschlossene, als auch freie Embryonen mit mehr oder minder deutlicher Sternanlage, auf der hohen See eingefangen. Sie wurden jedes Mal in ein zu ihrer Aufnahme bestimmtes Glas eingesetzt, wo sie sich, ohne dass das Wasser häufig gewechselt zu werden brauchte, weiter entwickelten.

Erste Art.

Der Embryo, wenn er das Ei verlässt, ist von länglich-ovaler Gestalt, gegen das eine Ende hin verschmüchtigt und abgerundet, an dem entgegengesetzten breitem Ende abgestutzt. Seine Oberfläche ist dicht mit äusserst feinen Cilien besetzt, mittelst welcher er, fortwährend um die längere Achse sich wälzend, ziemlich rasch im Wasser herumschwimmt. Seine Farbe ist weiss. Sie hat ihren Sitz in einer unter dem äussern Wimperepithelium liegenden Schicht, die aus Zellen mit feinkörnigem Inhalte zu bestehen scheint.

An der Umbildung in den Stern betheiligt sich zunächst nur die massivere, beim Schwimmen nach hinten sehende Abtheilung des Embryoleibes, der übrige Theil wird erst nachgehends verbraucht, schwindet so immer mehr und geht zuletzt ganz ein.

Das erste äusserlich wahrnehmbare Zeichen der beginnenden Umbildung ist eine rundliche Vertiefung, die sich kurze Zeit nach dem Ausschlüpfen des Embryo im Centrum des abgestutzten Hinterendes bildet.

Der Embryo wird nun etwas länger und schwächlicher, während sein hinterster Leibesabschnitt sich zunächst auftreibt und bald darauf zur Gestalt einer schrägen, auf die Achse des Embryo gestellten Scheibe, deren Rand wulstig hervorgehoben erscheint, auswächst. Mitten auf der freien, vom Embryo abgewendeten Seite dieser Scheibe erblickt man die bereits erwähnte rundliche Vertiefung des früheren Hinterendes. Die Scheibe ist die erste Anlage des Sterns, ihre freie, vom Embryo abgekehrte Seite bildet sich zur Ventralfläche, die Vertiefung zum Vorhofe des künftigen Mundes aus.

Die nächste Veränderung ist, dass der Rand der Scheibe



Länge beträgt etwa $\frac{2}{3}$ Millim., während der Stern $\frac{1}{3}$ Millim. misst. Das Schwimmen geht noch immer behende, aber ohne die frühern Rotationen vor sich.


Der Stern wird nun, indem seine Lappen sich verlängern und zuspitzen, deutlich pentagonal, er kommt, bevor der ihm anhängende Embryotheil ganz eingeht, unter einem fast rechten Winkel auf diesen zu stehen. Ist der embryonale Anhang auf ein geringes Ueberbleibsel reducirt (s. Fig. 2), oder bereits geschwunden, so sinkt der Stern zu Boden, und geht hier seiner ferneren Ausbildung entgegen. Zu dieser Zeit ist der Stern bis auf einen halben Millimeter herangewachsen. Sein Rücken tritt nun deutlicher gewölbt hervor. Die Kalkfiguren im Perisom des Rückens haben nun reichliche Zweige angesetzt. Die eine davon nimmt genau die Mitte des Rückens ein. In den Ecken des Sterns bemerkt man noch einzelne Kalkstücke von abweichender Form und Disposition. Es sind die Ansätze jenes charakteristischen Kalkgerüsts, das den Endgliedern der Ophiurenarme eigen. Die grössern, in der Peripherie gelegenen Füßchen sind nun geringer Bewegungen fähig, können sich aber noch nicht festsaugen. Von dem Munde ist noch nicht die mindeste Andeutung vorhanden, wohl aber unterscheidet man im Innern des Sterns den gelblich weissen Magen.

Bald darauf sind die grösseren Füßchen schon so weit ausgebildet, dass der Stern sich mittelst ihrer anheftet und fortkriecht. Die Anheftung geschieht mittelst kleiner, vorstreckbarer, konisch-spitzer Papillen, mit welchen die nun kolbig aufgetriebenen Enden der Füßchen besetzt sind. Das Kalkgerüst in den Ecken des Sterns oder den Endgliedern der künftigen Arme, besteht jetzt deutlich aus mehreren geraden, durch Querbalkchen mit einander verbundenen Stäben. Auf der Bauchseite unterscheidet man in jedem Inter-radialraume ein paar netzförmig durchbrochener, bis an die centrale Vertiefung oder die Vorhöhle des späteren Mundes reichender und hier convergirend mit einander zusammen-treffender Kalkplatten. Es sind die Anlagen der späteren Mundeckstücke. Die Kalkfiguren im Perisom des Rückens

haben sich, in Folge des Anschliessens immer neuer Zweige, so sehr vergrössert, dass sie sich fast berühren. Dagegen hat sich ihre Zahl durch gegenseitige Verschmelzung sehr vermindert. Sie sind nun grösstentheils in Netze mit verhältnissmässig grossen Maschen umgewandelt.

Hat der Stern die Grösse von etwa $\frac{5}{8}$ Millim. erreicht, so nimmt man auf der Bauchfläche, in jedem Radius, schon zwei rudimentäre Stacheln wahr, je einen zur Seite eines einzelnen Saugfusses. Das Perisom des Rückens scheint nun wie von einem einzigen Kalknetze durchzogen. Bei schärferer Untersuchung löst sich jedoch dieses Kalknetz in sechs rundliche, einander dicht begränzende Schuppen auf. Eine der Schuppen nimmt genau die Mitte des Rückens ein; ihres ersten Auftreters ist schon oben gedacht worden. Die fünf übrigen Schuppen liegen rund um jene herum.

Einige Zeit später erkennt man endlich auch den Mund in einer runden, bald enger, bald weiter erscheinenden Oeffnung, die sich im Boden des Vorhofes gebildet hat. Was die unterdess weiter entwickelten Mundtentakeln insbesondere anlangt, so zeigen sie sich in ihren Bewegungen nun nicht minder rührig als die Saugfüsschen.



Vorhof des Mundes hinein. In Folge der stärkern Ausbildung der Hartgebilde erschienen die Maschenräume derselben verkleinert, was namentlich an den Rückenschuppen deutlich in die Augen fiel. Die junge Ophiure, von mattweisser Farbe, maass etwas über $\frac{3}{4}$ Millim.

Zweite Art.


Diese Spezies stimmt mit der vorigen, hinsichts der Entwicklungsphasen, die der Stern von der ersten Anlage an zu durchlaufen hat, fast ganz überein. Nur der Embryo verhält sich eigenthümlich. Abgesehen davon, dass sein breiteres, beim Schwimmen nach hinten gerichtetes Ende gelbroth oder hochroth gefärbt ist, gleicht er anfangs zwar ganz dem der vorigen Art, streckt sich aber bald sehr viel stärker in die Länge und wächst zur Zeit, wenn die erste Anlage zum Stern auftritt, noch eine Strecke weit über diese hinaus. So kommt es, dass man noch in einem spätern Stadium den Embryo in der Gestalt zweier ungleich langer Anhänge, von denen der nachgewachsene kürzere beim Schwimmen hintangeht, über den Rand des nun pentagonalen Sternes vorragen sieht (Fig. 4). Zu dieser Zeit steht der Stern mit seiner Achse schon ganz rechtwinklig auf dem Embryo, von dem er auch durch seine rothe Farbe grell absticht.¹⁾ Bei dem bald darauf beginnenden Schwinden der Embryonalanhänge geht der kürzere zuerst ein.

Die Entwicklung liess sich nicht so weit wie bei der ersten Art verfolgen. Der Stern besitzt, ausser andern ihm mit jener Art gemeinschaftlich zukommenden Characteren, ganz dieselben, mit spitzen Saugpapillen versehenen Füsschen. Er unterscheidet sich, ausser der rothen Farbe, durch seine geringere Grösse.

1) Im Embryo liess sich zuweilen ausser kleineren Kalkablagerungen, über deren Form und Vertheilung ich nicht ins Klare gekommen bin, deutlich ein gerader, starker, bis in die beiden Enden reichender Kalkstab unterscheiden.

Erwägt man zuvörderst, dass das radiale Echinoderm zunächst nur aus einem Theile des Embryoleibes sich entwickelt, ferner, dass es gleich anfangs in einer schrägen Stellung zur Achse desselben auftritt, so unterliegt es, meines Erachtens, wohl keinem Zweifel, dass der Embryo eigentlich die Bedeutung einer Larve habe. Es ist eine Larve, die im Gegensatz zu den pluteusförmigen Ophiurenlarven, den Embryonenzustand nicht überschreitet.¹⁾

Mit der gewonnenen Einsicht in den Entwicklungsmodus der beiden Ophiuren hellt sich nun auch die Abkunft jenes Seesterns auf, dessen Larve unter dem Namen der wurmförmigen Asterienlarve bekannt ist. (Vergl. J. Müller über die Entwicklung und Metamorphose der Echinodermen. Separatabdruck der 3. Abhandl. p. 26, der 4. Abhandl. p. 40, der 6. Abhandl. p. 29). Nach den frühesten von J. Müller beobachteten Entwicklungsstufen scheint es mir nämlich jetzt nicht länger zweifelhaft, dass jener Seestern, trotz der abweichenden Form der Larve, nach einem ähnlichen Modus sich entwickelt. An der Umwandlung betheiligt sich nur ein gewisser Leibestheil der Larve — nämlich drei von den fünf Segmenten, welche die Larve ursprünglich besitzt — der Rest — die zwei übrigen Segmente — geht allmählig ein.²⁾ Hierbei stellt sich der Stern auf eine entsprechende Weise recht-



der Ambulakralkanäle stehen in gleicher Weise aus den Ecken des Sterns frei hervor. Es ist also mehr als wahrscheinlich, dass der Stern sich zuletzt zu einer Ophiure ausbildet, wie denn J. Müller selbst schon auf diese Eventualität hinweist (s. die Schrift über den Bau der Echinodermen p. 46).

Erklärung der Abbildungen.

Die Figuren 1—3 stellen einzelne Entwicklungsstufen der 1. Art dar.

Fig. 1. Der fünfklappige Stern mit dem ihm anhängenden, im Schwinden begriffenen Embryo. Ansicht von der Bauchseite.

a. Stern. — b. centrale Vertiefung oder Anlage der Vorhöhle des künftigen Mundes. — c. c. Anlagen der Saugfüßchen. — d. d. Anlagen der Mundtentakeln. e. Embryo.

Fig. 2. Der bereits pentagonale Stern von der Rückseite,

a. Stern. — b. Ueberrest des Embryo.

Fig. 3. Die späteste der beobachteten Entwicklungsstufen. Ansicht von der Rückseite.

a. a. Die Dorsalschuppen. — b. b. In der Bildung begriffene Armglieder. — c. c. Endglieder der Arme. — d. d. Die über den Rand der Scheibe hervorragenden Stacheln.

Fig. 4. Der bereits pentagonale Stern der 2. Art mit den beiden Embryonalanhängen. Ansicht von der Bauchseite.

a. Stern. — b. b. Anlage der Saugfüßchen. — c. Der längere, beim Schwimmen nach vorn sehende Anhang. — d. Der nachgewachsene kürzere Anhang.

Beiträge zur Anatomie der Spongien

von

N. LIEBERKÜHN.

(Der Gesellschaft naturforschender Freunde mitgetheilt in den Sitzungen
vom 6. September und 2. December 1856.)

(Hierzu Taf. XV.)

Ueber den Bau der Schwämme finden sich ausführliche Angaben in den Werken von Grant. Nach diesem Forscher bestehen die Schwämme aus einem harten Gerüst und aus einer weichen Körpersubstanz, welche von dem Gerüst getragen wird und sich auf demselben so vertheilt, dass auf der Oberfläche der Spongie eine grosse Menge von Oeffnungen,



tige Agentien der Wasserströmung nothwendig sind, welche durch die Kanäle beständig hindurchgehen. Es sind keine besondern Blindsäcke oder Mägen vorhanden, welche die Nahrung aufnehmen könnten, die zugleich mit den Wasserströmen in den Körper gebracht wird. Eben so wenig kommen Muskeln, Nerven, Sinnesorgane vor. Das Gewebe der Schwämme hielt Grant nicht für kontraktile.

Die Embryonen bieten während des Schwärmens und einige Zeit, nachdem ihre Entwicklung zu einem fixirten Zustande begonnen hat, in ihrem Körper keine bemerkbaren Kanäle oder Höhlungen irgend einer Art dar.

Audouin und Milne Edwards haben die Beobachtungen von Grant 1828 bestätigt und bei den Tethyen die Poren sich schliessen sehen, wenn die Thiere aus dem Wasser genommen oder anderweitig gereizt wurden.

Dujardin hat den Bau der Schwämme nicht näher beschrieben, sondern nur angegeben, dass sie aus einer Masse von amorphen den Amöben ähnlichen Parzellen bestehen, die sich auf ein Gerüst von Kieselnadeln stützen, die äussersten dieser Theile tragen Geisseln wie die Monaden.

Laurent, dessen grösseres Werk (Voyage autour du monde sur la corvette „La Bonite“; Zoophytologie, Paris 1844) mir erst jetzt zur Einsicht gelangt ist, giebt an, dass die Spongillen, welche eine Abtheilung der Schwämme bilden, im ausgebildeten Zustande eine äussere Haut besitzen, die sich in den röhrenförmigen Fortsatz verlängert; diese Haut selbst hat keine Poren; solche finden sich vielmehr unter der Haut, die zunächst eine grosse Höhlung umschliesst, aus welcher die Poren in das gallertige, durch das Nadelgerüst getragene, von Kanälen vielfach durchsetzte Gewebe führen. Ueber die Vertheilung der Wimpern hat Laurent keine Beobachtungen mitgetheilt.


Ueber eine bestimmte Anordnung der Wimpern im Innern des Schwammes berichtet zuerst Bowerbank (On ciliary action in the Spongiadaeae. The Transactions of the microscopical society of London. Vol. III. 1852). Er sah auf Durchschnitten grosser Stücke von *Grantia compressa* Zellen

mit Wimperhaaren und bildet grosse unregelmässige Hohlräume ab, die mit Wimpern besetzt sind.

Eine ganz andere Auffassung vom Bau der Schwämme giebt neuerdings der Verfasser des den schweizerischen mikroskopischen Präparaten beigegebenen Textes. Nach ihm sind die hornigen Fasern des Badeschwammes die Verdauungsorgane, in welche durch hypothetisch angenommene Wimpern die Nahrungssubstanzen hineingetrieben werden, Er berichtet, dass in den hohlen Fasern Polythalamien und ähnliche Körper vorkommen, wie sie in den Verdauungsorganen der Holothurien gefunden werden.

Die äussere Haut,


welche die Spongille allseitig umschliesst, wird von den äussersten Spitzen des Nadelgerüsts getragen, welche sie zum Theil nur wenig, zum Theil mehr als eine Nadellänge überragen. An einer Stelle setzt sie sich in den röhrenförmigen Fortsatz fort. Sie besteht aus kontraktile Zellen. Andere Bestandtheile, wie etwa Fasern oder eine strukturelose, sie umkleidende Membran wurden an ihr bisher nicht wahrgenommen. Die Zellen derselben unterscheiden sich



gillenmassen entwickelt haben. Ein solches möglichst dünnes und etwa 3 bis 5 Linien langes und ungefähr eben so breites Stück wird in eine grosse Quantität Brunnenwasser gelegt. Es enthält einen Theil des Gerüstes, dessen Nadelbündel oft nur eine einzige netzförmige Schicht bilden; die Zwischenräume dieses Gitters sind mehr oder weniger gross, bisweilen nicht mehr mit blossen Augen zu erkennen. Am geeignetsten zur Beobachtung sind Exemplare mit breiten, leicht sichtbaren Maschen. Das Nadelwerk ist unmittelbar nach dem Herausschneiden mit mehr oder weniger dicken Lagen von Gewebe überzogen, auf welchem vielfach abgerissene Zellen und kleine Gallertstücke umherliegen. Nach einigen Stunden verschwinden diese Unregelmässigkeiten bereits zum Theil, und die Gewebsbalken verlieren die Rauigkeit und werden glatt, so dass es aussieht, als wären sie von einer feinen, durchsichtigen Membran überzogen. Von manchen Stellen gehen dünne Fasern aus und ergiessen sich nach dem benachbarten Nadelbündel hin, von andern sieht man eine ganze Gewebslage wie eine feine Haut hervortreten und sich zwischen die Nadelbündel ausspannen: oft geschieht dies zugleich oberhalb und unterhalb eines Gewebsbalkens und es erstrecken sich beide Lagen bis zum nächsten hinüber, so dass sie eine Höhlung einschliessen. In andern Fällen tritt von dem obern und untern Theil eines mit Gewebe belegten Nadelbündels zu einem andern ein dicker Streifen allmählig wie eine Brücke hinüber und breitet sich alsdann in eine dünner und dünner werdende Haut nach beiden Seiten hin aus, so dass auch auf diese Weise ein Hohlraum gebildet wird. Nach Verlauf von einem oder einigen wenigen Tagen ist auf diese Weise das ganze Spongillensteinstück mit einer Haut überkleidet, es ist dies die äussere Haut der Spongille. Selbst schon ehe dieselbe den ganzen Körper umschliesst, erscheinen in ihr hin und wieder mehr oder weniger geöffnete Poren. An einer Stelle sieht man häufig schon Wasser aus dem Innern ausströmen; solches Loch ist zunächst sehr ausgedehnt, es verengt sich aber allmählig und die die Ausflussöffnung unmittelbar begrenzende

Haut ragt etwas nach aussen mit ihren Rändern hervor, es ist dies der Anfang des röhrenförmigen Fortsatzes, der allmählig länger wird, bis er die schon früher beschriebene Grösse erreicht hat. Während dessen bilden sich im Innern noch viele dünnere und dickere Brücken von Geweben von einem Nadelbündel zum andern; dieselben sind nicht von Nadeln durchsetzt, manche verlaufen auch von dem innern Parenchym oft mehrfach verzweigt an die äussere Haut.

Die beschriebenen Vorgänge finden oft so schnell statt, dass man Streifen von Gewebe und dünne Häute nach wenigen Minuten an Stellen bemerkt, an denen sich vorher Nichts davon vorfand. Es kann daher die Frage entstehen, ist es eine Neubildung von Gewebe, durch die sich das Spongillenstück zu einer Spongille vollendet, oder ist es nur eine andere Anordnung des bereits vorhandenen Materials, wodurch die Spongille zu Stande kommt, oder ist beides zugleich wirksam? Erscheinungen, welche auf Neubildung hindeuten, habe ich vergeblich gesucht, namentlich fand ich nicht Zellen mit zweien Kernen oder mit einem in der Theilung begriffenen Kerne vor. Sicher ist so viel, dass sich plötzlich an Stellen der äussern Haut röhrenförmige Fortsätze bilden




Wasser zwei Monate hindurch aus, wo die Spongillen atrophirend zu Grunde gingen. Bei diesen Vorgängen ist wohl nicht eine Neubildung von Zellen anzunehmen.

Die Poren,

durch welche das Wasser beständig in die Spongillen einströmt, hatte ich bisher nur in geringer Anzahl, nämlich bis zu zwei an einem Exemplare wahrgenommen. So findet es sich häufig, oft sind auch die Poren sämmtlich geschlossen und auf solchen Zustand passt Laurent's Beschreibung der Spongillen. Häufig fand ich aber die Poren über die ganze äussere Haut in zahlloser Menge verbreitet vor. Es eignen sich zu diesen Beobachtungen die aus ausgeschnittenen Stücken entwickelten Spongillen; man legt sie in ein Glasnäpfchen, welches so viel Wasser enthält, dass der obere Theil des Körpers gerade mit Wasser bedeckt ist; eine 200fache Vergrösserung ist ausreichend.

An einzelnen Stellen hat die äussere Haut das Aussehen eines Netzwerkes, in so nahen Zwischenräumen stehen die Poren bei einander; an andern Stellen stehen sie nur vereinzelt. Ihre Form ist kreisrund oder elliptisch; ihre Grösse ist ausserordentlich verschieden. Die grössten kreisförmigen haben einen Durchmesser von einer halben Nadellänge, die kleinsten sind in der Regel wohl in der Schliessung begriffene. Bisweilen wird eine Pore durch einen Fortsatz allmählig in zwei Abtheilungen getrennt; es fliesst nämlich ein feiner Streifen von irgend einer Stelle der Peripherie zu einer gegenüberliegenden hin und verdickt sich mitunter so, dass man nun nicht mehr eine, sondern zwei Poren vor sich hat. Das Schliessen der Poren geschieht äusserst langsam; in seltenen Fällen sieht man die Bewegung der Substanz direct; der Kreis wird allmählig kleiner, bis er spurlos verschwindet, nur bisweilen bleibt eine Art Vakuole zurück. Das Oeffnen der Poren geht eben so langsam vor sich. Man bemerkt zuerst ein äusserst feines Loch in der Haut, welches sich mehr und mehr erweitert, bis es die gewöhnliche Grösse erreicht hat. In einem frühern Aufsatz (p. 499 Jahrgang 1856

dieses Archivs) habe ich bereits mitgetheilt, dass junge Spongillen am fünften Tage nach ihrer Festsetzung Karminkörnchen durch ein Osculum aufnehmen. Seitdem habe ich deren bis zu acht an einem solchen Exemplare beobachtet und zwar schon vom zweiten Tage ab; sie waren gleichzeitig geöffnet und lagen meist am Rande der Spongille in dem ganzen Umkreise desselben vertheilt. An einer Stelle befanden sich zwei dicht neben einander; sie sind hier schwierig wahrzunehmen, wenn man nicht Karmin in das Wasser bringt. In ihrer grössten Ausdehnung haben sie den Durchmesser einer kontraktilen Zelle; sie können sehr lange geöffnet bleiben, so sah ich sie 40 Stunden hindurch. So lange die Poren offen stehen, strömt gewöhnlich Wasser in sie hinein; kommt ein Körperchen, z. B. Karminkörnchen in ihre Nähe, so wird es heftig durch die Oeffnung in das Innere hineingerissen; sind die Körperchen zu gross, so bleiben sie oft lange vor dem Eingang hängen. Wenn das Wasser reichlich mit Karminkörnchen versehen ist, so strömen dieselben gleichzeitig durch alle Poren hindurch. Bei grossen Spongillen geschieht dies so schnell, dass in wenigen Minuten der ganze Körper schon für das blosse Auge roth erscheint.




Spongille bis auf die Stelle, wo der röhrenförmige Fortsatz austritt; sie wird begrenzt nach aussen durch die Innenfläche der äussern Haut und nach innen durch das innere Körperparenchym. Bei Spongillen, die aus ausgeschnittenen Stücken entwickelt sind, strömt das Wasser von der ganzen Oberfläche gleichfalls erst in eine sackförmige Höhlung hinein; sie ist zuweilen so eng, dass sie kaum noch wahrgenommen wird, wenn nicht gerade gefärbte Flüssigkeiten hineinströmen. Dass es eine einzige, überall zusammenhängende Höhle ist, sieht man namentlich an jungen Spongillen und zwar am klarsten, wenn nur eine oder zwei Poren offen stehen. Die Körnchen werden dann häufig erst durch den ganzen Umfang der Höhlung getrieben, ehe sie in das Innere eindringen. Bei jungen Spongillen, welche sich an der Oberfläche des Wassers festgesetzt haben, strömen die Körnchen von unten durch die Poren in die Höhlung ein; bisweilen setzen sich nämlich Schwärmsporen statt auf festen Körpern an der Oberfläche des Wassers fest und entwickeln sich weiter; der röhrenförmige Fortsatz ragt hier nicht wie sonst nach oben empor, sondern nach unten ins Wasser hinein und auf dieser Seite beobachtete ich auch die Poren.

Durchsetzt wird jener Hohlraum nur an einzelnen Stellen von Nadeln oder von Nadelbündeln, welche aus dem Innern sich bis zur äussern Haut erstrecken, ferner wird er auch von Streifen oder Lagen von Zellen durchsetzt, die das Innere mit der äussern Haut verbinden, ohne von Nadeln begleitet zu sein.

Aus der sackförmigen Höhle strömt das Wasser ohne Aufenthalt in viele kleine Kanäle, deren Eingänge man häufig erkennen kann, welche in andern Fällen jedoch von undurchsichtigem Parenchym verdeckt sind. An jungen, einige Wochen festsitzenden Spongillen, deren Gewebe von wenig stark lichtbrechenden Körnchen erfüllt ist, zählte ich acht bis zehn solcher Oeffnungen; sie lagen im ganzen Umfange des Körpers in nicht sehr verschiedener Entfernung von einander. Die Kanäle erkennt man in einzelnen Fällen deutlich, sie verlaufen entweder gerade oder etwas gewunden; ihr Lu-

men ist sehr verschieden und auch derselbe Kanal ist in seinem Anfange oft weiter oder enger als in seinem Verlauf; gewöhnlich lässt sich der weitere Verlauf jedoch nur aus der Richtung erschliessen, welche die eindringenden Körperchen nehmen. Die einströmenden Karminkörnchen dringen schnell in die Kanäle hinein und bleiben in grösserer oder geringerer Entfernung von der Eingangsöffnung plötzlich in kugelförmigen Räumen stecken; diese kugelförmigen Räume sind die Wimperorgane. Die Wimperorgane sind bereits früher von mir beschrieben worden und zwar unter den wimpernden Spongillenstücken, welche man durch Zerreissung des Schwammkörpers erhält. Es liess sich damals jedoch nicht feststellen, ob es Theile eines zusammenhängenden bewimperten Kanales waren, oder ob eine andre Anordnung stattfand. Man sieht durch die Haut die kugelförmig angeordneten, dicht gedrängt neben einander stehenden Wimperzellen hindurch, deren Wimperhaare in die innere Höhlung des Apparates hineinragen. Liegen die Behälter der Oberfläche sehr nahe, so fällt die Wimperbewegung öfter sogleich auf und lassen sich bisweilen selbst die einzelnen Haare unterscheiden, liegen sie tiefer oder ist die äussere Haut nicht ganz durchsichtig, so



beide gleichzeitig statt. Der Einflussöffnung gegenüber oder in geringerer Entfernung von ihr liegt die Ausflussöffnung; wo diese sichtbar war, unterschied sie sich weder in der Grösse, noch in der Form von jener. Die Zahl der sichtbaren Wimperbehälter ist sehr verschieden; in einzelnen etwa zwei Monate alten Spongillen lagen ihrer so viele in dem Rand des Körpers, dass sie sich fast unter einander berührten; es waren ihrer bei weitem mehr als aus dem grossen Hohlraum wahrnehmbare Kanäle abgingen; es müssen sich also letztere entweder verzweigen, wenn jeder Kanal nur ein Wimperorgan haben soll, oder ein Kanal hat wirklich mehrere Wimperorgane; möglich wäre jedoch auch, dass nur ein geringer Theil jener Kanäle überhaupt in solchem Falle sichtbar war. Am frühesten fand ich die Wimperapparate in einer jungen Spongille, welche sich erst seit einem Tage festgesetzt hatte. Die Zellen waren sehr durchsichtig und die einzelnen Wimperhaare erkennbar. Bei den aus ausgeschnittenen Stücken entwickelten Spongillen beobachtet man öfter nach einigen Wochen leicht die Wimperapparate in zahlloser Menge innerhalb einer aus contractilen Zellen bestehenden Haut, welche sich unter der äussern Haut ausbreitet und sich theils an ihr anheftet, theils sich in die im Innern befindlichen netzförmig verbreiteten Gewebsbalken fortsetzt. Im Wasser befindliche Karminkörnchen sieht man hier aus dem grossen Hohlraum unmittelbar in jene Wimperapparate gelangen.


Das Kanalsystem.

Früher ist schon angegeben worden, dass die von den Spongillen aufgenommenen Karminkörnchen schliesslich durch den röhrenförmigen Fortsatz wieder ausgeworfen werden. Es bleibt daher noch übrig, den Weg zu verfolgen, auf welchem sie aus den Wimperapparaten, in denen sie öfter viele Stunden stecken bleiben, zu dem röhrenförmigen Fortsatz gelangen. Unter den aus ausgeschnittenen Stücken entwickelten Spongillen finden sich bisweilen Exemplare, welche schon für das blosse Auge eine Anzahl sich in den röhrenförmigen Fortsatz vereinigender Kanäle zeigen; bei schwa-

cher Vergrösserung bemerkt man, dass sich hier über den ganzen Körper ein verzweigtes Kanalsystem ausbreitet, dessen Hauptkanäle schliesslich in dem röhrenförmigen Fortsatz zusammentreffen, während die feinern Verzweigungen sich bis an die Oberfläche hin erstrecken.

Beobachtet man an einem solchen Exemplar die in dem Wimperbehälter befindlichen Karminkörnchen: so findet man, dass sie sich auf zwei Wegen aus denselben entfernen; die einen nämlich, und dies ist das häufigere, gleiten ohne Weiteres in das Kanalsystem hinein und werden sogleich durch das darin fortwährend strömende Wasser zu dem röhrenförmigen Fortsatz hinausgeführt; die andern gelangen in das Parenchym der Spongille hinein und bleiben daselbst stecken.

Die Kanäle, welche das Wasser aus den Wimperapparaten weiter führen, haben anfangs ungefähr das Lumen der Zuführungskanäle und münden entweder sogleich in einen grössern Kanal, oder vereinigen sich zuvor mit andern aus Wimperapparaten kommenden Gängen. Ihre Ausmündungsstellen sieht man häufig als kreisrundes Loch in der Wand des grössern Kanales und beobachtet auch, wie durch ein solches hindurch fremde Körperchen in den grössern Kanal



vorsichtig aus dem Wasser hervorgehoben. Die äussere Haut überzog sackförmig den ganzen Körper und stand an vielen Stellen an zwei Linien weit ab und war in nahezu gleichen Zwischenräumen in drei röhrenförmige Fortsätze ausgezogen, aus denen hin und wieder fremde Körperchen mit solcher Heftigkeit herausgeworfen wurden, dass sie bis an die gegenüberliegende etwa zwei Zoll weit entfernte Glaswand gelangten. Auf einem grossen Theil der Spongille verliefen drei weite Kanäle, welche in geringen Zwischenräumen Oeffnungen, Ausmündungsstellen kleinerer Kanäle, enthielten und sich kurz vor dem röhrenförmigen Fortsatz zu einer einzigen grossen Höhlung vereinigten. Den beiden andern röhrenförmigen Fortsätzen strömte das Wasser aus vielen kleinen, mit blossen Augen kaum erkennbaren Kanälen zu, welche sich ebenfalls vor ihrer Ausmündung vereinigten.

In vielen Spongillen ist das Kanalsystem als solches nicht wahrzunehmen; man erkennt nur vereinzelte Höhlungen im Innern des Körpers, welche jedoch zusammenhängen, wie man aus den Körnchenströmungen schliessen muss, die auch hier zuletzt aus dem röhrenförmigen Fortsatz austreten. In andern Fällen sind aber auch nicht einmal Höhlungen und röhrenförmige Fortsätze aufzufinden gewesen, selbst wenn die Spongillen frisch aus dem Wasser genommen wurden. Bei den jungen Spongillen ist ebenfalls von dem Kanalsystem häufig nur die Endigung in dem röhrenförmigen Fortsatz zu beobachten und bei undurchsichtigen Exemplaren auch dieses nicht.

Wie vorher bemerkt wurde, gelangen nach einigem Verweilen in den Wimperorganen nicht alle aufgenommenen Körperchen in das Kanalsystem, sondern es gleitet ein Theil in die eigentliche Gewebsmasse des Körpers hinein und bleibt von Zellen rings umgeben lange Zeit darin zurück, nur bisweilen kamen Fälle vor, wo innerhalb der Zellen selbst Karminkörnchen zu stecken schienen zwischen Kernen und Zellenwand, den Kern rings umgebend. Beim Zerreißen solcher Spongillen liessen sich immer Zellen auffinden, in denen Karminkörnchen sasssen. Es ist jedoch schwierig zu

entscheiden, ob die Zellenwand in solchen Fällen unversehrt war. Zuweilen wurden auch Infusorien durch die Poren in den Körper eingeführt; sie geriethen, nachdem sie eine Weile in der sackförmigen Höhle umhergeschwommen waren, durch die Kanäle so in das Körperparenchym hinein, dass sie von allen Seiten eng umschlossen waren; man sah durch das durchsichtige Körperparenchym hindurch das Spiel der kontraktilen Blasen noch etwa eine halbe Stunde lang; nach zwei bis drei Stunden war das Infusorium so vollständig zerfallen, dass sich Nichts mehr von ihm wahrnehmen liess. Der Vorgang sieht in jeder Beziehung so aus, wie wenn eine *Actinophrys Sol* ein Infusorium gefressen hat.

Ganz zu trennen von der Aufnahme fremder Körper durch die Poren ist die Erscheinung, wenn eine Spongille sich so über einen Gegenstand ausbreitet, dass sie ihn von allen Seiten umschliesst, worüber schon in einem frühern Aufsatz berichtet ist.


Das Kanalsystem ist kein System von Gefässen mit eigenthümlichem Bau, sondern es ist gebildet durch eine eigenthümliche Lagerung des gewöhnlichen Körperparenchyms. Es gelang wenigstens nirgends weder an der unversehrten

und letztere nicht bloss das Muskelgewebe vertreten, wie ich im vorigen Aufsatz angegeben habe.

Die Fortpflanzungskörper.

Es sollen in diesem Abschnitt die in dem grössern Werk Laurent's enthaltenen Beobachtungen nachgetragen und die früheren durch einige neuere ergänzt werden. Die bewimperten Embryonen gehen nach Laurent aus innern Knospen hervor und trennen sich stets von dem Mutterthiere, dessen Gewebe in dem Masse atrophirt, als die Abtrennung von den neuen Individuen vor sich geht. Bevor die innern Knospen nicht $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{5}$ Millimeter an Durchmesser erreicht haben, sind sie in dem Gewebe des Mutterthieres nicht zu unterscheiden; alsdann aber sieht man sie als einzelne weisse Punkte, die sich später in der einen Hälfte aufhellen und mit Wimpern umgeben; zuerst bestehen sie aus Körnern, granules, welche selbst wieder aus feinen Kügelchen, globules, und einer durchsichtigen Flüssigkeit zusammengesetzt sind. Diese Beschreibung passt nicht genau auf die noch unbewimperten Embryonen und deren Keimkörner oder Elementarbläschen, wohl aber auf eine Form der bewimperten Embryonen, welche eben ihr Epithelium verloren haben und sich in solchem Zustande öfters im Innern der Spongillen vorfinden, wo sie sich ohne anzuschwärmen so weit entwickelt haben. Solche Exemplare übersteigen an Durchmesser öfters auch $\frac{1}{5}$ Millimeter nicht und haben ausser fertigen Zellen und vereinzelt Keimkörnern auch meistens schon Nadelanfänge. Die Behauptung, dass mit der Ausbildung der Embryonen das Gewebe des Mutterthieres allmählig schwinde, ist nicht begründet; wenn man Spongillen mit Embryonen in Gefässen aufbewahrt, so atrophiren sie mit der Zeit; dasselbe geschieht aber auch mit Spongillen ohne Embryonen; mehrfach habe ich jedoch beobachtet, dass Spongillen nach dem Ausschwärmen der Embryonen ohne sichtbare Veränderung fortlebten. Laurent beschreibt unter dieser Rubrik der Fortpflanzung, welche er die erste Art der Reproduktion nennt, eine Reproduktion par des sortes de caieux. Die Erscheinung, um die

es sich hier handelt, ist folgende. Wenn man Spongillen, die aus ausgeschnittenen Stücken von Spongillen entwickelt sind, Wochen oder Monate lang im Wasser aufbewahrt hat, so zieht sich das Körperparenchym allmählig immer mehr von den äussersten Theilen des Gerüstes zurück und nimmt einen immer kleineren Umfang an; oft ist nur noch die Hälfte des Gerüstes davon bedeckt. Bald sieht man öfters nur noch einen dünnen Streifen der weichen Körpersubstanz, welcher nach und nach in seiner Mitte durchbrochen wird oder in noch mehr Stücke zerfällt. Diese werden gewöhnlich kugelig, bevor sie ganz zu Grunde gehen. Oefters trennt sich nur ein sehr kleines kugeliges Stück von der übrigen Masse ab. Zuweilen gelingt es nun, durch Zufügung von frischem Wasser, solche Stücke zur weitem Entwicklung, namentlich zur Erzeugung von röhrenförmigen Fortsätzen, zu bringen. Solche kugeligen Stücke sind es nun, welche Laurent für Fortpflanzungskörper ansieht. Wie wir früher mittheilten, ziehen sich auch die aus Schwärmsporen entwickelten jungen Spongillen häufig zu einer einzigen kugeligen Masse zusammen, in deren Umkreise viele Nadeln liegen, von denen es öfters zweifelhaft ist, ob sie von der Sponzille herausgestossen



welche Laurent selbst als dritte Fortpflanzungsart aufgestellt hat.

Die zweite Art der Fortpflanzungskörper sind nach Laurent die *gemmae*, welche er in zwei Abtheilungen theilt; die erste nennt er *oeufs de première saison*, die zweite *oeufs d'arrière saison*.

Die *oeufs de première saison* haben zu Anfang eine durchsichtige Membran und enthalten in ihrem Innern kleine helle, in einer durchsichtigen Flüssigkeit suspendirte, Kugeln, deren Zellenstruktur Laurent nicht erkannt hat. Später werden die Eier gelb und sind auf ihrer Oberfläche mit zahllosen Punkten bedeckt, welche Laurent für Löcher ansieht. Ausserdem finden sich noch ein; zwei oder drei grosse Löcher, die aus den kleinern entstanden sein sollen, und durch welche die zur Spongille werdende Substanz austritt. Die Entwicklung des Inhaltes besteht darin, dass die kleinern Kügelchen durch Zerstörung einer Anzahl von ihnen grösser werden.

Hätte Laurent bei Abfassung dieser Schrift die einige Jahre früher erschienene Arbeit von Meyen gekannt, so würde er einen grossen Theil der im Obigen enthaltenen Ungenauigkeiten vermieden haben. Wie namentlich aus seinen Abbildungen hervorgeht, versteht er unter diesen Eiern jedenfalls diejenigen *gemmae*, welche mit Amphidiskien besetzt sind. Das durchlöchernte Ansehen entsteht durch die auf der Schale aufsitzenden Stäbchen der Amphidiskien. Was Laurent als Durchtritt des Inhaltes durch die drei Löcher abbildet, sieht nicht aus, wie das Auskriechen der Spongille. Dies findet vielmehr durch den Porus Statt. Doch berichtet Laurent, lebende Spongillen aus diesen Eiern erhalten zu haben. Die Entwicklungsgeschichte, welche er von dem Inhalte dieser Eier giebt, ist durch Nichts gestützt, wie es auch der Natur der Sache nach nicht möglich war, da sie so nicht vor sich geht. Was er unter der dreifachen Umhüllungshaut der Eier versteht, lässt sich bei seiner Unkenntniss der Amphidiskien nicht feststellen; die äusserste könnte die Lage der Amphidiskien sein und die dazwischen vorkommenden Rück-

stände der Bläschen, welche Meyen für eine Schicht von Kalksalzen ansieht; die mittlere die lederartige Schale mit dem Porus, von der ich noch nicht habe ausmitteln können, ob sie früher vorhanden ist als die Amphidiskien; die dritte, welche innerhalb der Schale die eingeschlossene Spongille umgeben soll, habe ich bis jetzt noch nicht gefunden.

Die zweite Art seiner Eier nennt Laurent oeufs d'arrière saison. Sie unterscheiden sich von der ersten Art erstens dadurch, dass sie etwas grösser sind, zweitens durch ihre dunklere Farbe, drittens durch einen mehr oder weniger hervorragenden Tubus am Porus, durch welchen das eingeschlossene Thier austritt. Laurent meint hier jedenfalls die gemmulae ohne Amphidiskien, an denen die Schalenhaut öfters am Porus etwas nach aussen ausgezogen ist. Hier fehlt auch der Schein der Löcher in der Haut. Die Merkmale, welche diese Eier von den erstern unterscheiden sollen, sind nicht sachgemäss. Beide Formen sind zuerst weiss und später gelb, bei grünen Spongillen öfters gelblichgrün bis dunkelbraun. Beide Formen finden sich sowohl in der spätern als in der frühern Zeit des Jahres..

Die dritte Art der Fortpflanzung geschieht durch Theilung.




samen Gerüst so entstehen können, dass viele Spongillen aus ihren gemmulis auskriechen und das vorhandne Gerüst überziehen. Dass aber alle grossen Spongillenmassen auf diese Weise entstehen, ist nicht behauptet worden. Es könnte nämlich wohl sein, dass ein bewimperter Embryo eine bedeutende Grösse erreichte, sich alsdann theilte und dadurch vielen gemmulis die Entstehung gäbe. Es wäre dies eine ähnliche Erscheinung, wie sie bei manchen Infusorien beobachtet ist, welche sich incystiren und innerhalb der Cyste mehrfach theilen; es fände aber jedenfalls der Unterschied Statt, dass sich die Spongillen erst theilten und dann incystirten, während die Infusorien sich erst incystiren und dann theilen.

Laurent fand Spongillen mit einem einzigen röhrenförmigen Fortsatz, welche anderthalb Zoll im Durchmesser haben und bereits gemmulae oder Sporen in ihrem Innern enthielten. Nach seiner Annahme ist eine Spongille ein einzelnes Individuum, wenn sie einen röhrenförmigen Fortsatz besitzt und hat dann ihre vollständige Entwicklung erreicht, wenn sie Fortpflanzungskörper enthält. Darnach soll sie zu Grunde gehen. Die letztere Angabe ist unrichtig; ich habe mehrfach Spongillen sowohl mit einzelnen Embryonen als auch mit zerstreuten gemmulis gesehen, welche nach deren Entwicklung keine Veränderungen in ihrem Gewebe wahrnehmen liessen. Es finden sich nämlich vereinzelte gemmulae bei vielen grossen Spongillenmassen vor, vielleicht sind diese die Cysten von solchen Schwärmsporen, welche aus dem Mutterthier nicht ausgeschlüpft sind.

Laurent hält das Zusammenfliessen der Spongillen nur für eine enge Berührung ihrer äussern Haut; dieser Vorgang kann allerdings stattfinden; so wie sich nämlich eine Spongille auf einer Glasfläche, einer Schneckenschale u. s. w. festsetzt und ausbreitet, so kann sie dies auch auf einer Spongille thun. Spongillenmassen entstehen nach Laurent so, dass viele Individuen in solcher Weise zusammenfliessen; die meisten sollen ihre röhrenförmigen Fortsätze behalten und nur die durch die andern gedrückten Exemplare sollen dieselben verlieren. Der eigenthümliche Vorgang, welchen

ich Verschmelzungsprocess nenne, ist von Laurent nicht erkannt worden; wenn es auch richtig ist, dass die aus Schwärmsporen entwickelten oder aus gemmulis ausgekrochenen Individuen nur einen einzigen röhrenförmigen Fortsatz besitzen, so ist doch keineswegs jede mit einem röhrenförmigen Fortsatz versehene Spongille nur ein einziges Individuum, wie Laurent angenommen hat.

Der Vorgang bei diesem Verschmelzungsprocess ist folgender. Es wurden zwei Spongillen, welche sich aus ausgeschnittenen Stücken entwickelt hatten, in einem grossen mit Brunnenwasser gefüllten Glase so nebeneinander gelegt, dass sie sich an einer Stelle eben mit den hervorstehenden Nadeln berührten; der röhrenförmige Fortsatz des einen Exemplars lag unweit der Berührungsstelle, der des andern an der davon abgewendeten Seite. Am folgenden Tage hingen beide Exemplare so fest zusammen, dass sie bei vorsichtigem Herausnehmen aus dem Gefäss nicht auseinanderrissen. Sie wurden in ein Uhrglas mit Wasser gebracht und bei hundertfacher Vergrösserung beobachtet. An der Berührungsstelle waren die beiden Spongillen (ich bediene mich der Kürze halber für ein Spongillenstück mit einem einzigen röhrenförm-




Tage waren die beiden Spongillen so nahe an einander gerückt, dass ihre Nadeln sich durchkreuzten und der Verbindungskanal mehr als dreimal so weit war. Es war kaum noch die Grenze beider Exemplare zu erkennen. Als ich sie jetzt an der Vereinigungsstelle wieder auseinander riss und einen Tag in frischem Wasser aufbewahrte, schlossen sich die aufgerissenen Stellen wieder und der eingegangene röhrenförmige Fortsatz des einen Exemplars öffnete sich von Neuem. Es ist nicht eine bestimmte Stelle, an der die Spongillen verschmelzen, sondern es kann an jeder geschehen. Die auseinander gerissenen Spongillen legte ich so zusammen, dass sie sich an andern Stellen berührten, wie das erste mal; auch so trat derselbe Vorgang ein; es waren sehr flache Exemplare; als sie mit ihren breiten Seiten auf einander gelegt wurden, verschmolzen sie nach einigen Tagen so innig, dass die Vereinigungsstelle sich nicht wiedererkennen liess. Ich legte nun viele Exemplare aneinander, deren jedes mit einem röhrenförmigen Fortsatz versehen war. Hier blieben in einem Falle nur zwei von fünf, in einem andern einer von drei übrig, und es strömte das aufgenommene Wasser von dem letzten Exemplar durch das mittlere hindurch und zu dem einen übriggebliebenen röhrenförmigen Fortsatz mit dem Wasser der beiden andern zusammen hinaus. Es ist mir noch nicht klar geworden, ob in den Fällen, wo mehrere verschmolzene Exemplare ihre röhrenförmigen Fortsätze behalten hatten, ihre äussere Haut gegen einander geöffnet war. Die Verschmelzung geht auch bei Spongillen vor sich, welche Embryonen oder gemmulae oder Samenkapseln enthalten; zwei Samenkapseln tragende Exemplare vereinigen sich ebenso, wie zwei Embryonen tragende.

Aus diesen Beobachtungen lässt sich nirgends eine Andeutung entnehmen, dass der Verschmelzungsprocess der Spongillen irgend wie mit ihrer Vermehrung zusammenhängt. Es ist auch fraglich, ob dieser Vorgang, welchen man auch Conjugation oder Zygose genannt hat, bei den verschiedenen Thieren dieselbe Bedeutung hat. Dass dabei die Leibeshöhlen mit einander communiciren, ist neuerdings von Lachmann

bei einem *Carchesium* beobachtet, wo beide Thiere noch ihren Stiel hatten und so zusammenhingen, dass gefressene Substanzen aus der Leibeshöhle des einen Exemplares in die des andern übertraten.

Von den Bewegungserscheinungen.

lassen sich zwei Arten unterscheiden. Die erste Art besteht in Kontraktionen des ganzen Körpers oder eines grössern Theiles desselben. Die Bewegungen der ganzen äussern Haut und eines grossen Theiles des innern Parenchyms kommen selten zur Beobachtung. Die aus ausgeschnittenen Stücken entwickelten Spongillen bleiben in der Regel Monate lang auf dem Boden des Gefässes frei liegen, oder schwimmen auf der Oberfläche des Wassers; nur bisweilen setzen sie sich auf dem Glasboden fest. Es fliesst alsdann gleichsam die äussere Substanz über das Glas hin; man sieht zuerst an einer Stelle des Randes einen kleinen Theil der hellen Masse äusserst langsam hervortreten. Nach einigen Stunden dehnt sich dieser Vorgang über einen grössern Theil aus, und nach etwa einem Tage ist die ganze Spongille in ihrem Umkreise bis zu einem Drittel ihres Durchmessers breit von




boden ablösste; es wurde dabei der lichte Hof allmählig kleiner und fast undurchsichtig, so dass man von den innern Theilen nur noch wenig wahrnahm. Dieser Vorgang dauerte zwei Tage, die Spongille lebte darnach noch Wochen lang fort; der röhrenförmige Fortsatz war während alle dem unverändert geblieben. Hierher gehören auch die Bewegungen der sich festsetzenden Embryonen, die Contraction und Ausdehnung der röhrenförmigen Fortsätze, die Oeffnung und Schliessung der Poren, kurz alle diejenigen Bewegungen, welche den willkürlichen anderer Thiere ähnlich sehen. Dass sie von einem Gewebe ausgeführt werden, welches bisher nur contractile Zellen als Bestandtheile gezeigt hat, würde sie mit den Bewegungen der Hydren zusammenstellen lassen, deren Leibmasse nach Leydig's Untersuchungen ebenfalls aus contractilen Zellen besteht, welche sich lediglich bei den Contractionerscheinungen dieser Thiere betheiligen.

Die zweite Art von Bewegungen gehört der einzelnen Zelle als solcher an, welche die verschiedensten Formen innerhalb des Gewebes der lebenden Spongille annimmt, ohne dass Gesamtbewegungen daraus resultiren. Diese Bewegungen lassen sich an den verschiedensten Stellen des Thieres wahrnehmen, namentlich an den durchsichtigen Wandungen der grossen Kanäle und der röhrenförmigen Fortsätze, bei letztern besonders kann man sie stundenlang beobachten, ohne dass der röhrenförmige Fortsatz nur eine Spur einer Gestaltveränderung zeigt. In manchen der Zellen erkennt man Kern und Kernkörper vollständig klar, während die Umgrenzung der einzelnen Zelle sich oft schwer auffinden lässt. Die Bewegungen sind äusserst langsam und fast niemals direkt sichtbar. Es entsendet eine Zelle lange spitze Fortsätze, welche ihren Durchmesser bedeutend übertreffen, eine andere entfernt liegende Zelle schickt ihr gleiche, eben so lange entgegen; es dringen auch Körnchen in die entsandten Fortsätze hinein; bald verschwinden die Fortsätze wieder und treten neue an einer andern Stelle der Zelle hervor, dabei ändert die Zelle selbst beständig ihre Gestalt; wenn sie kugelig war, wird sie eiförmig oder vielackig, oder

breitet sich in eine dünne Scheibe aus; die Kerne von zwei Zellen nähern sich bisweilen so, dass man glaubt, sie gehören einer Zelle an und rücken alsdann bald wieder aus einander; oft sieht man auch nur lange und breite Streifen in dem Gewebe, welche sich spalten und wieder vereinigen, ohne dass man eine Zelle aufzufinden vermag, zu der sie gehören. In vielen Fällen gelang es mir nicht, die Kerne und Kernkörperchen in dem Gewebe ohne Zerreißung zu erkennen. Man nahm oft nur vereinzelte Vakuolen wahr, welche auch in der Wandung des röhrenförmigen Fortsatzes vorkommen und nicht mit den Poren zusammenhängen. Bei allen den beschriebenen Bewegungen bleibt die Membran im Ganzen dünn; ganz anders ist es, wenn nun einmal eine Gesamtcontraktion des röhrenförmigen Fortsatzes eintritt. Seine Haut wird hier zusehends dicker und höckerig durch die mehr und mehr zusammengedrückten Zellen. Die eben beschriebene Art der Bewegung der einzelnen Zellen lässt sich wohl nur in die Gruppe derjenigen Erscheinungen bringen, welche möglicherweise bei den farblosen Blutkörperchen vorkommen und neuerdings von Busch bei den Pigmentzellen beschrieben worden sind.

Ueber *Spongia limbata*.



boden ablöst; es wurde dabei der lichte Hof allmählig kleiner und fast undurchsichtig, so dass man von den innern Theilen nur noch wenig wahrnahm. Dieser Vorgang dauerte zwei Tage, die Spongilla lebte darnach noch Wochen lang fort; der röhrenförmige Fortsatz war während alle dem unverändert geblieben. Hierher gehören auch die Bewegungen der sich festsetzenden Embryonen, die Contraction und Ausdehnung der röhrenförmigen Fortsätze, die Oeffnung und Schliessung der Poren, kurz alle diejenigen Bewegungen, welche den willkürlichen anderer Thiere ähnlich sehen. Dass sie von einem Gewebe ausgeführt werden, welches bisher nur contractile Zellen als Bestandtheile gezeigt hat, würde sie mit den Bewegungen der Hydren zusammenstellen lassen, deren Leibesmasse nach Leydig's Untersuchungen ebenfalls aus contractilen Zellen besteht, welche sich lediglich bei den Contraktionserscheinungen dieser Thiere betheiligen.

Die zweite Art von Bewegungen gehört der einzelnen Zelle als solcher an, welche die verschiedensten Formen innerhalb des Gewebes der lebenden Spongilla annimmt, ohne dass Gesamtbewegungen daraus resultiren. Diese Bewegungen lassen sich an den verschiedensten Stellen des Thieres wahrnehmen, namentlich an den durchsichtigen Wandungen der grossen Kanäle und der röhrenförmigen Fortsätze, bei letztern besonders kann man sie stundenlang beobachten, ohne dass der röhrenförmige Fortsatz nur eine Spur einer Gestaltveränderung zeigt. In manchen der Zellen erkennt man Kern und Kernkörper vollständig klar, während die Umgrenzung der einzelnen Zelle sich oft schwer auffinden lässt. Die Bewegungen sind äusserst langsam und fast niemals direkt sichtbar. Es entsendet eine Zelle lange spitze Fortsätze, welche ihren Durchmesser bedeutend übertreffen, eine andere entfernt liegende Zelle schickt ihr gleiche, eben so lange entgegen; es dringen auch Körnchen in die entsandten Fortsätze hinein; bald verschwinden die Fortsätze wieder und treten neue an einer andern Stelle der Zelle hervor, dabei ändert die Zelle selbst beständig ihre Gestalt; wenn sie kugelig war, wird sie eiförmig oder vieleckig, oder

Fasern erreicht 0,12 Mm. und bleibt sich auf langen Strecken ziemlich gleich. Die Zahl der neben einander liegenden Nadeln in den dicksten Fasern fand ich bis zu etwa 20. Viele berühren sich nur mit den Spitzen, andere sind näher zusammengerückt. Die Nadeln sind an beiden Seiten zugespitzt; die grössten haben eine Länge von 0,13 und eine Dicke von 0,007 Mm. In der äussern Haut kommen keine besondern Kieselformationen vor.

Das Gewebe.

Die äussere Haut liess sich nicht als solche erkennen. Röhrenförmige Fortsätze, wie sie bei den Spongillen vorkommen, finden sich hier nicht, anstatt derselben existirt bei dieser Spongie stets eine fast kreisrunde Oeffnung der Anheftungsstelle gegenüber. Sie führt in einen Hohlraum, welcher sich von der Spitze des Kegels, meist etwas an Durchmesser zunehmend, bis nahe an die Basis erstreckt: in denselben münden viele Kanäle aus; die Ausmündungsstellen der grösseren erkennt man mit blossen Augen. Die Kanäle sind von mehr oder minder starken Gewebsschichten umgeben und sind bei verschiedenen Exemplaren weder constant an Zahl,

leben; ausserdem fanden sich äusserst feine, nicht mehr messbare Körnchen vor. Die Bewegungen dieser Zellen sind nicht von denen der Spongilen unterschieden und dauern im Seewasser auch etwa so lange fort, wie die der Spongillen im Fluss- oder Brunnenvasser. Die Wimperapparate erscheinen als kugelige, aus vielen kleinen Wimperzellen zusammengesetzte Gebilde, die grössten erreichen einen Durchmesser von 0,088 Mm., die einzelnen Zellen 0,004 Mm. Die Wimperzellen sah ich einige Male sich bewegen, vermag aber nicht zu entscheiden, ob es mittelst einer oder mehrerer Wimperhaare geschah.

Die Ausströmungen sind an dieser Spongie leicht zu beobachten, wenn man sie in ein grosses Gefäss mit Seewasser bringt und einige Zeit ruhig stehen lässt; man sieht dann eine dauernde Wellenbewegung auf der Oberfläche des Wassers, wenn das Thier von derselben nicht zu entfernt liegt. Aus der Ausflussöffnung werden verschiedene fremde Körper mit grosser Heftigkeit herausgeschleudert, so namentlich Embryonen, welche alsdann mittelst ihrer Wimpern weiter schwimmen.

Contractionerscheinungen wurden an dieser Spongie nur in einer Form beobachtet. Nachdem nämlich die Thiere mehrere Tage in einem Gefäss mit Seewasser zugebracht hatten, erhob sich bei einigen der äussere Rand der Ausflussmündung in Form einer dünnen durchsichtigen Haut eine oder mehrere Linien hoch, während das Wasser beständig ausströmte.

Fortpflanzungskörper.

fanden sich in zwei Zuständen vor; die einen waren noch unbewimpert und steckten unbeweglich im Gewebe fest; die andern waren mit Wimpern versehen und schwammen Tage lang in den Gefässen umher. Die unbewimperten Embryonen hatten meist eine kugelige Form und erreichten etwa den Durchmesser von $\frac{1}{4}$ Mm., einige waren auch oval. Man unterscheidet an ihnen eine feine structurlose Umhüllungshaut und einen verschieden angeordneten Inhalt; bei einigen ist

letzterer nämlich in grosse kugelige oder vieleckige Haufen angeordnet, welche bis $\frac{1}{4}$ des Durchmessers des ganzen Embryo erreichen; bei andern sind diese Haufen weit kleiner und in grösserer Anzahl vorhanden, bei noch andern machen ausschliesslich die kleinen Schwammzellen den geformten Inhalt aus. Alle diese kugeligen Haufen und Zellen bestehen aus einer eiweissartigen Substanz, in die durch und durch fettähnliche, äusserst feine Körnchen eingestreut sind. Des Ausdrucks Zellen habe ich mich bedient, weil die entsprechenden Gebilde bei den Spongillen alle Requisite einer Zelle haben. Den Keimkörnern oder Elementarbläschen der Spongillenembryonen entsprechende Gebilde fand ich bisher nicht vor. Der ganze Körper ist völlig undurchsichtig und bräunlich. Die eben gegebene Beschreibung passt auch auf die bewimperten Embryonen, nur kommen bei ihnen die fertigen Zellen häufiger vor und sind schon vielfach von feinen Nadeln begleitet, welche eine Länge von 0,02 Mm. und eine Dicke von 0,002 Mm. erreichen. Die Wimpern auf der ganzen Körperoberfläche sind dicker, als bei den Spongillenembryonen und eben so lang, kleine Zellchen dazu liessen sich bei der Undurchsichtigkeit des Körpers nicht unterscheiden.




Fig. 2. Ein Wimperapparat einer Spongille mit Einströmungsloch bei etwa 500maliger Vergrößerung.

Fig. 3. *Spongia limbata* auf *Furcellaria fastigiata* Kütz. sitzend. (Natürl. Grösse.)

Fig. 4. Gerüstfaser mit Kieselnadeln. 550 Mal.

Fig. 5. Contraktile Zellen. 550 Mal.

Fig. 6. Wimperorgan. 550 Mal.

Fig. 7. Bewimperter Embryo. 330 Mal.

Fig. 8. Noch unbewimperter Embryo.

Anmerkung. Im Innern der Spongillen kommen nur selten Infusorien parasitisch vor. Zuweilen fand ich *Podophrya fixa* an der Innenfläche der äussern Haut mit dem Stile aufsitzend und mit den Tentakeln in die grosse Höhle hineinragend; in den zum röhrenförmigen Fortsatz führenden Kanälen sah ich wiederholt eine Monade mit einer Art Springborste. Die in meinem ersten Aufsatz angeführten Infusorien kommen nicht in den Spongillen, sondern auf ihnen vor; ausser den dort genannten fand ich neuerdings noch *Amoeba diffusa*, *Uroleptus hospes*, *Stentor Roeselii* und *coeruleus*. Bei allen Stentoren machte ich nachfolgende Beobachtung. Ehrenberg beschreibt bei den Stentoren Streifen, auf denen die Wimpern stehen. Zwischen je zwei Wimperreihen verlaufen breitere, durch äusserst kleine, stark lichtbrechende Körnchen ausgezeichnete Streifen, welche Oscar Schmidt hervorhebt. Es giebt nun noch ein System von Streifen, welche sich wie Muskeln verhalten, insofern sie mit der von Eduard Weber für die Muskeln beschriebenen Eigenschaft versehen sind, dass sie im Zustand der Ruhe die geschlängelte Form annehmen und bei der Contraction sich gerade strecken. Es sind scharf contourirte körnchenfreie Fasern etwa von der Breite der körnchenfreien Zwischenräume, unterhalb deren sie der Längsaxe des Körpers nach verlaufen; sie setzen sich vorn unter dem grossen Wimperkreis und hinten am „Saugnapf“ an; einige von ihnen vereinigen sich während ihres Verlaufs. Am deutlichsten sieht man die bei der Contraction eintretenden Veränderungen, wenn ein farbloser oder wenig farbiger *Stentor* gerade so liegt, dass man auf den kreisförmigen Saugnapf blickt; man sieht alsdann von seinem Umfang im Zustand der Ruhe alle einzelnen Muskeln geschlängelt abgehen, in demselben Moment aber, wo sich das Thier zusammenschnellt, also verkürzt, verschwindet die geschlängelte Form vollständig, die Muskeln strecken sich gerade. Als bald beginnen die gerade gestreckten Muskeln wieder zu erschlaffen und in die geschlängelte Form zurück zu fallen, der *Stentor* verlängert sich wieder.


Ueber *Hydatina senta*

von

DR. FRANZ LEYDIG in Tübingen.

(Hierzu Tafel XVI.)


Wer von der Literatur über Räderthiere Notiz genommen hat, weiss, dass man längere Zeit hinsichtlich der Geschlechtsverhältnisse dieser Thiergruppe im Unklaren sich befand, denn obschon die neueren Beobachter darin einig waren, dass die Theile, welche Ehrenberg für Hoden, Samenleiter und Samenblase erklärt hatte, auf keinen Fall eine solche Bedeutung haben können, so wollte es doch auch andererseits nicht gelingen, männliche Geschlechtsorgane und Samenkörperchen



Leider konnte ich damals dieses Rotatorium, welches, wie mehrere Beobachter melden, zu den sehr verbreiteten und gewöhnlichen Arten gehört, um Würzburg nicht aufbringen, was um so bedauerlicher war, als durch Ehrenberg's Schilderungen die *Hydatina senta* gleichsam die Rolle eines typischen Repräsentanten der Räderthiere in den Büchern spielte. Doch hatte ich unterdessen das Vergnügen, von einem andern Forscher meinen Anspruch bezüglich der männlichen Natur der *Enteroplea Hydatina* bestätigt zu sehen. Cohn nämlich (üb. d. Fortpflanzung der Räderthiere, Zeitschr. f. wiss. Zoologie 1855) hatte Gelegenheit dieses Thier zu untersuchen, er fand den Hoden und die beweglichen Zoospermien. In diesem Frühjahr nun, in den ersten Tagen vom März durchfischte ich einen kleinen Tümpel bei Würzburg, welcher im Sommer wasserleer wird und gewann da die *Hydatina senta* in zahlloser Menge; es bevölkerte das Thierchen um genannte Zeit fast ausschließlich das Wasser, denn neben ihm kamen nur vereinzelt Vorticellen, hie und da ein *Brachionus*, sowie Larven von Dipteren zur Beobachtung. Gegen Ende März hatten sie sich so ausserordentlich vermehrt, dass sie der Oberfläche des Wassers zunächst eine fast continuirliche graulich weisse Schicht bildeten. Die *Enteroplea*, welche anfangs ziemlich spärlich sich zeigte, war jetzt ebenfalls so zahlreich geworden, dass auf vielleicht 20-30 Hydatinen eine *Enteroplea* zu rechnen war. Ich studirte das Thierchen näher und da meine Wahrnehmungen nicht in Allem mit denen Cohn's übereinstimmen, so dürfte es nicht überflüssig sein, über den Bau der *Hydatina* und der *Enteroplea* hter einiges mitzutheilen.

Es ist unrichtig, wenn gedachter Autor sagt, *Hydatina senta* „ist eines der grössten Räderthiere“, vielmehr gehört es nur zu den mittelgrossen, denn gar manche andere Arten, *Notommata myrmaleo* z. B. und noch mehr *Notommata Sieboldii* übertreffen dasselbe um das 3-, 4- und 5fache an Grösse. Derselbe Naturforscher bemerkt zwar gut, dass die Gestalt des Thieres in ihren wahren Umrissen nur dann zu erkennen sei, wenn das Thier frei in hinreichendem Wasser umherschwimmt, allein weder die von ihm gegebene Abbildung noch Beschreibung der

Gestalt der *Hydatina* kann ich als getreu bezeichnen und namentlich entfernt sich seine Abbildung des „Wirbel- oder Räderorganes“ noch weit mehr von der Natur als die, welche Ehrenberg geliefert hat, weshalb ich davon eine neue Zeichnung zu veröffentlichen für nothwendig halte. Was die Gestalt unseres Thieres betrifft, so gewahrt man an Individuen, welche beständig sich um ihre Achse wälzend bequem einher schwimmen, dass der Körper sich in drei Hauptabtheilungen, in ein Kopfbruststück oder Cephalothorax, in einen Leib oder Abdomen und in einen Schwanz gliedert. Das Kopfbruststück erscheint, abgesehen von dem Leibeseinschnitt, besonders auf der Rückenseite vom Abdomen durch eine höckerartige Wölbung abgegrenzt, auf welcher die unpaare Borstengrube, unter der Nerven enden, angebracht ist. Doch tritt dieser Höcker des Cephalothorax nur dann deutlich hervor, wenn der Magen nicht übermässig voll oder der Eierstock nicht zu sehr entwickelt ist; sollte beides der Fall sein, so muss natürlich durch Auftreibung des Abdomens der Höcker mehr oder weniger verschwinden. Das erste oder vordere Drittel des Kopfbruststückes ist durch eine scharfe Furche als Kopf abgesetzt. Der Leib, schwach geringelt, hört auf mit jenem Segment, wel-



chen schlagen nach auswärts. Merklich davon verschieden sind starke oder borstenähnliche Wimpern, welche zunächst an der innern Lippe des Wirbelorganes stehen und hier ebenfalls eine continuirliche Reihe herstellen; eben solche Borsten umsäumen auch den weiter nach innen liegenden, eigentlichen Rand der Mundhöhle und selbst zwischen den beiden bezeichneten Borstenreihen arbeiten in unregelmässiger Vertheilung Wimpern von der gleichen Stärke, endlich tragen noch die zwei vorhin erwähnten papillenartigen Vorsprünge einen Busch von ungefähr sechs Borsten. Alle die dicken borstenartigen Wimpern schlagen hackenförmig nach einwärts.


Die unaufhörliche Bewegung des Thieres, das beständige sich Ein- und Ausstülpen des Kopfendes erschweren nicht wenig die Beobachtung desselben und um sich von der eigentlichen Form des Wirbelorganes zu überzeugen, ist es räthlich, die Thiere langsam zu tödten und ohne dass sie sich einstülpen. Mir diente hierzu eine äusserst schwache Lösung von doppelt chromsaurem Kali, in der sie noch stundenlang umherschwammen und bei ihrem Absterben ausgestreckt blieben. Dass dann bei der Untersuchung ein Deckglas vermieden wird, ist selbstverständlich.

Die äussere Haut (vergl. Fig. 2.) besteht, wie das von andern Räderthieren dargethan wurde, aus zwei differenten Lagen, aus der äussern strukturlosen Cuticula nämlich und aus der darunter gelegenen „Körnerlage“; ich würde dies nicht mehr der Erwähnung für werth halten, wenn nicht Cohn sagte, dass die von mir beschriebene Körnerschicht bei ausgewachsenen Individuen der *Hydatina* kaum als solche zu unterscheiden sei. Man sieht aber sowohl am frischen Objekte als auch an Thieren, auf die Essigsäure eingewirkt hat, die in Abständen stehenden Kerne der fraglichen weichen Hautlage mit aller nur wünschenswerthen Klarheit, auch liegen bei manchen Individuen einzelne Fettpünktchen in dieser Hautschicht.

Hinsichtlich der Muskeln mag vorgebracht werden, dass ausser den Längen- und Ringmuskeln, von denen die ersteren die grösste Breite haben und dann ferner eine Differenzirung in helle Rinde und körnige Achsensubstanz (Fig. 1. und 2b.)

zeigen, auch verästelte Muskeln zugegen sind und zwar nicht bloss am Kopf, wo sie vor Allem in die Augen fallen, sondern auch in jedem Leibessegment. Sie stellen unverkennbar ramifizirte Zellen vor. In den breiten Längsmuskeln (Fig. 1. u. 2.) bemerkt man mitunter die Körnchen der Achsensubstanz sehr regelmässig gelagert, wodurch man an zart gezeichnete Querstreifung erinnert wird. Die Angabe Cohn's, dass die Substanz der Muskeln zuweilen „durch Vacuolen schaumig erschien,“ kann wohl nur auf veränderte oder tödte Muskeln bezogen werden.

Vom Gehirn und den davon ausstrahlenden Nerven glaubte ich ebenfalls eine neue Abbildung (Fig. 2c.) geben zu dürfen; dies Organ ist von oben angesehen nahezu viereckig, in der Profillage zeigt es eine ziemlich starke Wölbung nach oben. An die unpaare Grube mit dem Borstenbüschel gehen zwei starke Nerven, ausserdem treten noch zwei Fäden dorthin, welche muskulöser Natur sind, ich sah sicher, dass sie sich zusammenzogen. Es sind die Fäden, welche Cohn „nach derselben Stelle im Nacken von anderen Herden des Nervensystemes gehen“ lässt. Die Substanz des frischen Gehirns zeigt kleine Nuclei, eingebettet in eine homogene Grund-



diesen Scheinzellen, dass sie eine helle, scharf markirte periphere Schicht haben, nach innen eine körnige Inhaltsmasse, aus der ein wasserklarer Kern hervorschimmert.¹⁾


Mit Rücksicht auf das „Respirationssystem“ bin ich abermals im Falle, die Berichtigungen, welche Cohn meiner Darstellung angedeihen lässt, ablehnen zu müssen. Ich hatte (a. a. O.) mitgetheilt, dass die sog. Zitterorgane nach ihrer Form zwei Typen repräsentiren, die aber nicht zusammen in einem und demselben Thiere vorkommen, sondern auf verschiedene Gattungen vertheilt sich zeigen. Die einen nämlich bleiben gleichweite, cylindrische Röhren, derartige hat z. B. *Notommata myrmeleo*; die andern verbreitern sich am freien Ende und nehmen damit eine etwelche Trompetenform an, z. B. in *Notommata centrura*, *Euchlanis triquetra*, *Eosphora najas*. Cohn lehrt aber, „dass ein und dasselbe Zitterorgan je nach der Lage, die eine oder die andere Gestalt zeige“ und citirt dazu die von mir gegebene Figur der *Notommata centrura*, wo ebenfalls beide Formen zu sehen seien. Allein unser Autor missversteht hier offenbar die Zeichnungen, denn was er für cylindrische Zitterorgane hält, sind trompetenförmige im Längsschnitt gesehen; bei ihrer platten Beschaffenheit sind sie dann anscheinend cylindrisch. Sobald Hr. Cohn die wirklich cylindrischen, gleichweiten Röhren, wie sie sich z. B. bei *Notommata Sieboldii* finden, wird kennen gelernt haben, dürfte ihm die Formverschiedenheit zwischen beiden einleuchten.

Die Flüssigkeit, welche den Leibesraum erfüllend die Eingeweide umspült und das Analogon des Blutes vorstellt, enthielt bei Individuen, die reichlich mit *Euglena viridis* gefüttert wurden, zahlreiche helle Kügelchen oder Blutkörperchen von rundlicher Gestalt und ungleicher Grösse. — Merk-

1) Gegenüber der Angabe Cohn's, dass im Schlund von *Brachionus* Ciliarbewegung sei, beharre ich auf meiner frühern Aussage, dass der Schlund der Rotatorien nie mit Wimpern ausgekleidet werde; bei *Brachionus* ist der Schlund sehr kurz und Cohn hat fälschlich die starke Wimperung am Anfange des Magens in den Schlund verlegt.

würdig war es hier bei *Hydatina senta* dieselben Gebilde wieder anzutreffen, die ich früher einmal vermuthungsweise von *Lacunalaria* als Zoospermien zu deuten versuchte (Zeitschr. f. w. Zoologie 1851) und später in die Reihe parasitischer Bildungen brachte. Es sind scharf conturirte, kuglige Körper, der Rand derselben pelzig wie mit feinem Haarbesatz. Gegen Ende März war die ganze Leibeshöhle vieler Individuen mit diesen Kugeln derartig angeschoppt, dass das Thier bei auffallendem Licht stark weiss aussah. Uebrigens schwammen die damit behafteten Individuen eben so munter herum, als die davon freien Thiere.

Die kolbigen Körper im Schwanz bestehen aus einer zarten Hülle und einem blass molekulären Inhalt, in welchem man schöne Kerne mit je einem Nucleolus unterscheidet, bei manchen Individuen sind ausserdem kleine Fettpünktchen in wechselnder Menge vorhanden. Ich halte fragliche Organe für Drüsen, die nach Lage und Function den Schwanzdrüsen des *Enoplus* z. B. entsprechen (vergl. m. Aufs. in Müll. Arch. 1854 Taf. XI., Fig. 12.); sie münden an der Spitze der Fusszangen und wie der genannte Wurm „sich mit dem Hinterleibsende fest an das Objectglas heften kann, um den Körper




Räderorgan von allen Seiten dem Beschauer zukehren. Cohn behauptet fälschlich, es fehle dem Männchen die schief trichterförmige Einsenkung des Räderorganes. An Thieren, welche in ihren Bewegungen zu ermatten anfangen, lässt sich bezüglich der Körperform erkennen, dass die Rückenfläche etwas gewölbt, die Bauchseite mehr flach ist; die noch ganz frischen Individuen sind in fortwährender Contraction begriffen und der Körper erscheint dabei stark länggefaltet.

Die Muskeln, Gehirn sammt den Nerven, contractile Blase mit den Röhren und Zitterorganen verhalten sich im Wesentlichen wie beim Weibchen, weshalb davon nicht weiter die Rede sein soll, ich verweise auf die beigegebene Figur 3. Auch die kolbigen Drüsen im Schwanz mangeln nicht, nur giebt sich der kleine Unterschied kund, dass sie am Rande mehrmals seicht eingekerbt sind, was beim Weibchen nicht der Fall ist.

Dalrymple hatte an *Notommata anglica*, sowie ich selber an *Notommata Sieboldii* die Erfahrung gemacht, dass den Männchen der Nahrungskanal vollständig fehlt. Die männlichen Thiere besaßen weder Schlundkopf, noch Kiefern, Schlund oder Magen. Nur ein unregelmässiger Haufen von Zellen wurde als Rudiment des Nahrungskanales angesehen. Von der männlichen *Hydatina* meldet nun auch Cohn, dass ihr (der *Enteroplea*) der Verdauungsapparat ganz und gar in allen seinen Theilen fehle. Nicht einmal die zelligen Rudimente der erwähnten Arten von *Notommata* seien aufzufinden. Mit dieser Auffassung bin ich indessen nicht ganz einverstanden. Es mangelt zwar, wie bereits Ehrenberg feststellte, der *Enteroplea* das Gebiss und es fehlt überhaupt ein entwickelter Tractus, sowie denn auch niemals eine von aussen aufgenommene feste Nahrung in dem durchsichtigen Thiere beobachtet wird. Aber mit aller Bestimmtheit lässt sich sagen, dass der Nahrungskanal in verkümmelter Weise zugegen ist. Der Theil nämlich, welchen Cohn als suspensor testis, Ehrenberg als Darmkanal bezeichnet hat und den der erstere Autor für ein langes und breites Band hält, das von der vorderen Spitze des Hodens entspringe und quer

durch die Leibeshöhle nach der Stirngegend hinlaufe, ist zweifellos ein Rudiment des Nahrungsschlauches (Fig. 3 a.), dies zeigt sowohl seine Lage als sein Bau. Wenn man das Thier in der Profilansicht vor sich hat, so zieht das vordere Ende des Darmrudimentes genau nach jener Stelle des Räderorganes hin, wo beim Weibchen die Mundöffnung liegt, hinterwärts, was gleich nachher zur Sprache kommt, erstreckt es sich bis zur Kloakenöffnung. Diefeineren Verhältnisse anlangend, so findet man das Darmrudiment, gleich andern der Rückbildung verfallenen Organen nach einzelnen Individuen mehr oder weniger verkümmert, bald ist es ein heller, faltiger Schlauch, ohne zellige Theile, ein andermal enthält es, was einen deutlichen Wink abgiebt, unverkennbare Reste der Magenellen: grosse Blasen nämlich, mit Häufchen solcher gelbbrauner Körner, welche die Magenellen aller Rotatorien erfüllen.

Um die weiteren Beziehungen des rudimentären Darmkanals zu verfolgen, müssen wir zugleich auf den im hinteren Abschnitt des Abdomens befindlichen Hoden Rücksicht nehmen. Dieses Organ (Fig. 3, 4. c. c.) stellt einen ovalen Sack dar, dessen Wände aber keineswegs, wie Cohn beschreibt, „sehr dick und muskulös“ sind, sondern im Gegentheil von



hinten zugespitzten Körper, auf dem sich kammartig eine undulirende Membran erhebt. Bei manchen Individuen verhalten sich alle Zoospermien, so lange sie im Hoden eingeschlossen liegen, ruhig und bewegen sich erst, nachdem sie durch Druck herausgefördert und mit Wasser zusammengebracht wurden, dann verlangsamt sich indessen die Bewegung, um bald ganz aufzuhören; ein andermal zeigten die Zoospermien schon innerhalb des Hodens eine wimmelnde Bewegung.

Vielleicht erfahren die Zoospermien, sobald sie durch Begattung in den weiblichen Körper übergeführt sind, hier eine weitere Entwicklung, wenigstens ist mir auffallend, dass die in der Leibeshöhle einzelner Weibchen herumtreibenden Samenelemente an dem einen Ende viel dicker waren, gleichsam einen abgesetzten Kopf hatten, was bei den aus dem Hoden herausgepressten nie zu Gesicht kam. Die regungslosen, stäbchenartigen Zoospermien liegen ganz im Einklang mit dem, was bei *Notommata* wahrgenommen wird, im Hoden zunächst da, wo der Ausführungsgang beginnt und rufen an dieser Stelle durch ihre regelmässige Aneinanderlagerung eine radiäre Streifung hervor. Ich muss es geradezu widersprechen, dass man diese am hinteren Ende des Hodens befindliche „dichte, parallele Längsstreifung“ von „Muskelfasern“ ableiten will, man vermag die „Streifen“ so gut wie den übrigen Inhalt des Hodens herauszudrücken und kann sich auf diese Weise vergewissern, dass die stäbchenförmigen Zoospermien die Ursache der Streifung waren. Die Wand des Hodens entbehrt, wie schon erwähnt wurde, der Contractilität, wohl aber lässt sich beobachten, dass der Ausführungsgang zu kräftigen Contractionen befähigt ist, sowie ich denn auch die dicke Wand desselben und die an letzterer sichtbare Querstreifung auf eine Muskelhaut beziehe. Im Innern des Ductus ist Wimperung zugegen, am längsten sind die Cilien an der Oeffnung und letztere befindet sich am ersten Segment des Schwanzes. Ausser sitzen am Ausführungsgang noch einige drüsige Körper, die man, was auch bezüglich der *Notommata* geschah, accessoriischen Geschlechtsdrüsen, etwa einer Prostata vergleichen könnte.

Bei *Enteroplea* kommen die gleichen dunklen Körnerhaufen vor (Fig. 3, 4b.), welche man bei vielen Embryonen und jungen Thieren der Rotatorien wahrnimmt; sie bilden meist zwei Haufen, doch auch drei, die Körner wechseln überhaupt sehr nach Zahl und Grösse, bald sieht man Haufen kleiner Kugeln, bald sind es einige einzelne grössere Stücke. Ich hatte diese Körner nach ihrem optischen und chemischen Verhalten für Harnconcremente angesprochen und die Vermuthung geäussert, es möchten solche Anhäufungen von Körnern oder krystallförmigen Bildungen, indem sie sich mit Ausnahme der Männchen nur im Embryo und ersten Jugendzustand finden, die Bedeutung einer Primordialniere haben. Cohn dagegen meint: „es fällt diese ganze Hypothese mit dem Nachweise, dass bei *Enteroplea* die Blase mit den dunklen Körnern durchaus in keiner Verbindung mit dem Darm steht, noch stehen kann, da überhaupt kein Darm vorhanden ist, dass sie vielmehr, was ich ganz zweifellos nachweisen konnte, auf der äussern Wand des Hodens festgewachsen ist.“ Und doch kann ich nicht umhin zu bemerken, dass wieschon aus der obigen Schilderung des Hodens erhellt, der Cohn'sche „zweifelhafte Nachweis“ ein Irrthum ist. Denn der klare, die dunklen

gar keine Aehnlichkeit mit einander haben, sondern ganz verschiedene Dinge sind.

Zum Schluss mag auch noch Einiges berichtet sein über einen im Magen der weiblichen *Hydatina* lebenden Parasiten, der bisher unbeschrieben scheint und in die Ehrenberg'sche Familie der *Astasiaea* oder „Aenderlinge“ zu zählen sein dürfte. Der Parasit war so häufig, dass fast alle Hydatinen, und es kamen doch deren Hunderte zur Untersuchung, wenigstens einen im Innern hatten, ja es fand sich, dass ganz junge Individuen, deren Magen noch farblos war, bis zu 5 und 6 dieser Geschöpfe beherbergten. Wollte man annehmen, dass es ein Pseudoparasit wäre, der etwa einen Theil der aufgenommenen Nahrung bildet, ein Gedanke, der sich anfangs aufdrängen kann, so redet doch dagegen, dass man das Thierchen niemals in einem Zustande antrifft, der nur einigermaßen darauf hindeutet, als unterliege es, wie andere gefressene Thiere, *Euglena* z. B., der verdauenden Kraft der Magenwände, vielmehr findet man es immer unversehrt und in kräftigster Bewegung.

Unser Thierchen (Fig. 6.) hat die Grösse von *Euglena viridis* und auch so ziemliche Aehnlichkeit hinsichtlich der Gestalt, doch am meisten zeigt es sich der von Ehrenberg geschaffenen Gattung *Distigma tenax* (*Proteus tenax* bei Müller und Schrank) verwandt. Die Grundlage seines Körpers bildet eine weiche, gallertige Substanz, von der sich keine besondere Rindenschicht oder Haut abgegrenzt hat. Im Innern liegen viele fettartig glänzende Kugeln, die verschieden gross und nicht von einfach runder Form sind, sondern bald geschichtet bald wie von einer Oeffnung durchbrochen, bald wie mehrfach getheilt erscheinen, manche sehen aus, als ob sie in vier Portionen gefurcht wären. Nach Druck mit dem Deckglas nehmen sie eine ziemlich intensive, indigo-blaue Farbe an. Wegen dieser fetttröpfenähnlichen Körper sieht der Parasit bei auffallendem Licht stark weiss aus. Ausserdem unterscheidet man nach dem vorderen Körperende zu einen oder zwei helle, kernartige Körper, die selbst wieder einen opakeren


Fleck aufweisen. Ganz vorn endlich liegt ein röthlicher Punkt oder „Augenfleck“, der eine scharf umschriebene Gestalt hat. Die Bewegungen des Thieres sind sehr lebhaft, namentlich wenn der Magen der *Hydatina* bei etwa eintretendem Wassermangel anfängt, ungewöhnliche Contractionen zu machen, dann sucht es auch wohl aus dem Darm heraus ins Freie zu kommen und ist ihm das geglückt, so eilt es mit grosser Hast durch seine peristaltischen Zusammenziehungen davon. Das Thierchen schwillt an und schnürt sich ein von vorn nach hinten in analoger Art, wie man bei Muskelcontractionen niederer Thiere häufig eine verdickte Stelle wellenartig längs des Muskels weggehen sieht.

Erklärung der Abbildungen.

Alle bei starker, ungefähr 300maliger Vergr.

Fig. 1. Der Kopf der weiblichen *Hydatina* von unten, um die Gestalt des Räderorganes zu zeigen; a. der Schlundkopf, sollte weiter nach vorn, der Mundöffnung näher gezeichnet sein, b. b. Muskeln.

Fig. 2. Kopf eines etwas kleineren Thieres von oben; a. Schlund-



Ueber die umspinnenden Spiralfasern der Binde- gewebsstränge

von

DR. E. KLÖPSCH,

Assistenten am physiologischen Institut der Universität Breslau.


(Hierzu Tafel XVII.)

Als im Jahre 1841 Henle in seinem Lehrbuch der allgemeinen Anatomie die bis dahin bekannten Ergebnisse fremder und eigener Forschungen auf dem Gebiete der Histologie zum ersten Male nach Veröffentlichung der Schwann'schen Beobachtungen über die Zelle zu einem grossen und glänzenden Mosaik vereinigte, war es natürlich, dass ein grosser Theil der darin enthaltenen Detailangaben ohne Weiteres als baare Münze in Umlauf gesetzt wurde. Die Autorität grosser Lehrer und genialer Forscher hat zu allen Zeiten etwas Faszinirendes gehabt, und ähnlich, wie nach Wolf's Prolegomenen die kritische Durchforschung Homer's länger als ein Vierteljahrhundert nur die von dem grossen Meister vorgezeichneten Wege wandelte, — in ähnlicher Weise sahen wir nach Henle's grosser Arbeit wohl ein Jahrzehent lang seine Gedanken fast unumschränkt über Handbücher und Monographien schalten und walten. Mit dem grossen Strome seiner Beobachtungen und Schlüsse schwammen auch seine Angaben über die umspinnenden Spiralfasern der Bindegewebsbündel an der Hirnbasis, in serösen Häuten, im Unterhautbindegewebe ¹⁾ etc. in die Reservoirs des histologischen Wis-

1) Henle, Allg. Anat. p. 351.


Müller's Archiv, 1887.

sens hinein, ohne über ihre Berechtigung sonderlich befragt zu werden. Sharpey, Kölliker, Gerlach u. A. biffdeten in ihren Handbüchern die umspinnenden Fasern ab und besprachen sie, ohne eine Kritik an ihnen zu üben. Leydig (über die Haut einiger Süsswasserfische. Sieb. u. Kölliker's Zeitschr. III. p. 4) erwähnt, dass die Bindegewebsbündel in der Lederhaut der Fische von spiralig verlaufenden Kernfasern in sehr engen Touren umspunnen werden und beschreibt in gleicher Weise Bindegewebsbündel, welche beim Aal und bei *Cottus Gobio* vom Unterhautzellgewebe gerade gegen die Epidermis aufsteigen. Er wiederholt diese Angaben in seinen Untersuchungen über Fische und Reptilien (1853 p. 34) ohne irgendwelche Zweifel, weder im beschreibenden Theile, noch in den allgemeinen Schlussbemerkungen: „über die Verhältnisse der Binde substanz“, zu äussern. Aber mit dem Wissen wächst der Zweifel! War die widerspruchslöse Annahme der umspinnenden Fasern einerseits eine Wirkung der Autorität ihres Entdeckers, so war sie auf der andern Seite ebenso eine Folge des Mangels an Beobachtungen, welche die Henle'schen in Zweifel zu stellen geeignet gewesen wären. Dieser Mangel wurde allgemach ausgefüllt.



mit ihrer Polemik gegen die Kernfasertheorie im Allgemeinen gaben, um eine Aenderung der Henle'schen Ansichten über die umspinnenden Fasern zu veranlassen. Virchow und Donders stellen die Behauptung auf, dass die durch Essigsäure darstellbaren Fasern, welche die Bündel des Bindegewebes und anderer fasriger Gewebe durchsetzen und umspinnen, nicht aus der Verlängerung und Verschmelzung von Kernen, sondern aus der Verschmelzung faserartig ausgewachsener oder sternförmig verästelter, den verlängerten Kern genau umschliessender Zellen hervorgehen. Donders erklärte überdies diese von Henle für Kernfasern gehaltenen umspinnenden Fasern für identisch mit den elastischen Fasern. Henle unterwarf die von Donders und Virchow vorgetragenen Meinungen, wie im Allgemeinen, so in Bezug auf die umspinnenden Fasern einer sorgfältigen Kritik und änderte in Verfolg derselben sein Urtheil über ihre Natur in mannigfacher Weise. Hatte er früher (Allg. Anat. p. 351) gelehrt, die meisten primären, von Spiralfasern umwickelten Bündel seien ohne besondere Hülle, und hatte er die in vielfachen Touren dieselben umspinnenden Fasern als ein fremdes, histologisch verschiedenes und von Aussen an die Bündel herantretendes Formelement dargestellt, so interpretirte er jetzt (Canst. Jahresbericht 1851 p. 25) die umspinnenden Fasern und die von ihnen bewirkte Einschnürung in folgender Weise. Er bespricht die von ihm sogenannten tertiären Bindegewebsbündel der Sehnen. Ihre der Haut der secundären Bündel gleichartige Umhüllungshaut lässt er in entschieden elastisches Gewebe übergehen. „Man sieht“, sagt Henle, „die Fasern des letzteren sehr gedehnt und deshalb sehr blass und gestreckt von verschiedenem Durchmesser in eng- und weitmaschigen Netzen über die unversehrten, isolirten Sehnenbündel verlaufen. Beobachtet man sodann die Einwirkung der Essigsäure, so bemerkt man, wie das langsam aufquillende Bündel die Fasern, die dabei nur noch gestreckter und blasser werden, auf einzelne reifenartige Massen zusammenschiebt, zwischen denen sich das Bindegewebe herverbauscht. Dies ist“, fährt er fort, „die Genesis der Fasern,


welche größere Bündel spiralig zu umwickeln scheinen und sich mit meiner Kernfasertheorie von Anfang an nicht vertragen wollten. Mit den Bindegewebsfasern sind sie so genau verbunden, dass man selbst durch Längsspaltung der Bündel die von jenen Querfasern bewirkten Einschnürungen nicht aufhebt. Löst man aber die Bindegewebsfasern durch Kochen in Kali auf, so bleiben die einschnürenden Querfasern im Zusammenhang mit allen das Bündel durchziehenden Kernfasern zurück, ganz und gar mit dem Ansehen des elastischen Gewebes, dunkel, geschlängelt, ästig anastomosirend.“ Henle giebt also jetzt die Umspinnung durch fortlaufende Spiralfasern auf und setzt dafür elastische, mit der Hülle der Bindegewebsbündel aufs Engste verbundene Fasernetze, — die Einschnürung bleibt durch Fasern veranlasst. ¹⁾ Wie viel sich gegen diese neue Interpretation der oft erwähnten Erscheinung eingeschnürter Bindegewebsstränge erinnern lässt, werden wir später auseinandersetzen. Sie hielt auch Luschka nicht ab, in seiner Schrift über den Nervus phrenicus (p. 64) die Entstehung der Einschnürungen an den mit Essigsäure behandelten Bündeln des sogenannten netzförmigen Bindegewebes im Oment. majus auf andere Momente zurückzuführen



andersetzung drei Klassen von Bindegewebsbündeln, die je nach der Behandlung mit Essigsäure verschiedene Bilder geben. Er fand zuerst Zellstoffstränge mit einem, nach Zutritt von Essigsäure, ausgezeichnet varicösen Aussehen, ohne dass man den wie eingeschnürten Stellen entsprechende Faserelemente vorfände. Er nimmt bei diesen Zellstoffsträngen eine von der innern Bindesubstanz verschiedene Umhüllungsschicht an, welche sich zu jener ähnlich verhalte, wie die membranöse Hülle des Nervenröhrchens zu seinem Inhalte. Bei einer zweiten Klasse von Bindegewebsbündeln bemerkte Luschka abwechselnd Auftreibungen und Einschnürungen, von welchen die letzteren wie durch fest angelegte, durchscheinende, zart contourirte Ringfasern entstanden erscheinen. Die Bildung solcher einschnürender Ringe führt er auf das durch die Essigsäure veranlasste plötzliche Einreissen einer membranösen Umhüllung des Zellstoffbündels an verschiedenen Stellen und in der ganzen Circumferenz zurück. Hiernach sollen die nunmehr isolirten Abschnitte der membranösen Hülle bis zur Düntheit jener einschnürenden Ringe zusammenschnurren, zwischen denen dann die aufquellende nackte Bindesubstanz hervorgeht. Bei jener ersten wie bei dieser zweiten Klasse der Bindegewebsbündel also führt er die Einschnürung auf eine umhüllende, ihrer Natur nach vielleicht mit der Substanz des elastischen Gewebes identische Schicht zurück, der er aber bei der ersten Klasse eine grössere Dehnbarkeit zuschreibt, in Folge deren sie sich nur ausbucht und dadurch das Zellstoffbündel varicos erscheinen lasse, nicht aber einreisse und zusammenschnurre. Zu einer dritten Klasse endlich zählt Luschka die eigentlich von Henle beschriebenen Zellstoffbündel mit scheinbaren, spiraligen Umwicklungsfasern, welche bald in einzelnen Touren und in kürzeren oder längeren Strecken, bald in mehrfachen, ganz dichten, sich vielfach kreuzenden Windungen um das Bündel gelagert erscheinen. Nach den bei der ersten und zweiten Klasse von Zellstoffbündeln angeführten Beobachtungen der ganz strukturlosen Umhüllung und der aus ihr künstlich hervorzubringenden

Ringfaserbildung, hält Luschka auch diese scheinbar umwickelnden Fasern nicht für besondere Formelemente, sondern er lässt sie aus dem Zerfallen einer gleichförmig aus elastischer Substanz gebildeten Scheide der Bindegewebsbündel hervorgehen. Besondere Formelemente in Reihen, die den Einwicklungsfasern entsprochen hätten, konnte er nie zur Anschauung bringen. Schliesslich führt L. gegen Henle's oben erwähnte Annahme eines elastischen Fasernetzes über die Bindegewebsbündel und die Entstehung der Einschnürung durch Aufeinanderschieben dieser Netzfaser, die ursprünglich ganz gleichartige Beschaffenheit der Scheide an.

Trotz dieses entschiedenen Auftretens gegen die Henle'sche Theorie nahm Luschka doch schon im Jahre 1855 in seiner Monographie über die Adergeflechte des Hirns p. 58 die erste und älteste Theorie Henle's in Bezug auf die umspinnenden Fasern wieder auf, ohne eine Vermittlung dieser Annahme mit seiner früheren, ganz widersprechenden Auseinandersetzung zu versuchen. Im Gegentheil, er geht jetzt noch weiter und fügt eine rein teleologische Erklärung des Laufs der spiralig umspinnenden Fasern bei, indem er sie den in der Mechanik gebräuchlichen Sprungfedern vergleicht




er auch die isolirten Zellstoffstränge des netzförmigen Bindegewebes durch Vergrösserung der Bindegewebskörper sich bilden, mag man in denselben nun, wie Henle, spaltförmige Lücken oder wirkliche sternförmige Zellen, wie Virchow, sehen. Aus dieser Erweiterung der Henle-Virchow'schen Theorien über das Verhältniss der Bindegewebskörper zu der Grundsubstanz — zieht Leydig nun seine Folgerungen über die Natur der Membranen, die er, wie Luschka im Nerven einreissen und dadurch scheinbare Spiralfasern bilden lässt. — „Nimmt man“, sagt er, „mit Henle die Bindegewebskörper für spaltförmige Lücken zwischen den Bindegewebsbündeln, so müssen die Membranen, welche zu Spiralfasern zerreißen, lediglich als die elastisch verdichteten Grenzschichten der homogenen Bindegewebsbündel gelten, sieht man hingegen die Bindegewebskörper als sternförmige und mit den Ausläufern anastomosirende Zellen im Bindegewebe an (Virchow), welche die Interzellularmasse zu cylindrischen, händerartigen Strängen absondern, so kann man der elastischen Haut, welche sich zu Spiralfasern zu zerklüften vermag, die Bedeutung einer festgewordenen Zellenmembran beilegen. Mit der von mir oben ausgesprochenen Vermuthung“, fährt er fort, „dass ähnlich wie am Knorpel die Zwischensubstanz um die zelligen Theile herum zu den Knorpelkapseln verdichtet, so auch hier am Bindegewebe derselbe Hergang zu statuiren wäre, liessen sich wohl die beiderlei Ansichten mit einander verschmelzen.“

Wir können, wie wir weiter unten näher auseinandersetzen werden, der hier von Leydig versuchten Erweiterung der Henle-Virchow'schen Bindegewebstheorie, um die Genese des netzförmigen Bindegewebes zu erklären, — schlechterdings nicht beipflichten; dem Bestreben des berühmten Histologen aber, die Kritik und das Verständniss der umspinnenden Spiralfasern, aus der erkannten Natur des netzförmigen Bindegewebes abzuleiten, stimmen wir vollkommen bei. Leydig betritt damit den Weg des einzigen Histologen, der seit langen Jahren die umspinnenden Fasern mit Bewusstsein und auf Grund seiner Theorie

der Spiralfasern und des netzförmigen Bindegewebes negirte, den Weg Reicherts.

Entscheiden wir uns einerseits mit Virchow und Reichert dafür, dass die Spiralfasern integrierende Bestandtheile der Bindesubstanzgebilde sind und speciell die Bindesubstanzkörperchen des Sehnengewebes — so können sie an irgend welchen Bündeln von Bindesubstanz nicht ein von aussen herantretendes, accidentielles und für sich selbstständiges Formelement sein, so muss damit Henle's Ansicht für uns ihre Geltung verlieren, dass ein Netz von elastischen Fasern (elastische Fasern nach Henle gleich Spiralfasern) über die unversehrten, isolirten, aus Bindesubstanz gebildeten tertiären Bündel des Sehnengewebes verlaufe, und dass durch das Zusammenschnurren dieses Fasernetzes die einschnürenden Fasern gegeben seien. Statuiren wir andererseits mit demselben Forscher, dass das sog. netzförmige Bindegewebe, an welchem vorzugsweise die Einschnürungen durch scheinbare Fasern beobachtet werden, nur ein Structurverhältniss¹⁾ des geformten Bindegewebes ist, nicht aber ein in seiner Textur verschiedenes Glied der grossen Bindegewebsfamilie — so müssen alle an ihm zu Tage tretenden




tigen, ob die Erfahrung mit der Theorie übereinstimmt und ihr somit zur Bestätigung dient.

Fragen wir zuerst, ob die Beobachtung lehre, dass die scheinbare Einschnürung von Bindegewebsbündeln überhaupt auf Fasern zurückgeführt werden könne, seien sie nun, wie Henle früher meinte, von Anbeginn an der eingeschnürten Stelle gelegen, oder nach seiner spätern Ansicht erst nach Aufquellen des Bindegewebes reifartig an die Einschnürungsstelle geschoben? Unsere Beobachtungen verneinten diese Frage für alle Fälle.

Nehmen wir ein Bindegewebsbündel, sei es von der Innenfläche des Arachnoidealsackes im Gehirn oder Rückenmark, oder aus dem Omentum majus, oder aus dem Raum zwischen Unterhautzellgewebe und der Epidermis der Fische, oder einen jener zahllosen Bindegewebsstränge aus pathologischen Adhärenzen z. B. zwischen dem Peritonäalüberzuge der Leber einer- und des Zwerchfelles andererseits (die letzteren empfehlen sich sehr zur Untersuchung), so finden wir unter dem Mikroskop Stränge von 0,003 bis 0,040''' Breite, an deren Aussenschicht keinerlei distinguirte Formelemente erkannt werden. Im Innern der Bindegewebsstränge dagegen zeigen sich bei sehr pelluciden Strängen oft schon vor der Behandlung mit Essigsäure Spiralfasern, welche durchaus in der Längsrichtung der Stränge verlaufen, sich schlängeln und hier und da verbiegen. Die völlige Homogenität der Hülle bleibt aber auch nach dem Zusatz von Essigsäure. Wir sahen niemals das von Henle angenommene elastische Faser-netz an der äusseren Schicht der Zellstoffbündel auftreten, wir sahen niemals, dass früher wahrgenommene Spiralfasern durch die eintretende höchst bedeutende, das Zellstoffbündel oft 3–4fach verbreiternde Aufquellung verschoben und so zur reifartigen Einschnürung verwendet wurden. Alle vor wie nach dem Zusatz von Essigsäure beobachteten Spiralfasern in dem Zellstoffbündel bewahrten ihre Lage und ihre der Längsaxe der Bündel annähernd parallele Richtung und nachdem die zirkelförmigen Einschnürungen von der verschiedensten Form sich gebildet hatten, sahen wir die vorhandenen

Spiralfasern bei sorgfältiger Einstellung des Focus stets unter der Einschnürungsstelle durchlaufen, ganz abweichend von Henle, der sein elastisches Fasernetz über die unversehrten Bündel verlaufen liess. Was sich also von wirklichen Spiralfasern (oder, wie Henle und andere wollen, elastischen Fasern) in den Bindegewebsbündeln vorfindet und erkennbar wird, trägt nach unsern Beobachtungen nie zur Einschnürung bei. Der Zusatz von Essigsäure ändert das Gesamtbild der Stränge, abgesehen von den Einschnürungen, ferner insofern, als in den gröberen von ihnen durch diese Reagenz sehr häufig seine Gefässe und Nerven sichtbar werden, die in der Axe der Bündel verlaufen.

Nicht selten gelang es mir, von diesen gröberen Bündeln einen Quer- oder Schrägschnitt zur Anschauung zu bringen, namentlich wenn dieselben aus einem Präparate entnommen wurden, was einige Zeit in Chromsäure gelegen hatte. An diesen erschien die Bindegewebsmasse fein concentrisch gestreift (siehe Fig. 1.), bald so, als wenn sie aus feinen Lamellen zusammengesetzt wäre, bald so, dass das Bild einer continuirlichen Spirallinie entstand und damit eine Hinweisung auf eine concentrische Schichtung von Bindegewebsmem-




terung und Auftreibung der Stränge, wie sie stattfindet, in den tiefen Einschnüpfungsfurchen elastische Fasern von 0,001 bis 0,002 Linien Breite zu sehen. Die Bilder von Fasern also sind in jedem Falle, auch wenn wir mit Henle annähmen, dass auf einander geschobene elastische Fasern die Einschnürung bedingen, nur Trugbilder von Fasern, nur Linien, welche durch Aneinanderlegung der Bauschen der aufgeschwellten Bindegewebshülle und die zwischen denselben stagnirende Flüssigkeit (Wasser, Essigsäure) entstehen, während die supponirten Fasern im Grunde der Furchen verborgen liegen müssten. Henle glaubt die Zweifel an diesen Fasern dadurch zu heben, dass er auf die dunklen Kügelchen verweist (Canstatt's Jahresb. 1852 p. 30), welche am Rande der eingeschnürten Stellen oft sichtbar werden — „die scheinbaren Querschnitte der umspinnenden Fasern.“ Auch wir haben diese Kügelchen oft bemerkt, sie aber nie für Durchschnitte von Spiralfasern halten können, denn einerseits sind sie dazu viel zu gross und andererseits erscheinen sie auch dann in den Rinnen, wenn die Continuität der scheinbaren Fasern rings um das Bündel vorhanden ist. Wir können diese Kügelchen also nur für Körnchen, für Tröpfchen oder Luftbläschen halten; die zwischen den Bauschen des aufgequollenen Stranges durch Adhäsion festgehalten werden. Aller Zweifel an den spiralig umspinnenden Fasern aber soll nach Henle schwinden, wenn man statt der Essigsäure Kali und Wärme anwendet, welche das Bindegewebe auflösen und die elastischen Fasernetze leer zurücklassen sollen. Wir haben dies Experiment vielfach angestellt, aber eben so wenig wie Luschka (im Nerv. phren.) und Taube (Dissert. de membran. seros. in cav. cranii. Dorpat 1854) diese elastischen Querfasern sehen können.

Spricht nun die optische Analyse nach unseren Beobachtungen ganz gegen die Einschnürung durch Fasern, welche positiven Elemente haben wir, um die zweifellosen Einschnürungen zu erklären?

Zunächst die häufig von uns gemachte Beobachtung, dass die scheinbar umspinnenden Fasern in Lamellen einer homo-

genen, durch Essigsäure leicht streifig gewordenen Bindesubstanz ausgehen (cf. Fig. 3.). Wir sahen unter Einwirkung der Essigsäure zu verschiedenen Malen die Entstehung solcher Lamellen. Sie entstanden durch mehrfaches Einreissen einer äussersten Schicht am Bindegewebsstrange. Die auf quellende innere Substanz der Stränge drängte die so entstandenen isolirten Theile der Hülle auf schmale ringförmige Streifen (a. a. a.) zusammen, die bald bei weiterer Auftreibung der Stränge in der Tiefe der Furchen zwischen der sich aufbauschenden Bindegewebsmasse verschwanden. In manchen Fällen zerriss aber auch ein solcher ringförmiger, einschnürender Hüllenstreifen bei weiterer Ausdehnung der Bündel und das eine seiner Enden ragte nun, entspannt und sich in Folge dessen wieder theilweise lamellös ausbreitend (Fig. 3. b.) in die umgebende Flüssigkeit hinein. Die eben geschilderte Erscheinung ist nur an denjenigen Bündeln der Bindesubstanz von netzförmigem Structurverhältniss sichtbar, in denen die Bindesubstanz weitaus alle übrigen Formelemente d. h. die in der Axe verlaufenden und entweder noch sichtbaren oder schon ganz in der umgebenden Bindesubstanz aufgegangenen Gefässe oder Nerven überwiegt. Es gehört




Dass aber hier bei der Hülle der Muskelbündel spiralförmige Fasern vorkämen, wird Niemand behaupten; und in jedem Falle würde er dadurch widerlegt werden, dass die Mehrzahl der scheinbar einschnürenden Fasern nicht über das ganze Bündel sich fortsetzt. Die Erscheinung der partiellen Einschnürung ohne Einreissen einer membranösen Grenzschicht aber dürfte sich dadurch erklären, dass bei den Bindegewebsbündeln, an denen sie auftritt und an den zarten Muskelbündeln die Grenzschicht des Bindegewebes dehnbarer und viel weniger von der innern Schicht desselben differenzirt ist, als bei denjenigen, welche die vollständige Einschnürung durch zusammengeschuurte Membrantheile zeigen. Sie platzt in Folge dessen nicht, sondern dehnt sich nur varicös aus.

Eine scheinbar durch Fasern veranlasste Einschnürung zeigt sich aber auch bei dem partiellen Einreissen der Grenzschicht. Auch diese Erscheinung haben die zarten Muskelbündel mit einem Theil der Zellstoffstränge gemein. Wir bilden in Fig. 5. ein solches Bindegewebsbündel ab, dessen Scheide bei der Behandlung mit Essigsäure nur an einer Stelle eingerissen ist. Durch die eingerissene Stelle quillt der Inhalt des Bündels wie durch eine Bruchpforte hervor, während die Ränder der eingerissenen Scheide als zwei doppelt contourirte Linien nach der entgegengesetzten Seite des Bündels verlaufen. Auch hier liegt eine Quelle der Täuschung vor für jeden, der nicht unter dem Mikroskop selbst die Einwirkung der Essigsäure und die Entstehung der scheinbar so evidenten Fasern beobachtet.


Eine besondere Beachtung verdienen endlich jene Bindegewebsbündel, die eine mehrfache Art der Einschnürungen zeigen. Die Stränge des Bindegewebes von netzförmiger Structur bilden nämlich keinesweges immer einfache Stränge, die nur etwa aus feinen Gefässen oder Nerven und der umlagernden, starken Bindegewebshülle bestehen. Nein, häufig sind sie in eben derselben Weise durch Vereinigung mehrerer primärer Stränge gebildet, wie wir dies an der Sehne in ausgebildeter Weise sehen. Eine gemeinsame Bindegewebs-

Hülle umschnürt zwei feinste Stränge, eine zweite vereint wieder die beiden vereinigten Stränge mit einem dritten; Spiralfasern verlaufen in der Substanz aller Scheiden der primären, wie der secundären und tertiären Stränge, so dass der Durchschnitt derselben vollständig dem Durchschnitt frischer Sehnen gleicht. Beobachtet man nun die Einwirkung der Essigsäure auf diese zusammengesetzten Stränge, so erscheinen, wie in Fig. 6., mehrfache Einschnürungen, totale, die der allgemeinen Hülle des zusammengesetzten Bündels angehören (a. a. a.), partielle (b. b. b.), die sich über zwei secundär vereinigte Bündel erstrecken und endlich (c. c.) solche partielle, die nur an der Hülle eines primären Stranges sich gebildet haben. Dass diese Bilder nicht etwa auf eine Täuschung durch blosses An- oder Uebereinanderliegen mehrerer einzelner Stränge beruhten, davon überzeugten wir uns durch die sorgsamste Prüfung und theilen in Fig. 7. noch die Zeichnung eines Bündels mit, bei dem in a. a. a. die Einschnürungen der allgemeinen Hülle, in b. b. die Einschnürungen des einen nach oben gelegenen primären Bündels besonders deutlich sind. So wenig man nun geneigt sein wird, ein Netz elastischer Querfasern an primären Seh-



Zunächst dürfen wir das allgemeine Gesetz, dass das Bindegewebe, wenn es an Organen als umkleidende Hülle auftritt, sich in Schichten von lamellöser Textur abgelagert, auch auf das sogenannte netzförmige Bindegewebe anwenden. Denn in diesem Verhältniss, als Organhülle, steht ja auch die Bindesubstanz im netzförmigen Bindegewebe. Sie umhüllt hier Gefässe und Nerven, wie unsere Beobachtungen und entsprechende Luschka's evident dargethan haben. Diese Gefässe und Nerven können freilich nicht in jedem Strange des netzförmigen Bindegewebes mehr nachgewiesen werden; sie können geschwunden sein und zu Bindesubstanz umgewandelt, wie die Umbilicalvene zum Lig. teres, deswegen kann aber nicht angezweifelt werden, dass der Ausdruck „netzförmiges Bindegewebe“, wie Reichert längst erwiesen hat, nur ein Structurverhältniss der Bindesubstanz, eine durch Gefässe und Nerven, denen die Bindesubstanz dient, an deren Aufbau in Netzform sie sich theiligt, veranlasste Ausbreitung bezeichnet, nicht aber eine Bindesubstanzform von eigenthümlicher histologischer Genese und besonderer Textur. Die Textur der netzförmigen Bindesubstanz ist dieselbe, wie sie die geformte Bindesubstanz des sogenannten Sehnengewebes überall zeigt: sie besteht aus der feingestreiften Grundsubstanz und aus den stets der Länge nach verlaufenden Spiralfasern (Bindesubstanzkörperchen des Sehnengewebes). Die an ihr auf Zusatz von Essigsäure erscheinenden Einschnürungen erscheinen daher auch in gleicher Weise nur weniger ausgebildet an den Sehnenbündeln und den Bindegewebehüllen zarter Muskelfasern. Die Bindesubstanz im netzförmigen Bindegewebe ist also nur Organhülle und als solche in Schichten von lamellöser Textur abgelagert. Diese Schichten haben wir auch an dem von uns oben beschriebenen und (Fig. 1.) abgebildeten Durchschnitt von Strängen der netzförmigen Bindesubstanz nachgewiesen. Bei unserer Betrachtung der Einschnürungserscheinungen wurden wir aber auf eine Verschiedenheit der äussersten dieser Schichten, der Grenzschicht, von den inneren Schichten hingewiesen. Luschka nimmt an, dass

diese so verschiedenartig sich darstellende Grenzschicht aus elastischer Substanz gebildet sei. Sollte darunter verstanden sein, dass in unserer Grenzschicht ein wirklich elastisches Gewebe, eine Verdichtung der bindegewebigen Grundsubstanz zu netzförmigen Faserzügen vorliege, so müssten wir dem widersprechen. Beziehen wir aber den Ausdruck „elastische Substanz“ auf jene glashellen Membranen, in welche die Interzellularmasse der Binde substanz durch Härtung und Verdichtung so häufig übergeht, ohne dass in ihr ein Fasernetz aufträte, so müssen wir der Ansicht Luschka's durchaus beipflichten. Nach Reichert's und Zellinski's Untersuchungen steht es fest, dass im Bindegewebe neben der leimgebenden Substanz stets eine mehr oder weniger leucingebende vorkommt, und dass insbesondere nach aussen hin die Binde substanz sich häufig in Gewebsschichten abgrenzt, aus denen auch bei längerem Kochen kein Leim, wohl aber Leucin sich darstellen lässt. Mit diesen leucingebenden, glashellen Membranen, mit diesen zu elastischer Substanz verdichteten Grenzschichten der Binde substanz (wie wir sie in der Tunica Desmoursii, der basement membrane, der Tunica propria der Drüsen, dem Sarcolemma, der Primitivscheide



den kleinen spaltförmigen Räumen des Bindegewebes. Aehnlich nun, wie am Knorpel die Zwischensubstanz um die zelligen Theile herum sich zu den Knorpelkapseln verdichtet, ähnlich, meint er, hätte sich die Grundsubstanz um die ausnehmend vergrösserten Bindegewebskörper — (sive Spalträume zwischen den Zellstoffsträngen) verdichtet, und so habe die elastische Haut, welche zu Spiralfasern zu zerklüften vermöge, die Bedeutung einer festgewordenen Zellenmembran. Ja Leydig geht noch weiter. Er bezieht sogar (p. 32) die Einschnürungen direct auf die queren Ausläufer der durch die Hohlräume vertretenen Bindegewebskörper. Wir können dieser kühnen Erweiterung der Virchow'schen Theorie nicht beipflichten. Denn einmal ist die Binde substanz an den Strängen des Subarachnoidalraumes nicht bloß Intercellularsubstanz des Bindegewebes, sondern sie ist Grundsubstanz mit Bindegewebskörperchen, Grundsubstanz mit Spiralfasern (Binde substanzkörperchen des Sehnengewebes). Die Binde substanzkörperchen können darum nicht in den grossen Räumen zwischen den Strängen gesucht werden; sie liegen deutlich innerhalb der Stränge selbst und müssen sich dort vorfinden, weil diese Stränge überhaupt wohlgeformtes Bindegewebe, nur mit einem eigenthümlichen Structurverhältniss sind. Ueberdies hiesse es wohl den Bindegewebskörperchen ein nirgends erwiesenes Wachsthum zutrauen, wenn man sie zu Lücken von $\frac{1}{4}$ Zoll Länge und Breite auswachsen liesse, denn so gross und noch grösser sind in der That oft die Räume zwischen den Strängen in dem Subarachnoidalraum des Rückenmarks. Man sieht ferner die Einschnürungen keineswegs derart erscheinen, dass sie irgendwie für die queren Ausläufer der Bindegewebskörper gehalten werden könnten. Wir wenigstens können uns nicht denken, wie ein solcher Querausläufer die vollständig circuläre Einschnürung eines Stranges bewirken könnte.

Fassen wir zum Schluss die Resultate unserer Auseinandersetzungen zusammen, so ergibt sich aus denselben, wie wir glauben, Folgendes:

1. Die von Henle angenommenen umspinnenden Spiralfasern existiren nicht.
2. Eben so wenig lassen sich die an den Strängen des sog. netzförmigen Bindegewebes bei Behandlung mit Essigsäure erscheinenden Einschnürungen auf ein Netz elastischer Querfasern (Henle) zurückführen.
3. Sie sind vielmehr dadurch veranlasst, dass eine eigenthümlich charakterisirte Grenzschicht der Stränge bei Behandlung mit Essigsäure entweder
 - a) partiell einreisse und den Bindegewebsinhalt wie durch eine Bruchforte austreten lässt, oder
 - b) an vielen Stellen ringsum einreisst und auf schmale Bänder zusammenschnurrt, oder
 - c) sich nur rosenkranzförmig an einzelnen Stellen ausdehnt.
4. Die eigenthümliche Beschaffenheit dieser Grenzschicht kann nicht aus der histologischen Genese des netzförmigen Bindegewebes (unter Anwendung und Erweiterung der Virchow'schen Theorie vom Verhältniss der Bindegewebskörperchen zur Intercellularmasse) abgeleitet werden (Leydig); sondern erklärt sich lediglich daraus, dass die

Hand und Fuss

von

LUDWIG FICK in Marburg.

Hand und Fuss.

Wenn man berücksichtigt, dass seit langen Jahren die Ausdrücke Hand und Fuss als termini technici in der zoologischen Classification verwendet und die Affen noch immer als Vier-Händer im Gegensatz zu den Menschen als Zweihänder specificirt werden, so sollte man vermuthen, es seien die betreffenden morphologischen Verhältnisse erschöpfend festgestellt; dennoch verhält sich die Sache nicht ganz so und es möchten die folgenden Betrachtungen über die genauere Begriffsbestimmung dieser beiden Glieder trotz mehrerer höchst verdienstlicher einschlagenden Arbeiten nicht überflüssig sein.

Es lehrt der oberflächliche Augenschein, dass in der Construction der Hand und des Fusses bis zu einem gewissen Grade ein und derselbe Typus herrscht, so wie auch die Leistung beider Glieder bis zu einem gewissen Punkte gleichwerthig ist. Ebenso lehrt aber auch die oberflächliche Betrachtung, dass zwischen beiden Differenzen bestehen, durch welche der gemeinsame Grundtypus in beiden Gliedern in einer besonderen Variation sich darstellt. Diese Differenzen, verschiedene Leistungsfähigkeiten statuierend, stempeln die Hand, wie man sich ausdrückt, zum Werkzeug für das Ergreifen eines Objects, während die specielle Organisation des Fusses diesen als die Stützfläche des aufgerichteten Körpers signalisirt. Die Fähigkeit, mit Leichtigkeit ein Object zu fassen, welche auch der unteren


Extremität des Affen und zwar geradezu auf Unkosten der Qualifikation des Fusses zur platten Stützfläche des Körpers gegeben ist, hat die Zoologen bestimmt auch der unteren Extremität des Affen eine Hand zu geben. Wie sich diese, aus der oberflächlichen Betrachtung der Leistung abstrahirte Bestimmung zu dem inneren Mechanismus verhält, mag in folgendem betrachtet werden.

Analogie der Hand und des Fusses.

Lässt man zunächst alles unberücksichtigt, was die Differenz zwischen Hand und Fuss statuirt, so lässt sich die folgende Analogie beider nicht bestreiten.

Es zerfällt von dem Schulter- und Beckengürtel aus jede Extremität in ihrer Längenaxe in 4 auf einander folgende Abtheilungen, von denen jede für sich an der rückwärts liegenden Abtheilung bewegt werden kann. Diese 4 Abtheilungen sind:

Oberschenkel und Oberarm,
Unterschenkel und Vorderarm,
Fuss und Hand,
Zehen und Finger.



Es sind aber die Unterabtheilungen der Finger und Zehen mit der Unterabtheilung des Fusses und der Hand nicht gleichwerthig. Es hat nämlich jedes Phalangenglied seinen besondern Muskel-Bewegungsapparat, welcher nach Abzug der peripherischen Abtheilung noch thätig bleibt, wogegen die Unterabtheilungen der Hand in carpus und metacarpus, so wie des Fusses in tarsus und metatarsus, nicht gegen einander bewegt werden, vielmehr mit der Entfernung des metacarpus und metatarsus die den carpus und tarsus bewegenden Muskelapparate ausser Function gesetzt werden. Da also metacarpus und metatarsus die Bewegungen des carpus und tarsus (wenigstens grösstentheils) mitmachen, so muss die Bedeutung dieser Unterabtheilung anderweitig begründet werden. — Es zerfällt aber endlich der carpus und tarsus selbst in zwei weitere Unterabtheilungen, von denen die eine eben die Verbindung mit dem metacarpus und metatarsus herstellt, aber nur an hallux und pollux activ mit diesen articulirt, während zwischen ihr und crus und antibrachium die andere carpus- und tarsus-Abtheilung sich befindet, durch welche die zwischen crus und antibrachium einerseits und metacarpus und metatarsus anderseits möglichen Activbewegungen regulirt werden.

Neben dieser Gliederung des Extremitätenskelets in der Längensaxe geht wie bekannt die Gliederung der Haupt- und Unterabtheilungen im Querschnitt her, indem in der oberen wie unteren Extremität die erste Abtheilung einfach durch femur und humerus gestützt wird, beide sodann im Unterschenkel und Vorderarm in zwei Knochen zerfallen, sodann die erste carpus- und tarsusreihe durch 3 Glieder gebildet wird, während die den metacarpus und metatarsus mit carpus und tarsus verbindende zweite Fuss- und Handwurzelabtheilung aus 4 Knochen zusammengesetzt ist, und endlich am metatarsus wie am metacarpus 5 Zehen und Finger articuliren.


Dass patella und os pisiforme diesen beiden Extremitäten gemeinsamen Typus nicht alterire, insofern sie nur Appendicularknochen einzelner Abtheilungen darstellen, welche unter Umständen in die Abtheilung einschmelzen, zu welcher sie

gehören, ist so sehr allgemein anerkannt, dass es einer Rechtfertigung nicht bedarf.

Die Analogie der Leistung beider Extremitäten findet sich nun, wenn man zunächst von dem Mechanismus absieht, durch welchen sie ausgeführt wird, in folgenden Bewegungsfähigkeiten. Die ersten Abtheilungen beider Extremitäten sind in den Pfannen ihrer Rumpfgürtel arthrodisch beweglich, d. h. sie können einen Bewegungskegel beschreiben, dessen Spitze (Drehpunkt) in ihren Gelenkköpfen gelegen ist, während in der Basis des Kegels das periphere Ende der Längsaxe in jeden beliebigen Punkt gestellt werden kann, auch können beide in jeder beliebigen Stellung, die sie innerhalb ihres Bewegungskegels einnehmen, um eine vom Drehpunkte durch die Basis gezogene Längsaxe rotirt werden.

Die zweite Abtheilung, Vorderarm und Unterschenkel sind an der ersten Abtheilung in beschränkter Articulation, im Ginglymus, um eine Queraxe beweglich.

Die dritte Abtheilung, der Fuss und die Hand können wieder arthrodische Bewegungskegel beschreiben, deren Drehungspunkte innerhalb der Hand- und Fusswurzel liegen.



Unterschied zwischen Hand und Fuss.

Beide Extremitäten unterscheiden sich zunächst dadurch, dass ähnliche Leistungen in analogen Abtheilungen beider Extremitäten dem Maasse nach verschieden ausgebildet sind, zweitens insofern in der einen Extremität die dem Wesen nach gleichartige Leistung durch einen andern Mechanismus zu Stande kommt, und endlich drittens, indem in jeder Extremität wesentlich verschiedene Leistungen vorkommen.

Die verschiedenen Leistungen und Mechanismen des Fusses und der Hand hängen aber mit entsprechenden Constructionsunterschieden im Arm und Schenkel zusammen, weshalb es sich rechtfertigt, wenn trotz der Ueberschrift „Hand und Fuss“ die Betrachtung sich über die ganze Extremität erstreckt, weil der Unterarm oder Unterschenkel nicht beliebig eine Hand oder einen Fuss zu tragen im Stande ist, vielmehr ebenso durch ihre Construction die Leistung der ihnen entsprechenden Endabtheilung bedingen helfen, wie umgekehrt ihre eigenthümliche Leistung theilweise durch die Construction jener bedingt wird.

Als Verschiedenheit der ersten Art fällt zunächst auf, dass der Ginglymus, welcher die Längsaxe der Extremität zwischen Ober- und Unterschenkel, so wie zwischen Ober- und Unterarm bricht, bei den meisten Säugethieren in eine andere Richtung zur Volarfläche der Hand als zur Plantarfläche des Fusses gestellt ist. — Betrachtet man z. B. das Pferdeskelet, so ist die obere Extremität zwischen humerus und antibrachium nach vorn, an entsprechender Stelle die hintere Extremität nach hinten geknickt. — Sind beide Ginglymi in Contraction, so entfernen sich die Endglieder der Extremitäten, welche sich nähern bei der Streckung. — Bekanntlich stellt sich die Sache anders dar bei den Sauriern etc. Es wird als naturgemässe Stellung für die Vergleichung der oberen und unteren Menschenextremität gewöhnlich die der Stellung bei den meisten Säugethieren entsprechende angesehen und danach vorn und hinten bestimmt. Es ist dies

unrichtig, da es nur auf die Stellung des Menschenarmes ankommt, um den Parallelismus des Knie- und Ellenbogengelenks in ihrer Relation zu *vola* und *Planta* so herzustellen, wie er bei den Sauriern im Gegensatze zu den Säugethieren feststehender Charakter ist. Betrachtet man am Menschen die Bewegung des Kletterns, so arbeiten beide Extremitäten in einer Stellung, in welcher sich der völlige Parallelismus in der Relation des Knie- und Ellenbogengelenks zur *planta pedis* und *vola manus* herstellt, wie er bei den Sauriern für alle ihre Bewegungsarten charakteristisch ist.

Da nun, wenn man die Muskel- und Nervenapparate beider Extremitäten parallelisirt, die Analogien nicht hervortreten, wenn man den Knie- und Ellenbogenginglymus opponirt, wie beim Pferde, dagegen sofort in die Augen springen, wenn man die Stellung der Saurier oder die menschliche Kletterbewegung unterlegt, so geht daraus hervor, dass diese letztere Stellung die dem Grundplan der Extremitätenorganisation des Wirbelthieres entsprechende, die Säugethierstellung aber eben eine für sie charakteristische Modification des Grundplans, und endlich die Fähigkeit des Menschenarmes sowohl parallel dem Schenkel, wie demsel-

stellt und die Basis des Bewegungskegels des Fusses ist nach innen und vorn gegen die verlängerte Medianebene des Körpers gerichtet, so dass bei Parallelstellung beider Unterschenkel die Plantarflächen beider Füße gegen einander gerichtet werden können.


Eine weitere Verschiedenheit der ersten Art besteht darin, dass die Leistungen des metacarpus sowohl, wie der Finger, in der oberen Extremität dem Maasse nach viel freier entwickelt sind, als die entsprechenden in der anderen.

Während unbedingt jede Menschenhand so hohl gemacht und ihre Finger so geschlossen werden können, dass ein kleiner Gegenstand in der *vola manus* vollkommen verborgen werden kann, so können auch bei stärkster Uebung der Hallux und die kleine Zehe des Fusses sich nicht decken.

Eine wesentliche Verschiedenheit der zweiten Art ist darin begründet, dass die kegelförmige Bewegung des Fusses an dem Unterschenkel von der entsprechenden Bewegung der Hand nicht nur in Richtung und Maass verschieden ist, sondern durch einen wesentlich verschiedenen Mechanismus ausgeführt wird. Beide Bewegungskegel haben keine kreisförmige, sondern eine ovale Basis, d. h. die Bewegung des Fusses wie der Hand ist in der Richtung der Flexion und Extension freier, als in den beiden Seitenrichtungen, die ovale Basis des Bewegungskegels ist also mit den Spitzen des Ovals nach Plantar- und Dorsalfläche hin gerichtet. Es rührt dies daher, dass in beiden Gliedern ein ziemlich beträchtlicher *Ginglymus* noch zu den Gelenken, welche die arthrodische Bewegung ausführen, hinzukommt. Die ganze arthrodische Bewegung aber, in welcher die Hand als *totum* betrachtet, diesen Kegel mit ovaler Basis beschreibt, kommt bei der oberen Extremität zu Stande, durch eine Arthrodie in der *articulatio carpi et antibrachii*, zu welcher noch ein nach Dorsal- und Volarfläche gerichteter *Ginglymus* zwischen *prima series* und *altera series* der Carpusknochen hinzukommt. Diese beiden Carpusgelenke werden durch dieselben Muskeln bewegt (*flexores* und *extensores carpi*), welche mit Ausnahme des *flex. carpi ulnaris* sich an der zweiten Carpusreihe und

über dieser hinaus befestigen, so dass man durchaus nicht im Stande ist, eines dieser Gelenke allein zu bewegen und das Maass, in welchem die beiden hier combinirten Gelenke factisch angesprochen werden, nicht von directen Einflüssen, sondern von den Gegenwirkungen abhängig ist, welche veranlassen, dass bei dem Muskelzuge bald beide bis zur Erschöpfung ihrer Bewegungsmaxima, bald gleich, bald ungleich angesprochen werden. Die Wirkung des flex. carpi ulnaris geht zwar zunächst auf das os pisiforme, durch dessen starke Bandverbindung mit dem hamatum aber nothwendig in demselben Grade, wie die der übrigen musculi carpi, auch auf die zweite Carpusreihe. Es wird hierdurch veranlasst, dass dieser Muskel, wenn er allein zieht, weniger als die übrigen musculi carpi den Ginglymus zwischen erster und zweiter Carpusreihe erschöpfen kann.

Es ist bei diesem Articulationsmechanismus noch von Wichtigkeit, dass die lockere Verbindung der Einzelknochen der ersten Carpusreihe unter sich, ein ziemlich starkes Wackeln derselben untereinander zulässt, welche Wackelbewegung in dem Gelenk des pisiforme gipfelt. Ferner ist zu bemerken, dass die festere Verbindung der Carpusknochen der zweiten Reihe



Reihe hervorgehobene talus und zwar im sehr freien Ginglymus, sodann an ihm in einer ganz eigenthümlichen Weise der übrige tarsus; und zwar so, dass unter Mitbenutzung des Ginglymus zwischen talus und crus wiederum ein mit ovaler Grundfläche nach Bieg- und Streckseite erweiterter Bewegungakegel durch die Bewegung zwischen talus, naviculare und calcaneus zu Stande kommt, in welchem zugleich noch eine kleine Rotation um eine von der Ferse nach der Fussspitze laufende Längensaxe, durch dieselben Muskeln ausführbar ist. In der Fusswurzel liegt also die Ginglymusaxe hinter dem arthrodischen Drehungspunkt, während in der Handwurzel das ginglymische Gelenk vor dem arthrodischen liegt. Auch hier setzt sich kein Muskel an den talus fest, aber hier können alle 3 möglichen Bewegungen, Ginglymus, Seitenbewegung und Rotation eben sowohl isolirt ausgeführt, wie combinirt werden.

Als Unterschied der dritten Art endlich tritt sofort entgegen, dass die Rotation um die Längensaxe, welche der Hand wenigstens als Activbewegung völlig fehlt, in der bekannten, höchst vollendeten Weise durch die Pro- und Supination des Radius ausgeführt wird, welche in jeder beliebigen Ginglymusstellung des antibrachium am brachium; in jeder beliebigen Stellung des carpus am antibrachium ausführbar, ihre volle Leistung auf die lediglich mit dem Radius in directer Verbindung stehende Hand erstreckt. Kann der Fuss ein klein wenig selbstständig rotirt werden in seinem tarsus, so erweitert sich durch diese sehr geringe Rotation der Bewegungakegel des Fusses nicht, während die mit dem Radius geradezu um das feststehende Capitulum der Ulna herumlaufende Hand hierdurch eine ganz ausserordentliche Erweiterung ihres Bewegungskreises erhält. Es läuft die Rotationsaxe des Radius oben durch das capitulum radii, unten durch das capitulum ulnae. Ergänzt wird wiederum die geringe selbstständige Rotationsfähigkeit des Fusses durch die in allen Stellungen — welche nicht die Seitenbänder span-


nen — mögliche Rotation des ganzen Unterschenkels im Kniegelenke.

Von Wichtigkeit ist hierbei, dass die Rotation der unteren Extremität sowohl im Kniegelenk wie des Fusses in den Tarsusgelenken nur Nebenleistungen derjenigen Muskelgruppen sind, welche die übrigen ginglymischen und arthrodischen Bewegungen der betreffenden Abtheilungen ausführen, dass mit einem Worte eine selbstständige Rotationsmusculatur an der unteren Abtheilung der unteren Extremität nicht existirt. — Dagegen wird die Rotation des Radius, wie sie denn auch unabhängig in allen beliebigen Hand- und Armstellungen bewerkstelligt werden kann, durch selbstständige Rotationsmuskeln ausgeführt. Bekanntlich sind von den Muskeln, welche die Rotation des Radius ausführen, mehrere nicht reine Rotatorien, sondern haben noch anderweite flexorische Nebenwirkungen (supinator und pronator long.), auch ist der Einfluss des Biceps auf die Supination des Radius eben wohl nur eine Nebenwirkung des unter allen Umständen flectirenden, also mit Recht den flexores zugezählten flexor anti-brachii radialis, wodurch auch im Arm eine dynamische Association und Uebergang der Rotation in die Flexion prä-

Und auch diese ist bei den einzelnen Subjecten derselben Species oft sehr verschieden, wiewohl immer nur dem Grade der Entwicklung nach, so dass freilich niemals verschiedene Arten der Articulationsflächen in einander übergehen, ohne eine spezifische Aenderung des Organisationstypus anzudeuten. Es können nämlich alle charakteristischen Arten der Gelenke, die arthrodischen allseitig beweglichen Gelenkköpfe, wie die ginglymischen und die rotatorischen einseitig beweglichen Rollflächen, wie endlich die sattelförmigen Gelenkflächen verkümmern und sich in blosse amphiarthrodische Wackelgelenkflächen abflachen, bei dennoch gleichgebliebenem Organisationstypus, aber niemals kann eine der dreigenannten charakteristischen Arten in die andere übergehen. Es kann also ohne Veränderung des gesammten Organisationstypus, an der Stelle, welche einen Gelenkkopf enthält, niemals eine trochlea oder eine Sattelfläche stehen, wohl aber kann jede der 3 Formen unter einer platten Wackelfläche gleichsam versteckt sein. Wenn nun in dieser Beziehung die identischen Gelenkflächen auf nicht wesentlich verschiedene Organisationstypen mit gutem Rechte schliessen lassen, so bezeichnen dennoch auch die Gelenkflächen den Organisationstypus noch nicht völlig erschöpfend, da z. B. ein arthrodischer Gelenkkopf den Rotationsapparat vielleicht entbehren und ein völlig analog gebildeter denselben haben kann. Um also verschiedene Organisationstypen eines Bewegungsgliedes erschöpfend zu charakterisiren, wird die Abwägung der betreffenden Muskelmechanismen vollkommen unentbehrlich sein.

Es werden aber für die Analyse der Muskelform folgende Gesichtspunkte festzuhalten sein. 1) Da ein Muskel oft verschiedene Bewegungen ausführen kann, so wird zu unterscheiden sein zwischen Haupt- und Nebenwirkung. 2) Da ein Muskel häufig auf mehrere Gelenke wirken kann, so wird zu unterscheiden sein, welchen der durch ihn in Bewegung versetzten er wesentlich angehört. Es ist 3) klar, dass Muskeln, deren mittlere Zugkraft, wenn man sie in ihre ein-

zelnen Componenten auflöst, sich aus vielen verschiedenen, auf einen Punkt zusammenlaufenden Zugkräften componirt darstellt — in der ungleichen Kraftentwicklung ihrer einzelnen Componenten die Fähigkeit haben — Nebenwirkungen ausser ihrer mittleren Wirkung — darzustellen, während dies bei Muskeln, deren sämtliche Zugkräfte parallel wirken, nicht der Fall ist. — Es ist leicht abzusehen, dass ein dergleichen aus ungleich gerichteten, aber auf einen einzigen Punkt convergirenden Kräften combinirter Muskel wohl genauer als eine Muskelcombination, denn als eine wirkliche Einheit anzusehen ist, und es wird deshalb einleuchtend sein, dass das Zerfallen von dergleichen Muskelcombinationen in mehrere factisch getrennte Muskeln und umgekehrt das Zusammenschmelzen (Verwachsen) mehrerer aus bestimmten Richtungen auf einen Punkt wirkender Muskeln für die Charakteristik eines bestimmten Organisationstypus nur geringere Wichtigkeit hat. Betrachten wir aber in diesem Sinne die ausführende Musculatur der Carpus- und Tarsusbewegungen, so zeigen sich hier folgende wesentliche Verschiedenheiten. Die Muskeln, welche die Hand in der Arthrodi am anti-brachium bewegen, sind: die flexores carpi, ulnaris, radialis und palmaris, so wie die extensores carpi, radialis primus, secundus und ulnaris. Die drei letzteren inseriren




mit dem flex. c. ulnaris. — Diese 6 Muskeln reichen vollkommen hin, um durch ihre concurrende und alternirende Contraction alle die dem carpus (zwischen ihm und antibrach. sowohl, als zwischen erster und zweiter Carpusreihe) eigenen Bewegungen auszuführen, mit Ausnahme der geringen Rotation, welche nur passiv ausführbar ist, wenn man den Radius in einem Schraubstock fixirt und nun die Hand als Ganzes zusammenfassend bewegt. Es können diese musculi carpi aber diese Rotation nicht bewirken, weil die Flecken der flexoren überall durch die Fascialbänder ganz dicht an die Knochen angeschlossen liegen, während am Fusse die Winkelstellung der Längsaxe des Fusses zu der Längsaxe des Unterschenkels und der grosse Spielraum, den die Fascialbänder den Sehnen des peroneus tertius und des tibialis anticus gestatten, dies möglich machen. Die 6 eigenthümlichen Carpusmuskeln haben dagegen sämmtlich noch eine Nebenwirkung auf das Cubitalgelenk, da sie über den Vorderarm bis an den Oberarm zurückspringen und deshalb bei voller Flexorwirkung die Beugung des carpus mit einer Beugung der ulna und umgekehrt verknüpfen.

Die vom Arm über die Carpusgelenke wegspringenden Fingermuskeln können zwar ihrer Lage nach eine Nebenwirkung auf die Carpusgelenke ausüben, sind aber nicht zu den Bewegungen in denselben nothwendig. Die völlige Freiheit in der Fingerbewegung bei jeder beliebigen Carpusstellung beweist, dass auch die Wirkung der Fingermuskeln, welche mit den Carpusmuskeln zusammenlaufen, dynamisch isolirt ist. Die Daumenmuskeln sind aber mechanisch und dynamisch völlig von den Carpusmuskeln getrennt, da die extensores und abductores des Daumen nicht mit den extensores an den humerus zurückgehen, sondern (gekreuzt mit den extensores carpi) nur vom Vorderarm entspringen und nur der flexor pollicis longus gewöhnlich einen ganz kleinen, jedoch isolirten Zipfel an den Oberarm heraufsendet. — Berücksichtigt man, dass der extensor pollicis abductor, bicornis, von seinen 2 Sehnen die eine an das os multangulum majus, die andere an den metacarpus pollicis befestigt und

dass man in der That das os multangulum majus mit dem ganzen Daumen exarticuliren kann, ohne die Leistung der Carpusarticulation aufzuheben, so ist charakteristisch für die Carpusleistung, dass sie in die Fingerleistung fast gar nicht eingreift und den Daumen auf das Vollkommenste frei lässt, während sie selbst mit den Leistungen im Cubitalgelenk mechanisch verknüpft ist.


Ganz anders verhält sich die entsprechende Musculatur der unteren Extremität. Den 6 Motoren des carpus entsprechen hier: musculus suralis, plantaris long., tibialis anticus, tib. posticus, peroneus longus, brevis und tertius. Von diesen entspricht der tibialis anticus seinem Ansatz nach genau dem extensor pollicis abductorius (abductor bicornis), indem er an das os metatars. hallucis und an den Tarsusknochen, welcher den Daumen trägt (os cuneiforme prim.), sich ansetzt. Wollte man jedoch diesen Muskel wegen dieses Ansatzes als Halluxmuskel ansprechen, so würde für die den 3 extensores carpi analoge Bewegung am Fusse allein der peroneus tert. übrig bleiben, welcher überdies fast ganz mit dem extens. comm. digit. long. verwachsen, weniger Selbstständigkeit als alle übrigen Tarsusmuskeln besitzt. Es würde hieraus die



carpi gekreuzt an der ulnarseite des antibrachium entspringt, dagegen der Tibial. anticus auf der Tibialseite inserirt ist. Da der Tibialis anticus also als der ausgiebigste motor unter den Tarsusmuskeln festgehalten werden muss, da er aber gleichwohl zugleich ein Extensor abductorius hallucis ist, so ist die Sache so zu fassen, dass uns hier in der Verschmelzung eines gemeinschaftlichen Flexor pedis tibialis und Ext. hallucis abductorius zum Musc. tibia. anticus, ein vollkommen spezifischer Unterschied zwischen Handdaumen und Fussdaumen, zwischen Hand und Fuss gegeben ist. — Während jede beliebige Carpusbewegung nicht allein den Daumen, sondern sogar seinen Träger (*Os multang. maj*) völlig frei lässt, so setzt jede Dorsalbewegung des Tarsus eine bestimmte und zwar abductorische (spreitzende) Bewegung des Fussdaumens fest. — Dasselbe Verhältniss wiederholt sich aber in der Sohlenfläche, indem hier einer der beiden Muskeln (*Peroneus long. und brev.*), welche dem Flex. carpi ulnaris ungefähr entsprechen, quer durch die Fusssohle bis an den Metatars. hallucis hinläuft. Während also der Tibial. anticus bei allen nach dem Dorsum gerichteten Fussbewegungen den Hallux in gespreitzter Abduction fesselt, so involvirt jede kräftige Fussbewegung nach der Sohlenfläche hin, zugleich eine kräftige adductorische und flexorische Bewegung des Hallux. — Somit ist also das im Handdaumen völlig freie Sattelgelenk zwischen Daumen und Carpus am Fusse nach beiden Seiten hin völlig gefesselt und den Fusswurzelbewegungen einverleibt und untergeordnet. — An der kleinen Fingerseite greift nicht nur der *Peroneus tertius* gleich dem Ext. carp. ulnaris bis an den 5ten Mittelfussknochen über, sondern auch der dem Flex. carp. ulnaris theilweise entsprechende *Peroneus brevis s. secund.* Es ist also auch die kleinste Zehe viel vollständiger dem Einflusse der Tarsalmotoren ausgesetzt, als bei der Hand, und ebenso wie die grosse Zehe bei kräftiger Dorsalbewegung in gespreitzter und bei Plantarbewegung in adductorischer Flexion gefesselt. Während am peripherischen Ende die Tarsalmotoren in die Frei-

heit der Finger viel weiter übergreifen, als an der Hand, ist dagegen rückwärts, mit Ausnahme der zwei Gastrocnemii, der Mechanismus des Kniegelenks vollständig aus ihrem Wirkungskreise erlöst. Die Gastrocnemii aber, weil sie doppelt und völlig getrennt sind, unterstützen noch den Mechanismus des Kniegelenks nach beiden Seiten hin, indem sie sowohl die Flexion desselben, wie die Rotation desselben unterstützen können. Die Analogien, welche sich aus der Vergleichung der Wadenmuskeln mit dem Rotationsapparate des Radius ergeben, liegen der nächsten Aufgabe fern und ist deshalb hier nur noch anzuführen, wie durch die Winkelstellung des Fusses zur Schenkelaxe und durch grosse Entfernung der Insertionspunkte der Tarsusmotoren von der Ginglymusaxe des Talus bei den gegebenen Gelenken des Tarsus die arthrodische und rotatorische Leistung des Fusses, durch die Tarsusmotoren möglich gemacht wird.


Wenn wir uns nun endlich zum letzten Unterschied wenden, nämlich zur Vergleichung des Hand- und Fussdaumens selbst, so ist schon in dem vorhergehenden soeben ein wesentlicher Unterschied angegeben. Es ist zunächst hervorzuheben,



so hat man in beiden eine Nagelphalanx, welche durch einen besonderen Beuger und Strecker im Ginglymus bewegt wird, sodann eine andere Phalanx, welche auf dem sehr flachen Gelenkkopf des Metacarpus und Metatarsus durch einen complicirten Muskelapparat abermals ginglymisch und nicht wie die übrigen Finger auf den Köpfen ihrer Träger (Metac. und Metatars.) arthrodisch bewegt werden. Die combinirten Muskelapparate, welche im Hallux wie Pollex sich an die erste Phalanx inseriren, springen nämlich in beiden übereinstimmend über das Os metacarpi und Os metatarsi zurück und bewegen mit der Phalanx zugleich diese Glieder in ihren sattelförmigen Articulationen am Carpus und Tarsus. Dieser Muskelapparat besteht in beiden aus mehreren, jedoch mehr oder weniger verschmolzenen Muskeleinheiten, die aus der ganzen Vola und Planta von den Köpfen des Metacarpus an bis zur ersten Carpusreihe sich sammeln und nach der Volarfläche der ersten Phalanx convergiren. – Sie werden bekanntlich zerfällt in 1) Portio adducens, welche sich vom Metacarpus und Metatarsus und der 2ten Reihe des Carpus und Tarsus sammelt. Bekanntlich zerfällt diese Portion beim Fusse in die beiden Unterabtheilungen des Adductor longus und transversalis, während man die in der Hand gewöhnlich nur bis zum Metatars. medii reichende querlaufende Portion (transversalis) mit der schief vom Os capitatum herablaufenden Portion (Adductor long.) zusammen als Adductor bezeichnet. 2) Portio flexoria in beiden Fällen an die beiden Sesambeine sich festsetzend, in beiden Fällen ein kleiner Musculus biceps, dessen einer Kopf mit der Portio adducens verwachsend an das eine Sesambein, während der andere Kopf mit der Portio abducens verwachsen an das andere Sesambein sich festsetzt. 3) Ein Portio abducens, welche im Fuss einen Musculus biventer darstellt, dessen flechsige Mitte am cuneiforme befestigt ist, während der zweite Bauch bis zur Ferse reicht. In der Hand reicht die Befestigung des Abducens ans Ligament. carp. volar. – Sodann breitet sich auf dem Rücken der ersten Phalanx bei beiden die Sehne eines besonderen Extensor brevis aus, der beim Daumen über das Handgelenk zum Vorderarm zurückspringt, beim Fusse aber von

dem Fussrücken herkommt. — Es ist leicht einzusehen, dass bisherher in dem Muskelapparat beider, auch in der Wirkungsweise desselben kein wesentlicher Unterschied stattfindet, dagegen bleibt, wenn man die beiden Phalangen des Daumen und grossen Zehen exarticulirt, am Os metacarpi pollicis noch ein besonderer Musc. opponens pollicis und der Abductor pollicis bicornis übrig, welche auch dann noch nach Entfernung der Phalangen einer Extensio abductoria und einer Flexio opposita, unabhängig von allen Handbewegungen, zu Stande bringen können, während am Fusse der Opponens völlig fehlt und der Bicornis durch den Tibialis anticus ersetzt wird, mit andern Worten jede selbstständige, von der Bewegung des Fusses im Fussgelenke unabhängige Bewegung des Os metatarsi hallucis fehlt.

Vergleicht man nun, nachdem wir gesehen haben, dass keineswegs nur ein verschiedenes Maass einer gleichartigen Bewegungsweise, sondern vollkommen verschieden geartete Gelenk- und Muskel-Mechanismen, den Unterschied zwischen



nau wie im Menschenfusse geartet sind, wie bei dem Menschen giebt der *Flexor hallucis longus* Sehnenzipfel an die anderen Zehen. – Die Abweichungen sind lediglich Verschiedenheiten in den relativen Maassentwicklungen der einzelnen, die Extremitäten combinirenden Momente, oder kleinere formelle Abweichungen der einzelnen Factoren, welche ebenfalls keine wesentliche Unterschiede, sondern kleine Variationen eines identischen Organisationstypus darstellen.

Da bei dem von mir untersuchten Chimpanseé, dessen Grösse mit dem von Vrolik beschriebenen (*Recherches d'anatomie comparée sur le Chimpanseé*, Amsterdam 1841) ungefähr übereinstimmt, der Muskelverhalt der Fusssohle nicht völlig mit den Vrolik'schen Angaben zusammentrifft, so will ich die abweichenden Muskelconstructionen etwas genauer angeben.

In der Fusssohle besitzen alle 4 Zehen deutliche Lumbricalen und starke Sehnen eines *Flexor perforans*; mit Ausnahme des kleinen Zehen, sind auch die übrigen mit *Flexores perforati* versehen. – Die Art und Weise aber, wie diese Zehenmuskeln sich bilden, gestaltet sich wie folgt.

Der *Flexor digitorum brevis* entspringt an der Ferse, zwischen dem Hallux und Kleinzeheballen wie gewöhnlich, liefert aber nur *Primus*- und *Medius*flechsen, welche hier als *Flexores perforati* regelmässig verlaufen. – Der *Flexor digitorum longus* hat keine rückwärts laufende *Caro quadrata Sylvii*, dagegen entspringen an ihm Muskelbäuche, welche nach den 4 Zehen hin verlaufen und zwar 2, welche an *Primus* und *Minimus* als *Lumbricales* verlaufen und 2 andere, welche an *Medius* und *Tertius* als *Flexores perforati* verlaufen, indem die zum *Medius* laufende Portion vollkommen mit der Portion verschmilzt, welche der *Medius* vom *Flexor digitorum brevis* erhalten hat. – Die Fortsetzung der vom Unterschenkel herabsteigenden Flechse spaltet sich in 2 Portionen, welche im *Primus* und *Minimus* als *Flexores perforantes* verlaufen. Die Portion der kleinen Zehe ist noch durch einen kleinen Muskelbauch ausgezeichnet, welcher gleichsam den nicht losgetrennten *Perforatus* darstellt.

Der *Flexor hallucis longus* liefert endlich, ausser dem

starken Flechsenstrahl für den Hallux, zwei starke als Flexores perforantes verlaufende Strahlen für Medius und Tertius und 8 Lumbricalmuskeln, von welchen der äusserste mit dem Lumbricalis, welchen der Minimus von dem Flexor digitorum com. long. empfängt, zusammenschmilzt, während die beiden andern an Tertius und Medius vertaufen.

In der Hand bemerke ich, abweichend von Vrolik, keinen abgesonderten Extensor pollicis brevis, der durch die Aponeurosen des Extensor pollicis longus und abductorius (bicornis) ersetzt wird. Sodann gehen die Muskelbäuche des Extensor digitorum communis so weit am Vorderarm herab, dass der Bauch des Ext. indicis proprius mit dessen Ulnarende vollkommen verschmolzen ist.

Wenn die Zehen des Affenfusses in ihrem relativen Grössenverhältniss weniger den Zehen des Menschenfusses als den Fingern der Hand entsprechen, so ist dies unwesentlich, da der Mechanismus derselben genau dem des Menschenfusses entspricht. Wenn die Bewegung des Hallux am Affenfusse allerdings weiter entwickelt ist, als bei dem Menschenfusse, so ist an der verkümmerten Bewegung des Menschenhallux zum sehr grossen Theile die Fussbekleidung Schuld, was der Kin-

nimmt; indessen genügt schon das Gesagte, um zu beweisen, dass sowohl die vorderen als die hinteren sogenannten Hände der Affen diese Benennung nicht verdienen“, welchem gegenüber ich meine Betrachtung gerade dahin resumire, dass aus dem Mechanismus der Extremitäten, zwischen Menschen und höheren Affen, ein specifischer Organisationsunterschied nicht abgeleitet werden kann; dieser Unterschied also in andern Theilen aufgesucht werden muss. — Da der Affenarm eine wahre Hand und das Affenbein einen wahren Fuss trägt, so würde, wenn heut am Tage ein Mensch mit dem Affenfusse des Chimpanzé gefunden werden könnte, dieser Mensch an seiner physiologischen Menschheit durchaus keinen Abbruch erleiden.

Vielmehr ist zum Schlusse noch darauf aufmerksam zu machen, dass in dem wesentlichen Mechanismus des Menschenfusses, selbst wenn die Affenform desselben (Grösse der Zehen, starke Entwicklung der Halluxabduction) noch so sehr zurückgetreten ist, doch immer noch die Adaption zum Kletterwerkzeug (welche in ihrer einseitigen Entwicklung den Affenfuss charakterisirt) deutlich neben der Adaption desselben zum Gehwerkzeug erkennbar und nachweisbar ist ¹⁾.

1) In Beziehung auf die Leistungsfähigkeit des Menschenfusses will ich hier beiläufig auf eine Thatsache aufmerksam machen, welche mir ein Officier, der über 20 Jahre in Java, Sumatra, Bali, Borneo etc. im niederländischen Dienste zubrachte, mitgetheilt hat.

Wenn im Felde den eingebornen barfüssigen Bataillonen der Sold (in lauter grober holländischer Kupfermünze), aus Mangel an Zahlstücken, auf dem Erdboden ausgezahlt wird, so ist es sehr gewöhnlich, dass die Soldaten mit der grössten Gewandtheit die ihnen zugewiesene Portion mit den Füssen vom Boden aufnehmen. — Es ist dies aber so wenig eine ungewöhnliche Fertigkeit Einzelner, dass sie vielmehr bei jedem Javanen ohne Weiteres vorausgesetzt wird, und die Zahlmeister diese barfüssigen Soldaten auf den Zahlplätzen auf das Strengste überwachen müssen, um ihr Geld vor der grossen Gewandtheit, mit welcher die — Javanenfüsse Geld escamotiren — zu schützen.

Dass Neger, Malaien etc. nicht wie unsere Kinder mit angedrückten Knien, sondern wie die Affen mit abducirten Schenkeln und aufgesetzter Planta klettern, ist allen, welche in den Tropen gelebt, bekannt.

Zum Klettern ist der Fuss des Chimpanse besonders adaptirt durch die bedeutende Grössenentwicklung der Zehen, welche das Umgreifen eines Objekts möglich macht, wobei es gerade sehr förderlich ist, dass mit dem Aufsetzen in Dorsalbewegung des Fusses, implicite die Finger gespreizt, und mit der Streckbewegung (Plantarrichtung) ebenso implicite der Hallux kräftig adducirt wird, wobei es ferner förderlich ist, dass der den Menschenfuss zum Sohlengang adaptirende *Musculus quadratus plantae* (Sylvii) fehlt. Ferner ist es beim Klettern wesentlich, dass während der Befestigung des Fusses am Object durch kräftige Contraction aller über das Fussgelenk springenden Muskeln die Rotations- und Ginglymusbewegungen des Kniegelenks, ohne die das Object haltenden Muskelkräfte zu stören, völlig frei der abwechselnden Wirkung der äussern und innern Kniebenger und des *Popliteus* überlassen bleiben.

Ich habe schon an einem andern Orte darauf aufmerksam gemacht, wie man leicht nachweisen kann, dass der Menschenfuss schon beim gewöhnlichen Gehen und noch weit mehr bei dem Laufen und Gehen auf unebener Grundfläche eine Greifbewegung mit den Zehen macht, d. h. die Zehen abducirt aufsetzt, und sodann

täten mit Nothwendigkeit hervorgeht, so wie umgekehrt grade die Fortbewegung des Menschen auf nur 2 Stützgliedern die Nöthigung enthält, besonders bei beschleunigter Gangart die Streckung im Fussgelenke und die derselben immanente Flexio adducens der Zehen zu machen, während der Fuss mit dem Boden noch in Berührung.

Dieser Bewegungsmechanismus des Menschen- und Affenfusses ist aber begreiflicherweise der schnellen Fortbewegung ebenso ungünstig, wie er die Sicherheit der langsameren Fortbewegung auf unebenem Boden fördert, wie er die kletternde Fortbewegung erst ermöglicht. Daher erklärt es sich, wie alle Völker selbst auf den niedrigsten Entwicklungsstufen das Bedürfniss empfinden, sich eine steife Sohle unter den Fuss zu binden, welche die störende Wirkung dieser Greifbewegung beim beschleunigten Gange theilweise aufhebt, – was bei Klettervölkern (wenn solche Praxis denkbar wäre) natürlich nicht der Fall sein würde.

Ebenso ist dieser Nachklang der Adaption des Menschenfusses zum Kletterwerkzeug und die Unmöglichkeit, mit nur 2 Stützgliedern ein ächter Zehengänger oder Springer zu sein, unter die Ursachen zu zählen, dass andauerndes Laufen so sehr dem Menschenbeine inadäquat ist, dass niemals eine Lebenspraxis sich hat ausbilden können, in welcher andauerndes Laufen die Grundlage der Existenz bildete. Dass der Mensch durch gewaltsame Uebung im Stande ist, auch ausgezeichnet schnell laufen zu lernen, so dass er in der Rennbahn mit dem Pferde concurriren kann, widerspricht dem Gesagten nicht im Geringsten.

Der sicher wandelnde, auf unebenem Boden durch Combination der rotatorischen Schenkel-, Knie- und Fussgelenksbewegung das Balanciren des Körpers selbst auf einem Beine ermöglichende, im Nothfall kletternde Menschenfuss hat in dieser weder zum Springen, noch Laufen, noch Klettern sehr weit adaptirten beschränkten Vielseitigkeit bedeutende Vorzüge vor dem Affenfusse, der einseitig so sehr zum Klettern adaptirt ist, dass er sogar an der Adaption zum sichern Wandeln auf glattem Boden einbüsst.

In der Leichtigkeit, die in jedem der 3 Hauptgelenke (im Schenkelgelenk, Kniegelenk und Fussgelenk) mögliche grössere und kleinere Rotation unabhängig von den Stellungen, in welchen diese Gelenke sich gerade befinden, bei fixirter Planta mit einander zu combiniren (beim Balanciren und Klettern in Anwendung), hat die untere Extremität einen Vorzug vor der oberen, welche zwar sehr vollkommen den Radius um die Ulna rotirt, aber bei fixirter Hand die rücklaufende Rotation der Ulna um den Radius, weil in diesem Falle der Humerus mit rotiren muss, nur schwierig und auf Unkosten der Fixation des Ellenbogen- und Schultergelenks ausführen kann.

Beobachtungen aus der Entwicklungsgeschichte der Pteropoden und Heteropoden

von

Dr. A. KROHN.

Briefliche Mittheilung an den Herausgeber.

Ich bin, von Sicilien zurückkehrend, vor fünf Wochen über Paris hier eingetroffen. Den Winter habe ich in Messina zugebracht, also Palermo, wohin ich anfangs zu gehen beabsichtigte, gar nicht berührt. Ich gab diesen Plan auf, weil das Meer bei Messina, nach vorläufiger Exploration, mir hinlänglichen Stoff zur Ergänzung meiner frühern Untersuchungen über die Entwicklung der Pteropoden und Heteropoden darzubieten schien. In wie weit ich diesen Zweck erreicht, das mögen Sie aus den Beobachtungen ersehen, die ich Ihnen beifolgend mittheile.

Cymbuliaden.

Von den drei bei Funchal beobachteten auf *Cymbulia* bezogenen Larven kommen zwei auch bei Messina vor. Die eine ist diejenige, deren Mundhöhle bereits die Anlage der Zunge und der Kiefer enthält, die andere die, deren Flosse mit Chromatophoren versehen ist. Ich glaube nun die sichere Ueberzeugung gewonnen zu haben, dass erstere die Larve der *Cymbulia Peronii*, letztere die der *Tiedemannia neapolitana* ist.

Für die Abkunft der ersterwähnten Larve von *Cymb. Peronii* spricht eben so wohl die röthlich braune Farbe des Mittellappenanhangs bei dem unlängst umgewandelten Thiere, als auch die Zunge, deren Zahnplatten in Form und Disposition fast ganz mit denen der *Cymb. Peronii* übereinstimmen. Als Belege für die Abkunft der zweiten Larve von *Tiedem. neapolit.* brauche ich nur den Mangel der Zunge und der Kiefer, so wie die Anwesenheit von Chromatophoren auf der Flosse, deren Anordnung mit Bestimmtheit auf *Tiedem. neapolit.* hinweist, anzuführen.

Von besonderem Interesse sind die Veränderungen die die *Tiedemannia* bis zu ihrer vollendeten Gestalt erleidet. Unmittelbar nach der Umwandlung ist zwischen ihr und der jungen *Cymbulia*, kein wahrnehmbarer Unterschied in Bezug auf die Gestalt. Während aber die junge *Cymbulia*, ohne wesentliche Veränderungen zu erfahren, heranwächst, verliert die *Tiedemannia* zunächst den Anhang des Mittellappens, entwickelt den künftigen Rüssel, und büsst zuletzt den Mittellappen ein, indem derselbe nach und nach sich verwischt und in der Flosse gleichsam aufgeht.

Bei der unlängst aus der Larve hervorgegangenen *Tiede-*

ab. Auf gleiche Weise gehen, je höher und breiter der hervorwachsende Theil wird, auch die seitlichen Antheile der Einbucht auf ihn über. Es versteht sich, dass hierbei auch die die Einbucht begränzenden Hautfalten mit herübergenommen werden. Hat sich der Endtheil des Rüssels auf diese Weise gebildet, so wächst auch der übrige Theil des Rüssels nach, und es braucht der Endtheil bis zu seiner definitiven Gestalt nur noch in die beiden bekannten rundlichen Seitenlappen sich auszuziehen. Es sind also die beiden mit schwingenden Cilien versehenen Wülste, die man nach den Beschreibungen von Troschel und Gegenbaur an den Aussenrändern der Rüssellappen ausgewachsener Tiedemannien wahrnimmt, nichts anderes als die weiter entwickelten oben gedachten Hautfalten, während die rinnenförmige Vertiefung zwischen den Wülsten, die von beiden Seiten aus zum Munde führt, der ursprünglichen Einbucht entspricht. Es ergibt sich zugleich das morphologisch interessante Resultat einer vollkommenen Uebereinstimmung zwischen den Mundregionen der *Tiedemannia* und *Cymbulia*.

Ueber den Zeitpunkt wann die bleibende Schale sich bildet habe ich noch immer keinen Aufschluss erhalten können. Bei Tiedemannien, die nach der Spannweite der Flosse etwa 7 Millim. maassen, gab sich zwar ihre Anwesenheit an dem ovalen, scharf contourirten Mantel sogleich zu erkennen, aber es gelang nicht sie zu isoliren, so zart und weich ist sie noch zu dieser Zeit. Was die Larvenschale betrifft, so muss sich das erste Rudiment derselben, der Analogie nach, schon während der Embryonalperiode bilden. Wenn Gegenbaur sie bei Larven, die unlängst die Eihülle verlassen hatten, nicht erkannt hat, so mag dies wohl an ihrer ungemeinen Zartheit und Transparenz liegen.

Tiedemannia Scyllae und *T. Charybdis* Trosch. sind sicher nur junge noch nicht völlig ausgebildete Individuen der *Tiedem. neapolit.*

Clioiden.

Die Zahl der von mir beobachteten, zu dieser Abtheil-

theilung gehörenden Larvenformen, beläuft sich auf fünf. Einzelne darunter sind schon theils von Ihnen, theils von Gegenbaur erwähnt.

Bei allen diesen Larven zeichnet sich der vorderste Wimperkranz dadurch aus, dass er durch mehrere, in regelmässigen Abständen auf einander folgende Lücken unterbrochen erscheint. Zwar hat schon Gegenbaur auf dies eigenthümliche Verhalten des vordersten Cilieukranzes aufmerksam gemacht. Es soll aber nach ihm ausnahmsweise nur bei einer der von ihm untersuchten Larvenformen anzutreffen sein. Allein es ergibt sich aus dem Obigem, dass diese Larve, deren ich später besonders erwähnen werde, durchaus keine Ausnahme macht.

Bei allen Larven, nur eine ausgenommen, liess sich in jedem Gliede der Reibmembran oder Radula, zwischen den seitlichen Zahnplatten, noch eine Mittelplatte erkennen. Zwei der Larven sind noch besonders durch die Anwesenheit von Zwischenplatten, wie solche den Heteropoden eigen, ausgezeichnet. Die Radula setzt im Fortschritt der Entwicklung nicht nur immer neue Glieder an, sondern es vermehrt sich nach und nach auch die Zahl der Seitenplattenreihen.

auf zwei bis drei jederseits. Die Mittelplatten sind ansehnliche, dreieckige, mit der Spitze nach hinten stehende Blättchen.

Die beiden bereits von Ihnen wahrgenommenen Gruppen spitzer Zähne neben der Zunge, scheinen allerdings die Anlagen ähnlicher Kiefer, wie sie der *Cho borealis* eigen. Ist man aber übereingekommen, nur den Theil der Mundhöhlenbewaffnung der Clioideen, der dicht vor der Zunge, auf dem Boden der Mundhöhle lagert, als Kiefer zu bezeichnen, so kommt den sogenannten Kiefern der *Cho borealis* gewiss eine andere morphologische Bedeutung zu. Meiner Ansicht nach können sie nur der beiderseitigen Hakenbewaffnung bei Pneumodermoneen entsprechen, mit der sie nach Souleyet (l. c. Pl. 15 bis, fig. 9–11) auch darin übereinstimmen, dass sie in besondern Säcken liegen, aus denen sie zu Zeiten hervorgestreckt werden.

2te Larvenform. Diese ist entschieden eine Pneumodermoneenlarve, ohne Zweifel dieselbe, die Sie im Monatsbericht 1852 beschrieben haben. Auf sie beziehen sich auch wohl grösstentheils die ausführlichen Untersuchungen von Gegenbaur. Hier findet sich vor der Zunge ein doppelter Kiefer, der in Gestalt und Bau vollkommen mit dem Kiefer einer von Troschel und Gegenbaur als *Pneumod. mediterraneum* bezeichneten Species, übereinstimmt. Die bereits von Ihnen gesehenen Mittelplatten der Zunge sind niedrige, bogenförmig gekrümmte Leisten, an deren freien Rändern ich jedoch nicht vier, sondern bloss zwei nach hinten gerichtete Dörnchen oder Zähne unterscheiden konnte.

Bei Larven mit deutlich angelegten aber noch unbeweglichen Flossen, lässt sich bereits das Herz, obwohl in noch schwachen Umrissen, unterscheiden. Später und zwar zu einer Zeit, wo von der künftigen Neben- oder Seitenkieme noch nicht die geringste Andeutung zu sehen, ist es rechterseits, in der Gegend des mittlern Cilienkranzes, nicht mehr zu verkennen.

Ich muss hier anhangsweise einer angeblich neuen, von Gegenbaur aufgestellten Pneumodermoneenart, nämlich der

Pn. ciliatum erwähnen, weil ich dasselbe, trotz seiner bedeutenden Grösse, nicht für ein völlig ausgebildetes Thier ansehen kann. Ich hatte Gelegenheit ein grösseres Exemplar als die von Gegenbaur beobachteten zu untersuchen. Es maass ausgestreckt über 6''' und trug dennoch die unverkennbarsten Merkmale einer Larve an sich. Ausser dem hintern Cilienkranze, den Gegenbaur als allein vorhanden angiebt, besass das Thier noch den mittlern Wimperkranz der Larven. Auch zog sich dieser Kranz, gerade wie nach Gegenbaur bei den letztern, (Pteropod. und Heteropod. Tab. IV, fig 11) um den Aussenrand der noch ganz ebenen, nicht in Blätter gefalteten Nebenkieme herum. Ausser den bereits zahlreichen Seitenplattenreihen (7 jederseits), fanden sich auf der Radula auch Mittelplatten, jede mit drei Zähnen, von denen die seitlichen bedeutend länger als das mittlere. Vor der Zunge ein ähnlicher Kieferapparat wie bei der obenerwähnten Pneumodermonlarve. Trotz der angezeigten Larvenattribute, besass das Thier doch schon vollkommen ausgebildete Zeugungsorgane.

3te Larvenform. Sie ist stets grösser als die sub 2 erwähnte Pneumodermonlarve, stimmt aber mit ihr sowohl

Die beiden nun folgenden Larvenarten, bis zum Verwechseln einander ähnlich, zeichnen sich vor den vorhergehenden nicht nur in Bezug auf den Habitus, sondern auch durch ihre nach einem abweichenden Typus angeordnete Zungenarmatur aus. Die Radula ist nämlich mit Zwischenplatten, denen der Heteropoden ähnlich, versehen. Der Vordertheil des Leibes ist verhältnissmässig breiter und jederseits in einen nach Aussen sehenden, flachen, spitz auslaufenden Lappen ausgezogen. Beide Lappen scheinen keinesweges Fühler zu sein. Der mittlere Wimperkranz ist schmaler als der hintere. Die Haut ist pigmentlos und enthält eine viel grössere Menge kleinerer Drüsenbälge als bei den früher beschriebenen Larven. Der Rüssel ist sehr kurz, die Mundmasse viel ansehnlicher und demnach auch die Zunge stärker ausgebildet. Trotzdem besteht die Radula aus einer geringern Menge von Gliedern, deren Seitenplatten viel länger und breiter sind, und so weit meine Untersuchungen reichen, jederseits auf zwei sich belaufen. Der Fuss wird häufig so tief eingezogen, dass er äusserlich nicht wahrzunehmen, und so zu fehlen scheint. Dasselbe gilt auch für die Flossen, die ich nur bei einer dieser Larven entwickelt antraf. Saugnapfe habe ich bei keiner von beiden gesehen. Bemerkenswerth ist noch, dass der hintere Wimperkranz nicht selten zickzackförmig geschlängelt erscheint. Diese durchaus temporäre Erscheinung beruht auf einer länger andauernden Contraction einzelner Längsmuskelbündel des Leibes, die ihre Insertionspunkte sämmtlich in der Hautdecke, dicht unter dem hintern Cilienkranze haben.


4te Larvenform. Es ist die gleich eingangs erwähnte, schon von Gegenbaur (Tab. V. Fig. 14 u. 15) beschriebene Larve. Der Radula scheinen auffallenderweise die Mittelplatten zu fehlen. Wie bei den Heteropoden sind die Zwischenplatten mittelst einer langen und verhältnissmässig breiten Basis der Reibmembran angewachsen, und endigen mit einer frei in die Mundhöhle vorspringenden Spitze oder Zahn, der beim Hervorstrecken der Zunge sich aufrichtet. Die Nebensäcke der Mundhöhle sah ich zwar stark entwickelt, aber

merkwürdigerweise wurde, übereinstimmend mit Gegenbaur, deren Armatur vermisst.

Ich bin sehr geneigt anzunehmen, dass die von Gegenbaur beschriebenen, noch mit dem Wimpersegel versehenen Pneumodermonlarven (Tab. V. Fig. 16 u. 17), deren auch ich in meiner ersten Mittheilung gedacht, nur frühere Entwicklungsphasen der eben zur Sprache gebrachten Larve sind. Es gründet sich diese Ansicht auf der, allem Anschein nach, ganz übereinstimmenden Beschaffenheit der Radula.

5te Larvenform. Bei dieser sind die Nebensäcke nicht weniger stark ausgebildet, aber auch stets mit Häkchen versehen. Die Mittelplatten der Radula sind sehr niedrige, bogenförmig gekrümmte Leistchen, mit mehreren, äusserst kurzen, stumpfen Zähnen auf dem freien Rande. Die Zwischenplatten ähneln denen der vorigen Art, nur ist die Spitze längs dem einen der beiden Ränder sägeförmig gezähnt.

Ich habe diese Larve in mehreren frühern Entwicklungsstufen, wo sie noch das Segel und die Schale besitzt, beobachtet. Eine dieser frühern Entwicklungsstufen hat auch schon Gegenbaur beschrieben, aber auf *Creseis* bezogen.



Abkunft bereits ganz richtig festgestellt wurde, die andere die Heteropodenlarve mit querverrippter Schale, die ich fälschlich auf *Carinaria* bezog. Ich vermute, dass erstere die Larve der *Pterotr. mutica*, letztere die der *Pterotr. coronata* sei.

Sehr merkwürdig ist die Anwesenheit der Fühler bei den Larven der Pterotracheen, worauf auch schon Gegenbaur aufmerksam gemacht. Er gedenkt der ersten Anlage der Fühler bei sehr jungen, aus den Eiern gezogenen Larven. Bei den ausgebildeten Larven sind sie sehr sichtlich entwickelt. Unmittelbar nach der Metamorphose ist keine Spur mehr von ihnen anzutreffen. Das Weibchen der bei Funchal beobachteten Firoloidesart, dem die Fühler fehlen, besitzt sie als Larve ebenfalls.

Die Gattung *Carinaria*, die man mit Recht als eine Uebergangsform von den Atlantaceen zu den Firoliden betrachtet, zeigt auch im Larvenzustande eine Combination der Charaktere beider Familien. Einerseits nämlich schliesst sie sich durch ihre stärker gewundene Schale und ihr in drei Paar Wimpel ausgezogenes Segel den Atlantalarven, andererseits durch ihre cylindrische Flossenanlage den Larven der Firoliden an.

Völlig ausgebildete Larven der *Carinaria* habe ich nicht beobachtet. Die ältesten, die mir der Zufall zuführte, besaßen eine Schale von etwa $\frac{5}{8}$ Millim. im Durchmesser, mit $2\frac{1}{2}$ Umläufen. Am Velum zeigte sich das obere oder hintere Paar der Wimpel noch nicht ganz entwickelt, während die zwei andern Paare sehr lang und zugleich schmal erschienen. Auffallend war die unverhältnissmässige Länge der beiden, längs der einen Seite mit warzigen Erhabenheiten besetzten Fühler, so wie ihre ruckweise erfolgende, sehr starke Verkürzung. Die Zunge schien noch nicht angelegt. An der durchweg cylindrischen, lebhaft wie ein Elefantenrüssel sich hin und her krümmenden Flossenanlage, liess sich der künftige Saugnapf noch nicht wahrnehmen. Der ganze Nahrungskanal zeigte sich dunkel purpurroth gefärbt.

So weit meine neuesten Beobachtungen über die Ent-

wicklung der Pteropoden und Heteropoden. Von andern niedern Seethieren, die meine Aufmerksamkeit besonders auf sich gezogen, erwähne ich noch schliesslich des *Pilidium* und der *Actinotrocha*. *Pilidium* ist, meiner nunmehrigen, noch fester als früher begründeten Ueberzeugung nach, die Larve oder Amme von *Nemertes*, in der weitern Bedeutung des Wortes. *Actinotrocha* ist ebenfalls eine Larve. Sie wandelt sich in einen Wurm um, der wahrscheinlich zu einer tubicolen Annelide auswächst. Ich werde nicht ermangeln Ihnen das Ausführlichere darüber später mitzuthellen.

Bonn, den 29. Juli 1857.

Ueber die Gewebe des Flusskrebses

Von

DR. ERNST HAECKEL.

(Hierzu Tafel XVIII. XIX.)

I. Die einzelnen Gewebe.

1. Nervengewebe.

Die beiden wesentlichen Elementartheile des Nervensystems, Zellen und Röhren, haben vor andern Wirbellosen beim Flusskrebs schon mehrfach die besondere Aufmerksamkeit der Beobachter auf sich gelenkt, da sie sowohl durch beträchtliche Grösse, als deutliche Ausprägung die Nervenlemente der meisten andern Thiere übertreffen und sehr leicht in die Augen fallen.

Die Nervenzellen oder Ganglien-Kugeln (Fig. 8a, b, c; Fig. 10, 11, 12) stimmen im Allgemeinen mit den sympathischen Ganglienzellen der Wirbelthiere überein, wie schon Helmholtz¹⁾ bemerkt, der sie, ebenso wie Hannover²⁾, sehr genau beschreibt. Trotz mannichfacher Modificationen an den verschiedenen Orten, welche namentlich bei Vergleichung der Zellen im Gehirn, in den Bauchmarksknoten und in den sympathischen Ganglien, auffallen, behalten sie doch überall denselben eigenthümlichen und leicht kenntlichen Zellen-

1) Helmholtz, de fabrica systematis nervosi evertibratorum. Diss. inaug. Berol. 1842.


2) Hannover, Recherches microscopiques sur le système nerveux, Copenhague. 1844.

character bei. Jede von ihnen stellt eine mehr oder weniger rundliche, ansehnliche Blase dar, deren zarte Zellmembran, oft von einer dichten Bindegewebskapsel eingeschlossen, eine trübe, körnige Flüssigkeit enthält, in der ein sehr grosser; mit einem Kernkörperchen versehener Kern schwimmt. Die Grösse der Nervenzellen beträgt in dem Bauchmark im Mittel $0,05 - 0,15^{\text{Mm}}$, in dem sympathischen Geflecht $0,01 - 0,04^{\text{Mm}}$. Viel kleiner sind die meisten im Hirn, welche zum Theil von den Blutzellen an Umfang übertroffen werden. Die grösste Ganglienkugel, die mir begegnete (im ersten Bauchknoten eines grossen Hummers) mass $0,25$ im Durchmesser, ihr Kern $0,05$, ihr Kernkörperchen $0,012^{\text{Mm}}$. Die Form, bei vielen fast ganz kugelig, wird bei andern durch die Anzahl und Verbindungsweise der mit der Zelle zusammenhängenden Fortsätze modificirt, bei den unipolaren birnförmig, bei den bipolaren elliptisch oder spindelförmig verlängert. Bei diesen setzt sich die Bindegewebs-Kapsel direct in das die Fortsätze umhüllende Neurilemm fort. Die Zellenmembran ist zwar äusserst dünn, zart und leicht zerstörbar, namentlich im Gehirn, aber dennoch bei vorsichtiger Präparation meist nachzuweisen, besonders im Sympathicus, wo sie an den mit Fortsätzen versehe-

tröpfchen zeigen. Sie sind in einer zähen, klebrigen, consistenten Flüssigkeit suspendirt, welche eiweissartiger Natur ist, mit Wasser sich nicht mischt, sondern Gerinnsel bildet, und von Alkalien völlig gelöst wird. In gewissen Hirnzellen, in denen auch die Fettkörnchen grösser sind, wird sie durch ein diffuses, gelbbraunliches Pigment leicht tingirt. Ihre Menge ist bei diesen oft so gering, dass sich die Membran kaum vom Kerne abhebt. Der sehr charakteristische Kern der Ganglienzellen stellt immer ein sehr ansehnliches, kugliges Bläschen dar, welches durch seinen wasserhellen Inhalt und die sehr scharf und dunkel, selten selbst doppelt gezeichnete Begrenzungslinie sehr deutlich von dem dunkeln Zelleninhalt sich abhebt, in dem es meist excentrisch suspendirt ist. In den unipolaren Zellen nähert es sich dem dem Fortsatz entgegengesetzten Ende. Seine Grösse beträgt meist den dritten oder vierten Theil, oft auch die Hälfte der Zelle, im Gehirn meist den grössten Theil des Inhalts. Das Kernkörperchen, excentrisch im Kern gelegen, bricht das Licht fast noch stärker als dieser selbst, misst meist 0,002–0,003, selten bis 0,012^{Mm} und scheint selbst wieder ein Bläschen zu sein, da es bisweilen in seinem Centrum noch ein dunkles, innerstes, rundliches Körnchen zeigt (Fig. 11).

Die Nervenröhren oder Nervenprimitivfasern (Fig. 1–12) weichen viel mehr als die Ganglienzellen von den entsprechenden Elementen der Wirbelthiere ab, nähern sich aber noch am meisten den sympathischen Elementen der letztern. Wie bei allen Wirbellosen, so fehlt ihnen auch bei den Decapoden die für die dunkelrandigen, markhaltigen Cerebrospinalfasern der Wirbelthiere charakteristische fettreiche Markscheide und den Inhalt der Nervenprimitivröhre bildet allein eine homogene, eiweissartige, halbflüssige Masse. Zwischen ihr und der einfachen, cylindrischen, oder ein wenig zusammengedrückten Röhrenwand sind von Strecke zu Strecke Kerne eingestreut. Was zunächst an den Nervenröhren des Krebsees sehr auffällt, ist einmal die grosse Deutlichkeit, mit der sich die einzelnen Röhren wegen des sehr reichlich zwischen ihnen entwickelten

Bindegewebes auch in den ganz unverletzten Nerven unterscheiden lassen, und dann die ausserordentlich schwankende, in ihren Extremen ganz aussergewöhnliche Grösse des Durchmessers. Die stärksten Röhren finden sich im Bauchstrang, wo sie die colossale Dicke von $0,1^{\text{Mm}}$ ($\frac{1}{20}'''$) erreichen. Im Schlundring eines grossen Hummers fand ich eine einzelne von $0,144^{\text{Mm}}$ Durchmesser! Die peripherischen Röhren sind verhältnissmässig viel dünner, übrigens sehr verschieden, $0,045-0,015-0,005^{\text{Mm}}$, zuletzt unmessbar fein. Die sympathischen Röhren sind im Allgemeinen die dünnsten, aber unter sich weniger verschieden. Die Wand (Fig. 2, 3, 9a.) der Primitivröhre oder die Nervenprimitivscheide ist an den feinern Cylindern einfach, an den stärkeren doppelt, immer aber scharf und dunkel contourirt, so dass sie sehr deutlich aus dem umhüllenden matten Bindegewebe hervorschimmert. An den stärksten erreicht ihre Dicke $0,002^{\text{Mm}}$ und bricht dann das Licht intensiv mit gelblichem Glanze. Hinsichtlich ihres übrigen, physikalischen und chemischen Verhaltens kommt sie dem elastischen Gewebe der Wirbelthiere am nächsten, reisst wegen ihrer beträchtlichen Festigkeit sehr schwer ein und zieht sich wegen ihrer Elasticität an isolirten und gekrümmten Röhren unter



derung eines leichten Druckes fliesst die dicke, zähe, klebrige Flüssigkeit aus dem offenen Ende der durchschnittenen Röhre hervor und gerinnt unter den mannigfachsten Formen von Tropfen, Fäden, Körnern etc., während die leere Primitivscheide in Falten gelegt zurückbleibt. Besonders schön sieht man dies zuweilen nach Zusatz sehr verdünnter Chromsäure, in welcher der ausfliessende Tropfen (Fig. 6) zwiebelähnlich in concentrischen Schichten erstarrt. Auch nach mehrstündigem Liegen in Krebsblut sieht man den ganzen flüssigen Inhalt in Form heller, klarer, äusserst zart gezeichneter Tropfen oder Kugeln erstarrt, welche bald alle gleichen und dann sehr geringen Durchmesser (Fig. 4), bald verschiedenen und grösseren haben (Fig. 5)¹⁾. Im letztern Falle ist oft ein kleinerer Tropfen, der zuweilen noch einen kleinsten, dritten einschliesst, in einem grösseren enthalten. Uebrigens scheinen alle diese grösseren Tropfen erst secundär, durch Verschmelzung und Zusammenfliessen der primären, kleinen Gerinnungskugeln zu entstehen. Verbunden werden die Kügelchen durch eine sehr spärliche, klare, flüssige Zwischensubstanz. Auf eine etwas verschiedene Weise und viel schneller kommt die Gerinnung bei den zarteren und blasseren Röhren des sympathischen Geflechts zu Stande (Fig. 9). Die Tropfen sind hier immer so gross, dass der Dickendurchmesser jedes einzelnen das ganze Röhrenlumen erfüllt, und da fast alle durch länglich runde oder elliptische (selten kuglige) Form, einander gleichen, so können sie, hintereinander angereiht, ein ziemlich regelmässig varicöses oder rosenkranzförmiges Bild liefern, welches der von Ehrenberg²⁾ gegebenen Abbildung zu Grunde gelegen zu haben scheint. Uebrigens scheint zwar dieser ganze, eigenthümliche Gerinnungsact durch eine Zersetzung des homogenen Röhreninhalts in verschiedene chemische Bestandtheile verursacht zu werden, ist aber keineswegs mit der sogenannten

1) Die Tropfen sind in Fig. 4 und 5 nicht dicht gedrängt genug gezeichnet. In der That stehen sie so nahe bei einander, dass sie sich überall berühren und wie ein feines Netz aussehen.

2) Ehrenberg; Beobachtung einer bisher unerkannten Structur des Seelenorgans. Berlin 1836. tab. VI. Fig. 3—5.

„Nervengerinnung“ an den dunkelrandigen Röhren der Wirbelthiere zu vergleichen, schon einfach aus dem Grunde, weil das der fettreichen Markscheide Analoge hier gänzlich fehlt.

Ganz in derselben Weise, wie die oben beschriebenen vom Flusskrebs, verhalten sich auch die Nervenröhren vom Hummer, von *Pakimerus quadricornis*, *Scyllarus arctus* und *latus*, *Homola Cuvieri* und verschiedenen anderen Brachyuren, welche ich im Herbst 1856 in Nizza zu untersuchen Gelegenheit hatte. Sehr verschieden zeigten sich dagegen die Nerven der auch sonst vielfach abweichenden, interessanten Familie der Cariden, von denen ich mehrere Species von *Palaemon*, *Pasiphaea*, *Pennaeus*, *Nika* etc. untersuchte. Sonderbarer Weise finden sich auch bei diesen zarten Thierchen im Bauchstrang ganz ähnliche colossal dicke Röhren, wie bei *Astacus* etc., nur dass natürlich hier der unverhältnissmässige Durchmesser der einzelnen gegenüber den andern viel zarteren Fasern um so mehr auffallen muss. Die Primitivscheide ist aber hier relativ noch viel dicker, und namentlich stärker lichtbrechend, so dass sie durch ihren gelblichen Glanz sehr in die Augen fällt. Ganz frisch und nur mit Krebsblut behandelt, zeigt auch hier der ganz homogene, wasserklare, flüssige Nerveninhalt nichts Be-


zugespitzter Basis radiär aufsitzend, so dicht wie die Blätter eines dickblättrigen Sedum neben und über einander stehen, und die centrale Axe ganz verhüllen. Die grössten Kugeln übertreffen den Röhrendurchmesser um das 3—6fache, enthalten oft 2—4 Bläschen in einander geschachtelt, zeigen aber trotzdem noch deutlich, wenn auch durch die beträchtliche Ausdehnung sehr verdünnt, den doppelten Contour der ursprünglichen Primitivscheide.

Die übrigen Decapoden-Familien haben mir nie eine derartige Veränderung, wie die Cariden, gezeigt. Wasser wirkt zwar auch bei ihnen sehr rasch zerstörend auf den Nervenröhreninhalt ein, allein in anderer Weise. Die tropfenförmigen Gerinnungen fliessen zuletzt nach längerem Liegen in Wasser zu einer halbfesten, trüben, körnigen Masse zusammen, welche sich von der collabirten, gefalteten und gerunzelten, glanzlos gewordenen Röhrenwand ablöst und wie ein Fibrin- oder Eiweiss-Coagulum in das Wasser heraustritt, ohne sich aber mit diesem sogleich zu mischen (Fig. 7).

Eine ähnliche gerinnungsartige Veränderung oder einen körnigen Niederschlag bringen mit einigen Modifikationen verschiedene andere Reagentien hervor, so namentlich verdünnte Mineralsäuren, von denen Chrom- und Salpetersäure sie überdies gelb färben, Sublimat, Arsenik etc. In concentrirter Essigsäure bleibt der Inhalt ganz klar. Kaustische Alkalien lösen die ganzen Nerven ziemlich rasch auf. Aether und kochender Alkohol machen einen trüben körnigen Niederschlag, aus dem sie nichts ausziehen. Alle diese Reaktionen zeigen, dass in dem halbflüssigen Röhreninhalt weder Fett, noch ein anderes der Markscheide der Wirbelthiere analoges Element sich findet, dass derselbe vielmehr aus einem eiweissartigen Stoff besteht, der wohl mit dem blassen Inhalt der marklosen Wirbelthierfasern identisch ist. Da aber die ganze Inhaltmasse dieser blassen, „grauen“ Nerven-elemente, wohin alle embryonalen Röhren, ein Theil der sympathischen, ferner die des Olfactorius, die Rückenmarksfasern der Cyclostomen und verschiedene andere Wirbelthiernerven gehören, nach dem Vorgange von Purkinje und

Kölliker jetzt ziemlich allgemein dem Axencylinder der markhaltigen Nervenröhren gleichgesetzt wird, so wird gewiss auch der eiweissartige Inhalt der Nervenröhren der Decapoden ein Analogon des Axencylinders sein, welcher ohne Zwischenlagerung einer Markscheide direkt von der Primitivscheide umschlossen wird; und vielleicht werden einmal alle Nerven der Wirbellosen unter diesem Gesichtspunkt aufgefasst werden müssen.

Eine wesentlich modifizierte Anschauungsweise über die Nervenröhren der Decapoden würde sich geltend machen müssen, wenn die allgemeinere Verbreitung eines sehr eigenthümlichen Gebildes nachgewiesen werden sollte, welches bisher nur in einem sehr kleinen Theile ihres Nervensystems gesehen worden ist. Es ist diess das von Remak¹⁾ entdeckte „centrale Faserbündel“, welches nur in den stärksten Bauchstrangsröhren vorkommt, deren Durchmesser $\frac{1}{100}$ übertrifft. „Genau im Centrum ihrer wasserhellen Höhle zeigt sich frisch ein geschlängeltes Bündel überaus zarter Fasern, welches den vierten oder dritten Theil des Röhrendurchmessers einnimmt. Jedes Bündel enthält einige 100 Fasern. Sie sind glatt, parallel, ohne Zweige und Anastomosen, unter




freilich alle Mühe, dasselbe hier zu sehen, vergeblich. Indess darf man doch vielleicht mit Remak annehmen, dass das centrale Faserbündel nur deshalb bei den peripherischen Röhren sich dem Blicke entzog, weil es bei diesen noch verhältnissmässig zarter ist. Ist es doch selbst bei den stärksten Bauchmarkscylindern so äusserst fein und zerstörbar, dass selbst ein so geübter und genauer Beobachter, wie Reichert¹⁾, sich wiederholt vergebliche Mühe gab, desselben ansichtig zu werden, und es endlich für ein Kunstprodukt oder eine Verwechslung mit dem Neurilemm erklärte. Auch ich selbst habe sehr lange beim Flusskrebs das centrale Faserbündel vergeblich gesucht, obwohl ich es schon in Nizza bei *Palaemon*, *Scyllarus* und mehreren Brachyuren sehr schön gesehen hatte.

Auch in den kolossalen Bauchmarksröhren der kleinen Cariden ist es deutlich ausgebildet und verhältnissmässig leicht zu demonstrieren, weil der sehr dünne, durchsichtige Bauchstrang gar keiner Präparation bedarf. Doch kann man es ebenso bei *Astacus fluviatilis* und *marinus* leicht und ganz konstant sehen, wenn man nur bei der Präparation jeden Druck und Zerrung, sowie den Zusatz von anderer Flüssigkeit, als Blut, vermeidet. Verwechslung mit anderen Gebilden ist, wenn man es einmal gesehen hat, kaum möglich, da ein ganz eigenthümlicher, selbst durch Zeichnung²⁾ kaum ganz getreu wieder zu gebender Charakter diese merkwürdigen Elemente vor allen anderen sehr auszeichnet, namentlich vor den viel gröbern und derbern Fibrillen des Neurilemms, an die man zunächst denken könnte. Auch die Zweifel an ihrer wirklich nervösen Natur brauchen kaum widerlegt zu werden, da die mit denselben versehenen Bauchmarksröhren nur

1) Reichert, Jahresbericht in Müller's Arch. 1844 p. 194.

2) Die Abbildung, welche Remak (Müll. Arch. 1844, Tab. XII, Fig. 8) davon giebt, kann, obwohl von einem vortrefflichen Zeichner mit besonderer Sorgfalt ausgeführt, doch nicht den richtigen Begriff von den centralen Fasern geben. Sie sind so äusserst zart, dass nur eine ganz matte Bleistiftzeichnung, kaum aber Kupferdruck ihren sehr eigenthümlichen Habitus wiedergeben kann.

durch ihren Durchmesser von den andern sich unterscheiden. Ausserdem kommen auch ganz allmähliche Uebergänge zwischen diesen und jenen vor, und auch an feinen Röhren glaube ich zuweilen eine Spur eines nur noch zarteren und durchsichtigeren Centralbündels gesehen zu haben. Hinsichtlich seiner Bedeutung möchte ich Remak beistimmen, der dasselbe zusammen mit der umhüllenden gerinnbaren Flüssigkeit (also den Gesammtinhalt auch der dicksten Röhren) dem Axencylinder der Wirbelthiere (bei dem er ebenfalls eine faserige Streifung behauptet) gleichsetzt. Indess ist auch eine andere Deutung desselben möglich, die Leydig¹⁾ andeutet, der die centralen Axenfasern ebenfalls wiederholt sah und auch abbildet. Er erblickt in den kolossalen Röhren (die er auch, aber ohne das Centralbündel, bei Käfern fand) Aequivalente der dunkelrandigen Wirbelthierfasern, scheint also das Centralbündel allein für den Axencylinder, und die umhüllende, gerinnbare Flüssigkeit für das Analogon der Markscheide zu halten. Für Aequivalente der sympathischen Fasern erklärt er die „feinen, granulären Fibrillen“, welche überall in reichlicher Menge zwischen den evident röhrigen, klaren Fasern, in gleicher Richtung mit ihnen verlaufen²⁾.




gegensetzte Meinung haben. Wie bei diesen, so findet man auch bei den Decapoden die mannichfachsten allmäligen Uebergänge zwischen den unzweifelhaften Röhren und den dünnsten, scheinbar soliden Fasern, namentlich an der peripherischen Endausbreitung der ersteren, wo sie nach vielfachen Theilungen und Verzweigungen so blass, unbestimmt und fein werden, dass es geradezu unmöglich ist, sie von den Bindegewebelementen zu trennen. Viel sicherer kann eine solche Scheidung im Bauchstrang geschehen, wo, wie unten (siehe Bindegewebe) gezeigt werden wird, die Bindegewebsnatur zum Theil unzweifelhaft ist. In keinem Falle aber dürfen diese Elementartheile mit dem centralen Faserbündel innerhalb der klaren Röhren auf eine Stufe gestellt werden. Ueber die wahre Bedeutung dieses letztern ist endlich noch eine dritte Ansicht möglich, dass nämlich die einzelnen Fibrillen des centralen Axenbündels die eigentlichen, letzten Formelemente der Nerven seien, wonach also die bisher als solche aufgefaassten Primitivröhren erst wieder gröbere anatomische Einheiten, Complexe von Primitivfasern, sein würden. Bevor wir auf diese Hypothese näher eingehen, ist es nothwendig, erst die eigenthümlichen Verhältnisse zu besprechen, welche die Nervenröhren der Decapoden bei ihrer Ausbreitung im ganzen Körper zeigen.

Der peripherische Verlauf der Nervenröhren und ihre Vertheilung in den Stämmen und Aesten geschieht bei den zehnfüssigen (und vielleicht allen) Crustaceen auf eine so ungewöhnliche und sonderbare Weise, die, soviel ich weiss, aller Analogie bei anderen Thieren entbehrt, dass man sich nur wundern kann über den sonderbaren Zufall, der diese so leicht in die Augen fallenden Verhältnisse bisher den Blicken der vielen Beobachter, die das Nervensystem der Krebse zum Theil so sorgfältig durchmusterten, gänzlich entzog. Keiner von ihnen sagt etwas von einer Theilung der Primitivfasern, und Valentin¹⁾ und Helmholtz

1) Valentin, über den Verlauf und die letzten Enden der Nerven. Nov. act. nat. cur. 1836, Tom. XVIII, p. 210.


versichern ausdrücklich, dass sie einfach und unverästelt zur Peripherie verlaufen und niemals, weder in den einfachen Nerven, noch in den Geflechten, eine Theilung eingehen. Und dennoch zeigt jedes Präparat einer Nervenverzweigung, sowohl an den sympathischen Geflechten, als an jedem von einem Bauchmarksganglion abgehenden peripherischen Stämmchen die schönsten und deutlichsten Gabeltheilungen der einzelnen Fibrillen. Alle Nervenprimitivröhren der Decapoden theilen sich wiederholt während ihrer ganzen peripherischen Ausbreitung, und zwar gehen fast bei jeder Gabelung eines Stämmchens die meisten dasselbe zusammensetzenden Röhren, ebenso wie jenes selbst, in je zwei divergirende Aeste, von gleichem oder verschiedenem Durchmesser, aus einander (Fig. 1, 2, 8, 9). Dadurch, dass diese konstante Verzweigung während des ganzen peripherischen Verlaufs stattfindet, unterscheidet sie sich wesentlich von den bei den Wirbelthieren bisher bekannten Theilungen der Nervenprimitivfasern, welche immer entweder nur in den Centren, oder nur vor der peripherischen Endigung erfolgen, und das einzige einigermaßen analoge Verhältniss bietet das elektrische Organ von *Malapterurus electricus*, dessen sämt-



tionen der Haut, indem sie nicht nur der Träger der Blutgefässe und sensiblen Nervenenden ist, sondern auch, indem die Muskeln an ihr, und nicht unmittelbar am Skelett, sich ansetzen. Da nun die Eindrücke der Aussenwelt, bevor sie zur Empfindung gelangen, durch die dicke harte Schale erst vermittelt werden müssen, jeder Eindruck aber, welcher auch nur einen kleinsten Punkt der ganz unempfindlichen, unnachgiebigen Schale trifft, von einem verhältnissmässig grossen Theil der darunter liegenden Hautoberfläche empfunden wird, so wird es nichts schaden, wenn alle diejenigen Hauttheilchen, die immer gleichzeitig einen auf einen Schalenpunkt gesetzten Eindruck empfinden, auch diese Perception den verschiedenen Aestchen einer und derselben Nervenprimitivröhre mittheilen, wodurch dann im Centrum wieder eine einfache Gefühlsempfindung gesammelt wird. Andererseits ist die Einrichtung der passiven Bewegungsorgane, des Hautskeletts, wie bei allen Gliederthieren, der Art, dass nur die festen Chitizinge oder -cylinder unter einander beweglich artikuliren, die einzelnen kleinsten Theilchen eines jeden starren Ringes aber nicht ohne gleichzeitige Bewegung aller andern ihren Ort ändern können. Bei jeder Bewegung müssen also immer eine grössere Anzahl Muskelbündel gleichzeitig zusammenwirken, und es lässt sich recht gut denken, dass die sämmtlichen Nervenzweige, welche diese nothwendig gleichzeitig thätigen Muskeln versorgen, auch nur von einer einzigen Primitivröhre abstammen. Es würde also weder bei den Muskelactionen noch bei den Gefühlsperceptionen eine allgemeine Verwirrung stattfinden, wie sie beim ersten Blicke auf die weit divergirende Verbreitung verschiedener Aestchen einer und derselben Röhre auf weit entlegene Punkte unausbleiblich scheint eintreten zu müssen.

Eine ganz andere und vielleicht ansprechendere Erklärung der Röhrentheilungen lässt sich geben, wenn man diese mit dem centralen Faserbündel in Verbindung setzt und dabei der dritten, oben nur angedeuteten Ansicht über den Werth des letzteren sich anschliesst. Beide eigenthümliche Formen, sowohl die Verzweigungen der peripherischen Röhren, als


die centralen Faserbündel in den Bauchmarkcylindern, habe ich bei den verschiedensten Decapoden, sowohl Macruren¹⁾ als Brachyuren²⁾, ganz in derselben Weise wiedergefunden. Wenn man nun mit Remak annimmt, dass auch in allen feineren, namentlich auch sämmtlichen peripherischen Röhren, das centrale Faserbündel vorhanden ist und nur wegen seiner ausserordentlichen Zartheit und Zerstörbarkeit sich bisher allen Nachforschungen entzogen hat, so liegt es nahe, die einzelnen Fasern des Axenbündels für die wahren, letzten Formelemente der Nerven, die bisher als solche aufgefassten Primitivröhren aber als gröbere Nerven-scheiden, die ganze Complexe von Primitivfibrillen umhüllen, anzusehen. Eine starke Stütze würde diese Hypothese durch die Vergleichung mit der von Leydig (a. a. O.) beschriebenen „fibrillären Nervensubstanz“ der Wirbellosen, namentlich der Articulaten, erhalten. Die Aehnlichkeit, welche ein vorsichtig und ganz frisch untersuchtes Nervenstämmchen eines Insekts und noch mehr einer Arachnide mit einer einzelnen Röhre sammt Faserbündel eines Decapoden zeigt, ist unverkennbar. Hier wie dort zeigen sich dieselben Bündel äusserst feiner und zerstörbarer, unverzweigter, paralleler Fäserchen (bei den Insekten meist noch feiner und mehr undeutlich körnig, bei den Spinnen deutlicher unterscheidbar).



sober erklären, da die Länder, welche wir ursprünglich als
 Primiviale aufzufassen, nur zum Zwecke einer inneren
 Schöpfung mit zusammenhängender Schöpfung verbunden.
 welche die vordere Primiviale in Länder zusammengefasst
 zur Primiviale einer Zeit einzelner Primiviale über dem
 die zweite Leistung einem welche se, nicht nur der Länder
 sich verweigern, gegen einander selbstständig verbunden
 werden. Länder wird nicht, wie die aufeinander Geisse
 in auch die zusammengefasste Land der Länder in allen
 Leistungen nicht werden, welche in der ersten Verant-
 worte in der zusammengefassten Menge von Primiviale in der
 Primiviale steht. Leistungen der Primiviale wird nur
 nach zusammengefasst, dass eine einzelne verlässliche Lage
 nicht eine keine zusammengefasste Lage, sondern wie se in
 der Primiviale mit einer einzelnen zusammengefassten, und
 einen Länder von einem der Leistung steht, in zwischen
 Vordere auch in der Vordere mit einer einzelnen Ver-
 zusammengefasst, und in einem Länder von einem sich be-
 stehen, nicht nur eine nicht zusammengefasst zusammengefasst
 zusammengefasst. Wie sehr sich auch diese Auffassung
 der Primiviale als Schöpfung eines Länder von vordere
 Primiviale in einer Primiviale zusammengefasst mag, in es nicht
 nur der Primiviale nicht in vordere, dass die Primiviale vordere
 vordere zusammengefasst nicht nur in einer sehr kleinen Teile des
 zusammengefasst in, welches in 1-11 vordere Länder in
 zusammengefasst nicht zusammen in der Primiviale, nicht „in-
 ter, welches, mit vordere in vordere einen zusammengefasst
 Teile zusammen in 1 in der zusammengefasst vordere zusammengefasst
 Länder zusammengefasst, vordere in vordere zusammengefasst
 in, nicht nur in vordere zusammengefasst zusammengefasst in
 und in einem eine zusammengefasst in, zusammengefasst zusammengefasst
 nicht in vordere mit zusammengefasst Länder in vordere ge-
 geben, allein in der der zusammengefasst mit vordere mit der
 se in vordere zusammengefasst in vordere in, wie in
 der vollkommenen zusammengefasst der Länder mit der zusammengefasst
 nicht nur der nicht in vordere, nicht alle zusammengefasst
 zusammengefasst in der nicht in der zusammengefasst in

gehenden Aesten Fig. 1, 2) untersuchen kann, immerhin sehr auffallend bleibt.

Die Verbindung der Ganglienzellen mit den Nervenröhren, von der grössten Wichtigkeit für die Nervenphysiologie, wird beim Flusskrebs von verschiedenen Autoren sehr verschieden angegeben. Valentin und Hannover (l. c.) nahmen nie den Uebergang einer Zelle in eine Primitivfaser wahr. Helmholtz unterscheidet rundliche oder ovale Zellen ohne oder mit Fortsatz, „welcher immer den Nervenfasern sehr ähnlich sei.“ Remak sah feinere Bauchmarksröhren keulig anschwellend in Ganglien kugeln übergehen. Bipolare Zellen werden von keinem erwähnt, obwohl sie im Sympathicus nicht selten sind. Die häufigsten sind jedenfalls die unipolaren, namentlich in den Bauchknoten; die apolaren sind wohl Kunstproducte, wie schon Helmholtz vermuthet. Nur in gewissen Gehirntheilen scheinen sie präformirt zu sein. Eigentliche multipolare, wie sie in den Nervencentren der Wirbelthiere vorkommen, mit mehreren, blassen, verzweigten Fortsätzen fand ich niemals; ebenso auch keine Fortsätze, welche nicht in Nervenröhren übergingen. Sehr selten sah ich im Sympathicus Zellen mit 3-4 Fortsätzen.



der Röhre durch eine eingelagerte elliptische Blase, deren Wände denen der Röhre innig sich anschmiegen, unterbrochen und substituiert sei. Auch an den dreilappigen tripolaren Zellen (Fig. 12) lief der doppelte Röhrencontour ununterbrochen über die eingeschlossene Blasenmembran fort. Dass letztere wirklich als Zellmembran den Ganglieninhalt umschliesse und dass dieser keine hüllenlose Masse sei, zeigte sich oft an zufällig oder absichtlich verletzten Zellen, besonders des Gehirns, wo der feinkörnige Inhalt aus der geborstenen, sehr zarten, aber deutlichen Hülle frei ausfloss. An den unipolaren Bauchmarkszellen konnte ich fast nie die Grenzmembran sehen, wahrscheinlich weil sie bei der hier nothwendigen eingreifenden Präparation immer verletzt wurde. Der körnige Inhalt schien hier allmählig sich, in dem klaren der Röhre zu verlieren.

Eine sowohl mit den Angaben aller erwähnten Autoren, als mit meinen eigenen Beobachtungen in starkem Widerspruch stehende Beschreibung der Nervenzellen des Flusskrebses gab Will (l. c. p. 76 sq.), welcher bei allen Wirbellosen zwei, sowohl im Inhalt des Bläschens als der Struktur des Anhangs ganz verschiedene Arten von Nervenkörperchen gefunden haben will. „Bei der einen Art ist der Zwischenraum zwischen Hülle und innerer Zelle durch eine frisch glashelle Masse erfüllt, die durch Wasser etc. körnig gerinnt. Sie haben immer einen Anhang, der eine einfache, nie in zwei Zweige gespaltene Röhre darstellt. Bei der andern Art liegen in der glashellen Masse viele kleine runde Zellen, in denen kein Kern, wenigstens kein centrischer sichtbar ist, dicht an der äussersten Hülle, oft in so bedeutender Anzahl, dass sie sie ganz auszufüllen scheinen. Beim Zerquetschen treten sie nicht leicht aus, sondern bleiben an der Hülle hängen. Oft hat diese Art mehrere Anhänge, die meist nach einer Seite, zuweilen aber auch nach entgegengesetzter abgehen und längsgestreift sind, besonders an der dicksten Ansatzstelle. Sie sind aus feinen, $\frac{1}{500}$ dicken Fasern zusammengesetzt, verästeln sich und zerfallen schliesslich in feine Fasern etc. etc.“ — Von diesen beiden Arten bezeich-

net die erste allein wirkliche Nervenzellen und zwar die unipolaren der Bauchmarksknoten, obwohl deren Inhalt, wie wir oben zeigten, auch frisch niemals wasserhell, sondern durch Fettkörnchen getrübt ist. Die Beschreibung der andern Art passt so vollkommen und exact auf die unten (beim Fettgewebe) zu beschreibenden Fettzellen, dass Will diese offenbar dabei vor Augen gehabt hat; es ist dies um so sicherer der Fall gewesen, als die bezeichneten Fettzellen die Ganglien, namentlich die vordersten im Thorax und das Gehirn, in dichten Lagen umgeben und bei deren Präparation sich leicht hinzumischen. Sie finden sich ausserdem in den verschiedensten Körpertheilen, namentlich um das Herz. Die angeblichen verzweigten, fibrillären Fortsätze derselben sind gewiss nichts anderes als gewisse Bindegewebsformen gewesen, die oft ganz ähnlich aussehen.


2. Muskelgewebe.

Die Muskeln des Flusskrebses, wie aller Articulaten, zeigen überall eine sehr deutlich ausgesprochene Querstreifung, sowohl die animalen Muskeln des Stammes und der Extremitäten als die Eingeweidemuskeln (am Darm, den Drüsen

kanntlich breitet sich neuerlichst die von Reichert und Holst aufgestellte Ansicht aus, dass das eigentliche Muskelementarorgan die Fibrille ist, welche in ihrer ganzen Länge durch Auswachsen einer einzigen embryonalen Zelle entsteht. Das Primitivbündel oder die Primitivfaser ist danach ein Complex von vielen einzelnen, später innig verschmolzenen Fibrillen oder verlängerten Zellröhrchen, deren jede einzelne einer glatten Muskelfaser oder contractilen Faserzelle äquivalent ist. Das Sarkolemma ist mithin die erste bindegewebige Hülle einer Summe von Primitivfibrillen. Dagegen ist nach der älteren Auffassung von Schwann, die auch Kölliker vertritt, das wahre Muskelement die Primitivfaser oder das Fibrillenbündel, welches durch Verschmelzung vieler rundlicher oder länglicher, in einer einzigen Reihe hinter einander liegender Embryonalzellen entsteht. Die Fibrillen sind danach der differenzierte Inhalt, das Sarkolemma die Summe der Membranen der linear an einander gereihten Zellen. Diese letztere Ansicht wird bei den Decapoden vorzüglich durch die eigenthümliche Struktur der Herzmuskelfasern gestützt.

Das Herz des Flusskrebses zeichnet sich schon für das blosse Auge durch seine opake, gelbliche Farbe und sehr weiche, fast gallertige Consistenz sehr vor den übrigen Muskeln des Körpers aus, welche viel derber, cohärenter, glänzend, vollkommen farblos und durchscheinend, zuweilen leicht bläulich sind. Die Natur seiner Elemente lässt sich, ebenso wie der Verlauf und die Verflechtung derselben, am frischen Herzen wegen seiner grossen Weichheit und des innigen Zusammenhangs der Fasern nur sehr unvollkommen verfolgen. Leicht und in Menge lassen sich aber diese letzteren isoliren, wenn man das Herz in verdünnter Essigsäure gekocht oder ein paar Tage macerirt hat. Jede Muskelfaser, einem Primitivbündel entsprechend, stellt dann einen einfachen cylindrischen Schlauch dar, umhüllt von einer sehr zarten, schwierig zu isolirenden Membran, dessen Inhalt scharf in zwei wesentlich verschiedene Schichten, eine periphere und eine centrale, geschieden ist (Fig. 14). Die äussere ge-

ripherische Zone bildet eine weiche, amorphe, dunkle, durch zahlreiche eingestreute Körnchen getrübte Masse, welche durch eine leicht gelbliche Färbung die Undurchsichtigkeit und Farbe des Herzens bedingt. Der innere centrale Cylinder ist consistenter, klarer, durchsichtiger und bald mehr homogen, bald durch mehr oder weniger breite und deutliche Längsstreifen in Fibrillen abgetheilt, welche bisweilen auch zarte Spuren von Querstreifen erkennen lassen. Obwohl die einzelnen Fasern bezüglich der Längs- und Querstreifung sehr verschieden sind, so lässt sich doch eine continuirliche, durch viele Zwischenformen vermittelte Stufenleiter von den ganz homogenen oder nur leicht streifigen Cylindern bis zu dem ausgesprochen quergestreiften Fibrillenbündel verfolgen. In der Centralaxe jedes Cylinders liegen scharf umschriebene, dunkel gekörnelte Kerne von bald mehr rundlicher, bald mehr elliptischer oder spindelförmig ausgezogener, oder auch mehr unregelmässiger Gestalt. Ihre Gruppierung geschieht sehr mannichfaltig, indem sie bald in regelmässigen weiteren Zwischenräumen (meist dreimal so gross als ihr eigener Durchmesser) von einander abstehen und dem Umfang des Cylinders sich etwas nähern (Fig. 14 B), bald aber so dicht gedrängt an ein-




Kern zwischen je zwei äusseren Einschnürungen der Hülle mitten inne liegt.

Wie sehr diese interessante Muskelfaserform für die Schwann'sche Ansicht spricht, braucht wohl nicht erst gezeigt zu werden. Dass dieselbe aber auch für die sehr verschiedenen Körpermuskeln vollen Werth hat, wird durch einen Theil der Darmmuskeln, sowie durch mehrere kleine Muskelpaare bewiesen, welche den Magen an den Thorax befestigen und in ihrer Struktur ein vollständiges Mittelglied zwischen diesen letzteren und jenen Herzmuskeln bilden. Auch diese Muskeln fallen schon dem blossen Auge durch ihre trübe, leicht gelbliche Farbe auf, wenngleich weniger als das Herz. Durch längeres Verweilen in Wasser, sowie durch Druck zerfällt die gesammte körnige Inhaltsmasse in unregelmässig gestaltete, wachsähnlich gelblich glänzende, homogene Bröckeln von der Dicke der Röhre und oft von noch bedeutenderer Länge. Mit verdünnter Essigsäure behandelt zeigen sie sich ebenfalls aus den eben geschilderten Elementen zusammengesetzt; nur dass diese zum grösseren Theile ihren embryonalen Typus schon mehr verloren haben. Die Querstreifung ist ganz deutlich ausgesprochen und die Längsstreifen lösen sich bei der Präparation oft in wirkliche Fibrillen auf, was beim Herzen nicht leicht geschieht. Während in vielen die varicös eingeschnürte, körnige, peripherische Zone und der centrale Kernstrang noch sehr deutlich sind, tragen andere schon den vollkommen entwickelten Charakter der übrigen, farblosen und klaren Muskeln. Da man hier eine vollständige Stufenleiter von den ganz embryonalen bis zu den höchst entwickelten Formen innerhalb eines und desselben Muskels neben einander hat, so dürfte dadurch mindestens für die Decapoden der Nachweis für die Entstehung des Muskelprimivbündels aus einer Kette linear an einander gereihter Zellen sicher geführt sein. Damit ist jedoch nicht bewiesen, dass nicht bei den Muskeln anderer Thiere eine solche verschmolzene Zellenreihe oder auch eine einzelne verlängerte Zelle nur je einer Fibrille den Ursprung geben könne. Im Gegentheil kann man, wie oben auch für die Nerven, namentlich

die centralen Faserbündel gezeigt wurde, beide Möglichkeiten ganz gut neben einander bestehen lassen.

Auch die feinere Struktur der Körpermuskeln des Krebses an sich bestätigt die eben aus dem Ban der Herzmuskelemente abgeleitete Deutung. Die Primitivfasern dieser glashellen, derben Muskeln isoliren sich ziemlich leicht und zeigen überall deutlich in einem strukturlosen, cylindrischen Schlauch eingeschlossen die quergestreifte Inhaltsmasse und zwischen beiden zerstreute Kerne, sehr analog den Nervenröhren, wesshalb man die Primitivbündel auch passend „Muskelprimitivröhren“ nennen kann. Der Durchmesser derselben ist in den verschiedenen Körpertheilen sehr verschieden; die dünnsten und schmalsten finden sich an den zugleich weniger ausgeprägten, anastomosirenden, vegetativen Muskeln des Darms etc.

Die Wand der Röhre oder die „Muskelprimitivscheide“, das „Sarkolemma“ der Autoren zum Theil¹⁾, ist ein vollkommen homogener, glasheller, durchsichtiger Cylinder, eben so dünn und einfach, als fest und elastisch. In Essigsäure und verdünnten Alkalien unlöslich, nähert er sich dem elastischen Gewebe, bekundet sich als die Summe der



fernt sich dadurch zugleich entschieden vom Bindegewebe. Im Ganzen schwerer als bei Wirbelthieren zu demonstrieren, erscheint er ziemlich leicht durch gewaltsame Zerrung eines Muskels, wobei der contractile Inhalt zerreisst und sich nach beiden Enden zurückzieht, zwischen denen der einfache Contour der Scheide sichtbar bleibt. Die Kerne (Reste oder Abkömmlinge der embryonalen Zellenkerne) liegen stets an der Innenseite der Scheide, zwischen ihr und dem Inhalt, treten oft mit letzterem aus ersterer hervor, und scheinen zuweilen selbst ganz im Innern der contractilen Masse zerstreut zu sein, so namentlich an den oben erwähnten weniger ausgebildeten Darm- und Magenmuskeln. Durch diese Lage gleichen sie den äquivalenten Kernen der Nervenröhren und entfernen sich von den übrigens ganz ähnlichen Kernen der umgebenden Bindesubstanz (Fig. 13 b, f). Bisweilen zeigen sie hübsche Theilungen in 2 oder 4 kleinere, noch dicht beisammen liegende Kerne (Fig. 13 d).

Die contractile, quergestreifte Masse, der differenzirte Zelleninhalt, oder das sogenannte Fibrillenbündel, hat durch die ausnehmende Grösse und Deutlichkeit seiner constituirenden Primitivpartikelchen, die bedeutender als bei den meisten Wirbelthieren ist, beim Flusskrebs schon mehrfaches Interesse erregt, und Will¹⁾ hat darüber nach sehr ausführlichen Untersuchungen eine umfangreiche Abhandlung geliefert. Er kommt zu dem Resultat, dass die Fibrillen nicht perlschnurartige Reihen präformirter Kügelchen sind, die durch Zwischensubstanz an einander hängen, sondern vielmehr ganz gleichmässig dicke Fäden, durch deren Contraction die Querstreifen entstehen, und zwar nicht dadurch, dass sich die Fibrille stellenweis verdickt und in einen variösen Faden verwandelt, sondern dadurch, dass die gerade Form der Fibrille in eine geschlängelte, wellenförmig fortlaufende übergeht. Auch Reichert²⁾ glaubt, dass durch

1) Will, Einige Worte über die Entstehung der Querstreifen der Muskeln. Müll. Arch. 1843 p. 353.

2) Reichert, Jahresbericht in Müll. Arch. 1844 p. 186.

Will's Beobachtungen eine wellenförmige Zickzackbiegung der Fibrillen bei der Contraction sicher bewiesen sei, und fügt nur hinzu, dass diese Thatsache eine gleichzeitige stellenweise Verdickung der Primitivbündel bei der Contraction nicht negire, dass vielmehr Will's eigene Behauptung für eine solche spreche, nämlich: „dass, wenn bei der Contraction der Muskelbündel eine immer grössere Anzahl breiter Querstreifen sich in schmalere verwandelt, die Bündel selbst überall da um $\frac{1}{4}$ ihres Durchmessers sich verbreitern, wo schmalere Streifen entstehen.“ Nur hinsichtlich dieser letztern Behauptung, sowie in dem Punkte, dass die Fibrillen ganz gleichmässig dicke, nicht varicöse Fäden seien, muss ich Will beistimmen. Dagegen konnte ich von einer zickzackförmigen Wellenbiegung bei der Contraction nichts wahrnehmen und muss überhaupt das Streben, aus dieser die Querstreifung abzuleiten, für verfehlt halten. Die zahlreichen und sehr verschiedenartigen Bilder, welche ich bei vielfacher Behandlung der verschiedensten Muskeln sowohl von höheren, als niederen Decapoden erhielt, haben mich vielmehr zu der alten, neuerlichst auch von Leydig (Lehrb. p.44) unterstützten Ansicht von Bowman zurückgeführt, dass die Querstreifung

weis aus den Röhren hervortreiben. Da also an den ganz frischen, nicht mit Wasser in Berührung gebrachten Fasern die Darstellung der Fibrillen eben so schwierig ist, als die der Scheiben, und die letzteren eben so sicher auf die eine, als erstere auf die andere Art sich darstellen lassen, so ist es wohl am natürlichsten, nach Bowman die aus beiden schliesslich hervorgehenden „primitive particles“ oder Fleischtheilchen als die natürlichen Muskelemente aufzufassen, die durch regelmässige Aneinanderlagerung in Länge und Breite die Querstreifung bedingen. Weiterhin muss man dann auch annehmen, dass dieselben durch zwei verschiedene Bindemassen vereinigt werden, in der Art, dass die eine, spärlichere Kittsubstanz, die in Wasser und Alkohol löslich, in verdünnter Salzsäure unlöslich ist, die Seitenflächen der Fleischtheilchen der Quere des Bündels nach verklebt und bei der Scheibenbildung erhalten bleibt, während die andere Verbindungsmasse, in verdünnter Salzsäure leicht, in Alkohol nicht, in Wasser erst nach langer Maceration löslich, die Grundflächen der Particles in der Längsrichtung der Faser an einander löthet und beim Zerfall derselben in Fibrillen die ersteren zusammenhält. Diese letztere Substanz, das Längsbindemittel, übertrifft die erstere, die man als Querbindemittel unterscheiden kann, bedeutend an Umfang, der indess einen sehr variablen Werth hat, was wohl hauptsächlich durch ihr ausgezeichnetes Imbibitionsvermögen bedingt ist. Während sie nämlich an der frischen Muskehröhre so dünn ist, dass sie nur als einfacher Contour zwischen den Discs erscheint, und so die einfache Querstreifung bedingt¹⁾, so quillt sie nach längerem Liegen in Wasser oder sehr verdünnter Essigsäure beträchtlich auf, endlich so stark, dass sie Zwischenscheiben, fast von der Dicke der echten Discs, bildet²⁾. In diesem höchsten Grade der Imbibition wird die

1) So an den noch vom Sarkolemm umschlossenen Fasern auf der rechten Seite in Fig. 13.

2) So an den aufgeweichten, zerfallenden, von dem Sarkolemm entblösten Bündeln auf der linken Seite in Fig. 13.


Primitivröhre einer Voltaschen Säule, mit der sie so oft verglichen wurde, erst recht ähnlich, indem sie dann nämlich ganz aus zweierlei verschiedenen, abwechselnd geschichteten Platten zusammengesetzt erscheint, wie diess auch schon aus vielen Abbildungen ¹⁾ bekannt ist. Ganz ähnliche Bilder giebt auch oft der nicht gequollene, aber völlig erschlaffte und erstorbene, sowie der (künstlich oder natürlich) stark ausgedehnte Muskel. Von demselben Bilde sucht auch Will mit Nothwendigkeit die Zickzackbiegung abzuleiten, indem er die „dunkeln Querbänder für Erhöhungen, die hellen für Vertiefungen“ erklärt. Er zeigt, dass von den drei möglichen Arten, auf die sich eine solide Faser verkürzen könne, nämlich a) durch gleichmässige Verdickung in der ganzen Länge mit gleichzeitiger Verkürzung, b) durch Bildung von Varicositäten, c) durch Zickzackbiegung — nur die letztere das obige Bild erklären könne. Dabei geht er aber von der irrigen Voraussetzung aus, dass die Muskelfaser solid und homogen sei. Da diess nicht der Fall ist, so kann nur die erste von ihm angeführte Möglichkeit (unter a) alle wirklich vorkommenden Bilder erklären. Dasselbe Bild von zweierlei verschiedenen, mit einander abwechselnden Scheiben hat wohl

scharfe und sehr dichtgedrängte Längsstreifung zeigen (als Andeutung der beginnenden Auflösung des Querbindemittels und des Zerfalls in Fibrillen), von der an den Scheiben der ganz homogenen Längsbindemasse nichts zu sehen ist. Auch erreicht die Dicke (Höhe) der letzteren, die übrigens sehr variabel ist, nur selten diejenige der echten Fleischscheiben, welche von 0,002 Mm. zu dem ausserordentlichen Durchmesser von 0,010 Mm. beim Flusskrebs steigen kann (Fig. 13 links). Für die Richtigkeit dieser Anschauung von der Verbindung der primitive particles spricht auch noch ein anderer Umstand, der zuweilen in hohen Graden der Aufquellung eintritt. Wenn sich dann nämlich der Zusammenhang der Fibrillen in Folge der Auflösung des Querbindemittels lockert, so können sich die Fibrillen innerhalb des Primitivbündels der Länge nach an einander so verschieben, dass Fleischtheilchen, die ein und derselben Scheibe angehörten, auf verschiedene Höhe zu stehen kommen und mit Längsbindemasse der nächsthöheren oder nächstniedereren Scheibe in Berührung treten¹⁾. Wird endlich nach sehr lange dauernder Wassereinwirkung auch die ganz gequollene Längsbindemasse der isolirten Fibrillen gelöst, so findet man nur noch die freien Sarcous elements in der Flüssigkeit zerstreut. Diese stellen dann im Zustande grösster Ausdehnung (bis zu 0,0124 Mm. Länge!) sehr blasse, homogene Stäbchen dar, die bald mehr gleichmässig ausgedehnt, cubisch erscheinen, bald mehr in die Länge ausgezogen, als cylindrische Säulchen oder noch öfter (was wahrscheinlich ihre ursprüngliche Form ist) als sechsseitige Prismen. Das Verhalten derselben bei der Contraction des Muskels kann man sich dann gemäss der eben geschilderten Zusammenfügung in der Weise erklären, dass alle Partikelchen gleichzeitig kürzer und dicker werden, und dass die, wahrscheinlich elastische, Längsbindemasse, dieser Bewegung folgend, zugleich breiter und niedriger wird.

Das feine, verzweigte, canaliculäre „Lückensystem“,

1) So in den mittleren Fasern der linken Gruppe in Fig. 13.

welches nach Leydig ¹⁾ die fibrilläre Inhaltsmasse des Primitivbündels in ganz analoger, aber nur viel zarterer Weise durchsetzt, wie das Bindegewebe von dem Netzwerk der vielfach communicirenden Bindegewebskörperchen durchbrochen ist, sieht man beim Krebs auch an ganz frischen Muskeln sehr deutlich. Betrachtet man die Primitivbündel von der Oberfläche, so erscheinen die Lücken als sehr feine und dünne, spindelförmige, selten seitlich sternförmig mit Ausläufern versehene Hohlräume, deren spitze Endausläufer sich zwischen den Fibrillen verlieren. Auf dem künstlichen und noch viel besser auf dem natürlichen Querschnitt zeigen sie sich als einfach rundliche oder ringsum in mehrere feine Spitzen ausgezogene Figuren zwischen den Durchschnitten kleiner Fibrillengruppen, welche früher für die Querschnitte der Fibrillen selbst galten. Niemals aber sah ich „Kernrudimente in den Knotenpunkten“ ²⁾. Die Kerne innerhalb der Primitivbündel liegen vielmehr fast immer der Innenseite der Primitivscheide genau an. Abgesehen von dem Fehlen der Kerne, sehen die interfibrillären Lücken zwar echten Bindegewebskörperchen oft sehr ähnlich, und wahrscheinlich ist auch ihre physiologische Bedeutung als saftführender Kanäle



schen Fibrillengruppen oder, wie Kölliker¹⁾ sie nennt: „interstitielle Substanz“. Die Körnchenreihen, welche letzterer bei Wirbelthieren zwischen den Fibrillen fand, sah ich beim Krebs nicht.

3. Bindegewebe.

Das Bindegewebe bietet bei den Decapoden so eigenthümliche und von den bekannten der Wirbelthiere so abweichende Struktur- und Formverhältnisse dar, dass es sehr zu bedauern ist, dass dasselbe bisher über alle Gebühr vernachlässigt wurde. Nicht nur kennt man den Zusammenhang der einzelnen auffallend verschiedenen Formen desselben noch gar nicht, sondern auch diese selbst sind zum Theil kaum einmal erwähnt worden. Den ersteren auszumitteln und einen einheitlichen Gesichtspunkt über die gesammte Formation zu gewinnen, ist mir leider trotz aller Bemühungen nicht gelungen²⁾. Ich muss mich daher damit begnügen, die einzelnen Formen zu beschreiben und wo möglich zu vergleichen. Wenn man nach der jetzt allgemein gültigen Auffassung die Bindesubstanzen als „Gewebe mit Intercellularsubstanz und eingesprengten zelligen Elementen“ charakterisirt, so muss man beim Flusskrebs und in gleicher Weise allen anderen Decapoden³⁾ vor allen 2 Hauptgruppen unterscheiden, deren jede wieder in 2 Unterabtheilungen geschieden werden kann, nämlich: A. Bindesubstanzen mit weit vorwiegender Grundsubstanz: a) gewöhnliches Bindegewebe, b) gallertiges Bindegewebe. B. Bindesubstanzen mit weit überwiegender Zellen: c) Zellgewebe. d) Fettgewebe.

1) Kölliker, einige Bemerkungen über den Bau der Muskeln. Zeitschr. f. wiss. Zool. 1856.

2) Embryonen, die allein diese, wie so manche andere, dunkle, histologische Verhältnisse aufklären können, standen mir leider nicht zu Gebote, da meine Untersuchungen in die Monate October bis April fielen.

3) Brachyuren und wenigstens die meisten Macruren. Die Cariden habe ich leider hierauf nicht untersuchen können.

a) Das gewöhnliche Bindegewebe.


Es entspricht noch am ersten dem bei den Wirbelthieren unter diesem Namen überall vorkommenden, indem es aus einer formlosen oder verschieden differenzirten Grundmasse und zahlreichen, überall in bestimmten Abständen in derselben liegenden geformten Elementen besteht. Die letzteren sind aber nicht, wie die Bindegewebakörperchen der Wirbelthiere, Zellen, sondern Kerne. Dieses „gewöhnliche“ Bindegewebe steht dem „Zellgewebe“ der Decapoden nicht nur durch seine Struktur, sondern auch durch seine Bedeutung und Function und demgemäss auch durch seine Verbreitung im Körper und sein Verhältniss zu den anderen Geweben schroff gegenüber. Während das Zellgewebe, überall da angehäuft, wo ein lebhafter Stoffwechsel stattfindet, bei diesem in hohem Grade betheiligt erscheint, hat das gewöhnliche Bindegewebe zu diesem letztern keine weitere Beziehung, als zu seiner eignen Ernährung nöthig ist. Seine Hauptfunction scheint vielmehr einmal darin zu bestehen, ganze, für physikalische Zwecke bestimmte Apparate für sich allein zusammenzusetzen, und sodann, die zelligen oder metamorphosirten Elemente der übrigen Gewebe zu umhüllen und unter

zer Organe und die verkittende Zwischenmasse der verschiedensten Theile im ganzen Körper.

Die Kerne des gewöhnlichen Bindegewebes bieten an allen diesen verschiedenen Orten keine charakteristischen Verschiedenheiten dar, wie denn überhaupt die Kerne der meisten Gewebselemente des Flusskrebses auffallend wenig verschieden sind. Wesentliche Eigenthümlichkeiten besitzen nur die grossen, wasserklaren Kernblasen der Nervenzellen mit ihrem dunkeln Nucleolus (Fig. 10—12) und die kleineren, aber ebenfalls hellen, oft jedes Körnchens entbehrenden Kernbläschen, der Blutzellen (Fig. 16—17). Die mehr kugligen oder elliptischen, meist biconvexen Kerne des Zell- und Fettgewebes (Fig. 20 und 24), sowie die unregelmässig gewölbten der Chitinogenzellen (Fig. 22 und 23) sind kaum, endlich die Kerne der Muskelfasern (Fig. 13 d) und Nervenröhren (Fig. 2, 3 c) gar nicht von denen des gewöhnlichen Bindegewebes verschieden. Diese letzteren selbst (Fig. 2 e, 13 b, f, 18 a, 20 c) sind im Mittel 0,005—0,015 Mm. breit, 0,02—0,03 Mm. lang, und zeichnen sich wesentlich durch ihre Abflachung aus, indem sie stets eine dünne, platte, selten leicht convexe oder concave Scheibe darstellen. Der Rand ist stets sehr scharf umschrieben; oft sieht er aus wie von einer perlschnurförmigen Reihe von Höckerchen ringsum eingefasst und dadurch aufgewulstet. Die Fläche hat ein mattes, durch zahlreiche kleine, dunkle Körnchen getrübbtes Aussehen, von denen gewöhnlich keines als Nucleolus durch besondere Grösse ausgezeichnet ist.

Die Form der Scheibe ist sehr mannichfach, im Allgemeinen länglich rund oder elliptisch, zuweilen kreisrund (namentlich in der Cutis), häufig bipolar verlängert und dann selbst spindelförmig oder endlich stabförmig lineal (so namentlich in den Sehnen, Fig. 13). Im letztern Falle werden sie echten Bindegewebskörperchen der Wirbelthiere oft sehr ähnlich. Indess muss ich ausdrücklich hervorheben, dass es mir trotz aller Mühe niemals gelungen ist, eine Zellmembran oder auch nur einen kleinen Hohlraum um den unzweifel-

haften Kern sichtbar zu machen ¹⁾. Alle die verschiedenen Mittel, durch die man bei Wirbelthieren so leicht die Zellennatur der Bindegewebskörperchen nachweist, leisten hier beim Flusskrebs gar nichts, was um so auffallender ist, als die ausnehmende Grösse und der scharfe Contour der Kerne ein Uebersehen einer etwaigen Hülle kaum als möglich erscheinen lässt. Auch von sternförmigen verästelten Ausläufern und communicirenden Kanälchen, durch welche die echten Bindegewebskörperchen ein plasmatisches Gefässsystem herstellen, ist gar nichts zu sehen. Es bleibt daher vorläufig nichts übrig, als abzuwarten, bis die Entwicklungsgeschichte das Verbleiben der ursprünglichen Zellen des Bindegewebes aufgeklärt haben wird. Eine Beobachtung an der Adventitia der Arterien scheint mir darauf hinzudeuten, dass für die Decapoden nicht die allgemein bei Wirbelthieren angenommene Virchow-Donders'sche Theorie, sondern vielmehr die Reichert'sche Gültigkeit hat, wonach die Grundsubstanz des Bindegewebes sich aus rundlichen oder länglichen Zellen entwickelt, die mit der von ihnen anfänglich ausgeschiedenen Intercellularsubstanz später in eine einzige Masse verschmelzen. An jungen Thieren von *Astacus* nämlich und noch deutlicher von *Palimurus* sah



nen Theilen ihres Umfangs berührten und stellenweis fast das Ansehen eines zusammenhängenden Gefässepithels entstand.


Die internucleare Grundsubstanz des gewöhnlichen Bindegewebes differenzirt sich an den verschiedenen Orten sehr verschieden und variirt dann bedeutend in Dichtigkeit und Gestaltung. Namentlich zeigen sich bezüglich der letztern die vollkommensten Uebergangsstufen von ganz homogenen zu fibrillär gestreiften Massen. Am einfachsten erscheint sie in der Cutis, d. h. in der sehr dünnen „basement membrane“, welche die Chitinogenzellen der äussern Haut sowohl als der Darmhaut trägt. Hier bildet sie eine weiche, trübe, feinkörnige, amorphe Masse. Etwas fester, aber noch vollkommen homogen erscheint sie an der membrana propria der Drüsen und ihrer Ausführungsgänge. Im Sarkolemma und Perimysium finden sich alle Uebergänge vom Homogenen zum deutlich Streifigen; ebenso in den allgemeinen Hüllen der Organe, z. B. der des Darmrohrs. Im Neurilemma nehmen die Streifen auch schon einen ganz regelmässigen Verlauf, parallel dem der Primitivröhren, an (siehe: Nervensystem) und werden hier von Einigen für wirkliche Fasern, selbst für Remak'sche Nervenfibrillen gehalten. Hier ist schon zum Theil, noch mehr aber an der Adventitia gewisser Arterien, der Verlauf der Streifen so geschwungen-lockig, wie er für die Wirbelthiere charakteristisch ist. An manchen weicheren Sehnen ist dieser sehr schön ausgesprochen, obwohl Reichert¹⁾, der zuerst das gewöhnliche Bindegewebe des Flusskrebses sehr genau beschrieb, ihn bei diesem vermisste. Endlich geht die deutliche dunkle Längsstreifung bei gewissen Sehnen in ausgesprochene Spaltbarkeit über. Bedeutend vermehrt wird diese noch durch eine eigenthümliche Verdichtung (Chitinisirung?) der organischen Substanz derselben²⁾ und eine gleichzeitige Infiltration mit Kalksalzen. An einigen Orten geht dann die Spaltbar-

1) Reichert: Vergleichende Beobachtungen über das Bindegewebe. Dorpat 1845 p. 51.

2) Ueber die angeblich chitinisirten Sehnen siehe unten: Sehnen- und Chitinogengewebe.

keit so weit, dass man daraus auf eine Zusammensetzung der scheinbaren „Bindegewebsbündel“ aus „Fibrillen“ schliessen könnte.

Diese kurze Uebersicht, welche durch eine ausführlichere Schilderung der Grundsубstanz an den verschiedenen Orten leicht vervollständigt werden könnte, möge genügen, um zu zeigen, dass eine Reihe continuirlicher Uebergänge von der ganz homogenen oder leicht körnigen durch die zartstreifige zur deutlich spaltbaren Substanz existirt. Diese Stufenleiter, bei Wirbelthieren schwer herzustellen, lässt sich beim Flusskrebs mit verhältnissmässiger Leichtigkeit verfolgen, wesshalb ihn auch Reichert in seiner classischen, eben citirten Schrift benutzt hat, um die Praeexistenz von Fibrillen in den Bindegewebsbündeln zu widerlegen und zu zeigen, dass das faserige Ansehen der Grundsубstanz nur durch verschiedene Faltungen, Runzelungen etc. hervorgebracht sei. In der That lässt sich auch aus andern Gründen dieser Beweis beim Flusskrebs leicht führen. So kann man z. B. an der sehr zarten, durchsichtigen Bindegewebslamelle, welche für sich allein die Kiemenvenen und den Vorhof (Fig. 18) bildet und die oft sehr ausgesprochene fibrilläre Streifung zeigt, durch passenden Druck



sieht, welche zwischen den chitinogenen Epidermiszellen zerstreut sind. Der grösste Theil der Pigmentmassen ist in dem amorphen, körnigen Bindegewebe der Cutis abgelagert. Einzelne Zellen finden sich aber auch im Neurilemm, Perimysium, den Arterienhäuten, selbst mitten im Zellgewebe, eingesprengt. Sonderbarer Weise ist das Pigment meist in weitverzweigte, sternförmige Zellen eingeschlossen, welche sehr entwickelten Bindegewebskörperchen ähnlich und auch wohl aequivalent sind, während man doch diese sonst vergeblich sucht. Ausser den unzweifelhaften vielverästelten Zellen, wo das Pigment innerhalb einer deutlichen Membran um einen hellen rundlichen Kern zusammengehäuft ist, findet man oft auch farbige Körnerhaufen, ähnlich um einen Kern gruppiert, ohne dass sich eine Membran nachweisen liesse. Endlich finden sich überall, theils ganz vereinzelt, theils in kleine Häufchen gesammelt, kleinere und grössere freie Körner. So scheinbar frei findet sich namentlich der blaue Farbstoff, der nach Focillon und Leydig aus blauen, in Kali leicht löslichen, säulchenförmigen Krystallen besteht, während der rothe und gelbe, entweder fein körnig oder mehr einem gefärbten Oele ähnlich, in Kali unlöslich, meist in Zellen eingeschlossen ist.

b. Das gallertige Bindegewebe.

Das sogenannte „Gallertgewebe“ oder „Schleimgewebe“ (Virchow), welches bei den Wirbelthierembryonen eine so grosse Rolle spielt, auch bei verschiedenen Wirbellosen (Qualen, Mollusken etc.) sehr verbreitet scheint, und aus einem fächerigen Maschenwerk sternförmiger anastomosirender Bindegewebszellen besteht, in dessen Maschenräume eine strukturlose Gallerte abgelagert ist, wird von Leydig ¹⁾ auch für den Flusskrebs angegeben. „In der unter der Schale liegenden weichen Haut sieht man ein grosses Maschengewebe, dessen Gerüst in den Knotenpunkten schöne, grosse Kerne besitzt und in den sehr verschieden grossen Hohlräumen eine helle

1) Leydig, Mäll. Arch. 1855 p. 378 u. 398. Vergl. auch Lehrbuch d. Histol. p. 24, 114 und die Abbildung Fig. 57.

Gallerte einschliesst.“ Ferner soll das Neurilemm „da und dort nach aussen in das gleiche, gallertige Bindegewebe“ übergehen. Indess gehört dasselbe an diesem letztern Orte entschieden zum Zellgewebe, und ist es mir überhaupt schliesslich sehr zweifelhaft geworden, ob eine Verwechslung mit diesem letztern nicht auch sonst stattfand, und ob wirkliches gallertiges Bindegewebe bei den Decapoden existirt und nicht vielmehr durch das Zellgewebe ersetzt wird, wie sogleich gezeigt werden soll.

c. Das Zellgewebe.

Das Bindegewebe, welches vorwiegend aus grossen, hellen „Bindesubstanzzellen“ besteht, die nur sehr geringe, halbweiche Zwischensubstanz zwischen sich lassen, scheint im ganzen Reiche der Wirbellosen eine weite Verbreitung und hohe Bedeutung zu haben, und verdient jedenfalls weit mehr Berücksichtigung und eine gründlichere Untersuchung, als ihm bisher zu Theil wurde. Am häufigsten noch erwähnt wird es aus dem Kreise der Mollusken, insbesondere der Classe der Cephalophoren, wo es von Leydig¹⁾, Gegenbaur²⁾, Claparède, Semper³⁾ u. A. beschrieben worden ist. Ganz be-

krebs wird das in Rede stehende Gewebe, das man der Kürze halber wohl am besten mit „Zellgewebe“ bezeichnet (welchen Namen es wenigstens besser als das gewöhnliche Bindegewebe verdient), kaum erwähnt. Nur Will¹⁾ gedenkt desselben kurz und Hannover²⁾ beschreibt es ausführlicher als eine besondere Hülle des nervösen Bauchmarks. Indess ist diese Beziehung zum Centralnervensystem keineswegs vorhanden. Es erscheint vielmehr hier, wie im ganzen Körper, nur als Begleiter der Blutgefässe, und zwar bildet es namentlich um die mittleren Arterien (doch nicht an allen Orten) eine sehr dicke, die aus gewöhnlichem Bindegewebe bestehende Adventitia einhüllende Schicht (Fig. 19, 20 e). Ausser dieser unverkennbaren Beziehung zu den Blutgefässen scheint es ausserdem noch an den Körperteilen, wo ein besonders lebhafter Stoffwechsel stattfindet, namentlich rings um den ganzen Darmkanal, unter der dünnen Cutisschicht etc. angehäuft zu sein. Nirgends aber tritt es als Constituens von physikalischen Apparaten, oder als bloss verkittende und umhüllende Zwischensubstanz auf, wie das gewöhnliche Bindegewebe. Vielmehr ergibt sich schon aus dem Vorkommen an den erwähnten Localitäten, dass dasselbe eine viel höhere Bedeutung haben muss und insbesondere chemische Functionen zu vertreten scheint. In dieser Beziehung könnte man das Zellgewebe der Crustaceen einerseits mit dem Fettkörper der Insecten, andererseits mit den Lymphgefässen der Wirbelthiere und Cephalopoden (?) vergleichen. In Betreff des ersteren ist auf die morphologischen Aehnlichkeiten schon aufmerksam gemacht, welche noch dadurch vermehrt werden, dass ebenfalls oft Fett auch in die Zellen des Zellgewebes, zuweilen bis zur völligen Ausfüllung, abgelagert wird. Hinsichtlich der Analogie mit den Lymphgefässen scheint mir vor allen die eigenthümliche Lagerung des Zellgewebes um die Gefässe sehr wichtig, in-

gefüllten Blasen zusammengesetzt aus.“ Ferner p. 346 Schlussbemerkung. Dagegen wird an a. O., namentlich p. 341, das Fett als in den Zwischenräumen eines maschigen Balkenwerks liegend geschildert.


1) Will l. c. Müll. Arch. 1844 p. 76.

2) Hannover, Recherches sur le système nerveux p. 67 Fig. 76 a.

dem bei Fischen und Amphibien allgemein die Lymphgefässe, bloss aus einer einfachen Bindegewebsmembran bestehend, die Arterien scheidenartig umgeben ¹⁾, und ein ähnliches, höchst merkwürdiges Verhalten von Leydig auch bei den Cephalopoden ²⁾ entdeckt worden ist.


Ebendahin dürften auch wohl die rings um den Darm angehäuften, schön gefärbten „Fetttröpfen“ niederer Crustaceen zu setzen sein. In wie weit diese auf morphologische Analogien basirte Vergleichung des Zellgewebes mit dem Fettkörper und den Lymphgefässen sich auch physiologisch bestätigen wird, muss eine spätere, gründliche chemische Untersuchung dieser bisher mit grossem Unrecht ganz vernachlässigten „Bindestanzzellen“ lehren.

Die Zellen selbst (Fig. 19, 20 e, 21) machen sich zunächst durch ihre beträchtliche Grösse bemerkbar, welche für den Durchmesser ungefähr 0,04–0,08 Mm. beträgt. Ihre Form ist wegen der ausserordentlichen Klarheit und Durchsichtigkeit meist sehr schwer genau zu erkennen, da immer mehrere sich gegenseitig deckende und in einander greifende Lagen zugleich zur Anschauung kommen, so dass man die einzelnen kaum sondern kann. Im Allgemeinen kugelig oder rundlich,



dem Kern keine geformten Bestandtheile. Nur selten umgiebt ein kleiner Haufen zarter körniger Substanz, gleich dem körnigen Protoplasma vieler Pflanzenzellen, den Kern wie ein Wölkchen (Fig. 20 g). Oefter dagegen, und sehr häufig bei jungen Thieren, erblickt man in jeder Zelle einen Fetttropfen, der bald kaum den Umfang des Kernes erreicht, bald die Zelle so vollkommen ausfüllt, dass für den ersteren kaum Raum übrig bleibt. Aus dem hellen Inhalt hebt sich der Kern (Fig. 20 f) sehr scharf hervor. Er stellt meist ein reguläres Segment einer Kugel oder eines Ellipsoids dar, indem sein einer Pol scharf abgeschnitten eine flache kreisförmige Scheibe bildet, die sehr von der übrigen Kugelfläche absticht (Fig. 21) und als die Theilungsfläche, die von der Theilung des Mutterkernes zurückblieb, anzusehen ist. Oft findet man die genau gegenüberliegenden Kerne zweier Nachbarzellen noch mit diesen Flächen einander zugekehrt, zuweilen noch in einer Mutterzelle beisammen, und endlich sind auch in der Abschnürung begriffene Kerne, sowie solche mit 2 Theilungsflächen, an beiden Polen, nicht selten (Fig. 20). Die Lage der Kerne, deren matter Inhalt durch viele feine Körnchen dunkel punktirt aussieht, ist immer genau wandständig, nie im Innern der Zelle, und sie ist es, die in Verbindung mit der grossen Durchsichtigkeit und der gegenseitigen Aneinanderlagerung der Zellen eine Verwechslung des Zellgewebes mit Gallertgewebe so leicht möglich macht. Da sich nämlich die einzelnen rundlichen Zellen nur sehr locker berühren, bleiben überall Zwischenräume zwischen ihnen übrig, die mit einer ebenso hellen, aber wie es scheint dichteren, zähen, weichen Bindemasse ausgefüllt sind. Diese Interzellularräume nun haben meistens eine deutliche Sternform, indem sie sich zuspitzende Ausläufer zwischen je zwei sich berührenden Zellen bis zum Berührungspunkt hineinschicken und indem diese Ausläufer, die schon an sich grossen, echten „Bindegewebskörperchen“ nicht unähnlich sind, unter einander in Verbindung treten, bilden sie ein dem lacunalen Lückensystem der letzteren sehr ähnliches System von zusammenhängenden Interzellularräumen (Fig. 20). Die vollkommen wandständige Lage der Kerne verführt

sehr leicht zu der Täuschung, als ob dieselben nicht innerhalb der Zellen, sondern in den Zwischenräumen liegen, und man glaubt dann um so sicherer, echtes gallertiges Bindegewebe vor sich zu haben. Doch ist es mir gerade wegen dieser leichten Möglichkeit einer Verwechslung sehr wahrscheinlich geworden, dass letzteres gar nicht bei den Decapoden existirt. Allerdings werden an manchen Orten (in der Cutis, in der mit Fettgewebe gemischten Lage um das Hirn und Herz, sowie um die Arteria sternalis im Sternalkanal etc.) die Zellen sehr klein und zartwandig, und der Kern ist sehr schwer innerhalb derselben zu sehen, da eine weiche, trübe, körnige Masse (Fig. 24 e) rings um sie ergossen ist. Auch scheint der gallertige Inhalt hier nach dem Zerreißen der Membran frei in Tropfenform austreten zu können. Aber dennoch habe ich mich fast immer durch anhaltende Betrachtung und verschiedenartige Behandlung eines Objects, das mir eher Gallert- als Zellgewebe zu sein schien, überzeugen können, dass letzteres allein vorhanden und dass die Kerne nicht in den sternförmigen Interzellularräumen, die den Zellen des Gallertgewebes so sehr ähnlich sind, liegen ¹⁾. Besonders nützlich ist hiebei die Application des Glycerins und der Chromsäure. Während die



diess, die einzelnen Zellen zu isoliren, was wegen der grossen Zähigkeit, mit der die dichte Intercellularsubstanz die Zellen unter einander verkittet, am frischen Gewebe fast nicht möglich ist.

d. Das Fettgewebe.

Es schliesst sich dem vorigen sowohl hinsichtlich seines Vorkommens, als seiner Bildung an, indem es mit ihm gemischt, und durch allmälige Uebergänge scheinbar zusammenhängend, unter der Cutis, um das Herz und Gehirn etc. sich findet. Nur um die beiden letztern Organe bildet es Schichten von einiger Mächtigkeit; sonst ist es in kleineren Gruppen im Körper zerstreut. Es besteht aus kugelförmigen, seltener länglich verzogenen Zellen (Fig. 24), welche in einer weichen, körnigen, trüben Intercellularsubstanz, sich eben nur locker berührend, ruhen. Die letztere ist vielleicht selbst eine weiche, homogene Form des gewöhnlichen Bindegewebes (Fig. 24 e), indem man stets freie Kerne darin findet, die freilich auch zufällig bei der Präparation hineingelangt sein können. Der Kern (Fig. 24 b) der Fettzelle ist meist eine linsenförmige, biconvexe Scheibe, immer wandständig und wie die Membran der Zelle (Fig. 24 a) leicht zu unterscheiden, viel leichter als bei Wirbelthieren. Auch besitzt das Fett immer einen viel schwächeren, matten Glanz und desshalb auch nicht die breiten, schwarzen Contouren, wie bei letzteren. Das Fett füllt immer die Zelle in Form von Tropfen fast ganz aus, und zwar bildet es entweder nur einen einzigen, sehr grossen Tropfen (Fig. 24 c) oder einen grösseren und viele kleinere (Fig. 24 d) oder endlich nur sehr viele (10 – 50 – 100) ganz kleine, diese aber immer unter einander von gleicher Grösse. Die einzelnen Tropfen scheinen durch eine eiweissartige Substanz getrennt und am Zusammenfliessen gehindert zu werden. Der Kern zeichnet sich unter ihnen durch dunklern Contour und granulirten Grund aus. Ohne Zweifel sind diess die Zellen, die Will (s. o.) als zweite Species der Ganglienkugeln beschrieben hat. Durch Aether und kochenden Alkohol werden die Fette, besonders leicht nach vorherigem Kalizusatz,

extrahirt und die leere Zellenmembran bleibt mit dem Kern zurück. —

Werfen wir schliesslich noch einen vergleichenden Rückblick auf die beschriebenen Bindegewebsformen, so können wir sie aus Mangel an Kenntniss ihrer Entstehung nicht unter einen gemeinsamen Gesichtspunkt bringen. Das Zellgewebe steht dem gewöhnlichen Bindegewebe nicht bloss wegen der sehr überwiegenden Grösse und Ausbildung der Zellen des erstern, sondern vielmehr dadurch, dass bei letzterm überhaupt keine Zellen nachzuweisen sind, schroff gegenüber. Die Pigmentzellen in letzterem, die aber auch sonst überall zerstreut sind, stehen ebenfalls isolirt da. Dagegen ist ein Zusammenhang zwischen dem Fett- und Zellgewebe nicht zu verkennen. Die grössten Formen des ersteren, wo ein grosser Fetttropfen die ganze Zelle erfüllt, sind von denen des letzteren, wo oft dasselbe der Fall ist, nicht zu unterscheiden, dagegen entfernen sich vom Zellgewebe mehr die kleineren Formen des Fettgewebes.

4. Blutgewebe.

Das Blut ist weder vom Flusskrebs, noch von anderen




sigkeit dar, die in sehr kurzer Zeit gerinnt. Die Gerinnung scheint erst durch die Einwirkung der Luft zu Stande zu kommen. Wenigstens fand ich das Blut in spontan gestorbenen Krebsen, die in den verschiedensten Zeiträumen nach dem Tode geöffnet wurden, selbst noch nach 48 Stunden, vollkommen flüssig. Auch gerinnt ein einzelner Tropfen schon innerhalb einer Minute, während eine grössere Menge, vor Luftzutritt geschützt, langsamer coagulirt wird. Die Gerinnsel sind übrigens sehr dicht und fest. Z. B. verkleben sie zwei an einander liegende Glasplättchen so innig, dass schon nach kurzer Zeit eine Trennung ohne Zertrümmerung des einen derselben sehr schwer ist. Ein Serum scheidet das geronnene Plasma nicht ab; erst durch Druck lässt sich eine geringe Menge gewinnen. Sehr auffallend ist dieser grosse Fibrin- (oder Fibrinogen-?) Reichthum gegenüber der geringen Menge desselben bei Cephalophoren. Die blassröthliche Färbung des Krebsblutes haftet, wie bei allen Wirbellosen, an der flüssigen Inter-cellularsubstanz. Nach längerem Verweilen an der Luft wurde sie oft dunkler ¹⁾. —

Die Blutzellen der Decapoden (Fig. 16d, 17) kommen im Allgemeinen, sowohl hinsichtlich ihrer relativen Zahl innerhalb der Blutflüssigkeit, als ihrer Struktur, als endlich ihrer besonderen vitalen Eigenschaften mit den farblosen Blutkörperchen der Wirbelthiere überein. Jede Blutzelle wird von einer klaren, sehr elastischen Membran umschlossen, welche wegen ihrer ausnehmenden Zartheit oft nur mit Mühe sich erkennen lässt. In der von ihr umschlossenen farblosen, hellen Zellenflüssigkeit schwebt mitten inne ein sehr klarer und durchsichtiger, aber scharf umschriebener, rundlicher oder elliptischer Kern von 0,008 – 0,012 Mm. Breite, 0,010 – 0,024 Mm. Länge. Selten enthält er im Innern ein oder einige Körnchen. Dagegen ist er rings umgeben und oft ganz verdeckt von einer Anzahl (meist

1) Einen sehr eigenthümlichen Farbenwechsel des Plasma sah ich an 2 Exemplaren von *Homola Cuvieri*, wo das beim Austritt aus dem lebenden Thiere ganz farblose Blut innerhalb 8–10 Stunden allmählig grau und zuletzt intensiv schwarz wurde. Auch das hellbläuliche Blut eines Hummers war nach mehreren Stunden dunkler violett.

50–80) kleiner, runder, cc. 0,002–0,003 Mm. grosser Körnchen, die nach ihrem dunkeln Glanze Fett zu sein scheinen¹⁾. Sie verleihen den Blutzellen ihr vorzügliches Lichtbrechungsvermögen, vermöge dessen man sie leicht bei Untersuchung der verschiedensten Gewebe herauskennt. Sehr selten findet man zwei Kerne in einer Zelle. Die allgemeine Grösse und Form der Blutzellen lässt sich nicht bestimmen, da sie innerhalb des circulirenden Blutes in beständiger Veränderung begriffen sind und in ewigem Wechsel die unendlich mannichfaltigen, sogen. „proteusartigen oder amöbenähnlichen“ Bewegungen und Formveränderungen zeigen, welche von den Rhizopoden schon lange bekannt sind und von Lieberkühn²⁾ bei den amöbenförmigen Körperchen an den verschiedensten Orten, in den Psorospermien-Cysten der Fische etc., wieder gefunden wurden. Letzterer hat dieselben auch an den farblosen Blutkörperchen der Wirbelthiere als allgemein verbreitete Erscheinung nachgewiesen, und die von Leydig³⁾ bei den verschiedensten Wirbellosen beobachteten, höchst mannichfaltigen Formen verästelter Blutzellen sind ganz gewiss ebenfalls auf diese amöbenartigen Veränderungen zu beziehen. Dass dieselben nicht durch äussere künstliche Einflüsse, ins-



halb der Gefässe von Wirbelthieren. Es ist daher wohl nicht zu zweifeln, dass sie eine wirklich vitale Erscheinung, durch Contractilität der Zellen selbst, und zwar wahrscheinlich des Inhalts derselben, bewirkt, darstellen, welche mit den andern Bewegungsacten thierischer Zellen, namentlich mit denen der Amphibienchromatophoren und mit den von Kölliker ¹⁾ an Bindegewebszellen entdeckten, auf einer Stufe steht. Die sehr veränderliche und vielleicht in stetem Wechsel begriffene, gegenseitige Lagerung der den Kern umgebenden (Fett?) Körnchen scheint auf eine beständige Veränderung in der Anordnung der Moleküle hinzudeuten, welche die jene umhüllende, homogene, klare Zellenflüssigkeit zusammensetzen. Diese Strömungen, die vielleicht durch den Stoffwechsel, durch den Austausch der in der Intercellularflüssigkeit und der in den Zellen selbst enthaltenen Lösungen luftförmiger oder fester Stoffe, insbesondere durch die respiratorische Gasdiffusion hervorgerufen werden, bedingen vermuthlich diese auf den ersten Blick so auffallenden Contractionsphänomene. Eine Uebersicht der wichtigeren und gewöhnlicheren dabei vorkommenden Formen giebt Fig. 17. Die Zellen, welche man in einem unmittelbar aus dem lebenden Thier entnommenen Blutstropfen findet, haben meist eine möglichst schmale und lange Form, entsprechend dem engern Durchmesser der Capillaren (Fig. 16), durch den sie sich hindurchwinden müssen. Die Körnchen verdecken dann meist den centralen Kern vollständig, während die beiden lang ausgezogenen und an der Spitze in ein dünnes Knöpfchen angeschwollenen Enden der spindel- oder sichelförmigen Zelle (Fig. 17 a–d) davon frei bleiben und nur sehr zarte Umrisse zeigen. Ausserhalb der Gefässe verändert sich diese verlängerte Form sehr rasch, indem sich die Zelle in ein mehr rundliches Körperchen zusammenzieht und nun nach verschiedenen Seiten mehrere (meist 3–5, selten bis 12) sehr zarte und homogene, aber deutliche Fortsätze aussendet, die sich zuweilen

1) Kölliker, Gazette hebdom. de médec. et de chirurgie, 1856, No. 45. Bewegungserscheinungen an den Saftzellen im Mantel einer Ascidie, im gallertigen Bindegewebe einer Qualle, und des Kopfes vom Zitterrochen.

noch verästeln. Die sehr verschiebbaren Körnchen ziehen sich dann meist vom Kern zurück und lassen ihn frei liegen (e—h). Die Zahl und Form der ausgestreckten Fortsätze wechselt nun beständig, bis die Gerinnung eintritt. Dann erstarren die Zellen entweder in dieser Sternform, oder sie passen ihre Gestalt dem Raume des einschliessenden Gefässes an (Fig. 16), oder, was das Häufigste ist, sie ziehen sich zu einer Kugel zusammen (Fig. 17 c), in der der dichte Körnchenhaufe den Kern wieder völlig verhüllt.

5. Chitinogengewebe.

Unter der Bezeichnung des Chitinogengewebes ¹⁾ fasse ich das Ueberzugsgewebe zusammen, welches als continuirlich zusammenhängende Decke die gesammte innere und äussere Oberfläche des Körpers der Crustaceen (und wahrscheinlich in gleicher Weise aller Articulaten) überzieht. Hinsichtlich seiner Function und Verbreitung im Körper entspricht es vollständig dem Epithelial- oder Horngewebe der Wirbelthiere, von dem es sich dagegen histologisch bedeutend unterscheidet. Wie dieses letztere, setzt es sich nicht nur unmittelbar von der äussern Haut an den Aufnahms- und Auswurfsöff-

erst nöthig, die Struktur desselben an den einzelnen, bisher aus einander gehaltenen Theilen zu verfolgen und nach einander zu betrachten: A. die äussere Hautbedeckung, B. die Auskleidung des Darmkanals, C. das Drüsengewebe.

A. Die äussere Hautbedeckung.

Die äussere Körperbedeckung zerfällt beim Krebs, wie bei allen Gliederthieren, in zwei scharf geschiedene Schichten, welche von fast allen Autoren erwähnt, obwohl fast immer falsch gedeutet werden. Die äussere, gewöhnlich mit der Epidermis der Wirbelthiere verglichene Hautlage ist gefäss- und nervenlos und besteht aus echtem Chitin, welches bei den Crustaceen noch überdiess meist mit einer beträchtlichen Menge kohlensauren und phosphorsauren Kalks infiltrirt ist. Die innere, weiche, meist beträchtlich dünnere Hautschicht ist der alleinige Träger der Blutgefässe und Nerven, wesshalb sie von den meisten Autoren der Cutis der Wirbelthiere parallelisirt wird. Dass dieser Vergleich nur theilweise richtig ist, wird sich aus der Betrachtung der einzelnen Lagen ergeben.

a) Die äussere Lage.

Die äussere oder oberflächliche Schicht (Fig. 22, 23 c) der äusseren Crustaceen-Decke hat bisher vorzugsweise oder fast allein die Aufmerksamkeit der Autoren auf sich gezogen, während die ungleich wichtigere innere Schicht fast ganz vernachlässigt wurde. Sie verdankt diesen ungebührlichen Vorzug vor der letztern einmal ihrer viel bedeutenderen Massenentwicklung und dann ihrer grossen Resistenz gegen mechanische und chemische Einflüsse, da das Chitin bekanntlich von verdünnten Mineralsäuren eben so wenig, als selbst von kochenden Alkalien angegriffen wird, und überdiess durch die Kalkinfiltration noch bedeutend an Festigkeit gewinnt. Da nun dieser feste Chitinpanzer an den macerirten und getrockneten Krustern, wie sie unsere Museen füllen, allein das Hautskelett zu bilden scheint und die gesammte Körperform allein repräsentirt, wurde er auch von den älteren Untersuchern der

Crustaceenhaut allein berücksichtigt, wodurch vorzüglich die falsche Auffassung desselben als eines der Epidermis analogen Horngebildes bedingt wurde.

Ungeachtet der zahllosen Modificationen, welche die Struktur des Chitinskeletts nicht nur bei den verschiedenen Familien und Ordnungen der Crustaceen, sondern auch an den verschiedenen Körpertheilen einer jeden Art erleidet, werden doch fast niemals gewisse wesentliche Eigenthümlichkeiten an demselben, wenn es hinreichend massig entwickelt ist, vermisst, namentlich eine schichtweise Zusammensetzung aus dünnen, homogenen, der Oberfläche parallelen Lamellen, welche auf dem Durchschnitt eine sehr regelmässige Streifung darbieten; ferner auf denselben zellenähnliche, polygonale Bilder, welche oft ganz das Ansehen eines regelmässigen Epithels zeigen; endlich dieselben vertical in der ganzen Dicke der Schale durchsetzend und deren äussere Fläche mit der inneren verbindend, ein System von zweierlei Porenkanälen, von denen die weit zahlreicheren, sehr dicht gedrängt stehenden, feineren bloss mit dem die ganze Schale tränkenden Saft¹⁾ erfüllt sind, während die an Zahl geringeren und weiter aus einander stehenden, grösseren einen Fortsatz der un-

cutisähnlich zusammensetzten. Die meisten folgenden Autoren, wie Meckel¹⁾ und v. Siebold²⁾, verglichen sie mit der Epidermis der Wirbelthiere, und glaubten, dass sie, wie das Horngewebe der letzteren, allein aus Zellen zusammengesetzt sei, die zuletzt wegen ihrer innigen Verwachsung und Verdichtung („Chitinisirung“) nicht mehr zu isoliren seien. Eine ganz neue und verschiedene Auffassung derselben wurde endlich von Leydig³⁾ gegeben, der, auf sehr umfassende und sorgfältige Untersuchungen gestützt, nachwies, dass man niemals, weder durch mechanische Präparation, noch durch chemische Reagentien die Zellenbilder der Schale isoliren und zu wirklichen Zellen auflösen könne. Wie diese entstehen und was sie bedeuten, konnte er nicht erfahren; dagegen beschreibt er zuerst die beiderlei Porenkanäle sehr genau und erklärt dieselben für Aequivalente der Bindegewebskörperchen, durch deren Ausläufer die geschichtete Grundsubstanz in cylindrische Massen, analog den Bindegewebsbündeln der Wirbelthiere, abgetheilt werde. Demgemäss erklärt er die ganze Schale der Crustaceen für „chitinisirte Bindesubstanz“. In wieweit diese Auffassung zu billigen sei, wird sich aus dem Folgenden ergeben.

b) Die innere Lage.


Die weiche, unter dem Panzer liegende dünne Haut (Fig. 22, 23 a, b) wurde, wie erwähnt, bisher sehr vernachlässigt, obwohl sie allein der eigentlich lebendige, alle vegetativen Functionen der Haut versehende und in stetem, lebhaftem Stoffwechsel begriffene Theil der Haut ist, während das nur mechanische Dienste verrichtende Chitinskelett selbstständigen Lebens und Stoffwechsels entbehrt und jährlich abgeworfen und durch ein neues ersetzt wird. Nur einzelne Autoren schrieben der inneren Hautschicht eine grössere Bedeutung zu, wie v. Siebold (l. c. p. 421), der sie mit einer inneren

1) Meckel, Müll. Arch. 1846.

2) v. Siebold, vergl. Anat. p. 420.

3) Leydig, Müll. Arch. 1855 p. 376.

Beinhaut vergleicht, welche beim Häutungsprozess den Stoff für die neu zu bildende Decke „schichtweise nach aussen absetze“. Noch deutlicher bezeichnet sie C. Schmidt¹⁾ als „Matrix“ des Chitinpanzers, die diesen von innen „wie die dura mater die Schädelknochen“ auskleide. Er beschreibt auch ihre Struktur beim Flusskrebs besser als alle anderen Autoren, und erkannte zuerst auf ihr „eine Schicht dunkler, rundlicher, einen scharf umschriebenen, dunkler granulierten Kern enthaltenden Epithelzellen, die durch Kali gelöst werden und aus Proteinstoffen bestehen.“ Darunter folgt „ein Gewebe aus zahlreichen, innig verfilzten Längs- und Querfasern“²⁾. Er schreibt jenen Zellen auch die Function zu, die Kalksalze aus dem Blut abzuscheiden, und bestätigt diess durch ein Experiment über die Regeneration der Schale, dessen Deutung im Einzelnen jedoch bezüglich der Zellenbildung nicht ganz richtig ist. Leydig zählt die weiche, nicht chitinisirte Haut des Panzers ebenfalls, wie diesen selbst, den Bindesubstanzen zu: „Bei niederen Krustenthieren wird sie fast nur aus mehr weniger deutlichen Zellen zusammengesetzt. Bei anderen verwischen sich die Zellenlinien und man hat nur klare Kerne innerhalb einer feinkörnigen Zwi-




(*Astacus*) besteht sie aus gewöhnlichem oder gallertigem Bindegewebe¹⁾.

Meine eigenen Untersuchungen haben mich überall in der weichen, innen der Schale anliegenden Haut der Decapoden wiederum 2 Schichten unterscheiden lassen, eine äussere einfache Epithelzellenschicht, und eine innere, aus mehr oder weniger festem und homogenem Bindegewebe bestehende Lage von sehr verschiedener Dicke, welche nach aussen zum stützenden Träger („membrana propria“ oder „basement membrane“) der Zellenlage sich verdichtet, während sie nach innen in das Bindegewebe der an der Haut angehefteten (Sehnen) oder unter ihr liegenden inneren Organe übergeht. Diese meist sehr dünne Bindegewebsschicht, welche auch die Pigmentzellen und Farbkörnerhaufen, die Nerven und ernährenden Gefässe der Haut trägt, liesse sich allein mit der Cutis der Wirbelthiere vergleichen, während die gewöhnlich auch dazu gerechnete Zellenlage über ihr höchstens mit der Epidermis zu parallelisiren wäre. Indess ist die Bedeutung der letzteren doch eine wesentlich andere. Diese einfache Epithelschicht ist nämlich die wirkliche Matrix des aussen auf ihr liegenden Chitinpanzers, welcher weiter nichts, als das schichtweise nach aussen abgesetzte und nach Art einer Cuticula erstarrte und indurirte Secret jener Zellen vorstellt. Der Kürze halber will ich diese für die ganze Entstehung der Schale so wichtigen Zellen, die auch deren eigenthümlichen Bau hinreichend erklären, „Chitinogenzellen“, sowie die von ihnen allein zusammengesetzte, einfache, auf der bindegewebigen Cutis ruhende Epitheliallage „Chitinogengewebe“ nennen. Die Natur dieser höchst wichtigen Zellen, die beim Flusskrebs nur Schmidt (l. c.) erkannt und sehr deutlich beschrieben hatte, ist gerade an vielen Stellen der Haut der höheren Decapoden schwer zu eruiren; wesshalb sie auch wohl hier allgemein übersehen wurden.

abgesehen von den andern Gründen, schon durch den absoluten Mangel jeder Intercellularsubstanz zwischen den vollkommen epithelartig an einander gelagerten Zellen widerlegt werden.

1) Leydig, Lehrb. d. Hist. p. 114.

Ihre Membran ist so äusserst zart, weich und leicht zerstörbar, dabei der Inhalt so trüb und grumös, dass man beide an frischen Objecten nur bei sehr vorsichtiger Behandlung unterscheidet. Nur die Kerne sind immer sehr deutlich und wurden als frei in einer körnigen Masse liegend für Bindegewebe gehalten. Sehr passend zur deutlichen und vollständigen Darstellung der Zellschicht ist namentlich verdünnte Chromsäure, welche sogar einzelne Zellen zu isoliren erlaubt, während Wasser sie sehr rasch zerstört. Die Chitinogenzellen selbst zeichnen sich vor anderen Gewebeelementen des Krebses durch ihren opaken, trüben Inhalt aus, indem zahlreiche, in einer weichen Grundmasse suspendirte, dunkle, fast fettartig aussehende Körnchen die ganze Zelle so dicht erfüllen, dass die sehr zarte Membran oft kaum zu unterscheiden ist (Fig. 22 a, 23 a). Ihre Grösse beträgt im Mittel 0,015—0,025 Mm., kann jedoch an verschiedenen Orten auch zwischen 0,010 und 0,040 Mm. schwanken. Ihre ursprüngliche Form nähert sich dem Kugeligen oder ist wenigstens stark biconvex. Durch gegenseitigen Druck flachen sie sich aber so ab, dass ein dem sogen. regelmässigen Pflanzenparenchym sehr ähnliches polyedrisches Zellgewebe entsteht. Die obere



den kleinen, mit durchsichtiger Schale versehenen Thieren aus der Caridenfamilie geschieht. Bevor wir den hier deutlich sichtbaren Zusammenhang beider Hautlagen erläutern, ist es nöthig, den ganz analogen Bau der Digestionsmembran und der Drüsen zu schildern.

B. Die innere Darmbedeckung.

Die Auskleidung des Darmkanals zeigt trotz der grossen Mannichfaltigkeit der verschiedenartigsten Anhänge, mit denen sie in Form von Haaren, Schuppen, Höckern, Stacheln, Zähnen etc., z. B. im Magen, versehen ist, immer denselben einfachen Bau, der im Wesentlichen ganz mit dem der, auch mit ähnlichen vielgestaltigen Anhängen besetzten äussern Hautdecken übereinstimmt. Ueberall liegt auch hier unter einer äussern Chitinhaut eine innere Schicht chitinogener Zellen.


a) Die äussere Lage.

Die äussere, d. h. die der Oberfläche des Darmrohrs zugewendete Lage seiner Auskleidung, die sogen. Intima, wird bekanntlich, wie der äussere Chitinpanzer, jährlich gewechselt, und stellt eine continuirliche Fortsetzung des letztern vor, den man sich nach innen zurückgeschlagen und eingestülpt denken kann. Als solche theilt sie auch die Eigenschaften und den Bau des Panzers, und wie bei diesem, so wurde auch bei ihr die Zusammensetzung aus Epithelialzellen bis in die neueste Zeit behauptet. Die zellenförmige Zeichnung, welche auch hier sehr deutlich und oft täuschend zellenähnlich ist, veranlasste v. Siebold (l. c. p. 451), Meckel (l. c. p. 20) und selbst C. Schmidt (l. c. p. 30), diese strukturlose Chitinschicht für das echte, zellige Epithel zu halten. Leydig allein (l. c. p. 444) erkannte ihre wahre Natur als einer Ausscheidung der darunter liegenden Zellen, konnte die zellenähnlichen Bilder nicht als wirkliche Zellen isoliren und macht dabei die richtige Bemerkung, „dass diese Zeichnung gewissermassen der Abdruck der darunter gelegenen Zellen ist, als deren Ausscheidungsproduct doch die homogene Intima angesehen werden muss!“ Dasselbe fand er bei vielen

anderen Gliederthieren; ich sah es bei *Palinurus*, *Scyllarus* und mehreren Cariden. Sehr bemerkenswerth ist dabei noch, dass da, wo diese Cuticula eine bedeutendere Dicke erreicht, sie nicht nur, wie das äussere Chitinskelett, verkalkt, sondern auch sonst vollkommen dieselbe Struktur annimmt. Man findet dann in ganz gleicher Weise die geschichteten Lamellen, die zweierlei sie senkrecht durchsetzenden Kanalsysteme, den Uebergang der gröberen Porenkanäle in das Lumen der Haare, endlich die ausgeprägt zellige Zeichnung durch alle Schichten hindurch, namentlich aber auf der obersten und untersten. So kann man z. B. einen mit Salzsäure behandelten Verticalschnitt aus den dicken, verkalkten Platten und Zähnen des Magens geradezu nicht von einem gleichen aus der äussern Schale unterscheiden.

b) Die innere Lage.

Wie die erwähnten verdickten Theile des Magenskeletts dem äussern zum Verwechseln ähnlich sind, so ist diess auch mit der darunter liegenden weichen Hautschicht der Fall, welche an manchen Orten, namentlich am Oesophagus und Magen, der Chitinogenschicht der äussern Haut vollkommen gleicht. Hier ist sie an einigen Stellen so zart und vergänglich, dass sie z. B. von Meckel ganz vermisst wurde.



tirt ist und umfangreiche Gefässnetze und Nervenplexus führt. Auch hier besteht sie aus homogenem oder körnigem Bindegewebe mit eingestreuten Kernen. Dagegen ist sie an anderen Stellen, z. B. am grössten Theil des Darms, so zart, dass kaum eine dünne Lamelle als Tunica propria unter der Chitinogenschicht erkannt werden kann, diese vielmehr unmittelbar der Muskelhaut aufzuliegen scheint. Der deutliche Uebergang in die einfache Drüsenstruktur ist hier unverkennbar.

C. Gewebe der Drüsen.

Das Drüsengewebe ist, wie schon oben erwähnt, von dem allgemeinen Ueberzugsgewebe der äusseren und inneren Decken nicht zu trennen, da es mit demselben in ununterbrochener Continuität steht und eigentlich nur Einstülpungen desselben in das darunter gelegene Körperparenchym darstellt, welche entweder nur zur Vermehrung der secernirenden Oberfläche oder zugleich zu einer qualitativ modificirten Secretion gewisser einzelner Stoffe bestimmt sind. Diese Auffassung wird nicht nur durch embryologische Erfahrungen bestätigt, wonach alle Drüsen durch Ausstülpungen der zusammenhängenden Zellenlage entstehen, die die gesammte innere und äussere Körperoberfläche des Fötus überzieht, sondern sie lässt sich beim Flusskrebs auch histologisch ziemlich leicht beweisen, indem man überall den continuirlichen Uebergang der äussern Haut und innern Darmdecke in die Ausführungsgänge der Drüsen und deren Elemente selbst sicher verfolgen kann. Sehr erleichtert wird dieser Nachweis durch den sehr einfachen Bau aller Decapodendrüsen, die noch dazu in sehr geringer Anzahl vorhanden sind.

Vom Flusskrebs kennen wir gegenwärtig mit Sicherheit nur 5 Drüsen, von denen 2, die Krebssteintasche und die Leber, in das Lumen des Darmrohrs, die 3 anderen aber, die grüne Drüse, die Gruppe der Kiemendachdrüsen und die Geschlechtsdrüse direct nach aussen münden. Das Nähere über dieselben soll unten beigefügt werden; hier soll nur kurz ihre allgemeine Uebereinstimmung im Bau angedeutet werden. a) Die sogen. Tasche oder der Sack, worin sich

zu jeder Seite des Magens alljährlich vor der Häutung ein Krebsstein bildet, entsteht nach Leydig¹⁾ einfach dadurch, dass sich die Intima des Magens an dieser Stelle von der darunter liegenden Schicht Chitinogenzellen ablöst. Diese letzteren scheiden mittelst eines lebhaften Exsudationsprozesses während einer ganz bestimmten, nur kurzen Zeit des Jahres die Krebssteine in vollkommen gleicher Weise ab, wie während der Häutung die gesamte Chitindecke vom darunterliegenden Chitinogengewebe ausgeschieden wird. Es bildet sich nämlich zuerst ein dünnes, homogenes Chitinscheibchen, welches sich im Bau nicht von anderer Cuticula unterscheidet, und während dieses ringsum durch Apposition neuer Schichten chitinisirender organischer Substanz sich vergrößert, erfolgt erst secundär vom Centrum aus die Kalkinfiltration. Der dünne, noch nicht verkalkte Saum des wachsenden Krebssteines, der aus den jüngst abgelagerten Chitinschichten besteht, ist von zahlreichen Porenkanälen durchsetzt. Auch an ausgebildeten, mit Salzsäure vom Kalk befreiten Krebssteinen sind die concentrisch geschichteten Lamellen sowohl, als die sie senkrecht durchsetzenden Systeme der Porenkanälchen leicht wahrzunehmen. Leydig vergleicht diese Bildung nur mit der Entstehung der verdickten und verkalkten Cuticulargebilde der Darmhaut. Man darf aber




zellen abwechselnd eine dünne Lage nicht verkalkender Intima und eine dicke Schicht verkalkenden Krebssteins in jedem Jahre geliefert. b) Die sehr entwickelten, traubenförmigen Hautdrüsen, welche nach Leydig¹⁾ in der Cutisschicht des Kopfbrustschildes, wo dasselbe die Kiemenhöhle überwölbt, liegen und in die letztere einmünden,²⁾ zeigen sich als unmittelbare Fortsetzungen der sogen. Respirationsmembran³⁾, welche sich in die verschmolzene Cutis der beiden verwachsenen Faltenblätter hineinstülpt. Das homogene Bindegewebe der Cutis verdichtet sich um die einzelnen Drüsenbläschen zu einer membrana propria, welche die Schicht der grossen, cylindrischen, granulären Secretionszellen als unmittelbare Fortsetzung der Chitinogenzellenschicht (der Epidermis) trägt, und die über letzterer liegende Chitinhaut setzt sich ebenso zusammenhängend in die strukturlose Cuticula der ersteren fort. Ganz dasselbe gilt von der c) grünen Drüse und der mit ihr zusammenhängenden grossen Blase, ebenfalls einer Einstülpung der äussern Haut, die von dem conischen Fortsatz an der untern Seite des Basalgliedes des äussern Fühlers ausgeht. d) Die Leberdrüse, der vielverzweigte Blindschlauch, der jederseits hinter dem Pylorus in den Darmkanal mündet, zeigt den Uebergang der 3 Darmmembranen in jeden einzelnen Blindschlauch deutlich, indem jeder eine strukturlose Chitin-Intima, eine ebenso strukturlose Membrana propria und zwischen denselben die Lage der Secretionszellen besitzt. e) Die Geschlechtsdrüse ist der einzige Drüsenapparat, dem die Intima, wenigstens zu gewissen Zeiten, zu fehlen scheint, so dass die Secretionszellen des Hodens und Eierstocks frei auf einer strukturlosen Tunica propria sitzen, welche nach aussen in kernhaltiges Bindegewebe übergeht. Uebrigens wird die Chitin-Cuticula nur an den Drüsenelementen selbst, nicht an ihren Ausführungsgängen vermisst.

1) Leydig, Lehrb. p. 116.

2) d. h. der inneren Lamelle der oben erwähnten Duplicatur des Cephalothorax, welche die Kiemenhöhle überdacht.


Wenn wir nach dieser Schilderung der allgemeinen Oberflächendecke des Decapodenkörpers und ihrer Modificationen in den einzelnen Theilen einen vergleichenden Rückblick thun, so kann die völlige Uebereinstimmung im Bau der inneren und äusseren Körperdecken und ihrer drüsigen Einstülpungen wohl nicht verkannt werden. Die wesentlichen Elemente sind in allen drei Abtheilungen die secernirenden „Chitinozellen“, welche überall eine einfache, continuirliche Epithelialschicht bilden und durch ihre Modificationen an den einzelnen drüsigen Theilen etc. den specifischen Charakter derselben bestimmen. Mit ihrer dem Körperparenchym zugewandten (innern) Fläche ruhen sie auf einer mehr oder weniger ausgebildeten homogenen Bindegewebsschicht, welche, wo sie die gehörige Dicke erreicht, Nerven, Gefässe und Pigmente führt und die Verbindung mit den benachbarten Körpertheilen vermittelt. Unter der äussern Hautdecke wird sie zu der oft beträchtlich dicken Cutisschicht, unter dem Darmepithel zu dessen „basement membrane“, unter den Drüsenzellen zu deren meist sehr dünner „Membrana propria“. Die der Aussenwelt zugewendete äussere Fläche der Chitinogenschicht dient zur Abscheidung der gleich nach ihrem Freiwerden chitinisirenden und oft auch noch verkalkenden Cuticula, der eigentlichen Chitinmembran, welche an



ergeben haben. Da Leydig für die Cuticula des Darms und der Drüsen selbst ihre Entstehung durch Secretion der Epithelzellen annimmt, so kommt es bloss darauf an, die völlige Uebereinstimmung jener erstern mit dem Hautskelett darzuthun. Nun ist dieses letztere aber nicht nur bei Embryonen und bei niederen Gliederthieren, sondern auch an verdünnten, nicht verkalkten Hautstellen der höheren Decapoden (z. B. an den weichen Bindemembranen der Gelenke) eine vollkommen homogene, structurlose Chitin-Cuticula, ganz gleich der Drüsen-Intima. Erst wenn sie dicker wird, lässt sie deutliche parallele Schichten erkennen und erst bei noch höherer Entwicklung treten die Porenkanäle in ihr auf. Andererseits sind die entwickeltsten Stellen der Darm-Intima geradezu nicht von äusseren Skelettpartien zu unterscheiden. So finden sich z. B. in den dicken, verkalkten Magenplatten und Zähnen nicht nur die geschichteten Lamellen mit der zelligen Zeichnung, sondern auch die zweierlei Porenkanäle, von denen die grösseren in das Lumen der Haare übergehen, ganz in derselben Weise, wie an vielen Panzerstellen, wieder. Sogar in der Drüsen-Intima können, wenn sie sehr verdickt wird, Porenkanäle auftreten¹⁾. Somit dürfte die völlige Uebereinstimmung im Bau aller dieser echten Chitin-Membranen und ihre gleiche Entstehung durch schichtweise Ausscheidung aus dem darunter liegenden Chitinogengewebe wohl nicht mehr zweifelhaft sein. An erwachsenen höheren Decapoden ist diese innige Beziehung allerdings wegen der Dicke und Undurchsichtigkeit der Schale und der zarten, trüben Beschaffenheit der Chitinogenzellen schwer direct nachzuweisen. Dagegen kann man diess unmittelbar bei vielen niederen, kleinen Krustern, unter den Decapoden bei den kleinen, durchsichtigen Cariden, wo ich mich an mehreren Arten der Gattungen *Palaemon*, *Nika*, *Penaeus*, *Pasiphaea* etc. zuerst davon überzeigte. Hier kann man an den ganz

1) Dahin gehören z. B. wohl „die feinen, perpendicularär zur Fläche stehenden Cylinder“, welche nach H. Meckel bei *Cossus ligniperda* die Intima der Sericterien zusammensetzen.


durchsichtigen, hellen, dünnen Schalen ohne weitere Präparation, bloss durch verschiedene Einstellung des Focus sehen, dass jedes polyedrische Zellenbild des Panzers in Form und Grösse genau dem Umriss einer darunter liegenden Chitinogenzelle entspricht, so dass die Convexität der letztern in die Concavität des erstern hineinpasst. Mitbin entsteht die Zellenzeichnung des Panzers auf die nämliche Weise, wie in der Darm-Intima, durch „Abdruck“ der Chitinogenzellen in die noch weichen einzelnen Secretsichten. Durch diese schichtweise, secretorische Absetzung der Chitinhäute nach aussen erklären sich auch mancherlei andere Eigenthümlichkeiten derselben, wie namentlich der allgemeine Mangel der Flimmercilien bei allen Articulaten ¹⁾, der jährliche Wechsel der gesammten Chitinüberzüge ²⁾ und vieles Andere. Auch zweifle ich nicht, dass bei genauerer, namentlich histogenetischer Untersuchung der andern Gliederthiere sich die Bedeutung der gesammten Chitindecken als eines erstarrten Secrets der darunter gelegenen Zellen ganz allgemein herausstellen wird. Für die Flügel, Schuppen und Haare der Lepidopteren haben diess jüngst die Untersuchungen Semper's dargethan ³⁾.



stehung und Bedeutung wirklichen Bindegewebes so wesentlichen zelligen Elemente lassen sich nirgends darin nachweisen. Zwar vergleicht Leydig die grösseren, in das Lumen der Haare sich fortsetzenden Porenkanäle mit Bindegewebskörperchen. Indess sind diese vielmehr mit einem Fortsatz der Chitinogenzellschicht ausgefüllt, wie ich sogleich zeigen werde. Auch die Analogie spricht nicht wenig gegen jene Auffassung, da wir sonst nirgends die äusserste Begrenzung des Thierkörpers aus echtem Bindegewebe formirt und noch weniger dieses letztere einem jährlichen Wiederersatz unterworfen sehen. Dabei sind die sehr wichtigen chemischen Gegengründe noch gar nicht berücksichtigt. Als auf einen Hauptbeweis für seine Ansicht stützt sich Leydig auf den „continuirlichen Uebergang der Sehnen in das Hautskelett.“ Von diesem werde ich unten zeigen, dass er wahrscheinlich eben so wenig existirt, als echte Chitinsehnen.

Dagegen erhält unsere Auffassung von dem Chitinogengewebe eine wesentliche Stütze durch die Analogie mit dem Pflanzengewebe, wenn man dabei die Mohl'sche Theorie vom Primordialschlauch zu Grunde legt, welche zwar neuerlich mehrfach angegriffen, aber doch noch von den meisten Botanikern beibehalten wird. Bekanntlich ist danach der stickstoffhaltige Primordialschlauch die wahre, ursprüngliche Pflanzenzelle und die früher allgemein dafür gehaltene, stickstofffreie Cellulosemembran ist erst ein secundäres Ausscheidungsproduct derselben, das schichtweis nach aussen abgesetzt wird. Wie beim Chitinogengewebe der Articulaten ist auch hier die wesentliche primäre, secernirende Zelle ein sehr zartes, weiches, feines Bläschen, oft so schwer nachweisbar, dass Manche noch jetzt den Primordialschlauch für ein Kunstproduct erklären. Dagegen bildet das erstarrte Secret derselben auch hier das feste, zunächst in's Auge springende Gerüst und die Masse der ganzen Pflanze, wie es auch beim Chitinskelett der Fall ist. Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden besteht aber darin, dass bei der Pflanzenzelle die sogen. primäre Zellmembran, d. h. die erste vom Primordialschlauch abgesetzte Schicht, im ganzen Umfang des

letztern, gleichzeitig als geschlossener Sack ausgeschieden wird, und dass dann die secundären Verdickungsschichten auf der Innenseite desselben, also zwischen Primordialschlauch und primärer Membran, sich niederschlagen. Dagegen ist bei der dem Primordialschlauch in vielen physikalischen Beziehungen sehr ähnlichen Chitinogenzelle der Secretionsprozess ein durchaus einseitiger, nur von derjenigen Oberfläche ausgehender, welche der Aussenwelt zugekehrt ist. Deshalb ist hier auch keine der primären Zellmembran analoge Hülle nachzuweisen, welche an der völlig entwickelten Zelle die äusserste Schicht bildete. Höchstens könnte man die oft sogen. äusserste Cuticula des Panzers (Lavallè's „oberflächliche Epidermislage“) damit vergleichen, welche in chemischer Hinsicht etwas von den tieferen Schichten differirt (resistenter gegen concentrirte Säuren ist) und allerdings die erste Ausscheidung der Chitinogenzelle darstellt, an deren Innenseite nachher die secundären Schichten ausgeschieden werden, so dass die zunächst der Zellmembran anliegende immer die jüngste ist. Die Chitinogenzellen bleiben deshalb immer in unmittelbarem Contact, während die Primordialschläuche schon sehr früh von einander isolirt werden. Offenbar ist dieser wesentliche Unterschied durch die Nothwendigkeit, die Chitindecke jährlich abzuwerfen und durch eine



Eine ganz besondere Berücksichtigung verdient endlich noch die Analogie zwischen den mannichfaltigen Hautanhängen: Haaren, Schuppen, Warzen, Höckern, Stacheln etc. der Pflanzen und der Gliederthiere. Bei letzteren hängen dieselben, wie erwähnt, überall in der Art mit den sog. gröberen Porenkanälen zusammen, dass deren Lumen sich unmittelbar in die Lichtung der hohlen Haare etc. fortsetzt. Bei getrockneten Schalen und oft auch schon beim lebenden, erwachsenen Thier, z. B. bei den glänzend weissen Haaren der Spinnen und Schuppen der Schmetterlinge sind dieselben mit Luft gefüllt. Ursprünglich dagegen sind sie stets durch einen unmittelbaren Fortsatz der Chitinogenzellschicht ausgefüllt, dessen secundäres Ausscheidungsproduct erst die äussere, von fast allen Autoren allein in Betracht gezogene Chitinröhre ist. Ganz wie bei den Appendicularorganen der Pflanzen kann man auch bei denen der Gliederthiere zwischen ein- und mehrzelligen unterscheiden, von denen jene durch einen papillenförmigen Auswuchs einer einzigen Chitinogenzelle, diese durch einen Fortsatz gebildet werden, der aus mehreren solchen zusammengesetzt ist (Fig. 22 d). Bei den höheren Decapoden lässt sich dieser Zusammenhang wieder viel schwieriger nachweisen als bei den niederen Crustaceen, wo man die Matrix der Haare als Fortsatz der Chitinogenzellschicht ebenso continuirlich verfolgen kann, wie die äussere Chitinröhre der ersteren als Fortsetzung des äussern Chitinpanzers. Auch hier ist (z. B. bei *Squilla*, den Cariden etc.) die Aehnlichkeit mit analogen pflanzlichen Bildungen oft überraschend, wie man denn überhaupt bei näherem Eingehen auf diese Analogie immer mehr treffende Vergleichungspunkte findet. Auch dürfte in chemischer nicht minder als physikalischer Beziehung eine Vergleichung der beiden erhärteten Secretionsprodukte noch manche Schwierigkeiten in deren


Cellulose enthaltende äussere Ueberzug der Epidermisfläche, der der Porenkanäle stets entbehrt, nicht mit den Chitinhäuten verglichen, wohl aber sehr gut die oft bedeutend verdickten, unter jener liegenden „Cuticularschichten“ der Epidermiszellen.

Auffassung erläutern. Wenigstens scheint das echte Chitin kaum minder mannichfache Modificationen eingehen zu können, als die echte Cellulose. —

II. Die zusammengesetzten Systeme.

1. Nervensystem.

Das Nervensystem des Flusskrebse zeigt schon für das unbewaffnete Auge eine Zusammensetzung aus zwei verschiedenen Substanzen, einer weissen Masse, welche, hauptsächlich aus den körnigen Ganglienzellen bestehend, der grauen, und einer farblosen, welche, allein aus den wasserklaren Primitivröhren zusammengesetzt, der weissen Substanz der Wirbelthiere entspricht. Die Zellen sind zur weissen Masse in den 12 Ganglienpaaren des Bauchmarks und dem Gehirn, sowie in den kleinen Knötchen des sympathischen Systems angehäuft und finden sich ausserdem auch hie und da einzeln in den Fasernetzen des letztern eingestreut. Dagegen fehlen sie ganz in der peripherischen Körperausbreitung der




Ganglien des Bauchmarks aber mit einem reicheren Netze umspinnt, namentlich die 6 vorderen. Am schönsten entwickelt ist dasselbe auf der Oberfläche des Gehirns, wo es jedes einzelne Ganglion mit zahlreichen rundlich-polygonalen Maschen überzieht (Fig. 15).

Das Bindegewebe selbst zeigt zahlreich die gewöhnlichen, oben beschriebenen Kerne (Fig. 2 e) innerhalb einer matten, homogenen, bald mehr körnigen, bald mehr streifigen Grundsubstanz (Fig. 2 d). Oft, namentlich zwischen den Röhren in der Mitte der Längscommissuren, ist die Längsstreifung, stets parallel den Röhren, so ausgesprochen und continuirlich, dass man Fasern zu sehen glaubt. Oft ist auch der Verlauf derselben so lockig geschwungen, wie beim Bindegewebe der Wirbelthiere. Dennoch kann man keine Fasern daraus isoliren, wesshalb sie auch wohl nicht für blasse Nervenfasern, analog den Remak'schen, zu halten sind. Die stärkeren Röhren sind von besonderen dicken Bindegewebscheiden (Neurilemm) eingehüllt, welche sich beim Uebergang der ersteren in Zellen (Fig. 10) continuirlich in die Kapseln der letzteren fortsetzen, die aus concentrisch geschichteten Bindegewebslamellen bestehen. Im Innern weicher, verdichtet sich die Bindemasse im Umfange der Stämme und Zweige zu einer festen und derben Hülle, welche am Bauchstrang selbst als besondere Membran sich darstellen lässt. In die Ganglien hinein schickt diese Fortsätze, welche ein maschiges, doch nicht sehr ausgesprochenes Fachwerk bilden, in dessen Maschen Zellengruppen zusammengehäuft sind. Pigment, in Form dunkelrother, schön verästelter Sternzellen, findet sich im Neurilemm nur ausnahmsweise¹⁾. Das Zellgewebe, welches Hannover und Will als eine zweite, äussere, besondere Hülle des Bauchmarks beschrieben, steht, wie oben gezeigt wurde, in keiner nähern Beziehung zu diesem, sondern nur zu den dasselbe begleitenden Gefässen.

1) Das Neurilemm der sympathischen Geflechte von *Homola Cuvieri* sah ich mit vielgestaltigen, weissen, gelben, orangefarbenen und purpurrothen Flecken überstreut, die aus sehr kleinen, Molekularbewegung zeigenden Körnchen bestanden.

Bezüglich der feineren Gewebsdifferenzen in den verschiedenen Theilen des Nervensystems ist schon oben mehrmals erwähnt worden, dass das Körpernervensystem (das „cerebroventrale“) sich vielfach von dem sympathischen unterscheidet, und dass in jenem wiederum die Zellen des Gehirns von denen der Bauchknoten, die Röhren des Bauchmarks von den peripherischen verschieden sind. Was zunächst das Gehirn betrifft, so muss man dasselbe, abgesehen von den dafür sprechenden physiologischen Eigenthümlichkeiten, auch aus histologischen Gründen wohl von den Bauchmarksknoten trennen, obwohl es gewöhnlich nur als der vorderste und grösste derselben angesehen wird. Die acht einzelnen Knötchen, aus denen es, wie Valentin (l. c.) fand, zusammengesetzt ist, sind von einer auch die Gesamtmasse einhüllenden gallertigen Fettgewebsschicht überzogen und vereinigt, aber nur sehr locker unter einander verbunden. Jedes einzelne der acht Knötchen wird dann noch von einer festen, homogenen, kernreichen Bindegewebsmembran (Fig. 15) umschlossen, welche die Präparation der im Innern enthaltenen Masse sehr erschwert. Diese besteht zum grossen Theil aus einer dunkeln feinkörnigen weichen Grund-




aus. Ziemlich häufig waren Zellen mit zwei Kernen, ebenso Kerne mit mehreren Kernkörperchen. Die 12 Bauchmarksknoten, auch der erste, der nach Valentin ähnlich wie das Gehirn aus acht Lappen bestehen soll, zeigen nichts von jenen eigenthümlichen Elementen, sondern nur die gewöhnlichen, sehr grossen, meist unipolaren Ganglienkugeln, mit schönem, hellem Kern, oft in kleineren Gruppen von 5 bis 10 gehäuft. Doch sind auch sie schwer unverletzt zu isoliren. Die 11 hinteren Ganglien bestehen aus je zwei symmetrischen Hälften (der letzte Schwanzknoten nach Valentin aus zwei Paaren), die in den Hinterleibsknoten viel inniger verbunden sind, als in den Brustknoten.

Was den Faserverlauf im Bauchmark betrifft, so hat schon Helmholtz beim Flusskrebs ebenso wie Newport beim Hummer gefunden, dass in jedem Verbindungsstrang ein oberer Theil, dessen Fasern, ohne die Ganglienkugeln zu berühren, oberflächlich über dieselben weggehen, von einem untern, dessen Röhren mit den Zellenhaufen in einem innigen Zusammenhange stehen und sich nicht von ihnen trennen lassen, unterschieden werden kann. Von jenen ersteren gehen, von vorn anfangend, an jedem Ganglion einige Fasern zu diesem letzteren herunter, so dass also der obere nach hinten immer dünner wird. Zugleich scheint er aber an jedem Knoten wieder durch einige neue von diesem entspringende Fasern verstärkt zu werden.

In dem oberen, ganglienlosen Strang verlaufen auch jene „colossalen Röhren mit dem centralen Faserbündel“, von denen weder Remak noch ich jemals eine Verbindung mit einer Zelle sehen konnten. In jeder Hälfte einer jeden Längscommissur finden sich deren etwa 3—5; immer übertrifft aber eine einzige, mehr nach der Mitte zu gelegen, bedeutend die andern, welche dann durch allmälige Uebergänge mit den schmälern, des centralen Faserbündels entbehrenden Fasern verbunden sind. Uebrigens nimmt ihr Durchmesser vom ersten Brust- bis zum letzten Schwanzknoten kaum an Dicke ab; doch finden sich im Schlundring meist die stärksten. Die unteren Stränge, vielleicht auch ein Theil der oberen, schei-

nen innerhalb der Knoten eine theilweise Kreuzung ihrer Fasern einzugehen, während innerhalb der Längscommissuren nirgends ein Austausch der streng gesonderten symmetrischen Seitenhälften stattfindet. Uebrigens wird der wichtigste Punkt in der Struktur des Bauchstrangs, die Frage über die Verbindung der Röhren mit den Zellen innerhalb der Knoten, sowie der Zusammenhang dieser beiden Elemente mit den von den Knoten abtretenden peripherischen Stämmchen wohl noch lange auf Enthüllung warten müssen, da bisher keiner der erwähnten, verdienten Forscher die dabei hinderlichen Schwierigkeiten zu überwinden vermochte. Gerade beim Eintritt in die Ganglien werden die bis dahin so scharf gezeichneten Elemente blass und matt, und selbst die so sehr hervorstechenden dicksten Fasern scheinen auf einmal unterbrochen zu werden. Dazu trübt dann noch die dichte, schwer zu entwirrende Bindegewebsverflechtung und der dunkle Zelleninhalt die Durchsichtigkeit bedeutend.


In den, bisher ganz vernachlässigten peripherischen Nervenstämmen lässt sich der Verlauf der einzelnen Röhren ohne Vergleich leichter und sicherer weithin verfolgen, vielleicht bequemer als bei irgend einem andern Thiere die-



scheint eine fast constante Vertheilung der dünnen und dicken Fasern auf zweierlei Stämmchen zu sein. Gewöhnlich fallen gleich beim ersten Blick jederseits ein oder ein paar sehr durchsichtige, platte Nerven auf, die nur ungefähr 5 bis 15 Primitivröhren halten, diese aber vom breitesten Durchmesser, während die beiden andern stärkeren und mehr cylindrischen Stämmchen eine viel grössere Anzahl, aber schmälere und blassere Röhren besitzen. Während in diesen letzteren sich theils wegen der dichtern Anhäufung, theils wegen der undeutlichen Ausprägung der Elemente der Faserverlauf nur mit grosser Mühe und unsicher verfolgen lässt, kann man dagegen bei jenen ersteren das Verhalten der einzelnen Röhren bis in die feineren Aeste mit der grössten Leichtigkeit und Sicherheit beobachten. Diese bandartigen, flachen Nervenbündel sind nämlich zugleich auch sehr reichlich mit Neurilemm ausgestattet, so dass die wenigen (meist kaum ein Dutzend, oft nur 3—5) sehr breiten und scharf contourirten, wasserhellen Röhren mit ihrer meist deutlich doppelten Grenzlinie, verhältnissmässig weit von einander entfernt, sich auf dem dunkeln, homogenen Bindegewebsgrunde äusserst nett und klar abheben (Fig. 1 u. 2). In ihrem ganzen eigenthümlichen Habitus gleichen sie so sehr den colossalen Röhren mit centralem Faserbündel, dass ich, obwohl ich dies letztere vergeblich bei ihnen zu sehen mich bemühte, dennoch glauben möchte, dass sie von jenen ausgezeichneten Elementen abstammen. Auch die oben geschilderten Theilungen der Primitivröhren, welche an den stärkeren, dunkleren, runden Stämmchen nur schwer zu sehen sind, lassen sich an diesen flachen, dünnen, hellen Bändern leicht bis in die 4te bis 6te Ramification verfolgen. Was noch besonders dabei auffällt, ist, ausser der grossen Breite der Röhrenwurzeln und der dem entsprechenden geringen Anzahl, die ungemein grosse Verschiedenheit im Durchmesser nicht nur der dicht an einander liegenden Röhren, sondern auch der verschiedenen Aeste einer und derselben, so dass bald beide Zwillingsäste ganz gleich sind, bald der eine den andern um das 10—15fache übertrifft. Sehr häufig entsteht

auch der Anschein von zurücklaufenden Schlingen, indem ein Röhrenzweig erst weit unterhalb der Abgangsstelle des Astes, für den er bestimmt ist, die starke Mutterröhre verlässt und nun, um in jenen einzutreten, ein ganzes Stück des gemachten Weges wieder zurücklaufen muss (Fig. 1, 2). Was weiter aus diesen eigenthümlichen Röhren wird, konnte ich leider nicht ermitteln, da die Zweige, wie scharf und deutlich sie auch anfangs sind, doch bald gegen die Peripherie hin durch fortgesetzte Theilungen so schmal und fein, dabei blass und undeutlich werden, dass man sie schliesslich unmöglich mehr von echten Bindegewebelementen unterscheiden kann.

Auch das sympathische Nervensystem bietet beim Flusskrebs kaum minder interessante Verhältnisse, als die eben erwähnten sind, dar. Die gröbere Anatomie desselben ist von Krohn¹⁾, Schlemm²⁾ und Brandt³⁾ sehr genau beschrieben, dagegen die feinere, mit Ausnahme von Valentin (l. c.), kaum berücksichtigt worden. Die Röhren haben gleich von ihrem Austritt aus dem Gehirn an, sowie nach dem Abgang aus den beiden gangliösen Anschwellungen mitten im Verlauf der beiden Schlundringsschenkel (welche 3 Stämme die Wurzel des Sympathicus bilden), ihren




Nicht minder unterscheidet sie der zwar geringere, aber viel constantere Durchmesser, der bei weitem nicht in solchen Extremen wie im Cerebroventralsystem schwankt. Die allermeisten Röhren haben nahezu gleiche Breite und dasselbe gilt auch von ihren Bifurcationen, welche desshalb wiederum ein ganz anderes Bild geben (Fig. 8) als die der Körpernerven. Bemerkenswerth ist dabei auch, dass, während bei letzteren gewöhnlich die Summe der beiden Zwillingsäste dem Lumen der Mutterröhre gleichkommt, bei den sympathischen Röhren dagegen meist alle 3 (Stamm und beide Zweige) ganz gleich sind. Die gleichzeitigen, massenhaften Bifurcationen fast sämtlicher Primitivröhren von ganzen Stämmen lassen sich auch hier prächtig mit einem Blick übersehen, und ebenso die wiederholte Theilung einer und derselben Röhre im weitem Verlauf verfolgen, wenngleich das blässere, weniger homogene Neurilemm die ebenfalls matter gezeichneten, schmälern und dabei dichter gedrängten, auch vielfach sich kreuzenden Röhren hier weniger scharf hervortreten lässt (Fig. 8).

Die sympathischen Ganglienzellen sind dagegen viel besser als die Gehirn- und Bauchmarkskugeln zur bequemen und sichern Betrachtung in unverletztem Zustande geeignet, da am Magen, namentlich an der untern und vordern Seite, sowie vor dem Oesophagus unten, aber auch an einigen anderen Stellen, mehrere hübsche kleine Ganglien vorhanden sind, die Durchsichtigkeit genug besitzen, um ohne alle Präparation in ihren natürlichen Verhältnissen verfolgt zu werden. Die meisten derselben bestehen nur aus 4—8, bis höchstens 12 Zellen, selten noch mehr. Die Zahl derselben, ebenso wie ihre Verbindungsweise ist übrigens sehr variabel. Doch scheinen z. B. in dem unpaaren, oben und vorn zwischen den vorderen Muskeln an der Magenkante gelegenen „Magenknoten“ (Krohn) constant nur 10—12 unipolare Zellen sich zu finden, welche sehr regelmässig zu 5 bis 6 hinter einander in der spindelförmigen Anschwellung

obwohl ich vermute, dass sie von einer Verlängerung des mittlern, unpaaren Magennerven kommen.

jederseits des durchtretenden Stämmchens liegen, dem jede einzelne Kugel eine neue Röhre mit auf den weitem Weg giebt. Ueberhaupt scheinen auch hier die unipolaren Zellen die häufigsten zu sein, wovon man sich viel sicherer als an den Bauchknoten überzeugt (Fig. 8 b), doch sind auch sehr deutliche bipolare nicht selten (Fig. 8 c). Auch einige kleine apolare pflegen gewöhnlich dabei zu liegen (Fig. 8 a), von denen ich mich jedoch nie deutlich überzeugen konnte, dass nicht doch ein nur versteckter Fortsatz vorhanden sei. Viele Kugeln, und diese meist bipolare, finden sich auch mitten im Verlauf der sympathischen Stämme einzelnen Röhren eingelegt, und um diese legen sich dann die benachbarten Röhren, oft an einem oder beiden Polen sich kreuzend, so herum, dass es aussieht, als ob eine einzige Rohre schlingenförmig um die Kugel herum- und wieder zurückliefe. Nach dem Abgange von der Zelle kann sich die zu ihr gehörige Röhre gleich, ebenso wie die andern, wieder verzweigen (Fig. 11), wobei dann die Aeste oft sehr weit divergiren, selbst in gestrecktem Winkel. Eine interessante Form bilden auch die kleinen „einzelligen“ Ganglien, welche sich hie und da auf der Magenoberfläche finden, einzelne Kugeln nämlich,



und zwar zuerst in dem berühmten Werk J. Müller's¹⁾, zuletzt in einer sehr ausführlichen Abhandlung Leydig's²⁾ sehr genau beschrieben worden. Von den übrigen Sinnesorganen ist sogar die gröbere Anatomie so gut wie ganz unerledigt und man hat sich noch nicht einmal über die physiologische Bedeutung derselben einigen können. Von der feineren Struktur aber, insbesondere dem wichtigsten Theile derselben, der Histologie der specifischen nervösen Apparate, ist noch gar Nichts bekannt. Für das Gehörorgan galt früher die „grüne Drüse“ und die mit ihr in Verbindung stehende grosse, mit wasserheller Flüssigkeit erfüllte Blase neben dem Magen, von denen unten gezeigt werden wird, dass sie vielmehr einen secretorischen Apparat darstellen. Gegenwärtig gilt für das Gehörorgan meist die Höhlung im Basalstück des innern Antennenpaars, welche nach Farre³⁾ und Leuckart⁴⁾ ein Gehörbläschen enthalten soll und früher für das Geruchsorgan galt⁵⁾. Ein sicherer Beweis ist aber weder für das eine, noch für das andere geliefert.

2. Muskelsystem.

Die Elementarorgane der Muskeln, die quergestreiften, cylindrischen oder durch gegenseitigen Druck zu prismatischen Säulen abgeflachten Primitivbündel werden zu größeren Einheiten (secundären etc. Bündeln) vereinigt durch ein zusammenhängendes Bindegewebsgerüst, welches die motorischen Nerven und ernährenden Blutgefässe zuführt, sowie die Verbindung der Muskeln mit ihren Ansatz- und Ursprungstheilen vermittelt. Die innerste, ganz homogene, nur hie und da von Kernen durchsetzte Binde substanz, welche als Sar-

1) J. Müller, Vergleichende Physiologie des Gesichtssinnes, 1826.


2) Leydig, Zum feinern Bau der Arthropoden. Müller's Archiv 1855 p. 406.

3) Farre, On the organ of hearing in Crustacea. Philosoph. Transact. 1843.

4) Leuckart, Ueber die Gehörwerkzeuge der Krebse. Wiegmann's Arch. 1853 p. 255.

5) v. Siebold, Vergl. Anat. p. 441.


kolemma die Primitivscheiden unter einander verklebt, wurde schon oben erwähnt. Sie geht nach aussen in das Perimysium internum über, das intermusculäre Gewebe, das die secundären Bündel zusammenhält; und diese endlich werden zu gröberen Strängen vereint und nach aussen abgeschlossen durch das Perimysium externum, welches aus einer festen Platte desselben derben, homogenen, mit Kernen durchsetzten Bindegewebes besteht (Fig. 13 e). Ein paar grössere, den Thoraxraum frei durchziehende Muskeln sind überdies noch von einem, schon von Reichert kurz erwähnten Epithel überzogen, welches aus grossen, planconvexen, rundlich polygonalen, durch gelblich-körnigen Inhalt getrübten, kernhaltigen Zellen besteht und im Profil einen ähnlichen Eindruck macht, wie die äussere, körnige Schicht der Herzmuskelröhren. Doch ist mir die rechte Epithelialnatur dieser vielleicht selbst contractilen Zellen sehr zweifelhaft, da nicht nur an den übrigen, den Brustraum durchziehenden Theilen das Epithel, welches einer Serosa entsprechen würde, fehlt, sondern überhaupt mir ausserdem bei den Decapoden kein Epithel bekannt ist, welches nicht zum Chitinogengewebe gehörte.



zweigelnchen; deren jedes mehrere fein gestielte Muskelpri-
mitivbündel trägt. Gegen die letzteren entfaltet sich das
weiche Verbindungsstück zu cylindrischen Schläuchen, dem
Sarkolemma im oben angegebenen Sinn, in denen die Mus-
kelfasern spindelförmig verschmälert und zugespitzt werden
(Fig. 13). Doch kann ich Reichert nicht beistimmen, wenn
er jene Sarkolemmschläuche für die Muskelpriimitivscheiden
selbst erklärt, und daraus einen directen, continuirlichen Ue-
bergang derselben in Bindegewebe nachweisen will. Die ei-
gentliche, nicht bindegewebige, sondern aus den verschmol-
zenen Membranen der Muskelbildungszellen hervorgegangene
Primitivscheide liegt vielmehr als die nächste, zarteste Um-
hüllung der contractilen Masse, welche das Primitivbündel
auch nach dem Herausfallen aus den strukturlosen Bindege-
websscheiden des Sarkolemm noch zusammenhält, der in-
nern Oberfläche des letztern innig an und wird durch das-
selbe mit den benachbarten verklebt. Das Bindegewebe der
Sehnen setzt sich daher nur in das zwischen die wahren Pri-
mitivscheiden eindringende Sarkolemm und in das Perimy-
sium internum et externum continuirlich fort, wie namentlich
an den weicheren Sehnen, z. B. der Hinterleibsringe, zu se-
hen ist (Fig. 13). Dagegen lässt sich die echte Primitiv-
scheide oft auch noch an den aus dem Sarkolemm isolirten
Muskeln nachweisen. Doch sind immerhin alle diese Ver-
hältnisse so zart, dass ein ganz zweifelloses Bild davon
schwierig zu gewinnen ist.

Weniger schwierig ist der von Reichert (ibid.) behaup-
tete continuirliche Uebergang des Sehnenbindegewebes in den
äussern Chitinpanzer zu widerlegen, wenigstens an den mei-
sten Stellen. Fast überall lässt sich nämlich zwischen bei-
den mit Sicherheit die sehr wichtige Chitinogenmembran nach-
weisen, so z. B. auf der Ansatzfläche des pinselförmigen
Kiefermuskels am Rückenschild. Die Sehnen setzen sich viel-
mehr an die Cutisschicht an, in der sie sich verlieren. Na-
türlich ist aber gerade an diesen Stellen der innige Zusam-
menhang der Chitinogenmembran und der Chitinschicht be-
sonders fest, so dass sich die Zellenlage der erstern nur

schwierig ohne gewaltsame Trennung und dadurch herbeigeführte Zertrümmerung trennen lässt. An einigen Stellen, namentlich am Ansatz der verkalkten Sehne an den Kiefer, war es mir trotz vielfacher Versuche nicht möglich, die die Uebergangsstelle bezeichnende Chitinogenmembran zu sehen, obwohl man sie auch hier, als zur Regeneration der Schale beim jährlichen Wechsel durchaus nothwendig, schon a priori als wirklich vorhanden voraussetzen muss¹⁾. Dadurch, dass diese secernirende Chitinogenzellenlage die Schale von den Sehnen und Muskelansätzen trennt, wird zugleich der Auffassung des Chitinpanzers als „chitinisirter Bindesubstanz“ eine Hauptstütze genommen. Der als bestes Argument dafür aufgestellte continuirliche Uebergang der „chitinisirten“ Sehnen in die Schale existirt nicht. Dazu ist noch die wirkliche Chitinnatur der sogen. „chitinisirten“ Sehnen sehr zweifelhaft. Selbst wenn sie aus echtem Chitin beständen, würde das noch nicht viel beweisen, da nach Leydig²⁾ sogar Muskeln chitinisiren können. Allein wie jetzt unter dem Namen des Chitins bunt durch einander die verschiedensten Stoffe, bloss wegen analoger Löslichkeitsverhältnisse, zusammenge-
worfen werden, so ist auch der Begriff des „Chitinisirens“



atrophirt scheinen und erst beim Uebergang in das weichere Bindegewebe des Sarkolemm und Perimysiums deutlich werden. Sie zeigen nichts von den für die echten Chitinmembranen charakteristischen Porenkanälen, Zellenabdrücken etc. Endlich scheinen mir auch einige chemische Differenzen vom echten Chitin vorhanden zu sein, die ich aber leider nicht genauer verfolgen konnte. Nach alledem möchte ich die chitinisirten Sehnen nicht für wirkliches, echtes Chitin, sondern für eine Bindegewebsmodification halten, welche ausser der Kalkinfiltration noch eine eigenthümliche Härtung und Verdichtung der Grundsubstanz erfahren hat, ähnlich wie es nach Reichert beim elastischen Gewebe der Fall ist. Auch Leydig erwähnt (l. c. p. 30) die vollständige chemische und morphologische Uebereinstimmung anderer Arthropodensehnen mit den aus elastischem Gewebe bestehenden kleinen Sehnen vom Hautmuskelnnetz der Vögel.

3. Hautsystem.

Die äussere Haut ist in allen ihren allgemeineren Verhältnissen bereits oben ausführlich geschildert worden. Auf die speciellen Modificationen ihres Baues an den einzelnen Localitäten einzugehen, würde hier viel zu weit führen, und soll deshalb nur kurz daran erinnert werden, dass das Chitinogengewebe durch die bindegewebige Cutisschicht, in der die sensiblen Nerven endigen, die ernährenden Gefässe verlaufen und an die die Muskeln sich ansetzen, überall mit den unterliegenden Organen verbunden wird. Wo sie dicker wird, geht das homogene oder körnig streifige Bindegewebe oft in Zell- (gallertiges Bindegewebe?) und Fettgewebe über. Auch die Pigmentzellen und Farbkörnerhaufen sind reichlich in ihr angehäuft. Bezüglich der ersteren ist zu erwähnen, dass hier und da sehr grosse, weitverästelte rothe Pigmentzellen zwischen den Zellen des Chitinogengewebes zerstreut vorkommen. Auch der Bau der Appendicularorgane wurde schon oben erläutert, ebenso wie der der Drüsen, und gezeigt, dass diese nur innere Einstülpungen, jene nur äussere Ausstülpungen der Chitinogenschicht und ihrer Chitin-Cuticula sind.


In die grösseren papillenartigen Anhänge des Skeletts setzt sich auch eine Cutispapille fort. Von den sogen. „chitinisirten Sehnen“ wurde gezeigt, dass sie keine unmittelbaren Fortsätze des Hautskeletts sind, wie man sonst immer annimmt. Von besonderen Hautdrüsen sind nur die oben unter dem Kiemenhöhlendach erwähnten bekannt. An den anderen Körpertheilen wird deren Function gewiss von den drüsigen Chitinogenzellen versehen.

4. Eingeweidesystem.

Da mir über dieses grosse Gebiet ausser den oben mitgetheilten Beobachtungen über das Chitinogengewebe nur wenige, vereinzelte Thatsachen zu Gebote stehen, so will ich ausser diesen eigenen Fragmenten der Vollständigkeit halber auch kurz das wenige, von Anderen bisher darüber Mitgetheilte erwähnen.

A. Verdauungsorgane.

Im ganzen Darmkanal und seinen Ausstülpungen sind überall die beiden Schichten des Chitinogengewebes und die sie stützende Bindegewebslage nachzuweisen, wie oben ge-



sten anderen Organen des Flusskrebses durch Karsten¹⁾, Schlemm²⁾ und Meckel³⁾ zu erfreuen gehabt. Der Darm im engern Sinne ist sehr einfach und gleichförmig gebaut. Leydig gab eine Abbildung desselben (l. c. Fig. 176). Das Bindegewebe der Tunica propria, welches das ganze Gerüst desselben bildet, zieht sich nach aussen zwischen den Muskeln, die eine innere Längs- und äussere Ringfaserschicht bilden, hindurch und bildet um letztere noch eine zarte, lockere Hülle, welche in das Zellgewebe übergeht, das gerade hier auf dem Darm rings um die Arteria abdominalis superior sehr stark entwickelt ist. An der Darmintima, die nach einiger Zeit sich leicht als zusammenhängender Schlauch aus dem Darm auslösen lässt, beschreibt Leydig (l. c. p. 335) „grössere Felder und innerhalb dieser wieder kleinere, welche die Abdrücke der darunter gelegenen Zellen darstellen.“ In diesen „grösseren Feldern“, die schon von Geveke⁴⁾ als „5 parallele Längsreihen von Drüsen“ erwähnt werden, erkenne ich entwickelte Darmzotten, die analog den unter dem Namen „Rectaldrüsen“ bekannten Darmpapillen der Insecten gebaut sind. Diese conischen Zotten von meist eiförmig-elliptischem Umriss, welche ziemlich dicht gedrängt auf den Längs- und Querfalten des Darms hervorragen, stellen einfache Ausstülpungen der chitinogenen Darmhaut in das Darm-lumen dar. Die Cuticula derselben ist völlig homogen, ziemlich dick, mit den erwähnten kleineren, polygonal-zelligen Feldern gezeichnet, deren jedes 3—6 sehr feine, pfriemenförmige, an der Spitze oft leicht gekrümmte, 0,007 Mm. lange Härchen trägt. Die Chitinogenzellen darunter sind trüber, grösser, mit dunklerem Kern, als die zwischen den Zotten den Darm auskleidenden. In die Axe der bald mehr conisch spitzen, bald mehr flach wallförmigen Zotten setzt sich ein kurzer, dunkler Ausläufer der Bindegewebsschicht fort, der

1) Karsten, Nov. act. nat. cur. tom. 21 p. 295 tab. 18—20. 1843.

2) Schlemm, De hepate ac bile Crustac. Berol. 1844.


3) Meckel, Müll. Arch. 1846 p. 35.

4) Geveke, De Cancris Astaci quibusdam partibus. Diss. 1817.

wahrscheinlich Nerven und Gefässe trägt, und unter der Zellenlage sich zu einer membrana propria verdichtet. Diese jedenfalls die an sich sehr beschränkte Darmoberfläche beträchtlich vermehrenden Falten befördern wohl hauptsächlich die Chylusresorption, könnten indessen bei dem Mangel anderer Darmdrüsen vielleicht auch ein besonderes Darmsecret liefern, wofür das drüsig modificirte Aussehen des Epithels spricht.

B. Respirationsorgane.

Jede Kieme des Flusskrebses besteht aus einem pyramidenförmig gefiederten Stamme, der ursprünglich eine Ausstülpung der äussern Haut darstellt und daher wie diese von einer Chitin-Cuticula überzogen ist. Der Centralschaft einer jeden Kiemenpyramide enthält 2 dicht an einander liegende, bluterfüllte, weite Kanäle, die seine Längsaxe durchstreichen und an deren Ende zugespitzt in einander übergehen. Seitlich stülpen sie sich in eine Menge Blindröhrchen aus, von denen das äussere zuführende Blutgefäss viel mehr besitzt, als das innere abführende. Diese cylindrischen Fiederchen, deren Mündungen an einem aufgeschnittenen Gefäss als dicht-



nen nun die Circulation vor sich geht. Was die ersteren betrifft, so ist ihre Anordnung sehr schwer zu erkennen und auch Leydig¹⁾, bei dem ich diesen eigenthümlichen Bau allein erwähnt finde, nicht ganz klar geworden. Die meisten Zellen sind birnförmig mit dem stielartig zugespitzten Ende an einen kleinen Eindruck der Cuticula angeheftet, mit dem kolbig angeschwollenen Theil, in dem ein deutlicher Kern liegt, nach innen gegen die Axe gekehrt und mit anderen Zellen verbunden. Durch gegenseitige sternförmige Aneinanderlagerung scheinen sie ein schwammartig durchbrochenes Maschenwerk zu bilden, in dessen Hohlräumen das Blut auf der einen Seite zur Spitze der Fieder hinauf-, auf der andern hinabsteigt²⁾. Die Kiemencirculation geschieht also wesentlich anders, als in den anderen, mit echten Capillaren versehenen Körpertheilen. Zwar ist dieselbe nicht eigentlich lacunal, indem sie nicht in beliebigen, veränderlichen Zwischenräumen des Parenchyms, sondern in fest begrenzten Intercellularräumen und nach einer bestimmten Stromesrichtung erfolgt. Aber dennoch kann man die beiden zu- und abführenden Gefäße sowohl in dem Centralschaft, als den ganz analog gebauten Fiederchen nicht eigentlich als Kiemen-Arterie und Vene unterscheiden. Denn die Oxydation erfolgt nicht an einer bestimmten, einer Capillarausbreitung entsprechenden Stelle eines jeden Röhrchens, sondern in dessen gesamten Intercellularräumen. Ebenso führt von den beiden Gängen des Centralschaftes nicht der eine zuführende bloss venöses und der andere abführende bloss arterielles Blut, sondern beide enthalten gemischtes, nur der letztere mehr oxydirtes, als der erstere. Jedes Blindröhrchen nimmt ja aus einem der Stämme venöses Blut auf und führt es relativ arteriell in denselben Stamm wieder zurück, wo es sich mit dem andern mischt und zur vollständigeren Oxydation

1) Leydig, Lehrb. p. 385 Anm.

2) In den ähnlichen Kiemenfäden der *Squilla mantis* schien mir die Anordnung der Zellen in jeder Röhrenhälfte einer spiraligen Wendeltreppe zu gleichen.

in die weiter vorwärts liegenden Röhrrchen tritt. Daher enthalten die an der Basis des zuführenden Ganges liegenden Blindröhrrchen rein venöses, die an der Basis des abführenden rein arterielles, die an der Spitze der Kiemen, wo beide in einander übergehen, gelegenen aber zur Hälfte oxydirt Blut. Mithin ist in jedem Theile der beiden Gänge verschiedenes Blut enthalten, je weiter vorwärts, desto höher oxydirt¹⁾.

1) Einfacher erscheint die Anordnung der blutführenden Inter-cellularräume bei den mit flachen, breiten Kiemenblättern versehenen Crustaceen, wo ich sie bei *Idothea viridis* (*Oniscus viridis* Slabber) beobachtete. Jedes einzelne Kiemenblatt derselben stellt eine sehr dünne, in Form einer flachen, länglich elliptischen Schuppe entwickelte Hautduplicatur dar. Die beiderseits deren Oberfläche deckende Chitinlamelle ist sehr dünn und zart, nur rings am Rande beträchtlich verdickt und mit sehr entwickelten gefiederten Haaren besetzt. Die beiden Platten werden in bestimmter Entfernung aus einander gehalten durch eine Anzahl kleiner Parenchymseln, deren jede aus ca. 3—6 in einer Fläche angeordneten rundlich polygonalen Zellen besteht. Diese schienen am freien Rande noch zum Theil von einem homogenen Chitinstreifen begrenzt, oft auch mehrere derselben in eine gemeinschaftliche secundäre Mutterkapsel eingeschlossen, so dass ein

C. Harnorgane.

Als solche dürften wohl am ersten noch die grosse grüne Drüse, welche jederseits hinter der Basis des äussern Fühlers im Grunde des Cephalothorax liegt, und die mit ihr verbundene grosse wasserhelle Blase, welche vorn seitlich neben dem Magen, zum Theil auf ersterer, gelegen ist, anzusehen sein. Mit vollem Unrecht und ohne genügenden Grund wurden beide bisher als Sinnesorgane angesehen, und zwar früher allgemein als Gehör-, später dagegen von Farre als Geruchsorgan. Dass dieselben dagegen sicher ein specifischer Secretionsapparat sind, dürfte schon durch die wenigen folgenden, wenngleich sehr lückenhaften Notizen hinreichend bewiesen werden. Schon Neuwyler, der dieselben zuerst ausführlicher beschrieb¹⁾, äusserte diess vermuthungsweise. Er fand, dass die grüne Drüse nur aus einem einzigen, darmähnlich gewundenen Schlauch besteht, dessen Innenfläche mit zahlreichen Zöttchen und Bläschen bekleidet ist, in denen sich bedeutende Arterienäste verzweigen und welche die klare Flüssigkeit secerniren, die sich in der wasserhellen Blase ansammelt. Das Ende des grünen Schlauchs senkt sich in die dunklere, zellenartig gebaute Stelle in der Mitte der Rückenseite und mündet mit der Mitte der letzten Windung in die Blase, welche ihrerseits zu einem dünnen Blasen Hals verschmälert in den conischen Fortsatz an der unteren Seite des Basalgliedes der äusseren Antenne ausmündet. Der letztere, der sogen. Hörcylinder, ist hohl und an der offenen Mündung mit einem feinen Häutchen überspannt, welches man, obwohl es in der Mitte einen Schlitz besitzt, für das Trommelfell hielt. Bezüglich der feinern Struktur ist schon oben erwähnt, dass das Lumen der grünen Drüse sowohl als der Blase von einer homogenen Chitin-Cuticula ausgekleidet ist, die sich im Zusammenhang durch den conischen, hohlen Fortsatz, der als Ausführungsgang beider Organe zu betrachten ist, in den äusseren Chitinpanzer fort-

1) Neuwyler, Verhandlungen der Schweizer naturf. Ges. zu Zürich, 1841, p. 176.

setzt. Darunter liegt eine einfache Schicht Chitinogenzellen, in der Blase aus hellen Platten-, in dem grünen Schlauch aus dunkeln Cylinder-Epithelien bestehend. Die Grundlage derselben wird durch faserig-streifiges Bindegewebe gebildet, welches von der Blasenintima als zusammenhängende Membran sich isoliren lässt und einen kleinen Nerven sowie sehr beträchtliche Blutgefässe zuführt. Letztere bilden daselbst ein reiches, schönes Capillarnetz und sind auch in der vielfach verwebten Binde-substanz, welche die Windungen des grünen Schlauchs ziemlich fest vereinigt, reichlich vorhanden. Schon diese Thatsachen würden genügen, um dem ganzen Apparat eine secretorische, keine Sinnes-Function zuzuschreiben. Dazu kommen nun noch die wichtigen Beobachtungen von Strahl, welcher mir mündlich Folgendes mitzutheilen die Güte hatte: Sowohl die Blase als die Drüse lassen sich vom Ausführungsgang (Hörcylinder) aus mit Quecksilber injiciren, was einen continuirlichen Zusammenhang dieser drei Höhlungen beweist. In dem conischen Fortsatz befindet sich ein complicirter Muskelapparat, welcher das Oeffnen und Schliessen des Schlitzes in dem sogen. Trommelfell vermittelt. Auf mechanische Reizung (Kitzeln etc.) dieses Trom-

parates fehlen noch sichere Thatsachen. Will und Gorup Besanez¹⁾ vermuthen Guanin im Blaseninhalt. Harnsäure liess sich nicht darin nachweisen. Ich fand bisweilen, freilich nur in sehr seltenen Fällen (unter einigen hundert Krebsen kaum zwei- oder dreimal), im Lumen der grünen Drüse kastanienbraune, maulbeerförmige Concretionen, die aus amorphen, kleineren, rundlichen Bröckeln zusammengeklebt zu sein schienen. Alles dies spricht noch am meisten für eine Niere mit Harnblase und Harnleiter, besonders in Verbindung mit dem Umstand, dass sich bisher kein anderer Harnapparat bei den Crustaceen nachweisen liess. Denn die Blindschläuche, welche zwischen Pylorus und Mastdarm einmünden sollen und von Andern als Nieren ausgegeben werden, suchte ich ebenso wie Meckel und Duvernoy vergebens. Leydig²⁾ will neuerlichst die Nierennatur der grünen Drüse bestreiten und erblickt in ihr das Analogon jener eigenthümlichen „Schalendrüse“, die er bei vielen niederen Crustaceen auffand. Indess dürfte diese Analogie wohl schon einfach dadurch widerlegt werden, dass jene Schalendrüse, wie er ausdrücklich versichert, stets einen in sich geschlossenen und in sich zurückkehrenden, gewundenen Kanal darstellt, während der einfache, cylindrische Schlauch der grünen Drüse mit dem einen Ende in einen geschlossenen Blindsack ausläuft, mit dem andern offen in die grosse Blase ausmündet.

D. Generationsorgane.

Die männlichen sowohl als die weiblichen Geschlechtsapparate der meisten Crustaceen entbehren noch jeder genaueren histologischen Untersuchung. Das einzige, was vom Hoden und Eierstock des Flusskrebsses und anderer Decapoden bekannt ist, scheint der Mangel der allen andern Drüsen zukommenden Chitincuticula zu sein, indem die Secretionszellen, aus denen sich Samen und Eier entwickeln, frei auf dem Bindegewebsgerüst der tunica propria liegen,

1) Gelehrte Anzeigen d. Königl. Bair. Ak. d. Wiss. 1848, p. 825.

2) Leydig, Lehrb. p. 466.

welches meist sehr entwickelt und mit reichlichen Gefässen versehen ist. Dagegen fehlt die Chitinintima nicht auf dem Epitel der Ausführungsgänge, sowohl des Samen- als Eileiters. Um die mit Capillargefässen versehene starke Bindegewebsunterlage der letztern schlägt sich stellenweis eine nicht bedeutende Muskelschicht und dann nach aussen noch eine zarte Bindegewebslage. Die Eier sind von Rathke¹⁾ und Wagner, die starren Strahlenzellen des Samens von Henle²⁾ und v. Siebold³⁾, und deren Entwicklung von Koelliker⁴⁾ beschrieben.

5. Gefässsystem.

Bevor wir auf die das Circulationssystem constituirenden Gewebe selbst eingehen, ist es nöthig, erst die gröberen anatomischen Verhältnisse des Kreislaufs der Decapoden zu berücksichtigen. Die erste genauere Darstellung desselben gaben Audouin und Milne Edwards⁵⁾. Danach existirte ein vollkommen geschlossener Kreislauf in der Art, dass das Blut aus den Körperarterien in Körpervenen, aus diesen in Kiemenarterien, aus diesen in Kiemenvenen übergehe und dass diese endlich zu einem grossen Stamm, welcher zu

secten behaupteten. Dagegen hatten sie das Verdienst, ausser den schon bekannten 6 Arterienmündungen auch die 6 venösen Spaltöffnungen am Herzen, sowie die Existenz des venösen Sinus um das letztere, nachzuweisen. Die Unrichtigkeiten ihrer Behauptungen wurden darauf von Krohn¹⁾ nachgewiesen, welcher die von ihnen als „wandungslose Rinnen“ hingestellten „canaux branchio-cardiaques“ restituirte, ihren richtigen Zusammenhang mit dem Vorhof erkannte und überhaupt von allen die beste Darstellung des Kreislaufs im Flusskrebs gab. Für ein Körpervenensystem konnte er zwar keine positiven Beweise beibringen, erkannte aber auch mit Recht die negativen von Lund und Schultz statuirtten Gegenbeweise nicht an. Später änderte Milne Edwards²⁾ selbst, nachdem er einen lacunalen Kreislauf bei den Mollusken nachgewiesen, seine Ansicht dahin ab, dass das Blut aus den Körperarterien in die Kiemen nicht durch Körpervenvenen, sondern durch wandungslose Kanäle („vacuities among the tissues“) zurückkehre. Seitdem, namentlich auch seit v. Siebold³⁾ diese Zweifel über ein geschlossenes Gefässsystem der Decapoden mehr urgirt hatte, wurde die Ansicht ziemlich allgemein, dass die Arterien nach längerem oder kürzerem Verlauf plötzlich aufhörend das Blut frei in die Zwischenräume des Körpers ergössen, von wo es in wandungslosen und variablen Gewebslücken sich fortbewege und endlich in venösen Sinus zu den Kiemen und dem Herzen gelange. Danach fehlen also die Capillaren gänzlich und sogar die Existenz der Venen und feineren Arterien wird geläugnet. Indess ist ein so unvollkommener lacunaler Kreislauf, wenn er auch bei niedern Krustern Geltung hat, bei den Decapoden sicher nicht vorhanden, bei diesen ist er vielmehr ebenso geschlossen wie bei den Wirbelthieren. Nur sehr wenige Autoren vertreten noch diese richtige, ältere Ansicht

1) Krohn, Isis 1834 p. 522.

2) Milne Edwards, „Crustacea“ in Cyclopaedia of anatomy, Vol. I. p. 750.

3) v. Siebold. Vergl. Anat.

wie Johannes Müller, der schon seit vielen Jahren das vollkommen geschlossene Gefässsystem der Decapoden in seinen Vorlesungen beschreibt und durch schöne Injectionspräparate erläutert. Da es mir bei der näheren Verfolgung desselben gelang, auch die bisher übersehenen Capillaren und Venenwände direct nachzuweisen, so sind nunmehr wohl alle bisher noch über den vollkommen geschlossenen Kreislauf der Decapoden gehegten Zweifel als gehoben anzusehen. In der Struktur der einzelnen Gefässabtheilungen ergaben sich mir dabei noch folgende Gewebsdifferenzen.

Das Herz besteht aus einem dicht verfilzten Gewebe der oben beschriebenen eigenthümlichen Muskelfasern, welche die relativ dünne und weiche Wand des Schlauches, sowie ein feines, netziges Balkenwerk bilden, welches ins Innere desselben vorspringt. Kaum lässt sich als Endocard eine besondere dünne Lamelle des homogenen Bindegewebes nachweisen, welches das ganze Gerüst des Herzens bildet, und als continuirlicher Ueberzug auch auf die Klappen und die äussere Fetthülle, sowie von hier mittelst der Flügel in das Vorhofsgewebe sich fortsetzt. Der Herzschlauch selbst ist unmittelbar umgeben von einer dichten Hülle reinen Fett-

Die Arterien zeigen sich im Allgemeinen (Fig. 19, 20) aus 3 Huten zusammengesetzt, einer inneren elastischen, mittleren Ringfaserhaut und usseren Adventitia, um welche sich bei vielen als vierte dickste Schicht noch eine ansehnliche Zellgewebsscheide legt. Die elastische Tunica intima (Fig. 20 a) ist vollkommen homogen, stark lichtbrechend, zeichnet sich durch ihren gelblichen Glanz und den scharfen, dunklen, doppelten Contour sehr vor den ubrigen aus und hat grosse Neigung, Langsfalten zu bilden. Ihre Dicke steigt auch an den starksten Arterien kaum uber 0,002 Mm. Ein Epithel habe ich auf ihr ebensowenig, als in irgend einem Theile des Gefasssystems entdecken konnen. Die vom Blut bespulte innere Oberflache desselben wird uberall durch eine genuine Bindegewebsformation begrnzt. Die mittlere Ringfaserhaut (Fig. 20 b) umgiebt das innerste, elastische Rohr in Gestalt einer aus lauter dicht gedrangten, sehr zarten, homogenen Ringen zusammengesetzten Scheide, bald inniger, bald lockerer ihr anliegend. Der Analogie nach musste man diese klaren, hellen, sehr zart contourirten Ringe allerdings fur Muskelfasern erklaren, da sie vollkommen mit denen ubereinstimmen, welche Leydig¹⁾ von den Gefassen vieler anderer Wirbellosen, z. B. *Helix*, als unzweifelhafte Ringmuskeln beschreibt. Doch scheint mir diese Deutung namentlich desshalb bedenklich, weil alle ubrigen Muskelemente der Articulaten, auch an den vegetativen Organen (z. B. Darm, Samenleiter), deutlich quergestreift sind, wahrend hier niemals die Spur von Querstreifen zu erblicken, auch nicht kunstlich hervorzurufen ist. Auch ist es mir niemals gelungen, die scheinbaren Ringfasern wirklich zu isoliren, so dass man sie vielleicht mit noch mehr Recht fur blosse regelmassige Falten einer elastisch retrahirten Membran halten konnte. Dafur wurde ferner sprechen, dass dieselben manchmal sehr deutlich ausgesprochen, in andern Fallen an demselben Arterienstuck kaum zu erkennen sind, und dass man sie im erstern Falle durch einen gleichmassig ausgeubten

1) Leydig, Lehrb. p. 437 Fig. 216 B b.

Druck fast zum Verschwinden bringen kann. Die nach aussen diese Ringhaut umgebende Adventitia (Fig. 19, 20 d) besteht aus einem Bindegewebslager von sehr verschiedener Mächtigkeit. In einigen der grössten Arterien so zart und fein, dass man kaum die homogene oder fein granulirte Zwischensubstanz zwischen den zahlreichen zarten Kernen (20 c) wahrnimmt, entwickelt sie sich dagegen an anderen Arterien, namentlich denen mittleren Calibers, zu einer so dicken Schicht, dass sie selbst den Durchmesser der letztern übertrifft. Besonders nach aussen zeichnet sich dies Bindegewebe dann oft sehr aus durch den regelmässig lockigen Verlauf der scheinbaren Fibrillenbündel, welcher durch die parallele Schichtung der Bindegewebslamellen entsteht. Sehr auffallend ist aber immer die Lage der Kerne, welche nicht unregelmässig in der Grundsubstanz zerstreut sind, sondern meist in regelmässigen Abständen der Ringhaut anliegen. Bedeutungsvoll wird diese Lagerung dadurch, dass oft, namentlich an jungen Thieren, zwar zarte, aber deutliche Zellencontouren die einzelnen Kerne umgeben, was, wie oben erwähnt, auf eine Entstehung dieser Bindegewebsformation aus verschmolzenen Zellen hindeuten scheint. Als vierte äuss.

pelfen Contour unterscheiden kann (Fig. 16 a), der in regelmässigen Abständen von länglich spindelförmigen, blassen, 0,024 Mm. langen Kernen unterbrochen wird (b). Ihre Lichtung ist an vielen Stellen (c) so eng, dass die grossen Blutzellen (d) nur eben mit dem kürzesten Durchmesser ihres Kernes, spindelförmig ausgezogen, sie passiren können. Ist das Blut theilweis ausgeflossen, so sinken die elastischen Wände der Capillaren zusammen (Fig. 16) und scheinen dann oft solide Stränge zu bilden, wesshalb sie auch wohl bisher ganz übersehen wurden. Eine Verwechselung mit dünnen Nervenröhren ist nicht leicht möglich, weil sie nie den ganz geraden Verlauf und den überall gleich weiten Durchmesser der letztern haben. Das schönste und deutlichste, obwohl nicht immer leicht wahrnehmbare Capillarnetz umspinnt in Gestalt eines sehr zierlichen, aus rundlich-polyedrischen Maschen gebildeten Geflechts die Oberfläche der Gehirnganglien (Fig. 15). Ein schwächer entwickeltes überzieht die vorderen Bauchganglien und die (Harn-) Blase; und nur einzelne Maschen sah ich in den grösseren Nervenstämmen, den Muskeln, dem Zellgewebe, der Bindegewebshülle der Ei- und Samenleiter, der grünen Drüse etc.

Die durch den Zusammenfluss der Capillaren gebildeten Körpervenien sind der am schwierigsten zu demonstrende Theil des Gefässsystems, indem ihre Wandung überall nur aus einer sehr zarten und dünnen Platte des gewöhnlichen, homogenen, kernreichen Bindegewebes (Fig. 18) besteht, und ausserdem so innig mit dem umhüllenden Bindegewebe der Nachbarorgane, dem Neurilemm, Perimysium etc. zusammenhängt, dass sie nur sehr schwer von ihnen zu trennen ist und oft kaum selbstständig differenzirt erscheint. Wenngleich es nun desshalb kaum möglich ist, die Venen als geschlossene, bluterfüllte Röhren auf längere Strecken zu isoliren, so überzeugt man sich doch bei anhaltender Untersuchung der verschiedensten Körpertheile, dass das Blut nirgends in unbestimmten, veränderlichen Lacunen, sondern überall in fest begrenzten Bindegewebsröhren aus dem Körper zurückkehrt und sich auf der untern Körperseite in mehreren, grö-

seren Venenstämmen ¹⁾ ansammelt. Im sogen. Sternalkanal scheinen dieselben sämmtlich in einem grossen, weiten Centralsinus zusammenzukommen, von dem in jede Kiemenpyramide ein starkes, zuführendes Gefäss (Kiemenarterie) abgeht, dessen zarte bindegewebige Wand ebenfalls eine Fortsetzung der Sinushülle bildet. Der eigenthümliche kleine Kreislauf in den Kiemen ist schon oben bei den Respirationsorganen beschrieben worden.

Die weiten Räume, in denen das Blut aus den Kiemen zum Herzen zurückkehrt, sind schon von Krohn (l. c.) so sorgfältig und naturgetreu beschrieben worden, dass ich hier nicht weiter darauf einzugehen, sondern nur zu bemerken brauche, dass ihre Wand aus derselben zarten, durchsichtigen Bindegewebslamelle (Fig. 18) wie bei den Körpervenen besteht, aber viel leichter als diese zu isoliren und im Zusammenhang zu demonstrieren ist. Aus jedem Kiemenschaft geht ein wegführender Stamm (Kiemenvene) durch das Basalglied an die Innenwand des Thorax und steigt, an dieser dicht anliegend, in einer Rinne zwischen den Muskelvorsprüngen, zum Vorhof empor, in den sie, trichterförmig erweitert, unmittelbar unter den grossen im Vorhof gelegenen

wand von den austretenden Arterien durchbohrt wird, schlägt sie sich nach innen, auf deren äussere Oberfläche, um und überzieht, von dieser sich fortsetzend, auch die Aussenfläche des Herzens. Wie die Körper- und Kiemen-Venen, so wird auch der Vorhof nur von einer ganz einfachen, dünnen, durchsichtigen Lage gewöhnlichen Bindegewebes gebildet, welches in einer homogenen, höchstens fein-körnigen oder -streifigen Grundmasse zahlreiche, längliche, granulierte Kerne enthält (Fig. 18).

Als Anhang mag hier noch eigenthümlicher parasitischer Körper kurz gedacht werden, welche namentlich in der Umgebung des Gefässsystems, demnächst am häufigsten um den Darmkanal herum, aber auch im Bindegewebe der verschiedensten anderen Organe, Muskeln, Nerven etc. in beträchtlicher Anzahl (zuweilen über 100) und (wenigstens bei den Berliner Spreekrebsen) fast constant vorkommen (Fig. 25). Sie bestehen im scheinbar ausgebildeten Zustande (B) aus einer sehr dicken, vollkommen durchsichtigen und strukturlosen, glashellen Kapsel von länglich elliptischer oder lanzettlicher Gestalt, deren innerer Hohlraum, ungefähr von demselben Breitendurchmesser wie die Dicke der Kapselwand, und 4 bis 6 Mal so lang, mit einer Anzahl grösserer oder kleinerer, fettähnlich dunkel glänzender Körnchen erfüllt ist. Zwischen diesen liegen, im Längsdurchmesser der Kapsel hinter einander angereiht und fast die ganze Breite des Hohlraums einnehmend, einige wenige (meist zwischen 3 und 6) grosse, blasse, wasserklare, ganz homogene, matt glänzende Kugeln, oft von den dunkeln Körnchen zum Theil verhüllt. Andere Kapseln enthalten nur eine grosse Menge der letzteren, die wieder in anderen (C) zu wenigeren, grösseren Tropfen zusammengefloßen erscheinen. Endlich findet man oft Cysten (A), deren Wand viele, zum Theil sehr regelmässige Risse und Sprünge zeigt, ferner an beiden Polen (und zuweilen auch noch beiderseits seitlich) scheinbare Austrittsöffnungen, und deren Hohlraum entweder völlig leer ist oder nur noch einige kleine Körnchengruppen, und oft dazwischen ein wenig blasse, feinkörnige Substanz enthält. Eine weitere Parasiten-Entwicklung

konnte ich an diesen Körpern während der Wintermonate (October bis April), in denen sie mir zur Beobachtung kamen, nicht wahrnehmen. Im Mittel beträgt die Länge der Kapseln 0,170 Mm., die Breite derselben 0,048, die Dicke der Kapselwand 0,012, der Durchmesser der hyalinen Kugeln 0,010–0,014, der Durchmesser der dunkeln Körnchen 0,002 – 0,007 Mm.

Fassen wir schliesslich die Hauptresultate unserer Untersuchungen kurz zusammen, so ergeben sich die folgenden Sätze, von denen ausdrücklich bemerkt wird, dass sie nur für den Flusskrebs mit Sicherheit ausgesprochen sind, wahrscheinlich indess für alle Decapoden Gültigkeit haben.

1) Alle Nervenprimitivröhren theilen sich wiederholt während ihrer ganzen peripherischen Ausbreitung, und zwar gehen fast bei jeder Gabelung eines Nervenstämmchens die meisten dasselbe zusammensetzenden Röhren in je zwei divergirende Aeste, von gleichem oder verschiedenem Durchmesser, aus einander.

2) Alle Fortsätze von Ganglienzellen gehen in Nervenprimitivröhren über, und zwar in der Art, dass der wasserhelle Inhalt der letzteren von dem trüb-körnigen der Zellen durch

5) Das Bindegewebe tritt in zwei wesentlich verschiedenen Formen auf, als verschieden differenzierte Grundsubstanz mit zahlreichen eingestreuten Kernen und als Zellgewebe mit sehr geringer Menge von Intercellularsubstanz zwischen den sehr grossen, wasserklaren, rundlichen Zellen, die auch Fetttropfen aufnehmen können.

6) Die echte Chitinsubstanz, welche als continuirliche Decke sämtliche der Aussenwelt zugewendeten Körperoberflächen, sowie deren Einstülpungen nach innen (Drüsen) und Ausstülpungen nach aussen (Haare und andere Appendicularorgane) ununterbrochen überzieht, ist die verschieden stark entwickelte Ausscheidung einer continuirlichen Epithelialzellenschicht (Chitinogenmembran), welche auf einer Bindegewebsunterlage ruht. Danach sind äquivalent:

	Chitin-Secret.	Chitinogenzellenlage.	Bindegewebs-Unterlage.
Aeussere Hautdecke:	Skelett.	Epidermis.	Cutis.
Innere Darmdecke:	Intima.	Epithelium.	Basement membrane.
Drüsengewebe:	Cuticula.	Secretionszellen.	Membrana propria.

7) Die Sehnen gehen nicht continuirlich in das Hautskelett, sondern in die Cutis über und sind von jenem durch die zwischen beiden befindliche Chitinogenzellenschicht getrennt.

8) Die grüne Drüse und die mit ihr zusammenhängende, mit wasserheller Flüssigkeit erfüllte grosse Blase, welche beide durch den sogen. Hörcylinder nach aussen münden, bilden einen Secretionsapparat.


9) Die Blutzellen befinden sich innerhalb des Plasma in beständiger amöbenartiger Bewegung und Formveränderung, und enthalten in einer sehr zarten Membran eingeschlossen einen flüssigen, klaren Inhalt, in welchem um einen centralen, hellen Kern eine Anzahl kleiner, dunkler Körner gruppiert sind.

10) Der Blutumlauf erfolgt in einem vollkommen geschlossenen Gefässsystem, dessen vom Blut bespülte Innenwand nirgends von einem Epithel bedeckt ist, sondern überall von Bindegewebe gebildet wird. Die stärkeren Körperarterien be-

stehen aus einer strukturlosen Intima, mittleren Ringhaut, bindegewebigen Adventitia (bei vielen noch von einer äussersten dicken Zellgewebsscheide umhüllt), die Capillaren aus einer strukturlosen, mit Kernen besetzten Membran, die Körpervenen, Kiemenvenen und der Vorhof aus einer einfachen, dünnen, homogenen, kernhaltigen Bindegewebslamelle. Nur innerhalb der Kiemen kreist das Blut in Intercellularräumen eines aus Zellen gebildeten cavernösen Gewebes.

Nachschrift.

Während des Druckes der vorliegenden Untersuchungen, die im Herbst und Winter 1856/57 angestellt, und deren Grundzüge bereits im folgenden Frühjahr veröffentlicht wurden ¹⁾, sind zwei Abhandlungen erschienen, die mehrere in denselben erörterte Fragen gründlicher und ausführlicher, als es mir möglich war, behandeln, und auf die ich desshalb hier um so mehr verweisen will, als sie jene nicht nur wesentlich bestätigen, sondern auch beträchtlich erweitern.



Wirbellosen ausgedehnt, bei deren grösstem Theile derselbe ganz analoge Zellenausscheidungen, wie die Chitinmembranen der Gliederthiere, nachweist. Namentlich erfahren wir, dass auch bei den Mollusken ganz ähnliche Cuticulargebilde sowohl auf der äusseren Epidermis als auf dem inneren Darmepithel sich finden, die aber ihre Entstehung aus den unterliegenden Secretionszellen leichter und sicherer nachweisen lassen, als diess bei den Krebsen möglich ist. Durch diese, im umfassendsten Maassstabe ausgeführten vergleichenden Beobachtungen einer so bedeutenden Autorität, wie Kölliker, dürfte wohl die Auffassung der Chitindecken der Articulaten als erhärteter Epithelialausscheidungen jetzt sicher bewiesen sein.

Die andere Schrift, von A. Rollett ¹⁾, enthält „Untersuchungen zur näheren Kenntniss des Baues der quergestreiften Muskelfaser“. Der Verf. ist durch seine zahlreichen Beobachtungen an den Muskeln verschiedener Wirbelthiere ebenfalls zu der Bowman'schen Ansicht über die Zusammensetzung aus „primitive particles“ zurückgeführt worden und hinsichtlich deren Anordnung zu ähnlichen, aber viel weiter greifenden Ergebnissen gelangt, als uns die Muskeln der Decapoden lieferten. Er fasst den Muskel geradezu auf als aus zweierlei Scheiben aufgebaut, aus einer stärker brechenden Hauptsubstanz und einer schwächer brechenden Zwischensubstanz. Von diesen scheint die erstere dem zu entsprechen, was wir allein für die echten Primitivpartikelchen hielten, während die andere wohl mit unserer „Längsbindemasse“ zusammenfällt. Einen besondern Werth erlangt diese Unterscheidung Rollett's durch die sehr interessante Entdeckung Brücke's, dass die doppelbrechende Eigenschaft der Muskelfaser nur der Haupt-, nicht der Zwischen-Substanz zukömmt. Auch die übrigen, ausführlichen Untersuchungen Rollett's, die insbesondere das Leydig'sche Lückensystem, die Lagerung der Kerne und die (von uns nicht berücksichtigten) Querschnitte der Primitivbündel betreffen, sind für unsere Angaben über die Krebsmuskeln von

1) Sitzungsberichte d. math. nat. Classe d. Wiener Akad. d. Wiss. 1857 p. 291.

Wichtigkeit, da sie mit denselben einerseits übereinstimmen, andererseits sie berichtigen und erweitern. Doch wird erst eine weitere vergleichende Untersuchung lehren, ob, wie es nach den vorliegenden Beobachtungen allerdings sehr wahrscheinlich ist, keine wesentlichen Unterschiede im Bau der quergestreiften Muskelfaser bei den Wirbelthieren und bei den Decapoden vorhanden sind.


Erklärung der Abbildungen.

Tab. XVIII.

Fig. 1. Ein dünnes Nervenstämmchen, das von einem Bauchmarksganglion abgeht. Fast bei jeder Theilung eines Bündels spalten sich die meisten Primitivröhren desselben auf gleiche Weise in je 2 Aeste. Vergr. 100.

Fig. 2. Eine Nervenheilung aus demselben Stämmchen, stärker vergrößert. a. Nervenprimitivscheide. b. Inhalt der Nervenprimitivröhre. c. Kerne an deren Innenwand. d. Neurilemm. e. Kerne desselben. Vergr. 300.

Fig. 2. Eine ganz feine Primitivröhre desselben, isolirt, vergrößert.



mit einer dicken Bindegewebskapsel, die sich in das Neurilemma der Röhre fortsetzt. Vergr. 400.

Fig. 11. Eine bipolare Zelle aus einem sympathischen Ganglion, mit einem Körnchen im Kernkörperchen, und einem Fortsatz, der in 2 Röhren unter gestrecktem Winkel auseinandergeht. Vergr. 400.

Fig. 12. Ein einzelliges Ganglion aus dem sympathischen Magen-geflecht. Die dreilappige Zelle, in 3 divergirende Röhren auseinandergehend, lag im umhüllenden Bindegewebe des Magens. Vergr. 400.

Tab. XIX.

Fig. 13. Uebergang einer weichen Sehne in einen kleinen Brustmuskul. Die Muskelprimitivröhren enden keilförmig zugespitzt mit ihrer frei in das Bindegewebe eingebetteten Primitivscheide (c). Das wellig-streifige Bindegewebe (a) der in eine Falte gelegten Sehne mit seinen Kernen (b) geht continuirlich nicht in die Primitivscheide, sondern in das mit ähnlichen Kernen (f) besetzte Sarkolemma und Perimysium (e) über. Von diesen zu unterscheiden sind die innerhalb der Primitivscheide sichtbaren Muskelkerne (d). Die contractile, quergestreifte Inhaltsmasse der Röhren ist in verschiedenen Zuständen der Contraction und Aufquellung gezeichnet. Während die Längsbindemasse rechts, im frischen Zustande, nur als zarter, dunkler Querstreif zwischen den breiten Discs sichtbar ist, erscheint sie links, nach längerer Einwirkung von Wasser, in höchstem Grade aufgequollen, fast so breit als die primitive partioles selbst. Die Querbindemasse ist zum Theil schon aufgelöst, so dass sich die Fibrillen an einander verschieben und ganz am Rande auseinanderfallen. Vergr. 300.

Fig. 14. A, B, C. Drei Muskelprimitivfasern aus dem Herzen, mit verdünnter Essigsäure behandelt. Vergr. 300.

Fig. 15. Das Capillarnetz auf der Oberfläche eines Gehirnganglion. Vergr. 50.

Fig. 16. Eine einzelne Masche desselben Capillarnetzes. Die sehr elastischen, strukturlosen, mit Kernen (b) besetzten Wände (a) haben sich nach dem theilweis erfolgten Ausflusse des Bluts so zusammengezogen, dass die übrigen Blutzellen (d) in dem verengten Lumen (c) kaum Platz haben. Vergr. 400.

Fig. 17. Blutzellen. a, b, c, d. Die Form, die die meisten beim Ausfliessen des Bluts aus dem lebenden Thier zeigen. e. Eine Zelle mit 2 Kernen. f, g, h. Verschiedene Formen, die die Zellen ausserhalb des Körpers bei ihren amöbenartigen Bewegungen annehmen. i. Die kuglig zusammengezogene Form, die die meisten im frei geronnenen Blute zeigen. Vergr. 400.

Fig. 18. Stück einer Venenwand, aus homogenem, fein streifigem oder körnigem Bindegewebe (b) mit vielen Kernen (a) bestehend. Vergr. 300.

Fig. 19. Ein mittelstarker Muskelast der oberen Schwanzarterie. Vergr. 65. c, d, e, f wie in folg. Fig.

Fig. 20. Ein Stück derselben, stärker vergrössert. Der Focus ist auf die Grenzfläche der Media und Adventitia eingestellt. a. Elastische Intima. b. Mittlere Ringhaut. c, d. Bindegewebige Adventitia. c. Kerne, auch über der Media im ganzen Umfang sichtbar. d. Streifige Grundsubstanz. e, f, g. Zellgewebsscheide. e. Sehr grosse wasserhelle Zellen derselben. f. Kerne derselben. g. Körniger Protoplasmahof um den Kern. Vergr. 300.


Fig. 21. Eine Zellgewebszelle, mit Chromsäure. Nach Ausziehung des wässrigen Inhalts bleibt die leere Membran gefaltet zurück. Vergr. 300.

Fig. 22. Verticalschnitt durch die äussere Haut. a. Chitinogenzellenschicht. b. Kerne derselben. c. Aeusserer Chitinpanzer. d, e. Ein Haar. d. Der mehrzellige Fortsatz der Chitinogenzellenschicht in das Lumen des Haars. e. Die röhrenförmige Chitincuticula desselben. Vergr. 300.

Fig. 23. Flächenansicht einer dünnen Stelle der äussern Haut. In c ist der Focus auf die Oberfläche der Chitincuticula, in a auf die der darunter gelegenen Chitinogenzellen mit ihren Kernen (b) eingestellt. Die Umrisse der letzteren entsprechen genau jenen der polygonalen Zeichnungen der ersteren. Vergr. 300.

Fig. 24. Ein Stückchen Fettgewebe aus der äusseren Schicht um das Herz. Die Fettzellen (a) enthalten ausser einem Kern (b) einen grössern (c) oder mehrere kleinere Fetttropfen (d). Zwischen denselben liegt ein wenig verbindende, körnige Masse mit freien Kernen (e). Vergr. 300.

Fig. 25. Parasitische Körper aus dem Bindegewebe. B. Kapsel mit hyalinen Kugeln und dazwischen kleinen, dunkeln Körnchen. C.



Bericht über die Fortschritte der mikroskopischen Anatomie im Jahre 1856.

Von

K. B. REICHERT

in Breslau.

Allgemeiner Theil.

Die Sarcode-Theorie. — Betheiligung von Abscheidungs-
produkten der Zellen an der Bildung von Geweben und
an der morphologischen Organisation der Organismen.

Unsere Ansichten über die morphologische Organisation niederer, thierischer Organismen, insbesondere der Infusorien sind nicht ohne Einfluss auf den Stand der Lehre von der Zelle und dadurch auch auf die Fassung und Deutung der einzelnen Erscheinungen im Gebiete der mikroskopischen Anatomie geblieben. Bekanntlich stellte Dujardin gegenüber Ehrenberg die Sarcode- und Vacuolen-Theorie auf. Der ganze Körper niederer thierischer Organismen sollte, mehr im Sinne älterer Naturforscher, aus formloser, beweglicher, halbflüssiger, thierischer Substanz bestehen, in welche die Nahrungsstoffe eingedrückt würden, und die überhaupt der hauptsächlichsten Lebenseigenschaften, welche Thieren mit bestimmter morphologischer Organisation zukommen, sich zu erfreuen habe. Der Verf. nannte diese Substanz, in welcher an beliebigen Orten mit Flüssigkeit gefüllte Hohlräume (Vacuoles) auftreten, „Sarcode“.

Die bedenklichen Konsequenzen, welche diese Theorie den Physiologen und vergleichenden Anatomen darbot, dürfen wir hier übergehen und nur das eine Moment hervorheben, dass durch diese Theorie das wichtige und so durchgreifende Naturgesetz, demzufolge die Geschöpfe der organischen Natur durch Vermittelung der Zelle gezeugt, entwickelt, gebildet werden, für eine Abtheilung und zwar thierischer Geschöpfe eliminiert wurde. Dass der französische Gelehrte daran keinen Anstoss nahm, darf um so weniger befremden, als selbst noch heut zu Tage in Frankreich die Lehre von der Zelle

mehr als ein Spielwerk und namentlich als ein Spiel der deutschen Phantasie, denn als ein Naturgesetz aufgenommen wird. In Deutschland haben mehrere Forscher — und Referent hat sich in gleichem Sinne bereits ausgesprochen, — die Sarcode als eine in Betreff der Struktur und Textur noch unbekannte Substanz betrachtet, deren Entwicklung aus Zellen in manchen Fällen unzweifelhaft sei, in anderen dagegen sich mit der Zeit werde nachweisen lassen. Anderen Forschern war die Sarcode eine erwünschte Handhabe, die Allgemeingültigkeit der Theorie der Zelle zu beeinträchtigen und wo möglich zu beseitigen. Noch andere Forscher endlich sind bemüht gewesen, die Lehre von der Zelle namentlich auf die als Sarcode aufgenommene Leibessubstanz der Infusorien zu übertragen. Lachmann weist in seiner später zu erwähnenden Arbeit (p. 356) darauf hin, dass hier besonders die schon von Meyen ausgesprochene Analogie eines Infusoriums mit einer thierischen oder pflanzlichen Zelle durch von Siebold und Kolliker weiter ausgeführt wurde. Der ganze Infusorienkörper sollte aus einer kontraktilen Zellmembran und einem kontraktilen Zellinhalt mit einer besonders kontraktilen Stelle, der „Samenblase“ Ehrenberg's, bestehen, der von Ehrenberg als Hode betrachtete Körper sei als Kern (nucleus), andere rundliche Körperchen, mochten sie innerhalb des Nucleus oder daneben liegen, seien als Kernkörperchen zu deuten. Die Infusorien hatten aber häufig eine nicht weiter abzuleugnende Mundöffnung, und so erhielten wir eine elementare Zelle, welche mit ihrem Inhalte durch dieses weite, offene Thor frei mit der Aussenwelt verkehrte.

Hülle des Zellinhaltes, — eine eben nur durch Gerinnung sich bildende Grenzschicht an dem letzteren; die Zelle konnte auch als ein hüllenloses Klümpchen (Furchungskugeln etc.) gedacht werden; der Zellinhalt kann sich dieser Hülle ganz oder auch nur theilweise entäussern und direkt mit der Aussenwelt in Verkehr treten; ihm wurde auch die Fähigkeit sich zu kontrahiren und dadurch beliebig die Form zu verändern, zugeschrieben. Auch das Kernkörperchen, welches so häufig als das unzweifelhafte Produkt einer Differenzirung des Kerninhaltes nachzuweisen war, erlangte eine freiere, unabhängigere Stellung. Die Schwann'sche Ansicht der freien Zellenbildung hat sich nun allerdings als ein Irrthum herausgestellt; auch wird wohl Niemand behaupten wollen, dass der Begriff der Zelle und das Naturgesetz, das sich in ihr uns offenbart hat, eine fertige und abgeschlossene Angelegenheit sei und nicht mehr zu entwickeln wäre. Allein die Geschichte der mikroskopischen Anatomie lehrt gleichwohl, dass man mit der Zelle verfahren hat und noch verfährt, als ob die sonstigen Eigenschaften der Naturgesetze gerade bei ihr ausser Kraft treten und keine Geltung hätten.

Für den vorliegenden Bericht wird es genügen, in leichten Umrissen die Sarcodé-Theorie, ihre Verarbeitung und ihren Einfluss namentlich auf die Lehre von der Zelle markirt zu haben. Das Gebäude ruht, wie man sich leicht überzeugt, auf zwei thatsächlichen Annahmen: auf der Annahme, — denn, wahrlich, mehr war es niemals, — dass die sogenannte Sarcodé formlos und nicht aus Zellen hervorgegangen sei, und dann darauf, dass niedere, aus Sarcodé bestehende Organismen, insbesondere die Infusorien einzellig seien. Gegen beide thatsächlichen Annahmen sind im Laufe der Zeit, namentlich im Jahre 1856 wichtige Beobachtungen veröffentlicht worden, welche nothwendig einen Umschwung in den herrschenden Ansichten herbei führen müssen.

Durch Joh. Müller (Monatsb. der Königl. Akad. d. W. zu Berlin; 1856, p. 389) und seine Schüler Lieberkühn (Beiträge zur Anat. der Infusorien: Müll. Arch. 1856, p. 20), Claparède und Lachmann (Ueber die Org. der Infusorien etc.: Müll. Arch. 1856, p. 340—398) wurde die Einzelligkeit der Infusorien mit dem grössten Nachdruck bekämpft. Joh. Müller weist darauf hin, dass bei einem Infusorium, welches in seiner Gestalt theils mit *Loxodes rostrum* E., theils mit *Trachelius meleagris* E. übereinstimmte, parallel dem konvexen Rande eine Reihe von Bläschen sich befindet, die konstant ein centrales, rundes Körperchen führen; dass ferner bei den Stentoren öfters, wie auch Lieberkühn, Lachmann, Claparède beobachteten, in dem von den Neuern als Kern gedeuteten Organe, der von Ehrenberg so genannten Samendrüse, bewegliche, den Ort verändernde Fäden vorkommen. Der Verf. sah bei *Paramaecium aurelia* den

ganzen Inhalt des vergrösserten, sogenannten Kerns in einen Bausch von in Locken gekräuselten Fäden formirt; auch im nicht gefaserten Zustande des Kerns ist derselbe häufig durch Einschnitte in Lappen getheilt, woraus hervorgeht, dass das fragliche Organ doch mehr als der Kern eine Zelle sein müsse. Am ausführlichsten ist die Organisation der Infusorien von Lachmann besprochen. Wenn man auch, bemerkt der Verf. (a. a. O. p. 357) a priori das Dasein einzelliger Thiere für möglich halte, so würde man dennoch zu ihnen nicht die grösseren Infusorien, besonders die *Enterodelen* E., rechnen können, und die kleineren, schwer zu beobachtenden, müssen, bevor nicht Thatsachen dagegen deutlich nachgewiesen sind, der Analogie nach beurtheilt werden. Die von F. Cohn bezeichnete Cuticula ist nach dem Verf. als, die eigentliche Cilien tragende Körperhaut der Infusorien, die sogenannte Zellmembran, Cohn's Rindenschicht als das kontraktile Körperparenchym, und die rotirende Masse Inhalt einer grossen Verdauungshöhle oder eines Magens, also als Chymus anzusehen. Das eigentliche kontraktile Körperparenchym schliesst die kontraktile Blase (*Vacuole* Duj.) und ein mit derselben zusammenhängendes System von Gefässen ein. Das Verhalten der Gefässe beim Spiel der kontraktilen Organe ist von Lieberkühn bei *Bursaria flava* E. und bei *Ophryoglena flavescens* E., von Joh. Müller bei *Paramaecium aurelia* genauer beschrieben worden. Das Körperparenchym enthält ferner häufig Chlorophyll- und andere farblose Kugeln, in anderen Fällen spindelförmige Stäbchen, aus denen nach Allmann Nesselfäden hervortreten sollen, endlich bei

Verf. in dem Körperparenchym grosser Vorticellen (*Epistylis* u. A.) bei 780maliger Vergrösserung rundliche, durch Essigsäure schärfer hervortretende Körner vom Habitus der Nuclei wahrnehmen, die mit einer gewissen Regelmässigkeit in eine weiche, helle Substanz eingebettet sind. Das mikroskopische Bild ist ähnlich, wie bei den Rotatorien, Insektenlarven etc., nur dass die Nuclei deutlicher sind. Auch bei den Rhizopoden finden sich in einer feinkörnigen Grundmasse viele Kerne, die ausserdem Bläschen einschliessen. (M. Schultze). Desgleichen wird hervorgehoben, dass die oben erwähnten, im Körperparenchym der Infusorien vorkommenden, stäbchenförmigen Körper dieselben sind, welche bei höheren Tiergruppen deutlich als Inhalt von Zellen erkannt worden, und dass die kontraktile Substanz im Stiel der Vorticellen mikroskopisch vollkommen mit den Muskeln niederer, wirbelloser Thiere übereinstimmt. So lange die als Sarcodengewebnisse angesprochenen Substanzen nicht allwärts in Betreff ihrer Entwicklung gekannt sind, werden sich allerdings noch Zufluchtsstätten für die Anhänger der Dujardin'schen Theorie vorfinden, zumal so zu sagen der Augenschein zunächst dafür spricht. Allein man darf doch nicht ausser Acht lassen, dass bei vielen, anerkannt aus Zellen hervorgegangenen Substanzen der Nachweis der Zellen-Struktur bei gegenwärtigen Mitteln nicht möglich ist, und dass es dem Fortschritt der Wissenschaft viel erspriesslicher ist, bei räthselhaften und unbekannten Dingen die Analogie in gewissen Grenzen walten zu lassen oder das „Nescimus“ einfach zu bekennen, als sofort mit Umgehung bekannter Gesetzmässigkeiten zu neuen Entdeckungen vorzugehen.

Eine morphologisch und physiologisch sehr auffällige Sarcod-ähnliche Substanz ist von dem Verfasser in dem frisch fast zähflüssigen Nahrungsdotter des Hechteies entdeckt worden. An in Weingeist erhärteten, befruchteten Hechteiern zeigt dieselbe einen tubulären Bau. Die mit Eiweisslösung gefüllten zahlreichen Röhrchen haben im Allgemeinen eine parabolische Form und Verlauf, deren Scheitel in der centralen Axe der Nahrungsdotterkugel, in dem sogenannten Scheitelfelde zusammentreffen; deren Schenkel von hier mehr oder weniger divergirend nach der Peripherie der Kugel ausstrahlen (Müll. Arch. 1856; p. 83 ff.). Ref. verweist hinsichtlich der Specialitäten auf die Abhandlung selbst. Die Kontraktionen der Substanz wiederholen sich in einem bestimmten Rhythmus, indem sie von einem seitlichen Pole der Kugel zum anderen langsam peristaltisch vor- und darauf umgekehrt antiperistaltisch zurückschreiten.*) (Müller's

*) Diese Bewegungen zeigen sich schon zu einer Zeit, wenn der Bildungsdotter noch aus Furchungskugeln besteht.

Arch. 1857, p. 46). Ueber die Genesis der Substanz ist dem Ref. Nichts bekannt und lässt sich daher auch vorläufig nicht mit Kölliker annehmen, dass dieselbe kontraktile Zellinhalt sei, obgleich sie zugleich mit dem Bildungsdotter von der als Zellmembran gedeuteten Dotterhaut umhüllt wird.

Eine zweite Frage von hoher Wichtigkeit sowohl für die mikroskopische als vergleichende Anatomie hat Kölliker durch seine Abhandlung „Ueber die secundären Zellmembranen, Cuticularbildungen und über Porenkanäle in Zellmembranen“ (Würzburg. Verhandl. 1857, p. 37—109) von Neuem in Anregung gebracht: es ist die Frage von der Betheiligung der Abscheidungsprodukte der Zellen an der Bildung von Geweben und an der morphologischen Organisation der Organismen.

Die Bildung von Körperbestandtheilen durch Abscheidungsprodukte war, wie bekannt, den älteren Anatomen und Physiologen eine ganz geläufige Vorstellung; man liess die Horngebilde, die Zähne, die Hautgebilde vieler wirbelloser Thiere, die harten Schalen etc. der Eier auf diese Weise sich bilden. Mit der Entdeckung der Zelle nahm diese Angelegenheit eine den Fortschritten der Wissenschaft entsprechende Wendung. Bei den Botanikern trat obige Vorstellung anfangs weniger in Anwendung. Die Zellstoffmembran der Pflanzenzelle wurde als die eigentliche, aber verdickte Zellmembran angesehen. Wie die Zellmembran durch Intussusception von Molekeln sich erweitere, so verdicke sie sich auch durch Juxtaposition von Molekeln der Fläche nach; die Verdickungsschichten können an die äussere oder innere Fläche der Zellmembran sich ansetzen. Durch Hugo Mohl's Lehre vom Primordialschlauch wurde die Zellstoffmembran der Pflanzenzelle zu einem festen Aus-

vom Primordialschlauch hatte bei den Botanikern an Stelle der verdickten Zellmembran die Vorstellung von der Betheiligung abgeschiedener Stoffe an der morphologischen Organisation in Anregung gebracht. Wenn Ref. nicht irrt, so ist es Schacht gewesen, der bei seinen Untersuchungen über die Mantelsubstanz der Ascidien darauf hinwies, dass die Ausscheidungsprodukte bei Pflanzen konform der Zelle, bei den Thieren mehr diffus zwischen den Zellen abgelagert auftreten.

Bei uns waren durch den Nachweis der Zellen-Struktur in den Hornsubstanzen letztere aus der Reihe der durch Absonderung gebildeten Bestandtheile der Organismen ausgeschieden. Es mag auch bei einigen Forschern sich die Ansicht gebildet haben, dass auch wohl andere Formbestandtheile der thierischen Körper, die man für Absonderungsprodukte gehalten, aus direkter Umwandlung von Zellen hervorgegangen sein mögen. Allein die Kontroverse über die Zahnbildung erhielt sich; ebenso war die Betheiligung der Absonderungsprodukte von Zellen an den Hartgebilden der Mollusken, der Eier nicht in Zweifel zu ziehen. Die Entdeckung der Zelle hat die älteren Vorstellungen zwar modificiren aber nicht vollständig eliminiren können; auch verdickte Zellmembranen hatten wir in den Dotterhäuten, selbst für die Knorpelzellen wurden sie von Vielen unerachtet der Einsprache des Ref. beibehalten. In umfassender Weise wurde die Betheiligung der Abscheidungsprodukte der Zellen an der Bildung von Geweben durch den Ref. bei Aufstellung der Gruppe der Binde substanzgebilde (1845) in die Wissenschaft eingeführt, nachdem bereits im ersten Jahresberichte des Ref. (Müll. Archiv. 1841, p. CLXIX) die Ansicht Schwann's von der Intercellularsubstanz als einem freien Cytoblastem bekämpft und auf die Abhängigkeit derselben von den darin befindlichen Zellen hingewiesen worden war. An letzterem Orte heisst es ausdrücklich, man habe sich die zu geformten Bestandtheilen des Organismus werdende Intercellularsubstanz gegenüber den sie umgebenden zelligen Gebilden ebenso vorzustellen, wie man sich früher, vor Entdeckung der Zelle, die Abhängigkeit der nicht organisirten Gebilde von den organisirten gedacht habe. Auch der *Liquor sanguinis* ist vom Ref. in Grundlage embryologischer Forschungen stets in obigem Sinne aufgenommen und gedeutet. Es hat nun allerdings zu allen Zeiten Histologen gegeben, — und unter ihnen als Führer solche Forscher, denen man gegenwärtig von gewissen Seiten her so gern den Mantel der Kritik und Unabhängigkeit gegenüber Schwann und der Zellentheorie umhängen möchte, — welche mit aller Konsequenz an dem freien Cytoblastem im Schwann'schen Sinne festhielten, die verschiedene Bedeutung und den verschiedenen Werth der um die Zellengebilde gelagerten Sub-

stanzen nicht beachteten und sich so die Einsicht in ein, wie sich jetzt herausstellt, sehr einflussreiches Bildungsgesetz unmöglich gemacht haben. Obgleich durch den Ref. die nothwendige Beziehung und Zusammengehörigkeit der Grundsubstanz und der Zellen bei den Bindesubstanzgebilden genetisch festgestellt war, so sprach man dennoch von Knorpelkörperchen etc., die ganz frei und ohne die zu ihnen gehörige Grundsubstanz in heterologe Gewebe eingelagert sein sollten. Es ist wahrlich ein wenig erfreuliches Geschäft für den Berichterstatter, der zugleich den fortschreitenden Gang in der Bewegung der Wissenschaft fest im Auge zu behalten hat, auf alte, gewissermassen verjährte Geschichten und Irrthümer zurückzukommen. Irrthümer sind menschlich, und Jeder hat seinen Theil davon zu tragen. Aber unstatthaft ist es, alle Irrthümer auf Kosten derjenigen Arbeiten, die unbeirrt den wahrheitsmässigen Gang verfolgt haben, decken zu wollen. Das Urtheil der Geschichte hat einen anderen Maassstab, als den nach der Menge und dem herrschenden Winde; es wird auch die Assecuranz-Gesellschaften für Lob und Tadel zu würdigen wissen, und Manches, was heut zu Tage als Standpunkt der Kritik und Unabhängigkeit vorausgibt wird, dürfte dann in einem anderen Lichte erscheinen. Doch genug! Gegenüber der geschichtlichen Darstellung Kölliker's (a. a. O. p. 93) kann Ref. nicht umhin, schliesslich hervorzuheben, dass bei uns wenigstens in gewissen Kreisen, stets zwischen einer Verdickung der Zellmembran und zwischen der Betheiligung von Abscheidungsprodukten der Zellen an der Bildung von Geweben und Be-

Der Verfasser unterscheidet: I. Feste Ausscheidungen an einzelnen Zellen.

Dahin gehören a) einseitig auftretende Ausscheidungen: Cylinderepithel des Dünndarms vieler Thiere mit verdickter (? R.) freier Wand; die Epidermiszellen von *Ammocoetes*; Hornzähne der Larven der Batrachier (? R.); isolirte zahnartige Bildungen an gewissen Cuticularbildungen von Mollusken (Acetabularplatten von *Sepia*, Kiefer von *Aplysia* etc.); eigenthümliche Fasern an der Dotterhaut der Scomberesoces, Wärzchen und Zöttchen der Dotterhaut der Süsswasserfische; Schuppen der Insekten, Haare, Borsten und Stacheln der Arthropoden, welche um Ausläufer einzelner Zellen sich bilden. — b) Allseitig sich bildende Ausscheidungen, secundäre Zellmembranen (? R.): äussere Kapseln der Knorpelzellen, Kapseln gewisser Knochenzellen (S. Köll. Mik. Anat. II, 2. p. 82), secundäre Dottermembranen vieler Eier der Fische, äussere Kapseln gewisser Zellen in den cellulosehaltigen Theilen der Tunicaten, die Cuticula der Infusorien.

II. Feste Ausscheidungen an ganzen Zellenmassen.

Dahin gehören a) einseitige Ausscheidungen auf freien Oberflächen der Epithelien, Cuticulae: äussere Cuticula der Strahlthiere, Weisswürmer, Anneliden; hornige Gehäuse der Quallenpolypen, Schalen der Mollusken und anderweitige äussere Cuticularbildungen derselben (Byssus der Acephalen, Acetabularringe der Cephalopoden); Chitinpanzer der Krustaceen, Spinnen, Insekten; Cuticularbildungen im Oesophagus und Magen der Rundwürmer: Cuticularbildungen im Darm der Mollusken (Kiefer, Zunge, Magenzähne, einfache Cuticulae); Cuticularbildungen im Darm der Arthropoden (einfache Cuticulae „Magenzähne der Krustaceen etc.); Cuticulae (Membr. intimae) gewisser Drüsen der Insekten; Chitinhaut der grösseren Tracheen, welche, wie Semper gezeigt hat, ursprünglich aus Zellen bestehende Röhren sind; Schmelz der Zähne nach der Lent'schen Darstellung (Kölliker bemerkt, dass er auf seinem jetzigen Standpunkte die an der Oberfläche des sich bildenden Schmelzes, zwischen ihm und dem Epithelium der Schmelzmembran vorkommende, weiche, hautartige Lage (M. praeformativa ? R.) am liebsten als jüngste, noch nicht ossificirte Schmelzschicht betrachten möchte); die äussere Eihülle der Barscheier, nach Abzug der Röhrrchen, die ausgewachsene Zellen der Membr. granulosa darstellen sollen; endlich vielleicht auch die äussere Schicht des Chorion der Insekteneier. — b) Einseitige Ausscheidungen an den angewachsenen Flächen der Epithelialformationen, Tunicae propriae (? R.): Strukturlose Membranae propriae von Drüsen (Harnkanälchen, Graaf'sche Follikel, Schweissdrüsen etc., viele Drüsen von Wirbellosen); strukturlose Häute unter Epithelien, Basement membrane (intermediäre Haut etc.); die Glashäute des Auges und Labyrinthes. —

c) Einseitige (? R.) und allseitige Ausscheidungen an Zellenkomplexen der Bindesubstanz: Grundsubstanz der Knorpel und Knochen, sofern dieselbe nicht von secundären Membranen der Zellen gebildet wird; Grundsubstanz vieler Formen von weicher Bindesubstanz (Schleimgewebe, Gallertgewebe höherer und niederer Thiere); Grundsubstanz der cellulosehaltigen Hüllen der Tunicaten; Grundsubstanz des Zahnbeins; eigentliche Scheide der *Chorda dorsualis*.

Mit Wahrscheinlichkeit liessen sich in diese Aufzählung noch aufnehmen: Kiefer der Anneliden, Borsten derselben, die hornigen Penes der Rundwürmer, der Liebespfeil der Schnecken, Krystallstiel der Acephalen, Kauapparat der Rotiferen, der Panzer dieser Thiere, der Infusorien, Polythalamien, Stachel des Rüssels der Nemertinen, Hacken der Cestoden etc.

Der Verfasser ist dann weiter bemüht, die so eben angegebenen Bildungen von den gewöhnlichen Drüsen- und Epithelialsekreten und von der paremchymatischen Flüssigkeit (Intercellularflüssigkeit K.) zu unterscheiden und gelangt hierbei zu einem Resultat, das sich nach der obigen Zusammenstellung voraussehen lässt. Der Verf. ist nämlich schliesslich der Ansicht, dass zwar gewisse Unterschiede zwischen geformten Zellenausscheidungen und Sekretionsprodukten bemerkbar seien, dass aber, wenn man die Verhältnisse nicht einseitig (? R.) auffassen wolle, scharfe Trennungen sich nicht durchführen lassen, da so viele Uebergänge vorlägen. Kölliker weist hierbei einerseits darauf hin, dass bei den Epithelial- und Drüsensekreten neben den flüssigen auch solche vorkommen, die mehr oder weniger fest werden. Dahin gehören die Eihüllen, die im Eileiter, Uterus etc. sich um die Eier absetzen; desgleichen die Kapseln um entwickelte Sa-

gleichen zeige sich an vielen verkalkten Zellausscheidungen, die als Secretionsprodukte gelten, ein röhriger Bau (Acephalen). In Betreff jenes Charakters geformter Zellausscheidungen, nach welchem sie von Anbeginn fest auftreten sollen, werden keine Ausnahmen beigebracht. Allein, wenn sie wirklich Ausscheidungsprodukte sind, so ist nach des Ref. Ansicht nicht zu zweifeln, dass sie gleichfalls ursprünglich flüssig auftreten. In einem solchen halbflüssigen Zustande sah gelegentlich Ref. die Epithelialsäume der Darmcylinder.

Der obigen Auseinandersetzung entsprechend theilt Kölliker die Extracellulärsubstanzen und Epithelialsekretionen ein in: 1. Wahre flüssige Ausscheidungen; 2. erhärtende Sekrete von mehr zufälliger (? R.) Form (Eischalen, Samenkapseln, Seide, Spinnfäden); 3. Ausscheidungen mit bestimmter Form, ohne besondere Struktur, (Cephalophoren-Gehäuse, Panzer und Gehäuse von Insekten, Polypen, Bryozoen etc., Byssus); 4. Wahre geformte Zellausscheidungen häufig von besonderer Struktur (Einseitige Verdickungen an Zellen, secundäre Zellmembranen, Cuticulae und Chitinpanzer, Membr. propriae).

Ebenso wenig als bei den geformten Zellausscheidungen auf freier Oberfläche (Extracellulärsubstanzen K.) und den Drüsensekreten soll nach dem Verf. auch zwischen den Interzellulärsubstanzen und den parenchymatischen Flüssigkeiten keine scharfe Grenze zu ziehen sein; eine Ansicht, die aus der verschiedenen Konsistenz der Grundsubstanz der Binde substanzgebilde und den Colloïdgeschwülsten abgeleitet wird.

Was den Bau der geformten Zellausscheidungen betrifft, so sind dieselben entweder homogen oder lamellös oder in der Richtung der Dicke fasrig (Kiefer und viele Cuticulae der Mollusken, Schalen der Acephalen, Zahnschmelz). Von diesen Anordnungen ist der lamellöse aus der schichtweisen Ablagerung, der fasrige in gewissen Fällen durch polygonale Zeichnung im Querschnitt ausgezeichnete, durch die Abhängigkeit der Absonderungsprodukte von den sie ausscheidenden Zellen der Epithelien zu erklären. Auch der Fläche nach treten in gewissen Cuticularbildungen Fasern auf (Cuticulae der Anneliden, Rundwürmer, Chitinpanzer gewisser Insekten), und diese sind wahrscheinlich durch secundäre Spaltung ursprünglich homogener Lamellen entstanden. Sehr verbreitet sind in den geformten Zellausscheidungen die Porenkanälchen (Darmcylinder vieler Thiere, Epidermiszellen von *Ammocoetes* und *Petromyzon*, Dotterhäute vieler Fische, der Holothuriern, Chitinpanzer der Krustaceen, Arachniden, Insekten, Schalen vieler Acephalen, Zungenzähne einiger Mollusken, Acetabularringe der Tintenfische, Cuticulae mancher Anneliden. Diese Poren sind meist unter $\frac{1}{1000}$ ''' dick, verlaufen meistentheils gerade durch die Cuticularbildungen

c) Einseitige (? R.) und allseitige Ausscheidungen an Zellenkomplexen der Bindesubstanz: Grundsubstanz der Knorpel und Knochen, sofern dieselbe nicht von secundären Membranen der Zellen gebildet wird; Grundsubstanz vieler Formen von weicher Bindesubstanz (Schleimgewebe, Gallertgewebe höherer und niederer Thiere); Grundsubstanz der cellulosehaltigen Hüllen der Tunicaten; Grundsubstanz des Zahnbeins; eigentliche Scheide der *Chorda dorsualis*.

Mit Wahrscheinlichkeit liessen sich in diese Aufzählung noch aufnehmen: Kiefer der Anneliden, Borsten derselben, die hornigen Penes der Rundwürmer, der Liebespfeil der Schnecken, Krystallstiel der Acephalen, Kauapparat der Rotiferen, der Panzer dieser Thiere, der Infusorien, Polythalamien, Stachel des Rüssels der Nemertinen, Hacken der Cestoden etc.

Der Verfasser ist dann weiter bemüht, die so eben angegebenen Bildungen von den gewöhnlichen Drüsen- und Epithelialsekreten und von der paremchymatischen Flüssigkeit (Interellularflüssigkeit K.) zu unterscheiden und gelangt hierbei zu einem Resultat, das sich nach der obigen Zusammenstellung voraussehen lässt. Der Verf. ist nämlich schliesslich der Ansicht, dass zwar gewisse Unterschiede zwischen geformten Zellenausscheidungen und Sekretionsprodukten bemerkbar seien, dass aber, wenn man die Verhältnisse nicht einseitig (? R.) auffassen wolle, scharfe Trennungen sich nicht durchführen lassen, da so viele Uebergänge vorlägen. Kölliker weist hierbei einerseits darauf hin, dass bei den Epithelial- und Drüsensekreten neben den flüssigen auch solche

gleichen zeige sich an vielen verkalkten Zellausscheidungen, die als Secretionsprodukte gelten, ein röhriger Bau (Acephalen). In Betreff jenes Charakters geformter Zellausscheidungen, nach welchem sie von Anbeginn fest auftreten sollen, werden keine Ausnahmen beigebracht. Allein, wenn sie wirklich Ausscheidungsprodukte sind, so ist nach des Ref. Ansicht nicht zu zweifeln, dass sie gleichfalls ursprünglich flüssig auftreten. In einem solchen halbflüssigen Zustande sah gelegentlich Ref. die Epithelialsäume der Darmcylinder.


Der obigen Auseinandersetzung entsprechend theilt Kölliker die Extracellulärsubstanzen und Epithelialssekretionen ein in: 1. Wahre flüssige Ausscheidungen; 2. erhärtende Sekrete von mehr zufälliger (? R.) Form (Eischalen, Samenkapseln, Seide, Spinnfäden); 3. Ausscheidungen mit bestimmter Form, ohne besondere Struktur, (Cephalophoren-Gehäuse, Panzer und Gehäuse von Insekten, Polypen, Bryozoen etc., Byssus); 4. Wahre geformte Zellausscheidungen häufig von besonderer Struktur (Einseitige Verdickungen an Zellen, secundäre Zellmembranen, Cuticulae und Chitinpanzer, Membr. propriae).

Ebenso wenig als bei den geformten Zellausscheidungen auf freier Oberfläche (Extracellulärsubstanzen K.) und den Drüsensekreten soll nach dem Verf. auch zwischen den Inter-cellulärsubstanzen und den parenchymatischen Flüssigkeiten keine scharfe Grenze zu ziehen sein; eine Ansicht, die aus der verschiedenen Konsistenz der Grundsubstanz der Binde-substanzgebilde und den Colloidgeschwülsten abgeleitet wird.

Was den Bau der geformten Zellausscheidungen betrifft, so sind dieselben entweder homogen oder lamellös oder in der Richtung der Dicke fasrig (Kiefer und viele Cuticulae der Mollusken, Schalen der Acephalen, Zahnschmelz). Von diesen Anordnungen ist der lamellöse aus der schichtweisen Ablagerung, der fasrige in gewissen Fällen durch polygonale Zeichnung im Querschnitt ausgezeichnete, durch die Abhängigkeit der Absonderungsprodukte von den sie ausscheidenden Zellen der Epithelien zu erklären. Auch der Fläche nach treten in gewissen Cuticularbildungen Fasern auf (Cuticulae der Anneliden, Rundwürmer, Chitinpanzer gewisser Insekten), und diese sind wahrscheinlich durch secundäre Spaltung ursprünglich homogener Lamellen entstanden. Sehr verbreitet sind in den geformten Zellausscheidungen die Porenkanälchen (Darmcylinder vieler Thiere, Epidermiszellen von *Ammocoetes* und *Petromyzon*, Dotterhäute vieler Fische, der Holothuriern, Chitinpanzer der Krustaceen, Arachniden, Insekten, Schalen vieler Acephalen, Zungenzähne einiger Mollusken, Acetabularringe der Tintenfische, Cuticulae mancher Anneliden. Diese Poren sind meist unter $\frac{1}{1000}$ dick, verlaufen meistens gerade durch die Cuticularbildungen

ticipienten in der Struktur, Textur, überhaupt in der morphologischen Organisation eines organisirten Bestandtheiles oder auch des Gesamtkörpers der organischen Geschöpfe verwerthet und verrechnet sein müssen. Auf diese Weise ist es geschehen, dass das im ganzen Körper verbreitete thierische Wasser, die etwa zwischen den glatten Muskelfasern befindliche parenchymatische Flüssigkeit und die Grundsubstanz der Bindesubstanzgebilde, desgleichen der Skelete wirbelloser Thiere und das abfliessende Exkret einer Schleimhaut zusammengestellt und unter eine Einheit subsummirt worden sind. Auf diesem Wege giebt es in der That keine scharfen Grenzen, und es könnten mit aller Konsequenz noch eine Menge andere Exkrete in Betracht gezogen werden. Ref. weiss wohl, dass es einen Standpunkt giebt, auf welchem wir von dem bezeichneten Unterschiede absehen und nur die Stoffwechsel-Thätigkeit und die physiologisch-chemische Seite der Zellen und Zellenkomplexe im Auge behalten können. — Allein dieser Standpunkt ist nicht der, auf welchem sich die angeregte Tagesfrage befindet, welche in erster Instanz und in ihrer Grundlage der Morphologie angehört. Die parenchymatische Flüssigkeit, die reinen Secre oder Exkrete, mögen sie flüssig bleiben oder fest werden, — und im letzteren Falle entweder amorph, wie das Harz, oder unter Umständen geformt, wie Spinnfäden, auftreten, — sind nicht in ein Gebiet hinüber zu ziehen, auf welchem es sich um die morphologische Organisation eines organisirten Körpers handelt.

3. In Betreff der hierher gehörigen Zellausschei-



ihnen die Intercellular- oder Grundsubstanz absetzt, vorher sind es morphologisch indifferente Zellen. Man darf daher im Sinne der morphologischen Organisation und auf dem systematisch-morphologischen Standpunkte weder von freien Blut- und Bindesubstanz-Körperchen, noch von freier Intercellular- oder Grundsubstanz des Blutes und der Bindesubstanzgebilde sprechen. Die von Schacht hervorgehobene Unterscheidung zwischen Gebilden dieser Gruppe, bei welchen das Abscheidungsprodukt mehr konform der Zelle, und denjenigen, bei welchen dasselbe mehr diffus zwischen den Zellen abgesetzt wird, findet ihre vollkommene Begründung. Auch ist es richtig, dass nicht allein beim Blut, sondern auch bei den Bindesubstanzgebilden während der ersten Bildung und vor der Veränderung durch das Alter und Krankheit niemals Zellenkapseln wahrgenommen werden, wie beim Zellgewebe der Pflanzen. (Virchow's Kapsel der Knorpelkörperchen wird durch eine, erst im Alter oder bei Krankheit in der ursprünglich homogenen Grundsubstanz eintretende Sonderung produziert; die Angaben über verdickte Zellmembranen der Knorpelkörperchen, desgleichen über Kapseln der Knorpelkörperchen in normaler Knorpelsubstanz beruhen nach den Erfahrungen des Ref. auf optischer Täuschung.) Allein es lässt sich mit Rücksicht auf die Eihüllen wohl nicht behaupten, dass in dem angegebenen Unterschiede sich zugleich ein Charakter der pflanzlichen und thierischen Gewebe zu erkennen gebe. — Bei der zweiten Gruppe behält das Ausscheidungsprodukt in allen Fällen nur die Bedeutung eines Exkretes der Zellen, von denen es geliefert wurde, bei. Ob das Absonderungsprodukt von seinen Zellen ganz entfernt und als geformter Stoff zur Eihülle verwendet wird, oder ob dasselbe mit seinen Zellen mehr oder weniger in Berührung bleibt, seine Natur als Exkret, als ein accessorischer Theil für das absondernde Zellengebilde tritt überall unverkennbar hervor, das Abscheidungsprodukt und seine Zellen gehen nicht in einen gemeinschaftlichen, morphologischen Bildungsprozess ein, bilden daher auch niemals ein morphologisch untrennbares und zusammengehöriges Ganze. Daher sind denn auch die Cuticularbildungen und Epithelialsäume für den histologischen Charakter der Epithelien nicht zu verwerthen. Wie die Exkrete der Epithelien in chemischer Beziehung für den Stoffwechsel im Körper ihre Verwendung finden, so werden sie, flüssig oder mehr weniger fest, auch in mechanischer Beziehung als schützende Decke, Stütze, Skelet verwerthet. Es liegt wohl auf der Hand, dass die beiden so eben besprochenen Kategorien oder Gruppen von Gebilden in den organischen Körpern nicht zusammengeworfen werden dürfen, dass man sie vielmehr, auf dem morphologischen Standpunkte, streng auseinander halten müsse. Eine Kontroverse und Unsicherheiten können da-

durch herbeigeführt werden, dass die Genesis eines fraglichen Gebildes noch nicht sicher festgestellt ist und verschiedene Ansichten aufzuweisen hat.

4. In Betreff der von dem Verf. mitgetheilten, sehr zahlreichen und schätzbaren, einzelnen Beobachtungen glaubt Ref. schliesslich noch folgende Bemerkungen hinzufügen zu müssen. Ob alle Formbestandtheile, welche von Kolliker in den Bereich der unter Vermittelung von Zelenausscheidungen entstandenen Gebilde hinübergezogen sind, auch wirklich dahin gehören, und zu welcher von beiden Kategorien dieselben gerechnet werden müssen, darüber möchte in manchen Fällen noch das Resultat genauer und unbefangener, genetischer Forschungen abzuwarten sein. Gleichwohl darf Ref. schon jetzt seine Zweifel hinsichtlich der Hornzähne der Batrachierlarven und der intermediären Haut, der Tunica propria der Drüsenelemente etc. von Neuem wiederholen. Des Ref. Bedenken gegen die Hornzähne der Batrachierlarven in der Kolliker'schen Fassung sind bereits im Jahresbericht 1854 (Müll. Arch. 1855, p. 18) ausgesprochen. Der Verf. hat gegen diese Zweifel ganz einfach einige Abbildungen (a. a. O. fig. 32) veröffentlicht, aus welchen hervorgehen soll, dass jeder Zahn als eine einseitige Ausscheidung an einer Epidermiszelle sich entwickele. Nach wiederholter Prüfung an Larven von *Rana temporaria* muss Ref. darauf bestehen, dass in dem Hohlraum der Hornzähne nicht eine Zelle, sondern eine papillenartige Matrix des bindegewebigen Substrats der Lippe sich befindet. Es ist nicht schwer, durch Druck, namentlich nach

die merkwürdigsten, sogar völlig sich widersprechenden, genetischen Deutungen erfahren. In solchen Fällen hat die Wissenschaft die klaren, vorliegenden Beispiele zur Richtschnur zu nehmen und zugleich die Lücken durch Berücksichtigung der allgemeinen morphologischen Verhältnisse in der Organisation zu füllen. In dieser Beziehung darf Ref. hervorheben, dass die Hornhaut mit ihrer vorderen glashellen Lamelle und der an der hinteren Fläche gelegenen Tunica Demoursii ein ganz besonders geeignetes Object abgibt, die Entstehung der unter den Epithelien oft ausgebreiteten glashellen Häute zu studiren. Man kann sich hier genau überzeugen, dass die genannten Lamellen durch allmälige Umwandlung des faserknorpelähnlichen Substrats der Cornea an der genannten Stelle gebildet werden. Auch an der intermediären Haut der Cutis, des Haarsackes, an den Tunicae propriae der Schweissdrüsen, Talgdrüsen, der grossen Drüsen im Proventriculus des Hühnchens lässt sich die Entstehung so weit verfolgen, dass man leicht die Ueberzeugung gewinnt, man habe es mit einer modificirten Grenzschicht des bindegewebigen Substrats der daselbst vorkommenden Epithelien zu thun. Wenn man nun ferner die Lagerungsverhältnisse der fraglichen Häute im fertigen Zustande, desgleichen ihre kontinuierlichen Verbindungen mit anerkannten bindegewebigen Substanzen in Betracht zieht, so darf über ihren histologischen Charakter als Bindesubstanzgebilde um so weniger gezweifelt werden, als nicht eine einzige, zuverlässige Erscheinung, nicht eine einzige Thatsache für ihre Entstehung aus einem Exkret der Epithelialzellen beigebracht werden kann.

Die Vorstellung, dass die Epithelial- und Drüsenzellen durch Ausscheidungsprodukte an ihrer Befestigungsstelle sich eine Unterlage, ein Substrat schaffen und, so zu sagen, sich selbst ihre Gebäude bauen, hängt unmittelbar mit einer andern zusammen, die sich ganz allmähig in der Wissenschaft die Bahn gebrochen und gegenwärtig sogar mit einer gewissen Vorliebe von namhaften Forschern gepflegt wird: mit der Vorstellung nämlich, dass die Epithelien und Drüsenzellen bei der morphologischen Organisation und Bildung gewissermaassen als regulatorische Apparate anzusehen seien, und dass das darunter gelegene, Gefässe und Nerven führende Substrat, resp. die Matrix, eine völlig untergeordnete, accessorische Bedeutung habe. Ref. erinnert daran, dass Kölliker durch Fortsätze des Malpighi'schen Netzes der Epidermis den Haarsack, die Talgdrüsen, desgleichen die Schweissdrüsen in das Corium gleichsam eindrücken und das Haar sich bilden lässt. In demselben Sinne hat Remak sein Hornblatt behandelt, und in den Entwicklungsplan des Wirbelthieres das Drüsenblatt eingeführt, obschon die erste Drüse, die im Embryo auftritt, die Wolff'schen Körper, sich an

diesen Plan nicht kehren und, wie Remak zugeben muss, das dargebotene Drüsenblatt zur Entstehung nicht benutzen. Man hat ehemals die Epidermis und Drüsenzellen in ihrer wichtigen physiologischen und morphologischen Bedeutung allerdings verkannt, oder richtiger nicht gekannt und dieselben irrthümlich für ein Exkret des Substrats angesehen. Die entgegengesetzte Wendung, die gegenwärtig die Angelegenheit genommen hat, scheint dem Ref. in einen grösseren Fehler zu verfallen, da die morphologischen und physiologischen Eigenschaften des gefäss- und nervenhaltigen Substrats hinlänglich gekannt sind, und wir dennoch Vorstellungen huldigen, welche mit diesem Verhalten im Widerspruch sich befinden. Die Entwicklungsvorgänge im Embryo, wenn man sie unbefangen zu würdigen und zu beurtheilen versteht, bieten denselben wahrlich keine Stützpunkte dar. Die Kölliker'sche und Remak'sche Darstellung von der Bildung des Haarsackes, des Haares etc. ist durch Reissner (Beiträge zur Kenntniss der Haare etc., 1854, p. 91 ff.) zur Genüge widerlegt. Wenn ferner bei der Bildung der Hautdrüsen das Corium sich einsenkt und die eingestülpte oder eingesenkte Stelle von einer Fortsetzung der Epidermis eingenommen wird, wie kann man wohl diesen Bildungsvorgang so hinstellen wollen, als ob das Hornblatt die Hautdrüsen baue und das Corium nebenher laufe! Wie gesucht und gezwungen ist es nicht von einem Drüsenblatt zu sprechen, wenn eine so wichtige und zwar die erste Drüse des Wirbelthierkörpers daraus sich nicht entwickelt, auch die Hautdrüsen und andere Drüsen sich von ihm lossagen, und endlich bei

hierbei auf das die allgemeine Form des Höhlensystems bedingende Moment Rücksicht nimmt, so wird man dem Substrate des Drüsenzellen-Epitheliums, grade so wie bei der Matrix des Horngebildes, den Hauptantheil an dem Bildungsprozesse vindiciren müssen. Diese, den Entwicklungserscheinungen entsprechende, natürliche Auffassung der Bildung einer Drüse wird in keiner Weise dadurch alterirt, dass letztere zufolge eines organologischen Knospenbildungsprozesses in Form von Einstülpungs- oder Ausstülpungsbildungen sich zu erkennen geben. Es würde den Ref. zu weit vom Wege abführen, wollte er auf die, so eben aufgenommene wichtige Frage ausführlicher eingehen; für den Bericht genügt es, die ganze Tragweite der Köl liker'schen Arbeit angedeutet und so für die weiteren Forschungen bestimmte Gesichtspunkte angebahnt zu haben.

Jedes Jahr bringt uns eine Anzahl von Mittheilungen und Ansichten über die Entstehung und Bildung der Zelle. Ref. hat es absichtlich vermieden, mit jenen Angaben vorliegenden Bericht zu füllen. Die Frage ist auf Grundlage der uns bekannten Erscheinungen zur Genüge erschöpft; neue, zuverlässige und beachtungswerthe Seiten werden uns nicht dargeboten. Auf dem gegenwärtigen Standpunkte der Zellengenesis dürfte als gesichert zu betrachten sein: 1) dass die exogene Zellenbildung grade so, wie es J. Müller von der Generat. aequivoca gesagt hat, als etwas Unerwiesenes und Unerweisliches dastehe; 2) dass die Schleiden-Schwann'sche Theorie der Zellenbildung, wonach die Zellmembran sich um den durch Präcipitation gebildeten Kern niederschlagen sollte, durch genaue Thatsachen nicht zu begründen gewesen ist; und 3) dass bei der Zellenbildung konstant der Inhalt einer Mutterzelle in toto oder in Portionen sich theilt. Weniger gesichert erscheint dem Ref. die Ansicht, dass auch das Kernkörperchen, der Kern und selbst die Zellmembran der Mutterzelle (durch sogenannte Abschnürung und Theilung) direkt an den gleichnamigen Bestandtheilen der Brutzelle participiren.

Der Hauptunterschied der Zellenbildung um den ganzen oder um gesonderte Portionen des Mutterzellinhaltes von der letzteren, der sogenannten Zellenbildung durch Theilung, ist der, dass im ersteren Falle das Kernkörperchen, der Kern und die Membran der jungen Zelle durch Sonderungsakte aus dem Mutterzellinhalte selbst hervorgehen, und der Schwerpunkt der Zellenbildung also in dem Mutterzellinhalte gegeben ist, während im letzteren Falle das Kernkörperchen, der Kern und die Zellmembran der Mutterzelle die Hauptrolle bei der Bildung der jungen Zelle spielen, und der Mutterzellinhalt sich passiv verhält und in den Hintergrund gestellt wird. Solche Unterschiede in der Zellengenesis dürfen nicht mehr als Variationen einer und derselben Norm betrachtet

werden; sie bedingen in der That zwei ganz verschiedene Normen der Zellenbildung, und die Produkte so verschiedener Bildungsprozesse dürften dann, nach des Ref. Ermessen, auch nicht mehr als gleichartige Körper anzusehen sein. Da diese letztere Konsequenz begründete Zweifel erweckt, so wird die Annahme zweier, so verschiedener Normen in der Zellengenesis bedenklich, und die Festsetzung derselben um so grössere Vorsicht erfordern, als ihre Verwechselung sehr leicht stattfinden kann und auch stattgefunden hat. Durch die Botaniker ist in den letzten Jahren die Zellenbildung durch Theilung auch bei uns nicht allein in Aufnahme gekommen, sondern überall als Schema für die Beurtheilung der Erscheinungen hingestellt. Es sind aber besonders die mit Zellstoff-Ausscheidungen komplicirten Zellenbildungsprozesse der Pflanzenzelle, welche zu der Annahme einer Zellenbildung durch Theilung geführt haben. Wenn man indess jene Erscheinungen, die sich auf die Bildung der Zellstoffkapsel beziehen, als nicht zur Zellengenesis direkt gehörig in Abzug bringt, so überzeugt man sich leicht, dass ein exakter Beweis für direkte Betheiligung der eigentlichen Mutterzellmembran (Primordialschlauch) an der Bildung der Brutzellmembranen nicht zu führen ist.

Bei den Thieren bietet der Furchungsprozess bekanntlich die günstigste Gelegenheit für das Studium der Zellengenesis dar, und dennoch bleibt Vieles zu wünschen übrig. In neuerer Zeit hat man hier grade die Zellenbildung durch Theilung in Anwendung gebracht, und scheint dabei besonders durch die künstlichen Häute verleitet worden zu sein,

diese Trennung zuerst am schwarzen Pole beginnt und von dort allmählig weiter schreitet, ist noch nicht erklärt. Allein dieser Umstand darf eben so wenig gegen obige Deutung herbeigezogen werden, als es Niemand einfallen wird, deswegen gegen die Ansicht, dass hier eine Zellenbildung durch Theilung vorliege, aufzutreten, weil wir keine Ursache anzugeben wüssten, warum die Mutterzellmembran sich zuerst am schwarzen Pole einzuschnüren beginne.

Der Furchungsprozess, insofern er ein Zellenbildungsprozess ist, beginnt aber nicht mit der Bildung der beiden ersten Furchungskugeln und mit dem Auftreten der ersten Furche; er nimmt vielmehr seinen Anfang mit der Umwandlung des Bildungsdotters in toto in die erste und einzige Furchungskugel, aus welcher dann die gewöhnlich sogenannten „beiden ersten“ Furchungskugeln hervorgehen. Die darauf bezüglichen Erscheinungen sind schon lange bekannt; man sagt, der Bildungsdotter ziehe sich auf kleineres Volumen zusammen und werde von der Dotterhaut durch ein mit Flüssigkeit gefülltes Interstitium getrennt. Ref. hat bereits in seiner Abhandlung (Müll. Arch. 1846) nachgewiesen, dass auch diese erste Furchungskugel eine Membran besitze, einen bläschenförmigen Kern enthalte und sich von allen späteren Furchungskugeln eben nur durch ihre Grösse unterscheide. Die Bildung dieser ersten Furchungskugeln ist darum so werthvoll, weil sie einfach ist und durch keine Erscheinungen complicirt wird, durch die man auf den Gedanken einer Zellenbildung durch Theilung geleitet werden könnte. Die Eihüllen liegen unverändert und getrennt von der ersten Furchungskugeln da; das Keimbläschen ist schon vorher geschwunden und durch seine Grösse, sowie durch seine zahlreichen Keimflecke bei einigen Thieren (Frösche, Fische) so ausgezeichnet, dass eine Verwechselung mit dem bläschenförmigen Kern der ersten Furchungskugeln nicht stattfinden kann. Zellmembran und Zellkern der ersten Furchungskugeln müssen durch Sonderung in dem Bildungsdotter selbst, nachdem derselbe mit der Materie des Keimbläschens und dem männlichen Befruchtungsstoffe sich gemischt hat, hervorgegangen sein. Wenn wir auch nicht wissen, wie diese Sonderung zu Stande kommt, so ist es doch eine Thatsache, dass sie stattgefunden hat, und dass darin ein wesentlicher Unterschied von der angenommenen Zellengenesi durch Theilung gegeben ist. Erwägt man also, dass die Furchungskugeln, sie mögen grösser oder kleiner sein, jedenfalls gleichartiger Natur sind, dass gleichartig organisirte Körper auch gleichartige Bildung haben müssen, dass ferner für die erste Furchungskugel eine direkte Bildung aus dem formlosen Mutterzelleninhalte, ohne unmittelbare Betheiligung einer Zellmembran und eines Zellkernes, feststeht, dass endlich auch

bei den späteren, paarig auftretenden Furchungskugeln die unmittelbare Betheiligung des Mutterzellenkerns, sowie der Mutterzellmembran mit Sicherheit nicht erwiesen ist und ganz bestimmte Erscheinungen sogar für eine Bildung aus paarigen Inhaltsportionen der Mutterzelle sprechen, — so sind wahrlich Gründe genug vorhanden, um die heut zu Tage so beliebte Zellenbildung durch Theilung mit Vorsicht aufzunehmen, dieselbe nicht als eine ausgemachte Sache in die Handbücher einzuführen und so von vornherein der Auffassung und Deutung der Erscheinungen eine so zweifelhafte Unterlage zu unterbreiten.

Ueber den Furchungsprozess der Sagitta sind von Gegenbaur Beobachtungen mitgetheilt. (Aus dem 4. Bande der Abhandlungen der naturf. Gesellsch. zu Halle.) Ref. kennt die Arbeit des Verf. nur aus Leydig's Bericht. (Canst. Jahresb. vom Jahre 1856, p. 19). Nach Gegenbaur beginnt der Furchungsprozess bei Sagitta mit dem Auftreten der ersten beiden Furchungskugeln. Der ersten Furchungskugel erwähnt der Verf. nicht. Sind 4 Furchungskugeln vorhanden, so bleibt im Centrum der Dotterkugel zwischen den daselbst mit abgerundeten Kanten zusammentreffenden Kugelabschnitten ein Hohlraum. Dieser Hohlraum ist auch in späteren Stadien des Furchungsprozesses vorhanden, und um ihn sind die pyramidenförmig gestalteten Furchungskugeln so angeordnet, dass die Spitze derselben gegen das Centrum des Dotters, die abgerundete Basis gegen die Oberfläche gewendet ist. In Bezug auf die, im Furchungsprozess vorliegende Zellengenesi sind folgende Mittheilungen hervorzu-

als wahrscheinlich vorhanden postulirt. — In der Substanz des Sagittendotters unterscheidet Gegenbaur die Grundsubstanz und die darin eingebetteten, sehr zahlreichen, sich gegenseitig durch Druck etwas abplattenden Dotterkörperchen. Diese Körperchen zeigen ähnlich, wie es Ref. bei *Strongylus auricularis* beobachtet hatte, eine radienförmige Anordnung um den neu gebildeten Kern; doch bleibt zwischen ihnen und dem letztern eine körperchenfreie Gegend.

Die exogene Zellenbildung hat J. Henle von Neuem zu vertheidigen gesucht. (Bericht etc. Zeitsch. für rat. Med., dritte Reihe Bd. I. p. 8 ff.) Der Leser wird erwarten, dass der geehrte Verf. Thatfachen beibringe, aus welchen die exogene Zellenbildung unzweifelhaft hervorgehe oder auch nur höchst wahrscheinlich gemacht würde. Dieses geschieht nicht. Henle verweist vielmehr auf die Geschichte der Generatio aequivoca, — eine Geschichte, die uns so klar vor Augen führt, mit welchen Opfern an Zeit, Mühe und Schreibmaterial ein Irrthum aus der Wissenschaft beseitigt werden musste, und die der grösste Anatom und Physiologe unseres Jahrhunderts mit den Worten abschloss, dass die Generatio aequivoca der exakten Forschung sich als etwas Unerwiesenes und Unerweisliches entziehe. Ganz mit denselben Worten lässt sich die exogene Zellenbildung abthun, wenn man sich auf den natürlichen Standpunkt stellt, die Beweise für die exogene Zellenbildung abfordert und diese einer gründlichen Kritik unterwirft. Natürlich ist aber dieser Standpunkt, weil die endogene Zellenbildung im ganzen Pflanzenreich und im Thierreich überall, wo sich eine genaue Untersuchung hat anstellen lassen, als eine allgemein verbreitete Thatsache, als ein Naturgesetz für die Zelle nachgewiesen ist, und eine Einsprache dagegen thatsächlich festgestellt werden muss. Unsern Verf. finden wir nicht auf diesem natürlichen Standpunkte. Indem Henle auf die Geschichte der Generatio aequivoca hinweist, verlangt er vielmehr, dass wir auf dem histologischen Gebiete überall, wo Zellen entstanden sind, die exogene Bildung derselben auf positivem oder negativem Wege widerlegen sollen. Zu den positiven Thatfachen werden alle Aufschlüsse gerechnet, durch welche der Nachweis geliefert wird, dass die irgendwo neu aufgetretenen Zellen, namentlich aber solche, welche Henle und seine Anhänger für exogen gebildet verausgabt haben, auch wirklich endogen gebildet seien. Den Ausschlag jedoch, — so meint Henle, — geben erst die negativen Thatfachen, welche zu beweisen haben, dass mit dem Ausschluss aller Zellen, die zu Mutterzellen werden können, die Neubildung von Zellen, also die exogene Zellenbildung, unmöglich gemacht wird. Man sieht wohl, dass der Verf. logisch vorgeschritten ist; allein man überzeugt sich auch leicht, auf welchen Widerspruch Henle mit dem grade entscheidenden

Postulate gerathen ist, indem er verlangt, dass wir auf histologischem Gebiete, also in unserem Organismus alle Zellen excludiren sollen, die möglicherweise zu Mutterzellen werden können. Indem Henle zur Kritik der negativen und positiven Thatsachen gegen die exogene Zellenbildung übergeht, wird es auch sofort klar, dass er es nicht so ernst mit den negativen Thatsachen gemeint hat. Als Versuch einer solchen negativen Beweisführung wird nämlich die Untersuchung Kölliker's über das Vorkommen von Lymphkörperchen in den Anfängen der Lymphgefäße (Zeitsch. für wiss. Zool. Bd. 7, p. 182 ff.) angesehen. Der Chylus, die Lymphe sind früher von Henle und anderen Forschern ebenso wie das Malpighische Netz, der Eiter etc. als Orte bezeichnet, wo exogene Zellenbildung stattfinden sollte. Einen exakten Beweis hat man nicht geliefert und konnte ihn nicht liefern; darum ist in diesen Berichten auch niemals irgend ein Werth auf solche Behauptungen gelegt worden. Es gehört in der That nur eine geringe Ueberlegung dazu, sich zu überzeugen, dass hier überall, wie überhaupt in unserem Körper, von einer Ausschliessung solcher Zellen, die als Mutterzellen der neu auftretenden Zellen dienen können, nicht die Rede sein darf, und dass vielmehr die Anhänger der exogenen Zellenbildung anzunehmen liebten, es seien dergleichen Zellen nicht vorhanden. Diese Annahmen wurden später beseitigt, indem man mit einer Gewissheit, die unter den obwaltenden Umständen möglich war, diejenigen Zellen nachwies, aus welchen die Zellenbrut sich entwickelt hat. Für die Lymphkörperchen wurde es höchst wahrscheinlich

Taktik hat sie mit den Anhängern der *Generatio aequivoca* gemein. Es scheint dem Ref. zweckmässig, dass man der exogenen Zellenbildung in ihre Schlupfwinkel nicht folge und überall, wo die endogene Zellenbildung nicht genau nachzuweisen ist, vielmehr einfach das „*nescimus*“ bekenne, als durch mangelhafte Beobachtung sich eine Blösse gebe, gegen die dann, wie es auch von Henle in seiner Besprechung über die positiven Beweisführungen geschieht, mit vollem Rechte zu Felde gezogen werden kann. Ref. geht auf diese Mittheilungen Henle's, denen er in den meisten Fällen beistimmen muss, nicht näher ein, und glaubt das Kapitel über die exogene Zellenbildung nicht früher wieder aufnehmen zu dürfen, als bis die Anhänger derselben nicht blos Behauptungen, sondern auch solche Thatsachen beigebracht haben, die einer genauen Untersuchung und Nachprüfung zugänglich sind.

Zu den räthselhaftesten Lebenserscheinungen der Zelle und ihrer Derivate gehören die sichtbaren Bewegungserscheinungen. Wir unterscheiden solche, die als Strömungen im Zellinhalte sich zu erkennen geben, und solche, die als Formveränderungen der ganzen Zelle oder deren Abkömmlinge oder eines Theiles derselben auftreten und am bekanntesten an den Muskelfasern, an den sarcode-ähnlichen Substanzen, an den Cilien sind. Bei den zuletzt erwähnten Bewegungserscheinungen besteht die Kontroverse, ob die Bewegungsursache in der Membran oder in dem Zellinhalte oder in beiden Bestandtheilen der Zelle zugleich zu suchen sei, obschon nach des Ref. Ansicht Vieles zu Gunsten der Zellmembran spricht. Eine andere Kontroverse berührt die Frage, ob die genannte Eigenschaft in gewissem Grade allen, wenigstens vollaftigen Zellengebilden zukomme oder erst bei bestimmter, histologischer Ausbildung zum Vorschein trete und also nicht als eine allgemeine Eigenschaft der Zelle anzusehen wäre. In Beziehung auf die letztere Frage sind mehrere Beobachtungen durch Leuckart (die Blasenwürmer etc. Giessen 1856, p. 121 in der Anmerk.) durch W. Busch (Müll. Archiv 1856 p. 415 ff.) und Kölliker (Sur des mouvements particuliers et quasi spontanés des cellules plasmatiques de certains animaux. Gaz. hebdomadaire de med. et de chir. No. 45, 1856.) mitgetheilt worden.

Leuckart erwähnt, dass er an den isolirten Leberzellen eines mit Blasenwürmern gefütterten Kaninchens nicht selten langsame, aber doch sehr deutliche amöbenartige Bewegungen wahrgenommen habe. — Busch beobachtete Bewegungserscheinungen an den Pigmentzellen der nackten Amphibien. Der Verf. hatte seine erste Beobachtung an einem Stückchen pigmentirter Haut der Froschlarve gemacht; später wurde die Untersuchung an unversehrten Thieren, an jungen Tritonen mit äusseren Kiemen und an Froschlarven mit schon entwickelten, hinteren Extremitäten wiederholt. Die Lücken

und Strahlen entziehen sich dem Blicke, das sternförmige Pigmentkörperchen wird zu einem Fettklumpen; dann treten die Strahlen wieder hervor, und die sternförmige Form des Körperchens stellt sich unter unseren Augen wieder her. Busch macht darauf aufmerksam, dass sich die durch Kontraktion herbeigeführten Veränderungen des sternförmigen Pigmentkörpers zwar so ausnehmen, als ob die Strahlen und Ausläufer eingezogen würden und darauf wieder hervortreten, dass aber wahrscheinlich nur die Pigmentkörnerchen durch Annäherung der kontrahierten Membran aus den Strahlen verdrängt werden, und dass dadurch letztere dem Blicke sich entziehen. Man sieht nämlich häufig an der Stelle, wo die Strahlen geschwunden sind, feine, entsprechend verlaufende Linien hinziehen. Desgleichen wurde beobachtet, dass sich von entwickelten, sternförmigen Pigmentkörpern, in Folge der Formveränderung durch die ausserordentliche Kontraktilität, scheinbar Parteen von einem Drittheil der ganzen Zelle abschnürten. Anfangs wird die Hauptmasse und das abgelöste Stück noch durch eine mit Pigmentkörnerchen gefüllte Anastomose in Verbindung gehalten; dann schwindet in der letzteren das Pigment gänzlich, und beide Theile scheinen nun völlig von einander getrennt zu sein. Später jedoch findet sich das Pigment wieder ein, und die Anastomose wird dadurch in der früheren Weise wieder sichtbar; ebenso stellt sich die ursprüngliche Form des sternförmigen Pigmentkörpers wieder her. Um also die durch die Kontraktion herbeigeführten Formveränderungen des sternförmigen

Spezieller Theil.

Eier und Samenkörperchen.

Die Beobachtungen Reicherts über die Mikropyle der Fischeier und über die Eihüllen derselben im Allgemeinen sind in Müller's Archiv (1856, p. 83 ff.) niedergelegt. Es ist in neuerer Zeit immer dringender das Bedürfniss hervorgetreten, die oft so komplicirten Hüllen des reifen Eies nach Genese und Beschaffenheit zu sondern und mit entsprechenden Namen zu belegen. Ref. unterscheidet die primitive Hülle des Eies, die Eizellmembran, und die sekundären Eihüllen. Der Name „Dotterhaut“ scheint nach des Ref. Ansicht am passendsten für die primitive Eihülle reservirt werden zu können. Kölliker hat in seiner Abhandlung (Untersuch. zur vergleich. Gewebelehre etc.; a. a. O. p. 82) diesen Vorschlag ohne nähere Begründung nicht acceptirt; er scheint lieber den Namen „Primordialschlauch“ eingeführt zu sehen, und nimmt die Benennung „Dotterhaut“ für die sekundären oder kapsulären Eihüllen in Anspruch. Es ist nun nicht zu leugnen, dass man bisher nicht selten solche Eihüllen mit dem Namen „Dotterhaut“ belegt hat, welche zu den sekundären gerechnet werden müssen. Wenn man aber dem Stande der Wissenschaft entsprechende Sonderungen in den Eihüllen und deren Benennungen vornehmen will, so scheint der Name „Dotterhaut“ am besten auf die ursprüngliche und eigentliche Hülle des Bildungsdotters zu passen; über die Einführung des Wortes „Primordialschlauch“ hat Ref. bereits im allgemeinen Theile sich ausgesprochen. Die sekundären Eihüllen dürften, nach dem Orte der Entstehung, zunächst in „Eierstocks- und Eierleiter-Hüllen“ zu trennen sein, wobei zugleich hervorgehoben wurde (p. 87), dass die Eierstockshüllen einen doppelten Ursprung haben können. Es finden sich nämlich Eierstockshüllen (bei Insekteneiern etc.) vor, die ihre Entstehung den um das Ei gelagerten Zellen (*Membrana granulosa*) des Eierstocks oder der Eiterröhren verdanken, während die sekundären Eihüllen der Fischeier mit punktirtem Ansehen als Absonderungsprodukte der Eizelle selbst sich nachweisen lassen. Der Name „Chorion“, der bald für die primitive Eihülle, bald für die sekundäre in Anwendung gebracht worden ist, scheint in Zukunft der ursprünglichen Bedeutung gemäss für die Hüllen des Embryo reservirt werden zu müssen. Joh. Müller nennt die festeren Eierstockshüllen „capsuläre“ Eihüllen oder Eikapseln und gebraucht die Namen „Schale“, „Eischale“, „Schalenhaut“, für die festeren Eileiterhüllen der Vögel, Amphibien und Selachier. — Obige Unterscheidungen der Eihüllen nach den Verhältnissen, unter welchen sie entstehen, können vorläufig nur als bestimmte Gesichtspunkte für die weitere Verarbeitung des Stoffes betrachtet werden. Die

schliessliche Bestimmung, zu welcher Kategorie eine vorliegende Eihülle zu rechnen sei, wird nur nach der Genese oder auch nach erkannten chemischen und morphologischen Kriterien der fertigen Eihüllen geschehen können. In beiden Beziehungen stehen unsere Kenntnisse noch sehr zurück, und die Kriterien der fertigen Eihüllen werden sich erst dann sicher festsetzen lassen, wenn die Genese bekannt ist. Aus der Anwesenheit einer einzigen, oder zweier oder mehrerer übereinander gelagerten Eihüllen des fertigen Eies lässt sich nicht mit Sicherheit schliessen, zu welcher Kategorie eine bestimmte Eihülle gehöre. Ist nur eine Eihülle vorhanden, so folgt nicht nothwendig, dass diese die eigentliche, primitive Dotterhaut sei, da letztere geschwunden sein kann, und dann bleibt die Wahl zwischen den sekundären Eihüllen. Finden sich zwei oder mehrere Eihüllen und Schichten vor, so sind die möglichen Kombinationen sehr zahlreich, wenn man bedenkt, dass die Eierstocks- und Eileiter-Hüllen aus mehreren Schichten bestehen und die ersteren sogar auch einen verschiedenen Ursprung haben können.

An den vom Ref. untersuchten Süsswasserfischen konnten mit Sicherheit zwei Eihüllen unterschieden werden, eine innere, meist dickere, festere mit punktirter, chagrinartiger Zeichnung und eine äussere, weniger feste, bald strukturlose (Hecht), bald mit sehr eigenthümlichen Röhrchen versehene (Barsch), bald durch zahlreiche, stäbchenartige Fortsätze sammtartig ausgebildete (Kaulbarsch, die meisten Cyprinoiden etc.) Hinsichtlich des näheren Verhaltens dieser beiden Eihüllen verweist Ref. auf die Abhandlung selbst. Was die

In der citirten Abhandlung Kölliker's (p. 81. ff.) finden sich mehrere, unsere Kenntnisse von den Eihüllen der Fische bereichernde Mittheilungen. Zunächst ist hervorzuheben, dass der Verf. mit Hilfe eines guten Mikroskops an der punktirten Eihülle eine durch die Dicke derselben hindurchziehende, feine parallele Streifung beobachtete. Auch Ref. hat sich nachträglich an feinen Durchschnitten von Hechteiern von der Anwesenheit solcher feinen Streifenzüge überzeugt. Bei Flächenansichten und an Falten dieser Eihülle waren übrigens, auch mit Hilfe eines Wetzlar'schen Instrumentes, diese parallelen Linien nicht deutlich zu unterscheiden, eben weil die Pünktchen an den freien Flächen und die durch sie im mikroskopischen Bilde erzeugten, scheinbaren Streifenzüge die Untersuchung erschweren. Kölliker bemerkt richtig, dass man die wirklichen und scheinbaren, parallelen Streifenzüge nicht verwechseln könne, wenn man beide kennt. Wem aber die wirklichen parallelen Streifen nicht bekannt sind, wird durch optische Täuschungen irregeleitet werden können. Durch den Nachweis, dass durch die Dicke der punktirten Eihülle der Fische parallele Streifen hindurchziehen, hat Kölliker die Ansicht des Ref., dass die an der Innen- und Aussenfläche der Eihülle sichtbaren Pünktchen Kanälchen angehören, festgestellt. Der Verf. nennt die in Rede stehende Eihülle poröse Dotterhaut. Kölliker unterscheidet gleichfalls zwei Eihüllen bei den Fischen. Aber er rechnet zur äusseren und zweiten nur die beim Barsch von J. Müller beschriebene Eihülle, in deren Röhren, wie schon erwähnt, Fortsätze der Zellen der Membrana granulosa eintreten; sie wird Gallerthülle genannt. Die von dem Ref. gleichfalls zur zweiten Hülle gerechnete hyaline und mit kurzen Fortsätzen versehene Schicht der Fischeier wird als äusserste Lage der porösen, chagrinartig gezeichneten Eihülle der genannten Fische angesehen. Ob die beiden Eierstockshüllen der Fischeier verschiedene Lagen einer Kategorie oder verschiedene Kategorien von Eihüllen darstellen, hängt mit der Entscheidung der Frage zusammen, ob sie beide einen und denselben oder verschiedenen Ursprung haben. Nun hält es Kölliker ebenfalls für wahrscheinlich, dass beide Eihüllen reifer Fischeier ausserhalb der eigentlichen Dotterhaut gebildet werden, obgleich die letztere an reifen Eiern noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen ist. Es kommt also darauf an, zu entscheiden, ob die bezeichneten Eihüllen reifer Fischeier als Absonderungsprodukte der ursprünglichen Eizelle oder der Membrana granulosa oder die eine auf die erste, die andere auf die zweite Weise gebildet werden. In Betreff der äusseren, tubulären Eihülle des Barsches ist nach den Mittheilungen Kölliker's wohl kaum mehr zu zweifeln, dass dieselbe der Membr. granulosa ihre Entstehung verdankt. Einen gleichen Ursprung hat höchst wahrscheinlich auch die

strukturlose, durchsichtige, gallertartige, zweite Eihülle der Hechteier (mit facettirter Oberfläche), welche Kölliker bisher noch nicht gesehen hat. Es ist ferner kaum einem Zweifel unterworfen, dass die chagrinartig gezeichnete, innere Eihülle als ein Absonderungsprodukt der ursprünglichen Dotterhaut auftritt. (Köll., Reich.) Die meisten Zweifel in Betreff der angeregten Frage bestehen hinsichtlich der sammtartig ausgebildeten, äusseren Eihülle vieler Fischeier. Ref. hatte diese zweite Eihülle mit der zweiten Eihülle der Hechteier parallelisirt, weil die feinen Fortsätze auf einer gallertartigen, homogenen Grundlage stehen, welche bei manchen Fischeiern stellenweise auch keine Fortsätze trägt und dann sich ganz ähnlich der äusseren Eihülle bei Hechteiern verhält. Nach Kölliker's Untersuchungen bei *Gasterosteus*, *Cobitis barbatula*, *Gobio floriatilis* bildet sich die sammtartige Eihülle früher als die chagrinartig gezeichnete. Die Fortsätze erscheinen als kleine Wärzchen an der Dotterhaut, die ganz strukturlos ist und für die eigentliche Dotterhaut gehalten werden muss; nach innen von dieser Wärzchenschicht werden später die punktirte gezeichneten Schichten der „porösen Dotterhaut“ sichtbar. Der Verf. sieht daher die Wärzchenschicht als die erste durch Absonderungsprodukte der ursprünglichen Eizelle gebildete Eihülle an; die einzelnen Schichten der porösen Haut folgen nach. Der Umstand jedoch, dass die sammtartige Eihülle früher als die punktirte auftritt und an der primitiven Dotterhaut haftet, liefert noch keinen vollkommen sicheren Beweis, dass sie als ein Absonderungsprodukt der Eizelle zu betrachten sei. Die Erscheinung, dass

1—2 oder mehrere eigenthümliche Bildungen, die bald wie helle, nadelförmige Krystalle, bald wie blasse Fäden oder Fasern vom Ansehen der Axencylinder sich zeigten.

Gelegentlich mag hier noch erwähnt werden, dass der Liquor folliculi Graafiani nach Luschka unter Betheiligung der Zellen der Membr. granulosa in folgender Weise abgesetzt und gebildet werde. (Württemberg. naturw. Jahresh. Jahrg. XIII. p. 24 ff.) Es solle hier zunächst in dem von den Blutgefässen abgesetzten Blastem exogene Zellenbildung um freie Kerne auftreten, und auf diese Weise die mehrfach übereinander geschichteten Zellen der Membr. granulosa entstehen. Von diesen Zellen verändern die ältesten ihren körnigen Inhalt, werden lichter und setzen eine helle, eiweissartige Substanz ab, die anfangs in grösseren oder kleineren Tropfen neben dem Kern erscheint, später aber zu einer „Homogenisirung“ des ganzen Zellinhaltes führt. Der verflüssigte Inhalt wird nun in verschiedener Weise frei und stellt den Liquor folliculi dar. Regel sei es, dass dieser Inhalt die Zellenwandung durchdringe und als helle, ölähnliche Tropfen zu Tage trete. Die Zellenwandung ziehe sich in diesem Falle zusammen und fülle sich dann von Neuem. Oder die Zelle zerschmelze, entweder ohne eine Spur zu hinterlassen oder unter dem Fortbestande des Nucleus, der sodann zur Grundlage einer neuen Zellbildung diene (? R.). Nicht alle Zellen betheiligen sich an diesem Sekretionsprozesse; einige erleiden auch eine fettige Degeneration, andere bleiben auf einer früheren Stufe stehen. Wirkliche freie Kerne, die also nicht durch Zerstörung der vorhandenen Zellen hervorgegangen wären, hat Ref. im Graaf'schen Follikel niemals vorgefunden.

Allen Thompson hat in einer brieflichen Mittheilung an Kölliker (Zeitschr. f. w. Zool. Bd. VIII. p. 425 ff.) sich gegen die von Meissner gegebene Darstellung der Bildung der Eier bei *Ascaris mystax* ausgesprochen. Nach dem Verf. sollen die Keimbläschen der zuerst sich bildende Bestandtheil des Eies sein, wobei es unentschieden gelassen wird, ob dieselben frei oder in Mutterzellen entstehen. In Betreff des Dotters wird die schon im Jahre 1850 veröffentlichte Ansicht aufrecht erhalten, dass die kleinen Dotterkörnchen zuerst als Ablagerung auf der äusseren Fläche des Keimbläschens erscheinen und auch später auf diese Weise sich vermehren. Der so gebildete Dotter solle keine Membran besitzen.

Die Entwicklung der Samenkörperchen hat Allen Thompson gleichfalls bei *Ascaris mystax* verfolgt (a. a. O.). Wie Ref., so lässt der Verf. im blinden Ende des Hodens diejenigen Zellen auftreten, welche im weiteren Verlauf der Röhre zu den Keimzellen werden, in denen zu je vier die Samenzellen sich bilden. Wie aber bei den Eiern, so sollen

sich auch hier die im blinden Ende entstandenen Zellen beim weiteren Vorrücken mit einer dunkleren, körnigen Masse umgeben, die zuerst einer besonderen Umhüllungsmembran zu entbehren scheine. In der Folge soll dieser Körper Membran, körnige Inhaltsmasse, Kern und Kernkörperchen hervortreten lassen. Beim Fortgange der Entwicklung entstehen nun vier Segmente mit radiärer Anordnung der länglichen Körnchen, wie bei *Ascaris acuminata*. Im untersten Theile der männlichen Organe, in sog. Vas deferens sind diese Segmente frei geworden; bei einigen sind die Körnchen noch nahezu radiär angeordnet, bei anderen ist der Inhalt mehr gleichartig körnig. Der äussere Theil dieser Zellen ist undeutlich (durchsichtig, körnerlos ? R.), oder sehr feinkörnig und lässt ohne Zusatz von Wasser keine Hülle erkennen. Der Kern, oder der das Licht stärker brechende innere Theil, hat $\frac{2}{3}$ des Durchmessers der ganzen Zelle und besitzt, wie bei *Asc. acum.* (Ref.) einen kleinen dunklen Kernkörper. Aehnliche Zellen kommen in den weiblichen Geschlechtsorganen vor, doch sind dieselben in der Peripherie heller und der Kern ist deutlich halbkugelförmig gestaltet, — Verhältnisse, welche selten an Körperchen vorkommen, so lange sie im Vas deferens sich aufhalten. Was die flaschen- oder handschuhfingerförmigen Samenkörperchen betrifft, die Bischoff fälschlich für Epithelialzellen angesehen hat, so sind dieselben aus den halbkugelförmigen hervorgegangen: zwischen beiden sind alle Mittelstufen zu finden. Ref. sah, wie schon im letzten Jahresbericht erwähnt worden ist, die halbkugelförmigen Körper, nachdem dieselben durch die enge Oeff-

merksam gemacht worden zu sein, dass dieselben bei *Angiostoma limacis* nicht allein in der Gebärmutter zwischen den in der Entwicklung begriffenen Eiern sich vorfinden, sondern auch darüber hinaus bis in die Tuben vorrücken und hier zwischen dem von der Eierstocksröhre hineingepressten Ei und der Röhrenwand, eins nach dem anderen durchkriechen. Es scheint Schneider undenkbar, dass eine etwaige peristaltische Bewegung der Tuben Eier und Samenkörperchen gleichzeitig nach entgegengesetzten Richtungen bewegen könnte, und so wäre also hiernach schon die Annahme einer eigenen Bewegung der Samenkörperchen unvermeidlich. Dem Ref. scheint diese Annahme nicht notwendig. Das besprochene Phänomen findet sich auch bei *Ascaris megalcephala*, bei welcher der Verf., desgleichen bei der oben erwähnten Ascaride der grauen Kröte, bei welcher Ref. keine Spur einer eigenen Bewegung der Samenkörperchen bemerkt haben. An freien Samenkörperchen zeigen sich die auf die eigene Bewegung bezüglichen Formveränderungen selten im reinen Wasser, häufiger im Eiweiss des Hühnereies und vorzüglich deutlich in Kochsalzlösungen von sehr verschiedener Konzentration. Im Hühnereiweiss ziehen sich anfangs einzelne Streifen über das Bläschen hinweg; dann beginnt der Rand sich zu kräuseln, einzelne Erhebungen tauchen auf und verschwinden, um an derselben Stelle von Neuem zu erscheinen, wobei der Kern förmlich herumgeschleudert wird. Nach einiger Zeit entsteht eine ganz verwickelte, nicht genau zu beschreibende Gestalt. Eine Ortsveränderung in einer bestimmten Richtung trat nirgend hervor. Auffallend ist, dass die Formveränderungen des Körperchens in Salzlösungen von den im Eiweiss auftretenden sich unterscheiden. Ähnlich wie in den Salzlösungen sind die Bewegungen in Zuckerlösungen, aber von geringerer Lebhaftigkeit. Selbst schwache alkalische Lösungen zerstören die Samenkörperchen. Die Bewegungen wurden beobachtet bei: *Ascaris acuminata*, *Cucullanus elegans*, *Meduris androphora*, *Strongylus auricularis*. Ueberall aber treten die Bewegungen erst im Uterus auf, in welchem die Samenkörperchen ihre vollständige Entwicklung vollenden. Bei *Strongylus auricularis* zeigen die spindelförmigen Samenkörperchen im Hoden, wie bei den übrigen Nematoden, keine Bewegung. In den weiblichen Geschlechtsorganen werden diese spindelförmigen Körperchen bläschenförmig, und dann bemerkt man an der am breiten Ende sichtbaren hellen Substanz amöbenartige Bewegungen. Ref. hat bei seinen früheren Untersuchungen die plötzliche Umwandlung des ovalen, bläschenförmigen Samenkörpers des *Strong. auricularis* in die langgezogene Spindelform recht oft beobachtet. Der umgekehrte Fall war ihm damals nicht vorgekommen. Eine Entwicklungsphase vermag Ref. darin ebenso wenig zu erken-

nen, als bei der oben besprochenen Umwandlung des halbkugelförmigen Kerns der Samenkörperchen oder, wenn man will, der Samenzelle bei *Ascaris mystax* in die Köcherform. Wenn aber das spindelförmige Samenkörperchen bei *Strongylus auricularis* wieder oval und bläschenförmig wird, so kann die vom Ref. damals gegebene Erklärung über die plötzliche Umwandlung der letztern Form in die Spindelgestalt nicht richtig sein, und es liegt dann sehr nahe, diese Formveränderung nicht als Entwicklungsphase, sondern als Kontraktions- und Dilatationserscheinung aufzunehmen, wozu Ref. schon damals sehr geneigt gewesen ist.

Epithelien.

Durch Eckhardt's Untersuchungen ist bekanntlich die Aufmerksamkeit der Histologen auf das Epithelium der Geruchschleimhaut gewendet worden. Es haben sich mit diesem Gegenstande beschäftigt: Ecker (Bericht über die Verh. der Ges. für Beförderung der Naturwis. zu Freiburg.; 1855 p. 199 ff. und Zeitsch. für wiss. Zoolog. Bd. VIII. p. 303 ff.); M. Schultze (Monatsb. der Berliner Akad. d. Wiss. 1856, p. 504 ff.); Seeberg (Disquisit. microscop. de textura membr. pituit. nasi. Dorpati Livon. 1856); Kölliker (Würzburg. Verhandl. Bd. VII. p. 31 ff.; Ausbreit. der Nerven in der Geruchsch. der Plagiostomen).

Ecker hat seine Untersuchungen an den Leichen zweier Hingerichteten angestellt und liess sich dabei von der Ansicht leiten, dass ähnliche Verbindungen, wie sie zwischen den Retinastäbchen und dem Corti'schen Organe einerseits

Ende der unteren Muschel, sowie des unteren Nasenganges sind noch mit Pflasterepithelium versehen. An dem ganzen übrigen Theile der Geruchschleimhaut breitet sich Cylinder-epithelium in zwei verschiedenen Formen aus. Bis zum sog. Locus luteus und der Regio olfactoria findet sich flimmerndes und zwar angeblich mehrfach geschichtetes Flimmerepithelium vor. Es lassen sich darin zwei Formen von Zellen unterscheiden: die eigentlichen Flimmerzellen und die sog. Ersatzzellen. Die flimmernden Zellen sind von circa 0,090 Mm. Länge, besitzen einen langen, nicht getheilten Stiel, den Kern und ziemlich lange, deutliche Cilien. Die zwischen ihnen gelagerten Ersatzzellen sind von gleicher Länge, jedoch meist breiter und bauchig aufgetrieben. Das freie Ende trägt niemals Cilien, scheint bald geschlossen, bald becherförmig geöffnet. Ein deutlich begrenzter Kern ist meist nicht vorhanden. Die Annahme, dass sie Ersatzzellen seien, biëtet sich am natürlichsten dar. Auf der anderen Seite widerspricht dieser Deutung die schon eingetretene Alteration des Zellkörpers. Das Epithelium des Locus luteus flimmert nicht; seine Zellen werden „Riechzellen“ genannt. Die Riechzellen bedecken bei Säugethieren die ganze nicht flimmernde, pigmentirte Regio olfactoria, beim Menschen dagegen nehmen sie nur einen ganz kleinen Theil derselben, nämlich den hintersten und obersten ein. Die charakteristischen Eigenschaften der Riechzellen sind folgende. Das feine Ende der Zelle ist ohne Flimmerhaare, das befestigte, lang ausgezogene Ende läuft in einen fadenförmigen Fortsatz aus, der sich zu wiederholten Malen dichotomisch theilt und an der Theilungsstelle gewöhnlich eine feinkörnige Anschwellung besitzt. Die terminalen Fäden sind von ausserordentlicher Feinheit. Zwischen den sog. Riechzellen liegen die Ersatzzellen eingebettet. Unter den Riech- und Ersatzzellen, unmittelbar auf der Schleimhaut liegt endlich eine Schicht von theils rundlichen, theils mehr unregelmässigen, öfters mit Fortsätzen versehenen Zellen, zwischen welchen sich die Wurzelfäden der Riechzellen einsenken und, wie es scheint, Verbindungen unterhalten. Ein bestimmter Beweis, dass die Fasern des N. olfactorius mit den Epithelium-Zellen, insbesondere mit den fadenförmigen Ausläufern und den zuletzt erwähnten Zellen zusammenhängen, konnte nicht geliefert werden.

Nach Seeberg geht das Pflasterepithelium im unteren und vorderen Theile der Nasenhöhle etwa 4'' hinter der äusseren Nasenöffnung durch eine Uebergangsstelle in das Flimmerepithelium über. An der Uebergangsstelle besteht das Epithelium aus polygonalen Zellen, die allmählig kleiner, rundlicher, dicker werden; dann nehmen sie plötzlich konische Form an und bedecken sich mit Cilien. Diese Umwandlung findet gegen den unteren freien Rand der unteren Muschel hin statt. Die konischen Zellen sind anfangs noch klein,

granuliert und enthalten in der Mitte den Kern. Die Cilien sind länger als gewöhnlich. Das Flimmerepithelium breitet sich dann über die ganze Nasenhöhle, auch über den Locus luteus, desgleichen über die Nebenhöhlen aus; ausgenommen sind die Stirnhöhlen. Wo das Flimmerepithelium auftritt, finden sich im Substrat auch Schleimdrüsen vor. Auch der Verfasser rechnet das Flimmerepithelium zu den mehrfach geschichteten (? R.). Die konischen, oberflächlich gelagerten Zellen nehmen von der oben bezeichneten Stelle an alsbald an Länge zu. Die grösste Länge erreichen sie sowohl an der Nasenscheidewand als an den Seitenwänden in der Gegend, wo die untere Muschel an der Crista turbinalis befestigt ist. Ihre Länge beträgt dann $0,006'' - 0,009''$. Die Länge der Cilien zeigt nicht die Unterschiede, welche Eckhardt angegeben hat; die Cilien sind vielmehr überall von gleicher Länge und Dicke. In der Gegend des Locus luteus, der übrigens mit einer mehr verwaschenen Grenze aufhört, werden die konischen Flimmerzellen wieder kürzer und erreichen eine Länge von $0,004'' - 0,0005''$ P. Die Ränder der Zellen werden zugleich blass, der granulirte Inhalt erscheint dunkler und dichter, der Querdurchmesser im Vergleich zum Längsdurchmesser vergrössert. Die Zellen verlieren leicht ihre Cilien und sind leicht zerstörbar. Von dem Befestigungsende der Cylinderzellen tritt zwischen die darunter gelegenen rundlichen Zellen ein fadenförmiger Ausläufer, der bisweilen in seinem Verlaufe Anschwellungen zeigt, auch in mehrere feine Aeste sich spaltet, an welchen die rundlichen Zellen der tieferen Schicht adhäriren und sich nur durch

vielmehr mit Eckhardt und Ecker eine solche Verbindung für wahrscheinlich.

M. Schultze unterscheidet im Epithelium der Regio olfactoria aller Wirbelthiere zwei Formen von Zellen. Die eine Art stellt die eigentlichen Epithelialzellen dar, denen ähnlich, die auch im übrigen Theile der flimmernden Riechschleimhaut vorgefunden werden. Diese Zellen sind lang gestreckt, am freien Ende annähernd sechsseitig prismatisch und gehen central in einen längeren oder kürzeren Fortsatz aus, der in der Nähe des bindegewebigen Substrats sich verbreitern und mit mehreren feinen Ausläufern enden soll. Die Fortsätze der einzelnen Zellen sollen auch durch seitliche Ausläufer untereinander in Verbindung treten (? R.). Beim Menschen, bei Säugethieren, Vögeln, Amphibien hat diese erste Art von Zellen in der Regio olfactoria keine Cilien; sie geht aber allmählig in die Wimperzellen der übrigen Schleimhaut über, wobei sie kürzer wird, die verästelten Fortsätze verliert und die Basis mit Cilien bedeckt. Die vom Verf. sogenannten eigentlichen Epithelialzellen der Regio olfactoria sind oft der Sitz einer Pigmentablagerung, welche in Verbindung mit der gleichzeitig vorhandenen Pigmentirung der Schleimdrüsenzellen Ursache der gelblichen Tinktion der Regio olfactoria ist. Beim Menschen und bei dem Meerschweinchen sind die Pigmentkörnchen in dem prismatischen Zellenkörper, beim Hunde, bei der Katze, beim Schaf und Pferde in dem centralen Fortsatze enthalten. Zwischen den Epithelialzellen der Reg. olfactoria finden sich bei allen Wirbelthieren die zweite Art von Zellen, die sich mit den „Ersatzzellen“ Ecker's und Seeberg's vergleichen lässt, und von denen es eigentlich unbestimmt geblieben ist, ob sie zur progressiven und nicht vielmehr zur regressiven Metamorphose gehören. Sie bestehen aus einem mittleren, kernhaltigen, in verschiedener Höhe zwischen den Epithelialzellen gelegenen Zellenkörper und aus zwei in entgegengesetzter Richtung davon abgehenden feinen Fortsätzen. Beide Fortsätze zeichnen sich durch die leichte Zerstörbarkeit aus, und durch die Neigung, — namentlich der centrale, — Varicositäten zu bilden, wodurch sie das Ansehen feinsten Nervenfasern erhalten sollen. Der centrale Fortsatz ist feiner, auch länger und läuft ohne Verästelungen oder Theilungen bis zum bindegewebigen Stroma des Schleimhaut-Substrats, an welchem er bei jeder Präparation, die ihn isolirt, auch abreisst. Der periphere Fortsatz beginnt an dem Zellenkörper ziemlich breit, verschmälert sich aber schnell bis auf 0,0004—0,0008" P. Es sind die eben beschriebenen Zellen, welche nach dem Verf. an ihrem freien Ende beim Frosch mit ausserordentlich langen (bis zu 0,04" P.), leicht zerstörbaren Flimmerhärchen bedeckt sind. Die Bewegungen dieser Cilien in Humor aqueus (! R.) sind nur schwach, nicht gleichförmig,

bringen auch nie einen Strudel in der umgebenden Flüssigkeit zu Stande und hören bald (1 Stunde nach dem Tode) auf. Der Verf. hat etwa 6—10 Cilien an der Zelle unterscheiden können. Da mindestens 4—6 solche Wimperzellen um eine wimperlose Epithelzelle gestellt sind, so sei erklärlich, dass man an der unverletzten Schleimhaut die durch die Epithelzellen gebildeten Lücken in der Anordnung der Cilien nicht wahrnehme. Stärkere und schwächere Chromsäurelösungen zerstören die Cilien und zum Theil auch die varikösen Faserzellen. Ganz ähnliche Bildungen, wie beim Frosch, finden sich in der Regio olfact. von *Salamandra maculata*, *Bufo variegatus*, *Coluber natrix*, *Anguis fragilis*, *Lacerta (agilis ? R.)* und bei vielen Vögeln. Bei den Fischen, Säugethieren und beim Menschen fehlen die haarförmigen, langen Cilien an den beschriebenen Zellen. An ihrer Stelle fand der Verf. an erhärteten Präparaten kleine, 0,001—0,002" P. lange, stäbchenförmige Gebilde, welche durch eine scharfe Querlinie vom Zellenfortsatz abgegrenzt sind und hier sich leicht ablösen. Mit Rücksicht auf die leichte Zerstörbarkeit der in Rede stehenden Bildungen, desgleichen auf ihre Uebereinstimmung im Habitus mit den Fortsätzen der Ganglienzellen, namentlich mit gewissen radiären Fasern der Retina, in Erwägung endlich, dass dergleichen Bildungen bei anderen wirklichen Epithelien nicht vorkommen sollen, glaubt M. Schultze sich berechtigt, die fraglichen Gebilde für Nervelemente zu halten und als „Nervenzellen“ der Regio olfact. bezeichnen zu können. Auch der Verf. hat den kontinuierlichen Zusammenhang der centralen Fortsätze dieser

feine, oft knotig anschwellende Fäden aus. Nach einigem Verweilen der Geruchschleimhaut im Wasser oder Chromsäure löst sich das Epithel mit grosser Leichtigkeit von dem Schleimhautsubstrat ab, und letzteres zeigt dann immer eine ganz glatte, reine Oberfläche, ohne Spuren von abgerissenen Fäserchen. In Grundlage dieser Untersuchungen, sowie in Berücksichtigung des Umstandes, dass knotige Ausläufer der Epithelialzellen auch an anderen Stellen des Körpers (Trachea) vorkommen, endlich in Erwägung der gewichtigsten, aprioristischen Bedenken spricht sich Kölliker gegen die Annahme eines Zusammenhanges zwischen den Zellen des Epitheliums der Riechschleimhaut und den Nervenfasern des N. olfact. aus. — Referent hat dieselbe Ansicht bereits im vorjährigen Jahresberichte veröffentlicht und sich dabei auf Präparate gestützt, die ihm Dr. Hoyer im Jahre 1856 hier im physiologischen Institute vorgelegt hatte. Die Inauguralabhandlung des Dr. Hoyer ist im Jahre 1857 in Berlin erschienen.

Durch die Entdeckung des Flimmerepitheliums im Nebenhoden des Schweines und im Kopfe des menschlichen Nebenhodens (Wiener medicinische Wochenschrift 1856 Nr. 12) wurde O. Becker veranlasst, das Epithel der Geschlechtsorgane sowohl der Vögel und Säugethiere, als des Menschen einer genaueren Untersuchung zu unterziehen, deren Resultate in Moleschott's Untersuchungen zur Naturlehre des Menschen etc. (Bd. II. p. 71 ff.) niedergelegt sind. Beim Menschen und den Säugethiern sind nicht allein die Ausführungsgänge (Fimbriae und Tuba) der Eierstöcke, sondern auch die der Hoden (Vasa efferentia) mit einem einfachen Flimmerepithelium ausgekleidet. Flimmerepithelium und Flimmerbewegung sind hier von Geburt an vorhanden und bleiben unverändert, sowohl während der normalen Ausbildung des Organismus bis zur Pubertät, als auch während der zeitweisen Veränderungen in der weiblichen (Bildung und Lösung von Eichen, Menstruation, Schwangerschaft) und in den männlichen (erregte oder stockende Samenbereitung, Ejakulation) Geschlechtsorganen nach Eintritt der Geschlechtsreife. Der Verf. stellt auch namentlich in Abrede, dass die Flimmerbewegung in den Tuben der Kaninchen nach dem Durchgange der Eichen aufhöre, wie es Bischoff angiebt. In beiden Geschlechtern wird durch die Flimmerbewegung ein konstanter Strom in der Richtung von den keimbereitenden Organen nach dem Aufbewahrungsorte der Keime hervorgebracht. Ausserdem wurde beim Weibe in den Kanälen des Nebeneierstocks, beim Manne in den ungestielten und gestielten Hydatiden des Morgagni und im Uterus masculinus Flimmerepithelium beobachtet. Vergeblich hat der Verf. nach Flimmerepithelium im Wolff'schen Körper, seinem Ausführungsgange und im Müller'schen Faden bei Säugethiern.

gesucht, obgleich Kolliker bei Eidechsenembryonen Flimmerbewegung im Wolffschen Körper gesehen hat. Wann in den oben bezeichneten Ausführungsgängen der keimbereitenden Geschlechtsorgane die Flimmerbewegung im Embryo auftritt, war nicht zu bestimmen. Das Vorhandensein derselben zur Stunde der Geburt zwingt aber zu der Annahme, dass Flimmerzellen schon im Fötus gegeben sein müssen, obschon der Verf. selbst einige Tage vor der Geburt vergeblich danach gesucht hat. Im Uterus, im Nebenhoden und Vas deferens findet sich bei der Geburt Cylinderepithelium, welches zur Zeit der Pubertät in dem nach den Ausführungsgängen der keimbereitenden Organe gerichteten, oberen Theile mit Cilien besetzt ist. (Fundus uteri, Nebenhodenkopf.) Das mehrfach geschichtete Epithel des Nebenhodenkanals besteht zur Zeit der Geburt aus Zellen, die sich in ihrer Form und Grösse in allen Schichten gleichen. Mit dem Wachsthum des Nebenhodens verlängern sich die Zellen der obersten Schicht, (beim Pferde bis 0,07 Mm.) sind sehr zartwandig, schwach kontourirt, völlig cylindrisch, grad abgesetzt, mit grossen, konstant unter der Mitte sitzenden Kernen und zur Zeit der Pubertät mit Cilien von ungewöhnlicher Länge bekleidet. Bei Menschen wechselt die Beschaffenheit der Zellen im mehrfach geschichteten Epithelium des Nebenhodenkanals. Doch hat Becker bemerkt, dass die oberste Schicht besonders dann die oben beschriebenen Eigenschaften zu Tage treten lässt, wenn der Kanal von Samen erfüllt ist. Die Cilien der Zellen erreichen hier die Länge von 0,035 Mm. Gegen den Schwanz des Nebenhodens hin fehlen die Cilien.

thelium, welches in dem für die Aufbewahrung und Ausbildung der Keime bestimmten Abtheilung der Leitungsapparate vorkommt (Fundus uteri, Nebenhodenkopf), in einem bestimmten Zusammenhange mit den funktionellen Vorgängen in den Geschlechtsorganen sich befindet; es schwindet im Uterus während der Periode, bösst seine Bewegungen ein während der Schwangerschaft und bildet sich dann später wieder von Neuem; es besitzt im Kanale des Nebenhodens seine höchste Ausbildung, wenn der Nebenhode von Samen strotzt, es verkümmert, wenn der Nebenhode keinen Samen enthält und wird vielleicht bei jeder Ejakulation mit fortgerissen und zerstört. — Auch bei den Vögeln (Sperling, Schwalbe, Huhn, Gans, Taube) findet sich in den Vasa efferent. des Hodens Flimmerepithelium.

Das Epithel der Vaginalportion des Uterus beschreibt E. Wagner in der herkömmlichen Weise und im Anschluss an Kölliker's Handbuch der Gewebelehre (1. Aufl. S. 343). Wegen der Vielgestaltigkeit der Zellen in dem geschichteten Pflasterepithelium glaubt der Verf. eine Analogie mit dem sogenannten Uebergangsepithelium der ableitenden Harnwege zu finden. In den tieferen Lagen tritt die polygonale Gestalt der oberflächlichen Zellen mehr zurück; letztere sind kleiner, weniger glatt, zum grösseren Theil länglich, entweder spindelförmig oder keulenförmig, und enthalten einen verhältnissmässig grossen, meist ovalen, selten runden oder spindelförmigen Kern, der zuweilen doppelt vorhanden ist. Im Inhalt der Zellen wie der Kerne, besonders der obersten Lagen, finden sich nicht selten einzelne kleine Körnchen, die zuweilen fettig glänzen. Die Epithelzellen der tiefsten Lagen sollen sich ähnlich, wie im Rete Malp. der Haut verhalten, nämlich cylindrisch sein. (Vierordt, Archiv für phys. Heilk. Jahrg. 1856, p. 498.)

Nach Stilling's Beobachtung (Neue Unters. über den Bau des Rückenmarks. Frankfurt a. M. 1856; p. 8 u. 21.) besitzen die Cylinderzellen des Epithel im Centralkanal des Rückenmarks Cilien von 0,003—0,006" Länge. An den Präparaten des Prof. Jacobowitsch, die Ref. hier zu Breslau zu sehen Gelegenheit hatte, war gleichfalls an der freien Basis der Cylinderzellen öfters eine streifige Substanz sichtbar, welche auf das Vorhandensein von Cilien gedeutet werden konnte. Die Zahl der Zellen, die im Querschnitt das Lumen des Kanals umgeben, wird auf 100 angegeben. Die Cylinderzellen sollen durch feine, kurze, grade Fäden von 0,0006" sich untereinander verbinden. Ihr Befestigungsende läuft in einen langen, faserartigen Fortsatz aus, welcher von den sogenannten Elementarröhrchen der Nervenfasern nicht zu unterscheiden ist. Diese Fortsätze sollen ferner einzeln oder zu 2—3 verbunden in die den Kanal umgebende graue Substanz eindringen und mit den Nervenzellen und Nerven-

fasern in kontinuierliche Verbindung treten. Sie gehen ferner aus der grauen Substanz in den weissen Mantel des Rückenmarks, hängen daselbst mit doppelt kontourirten Nervenfasern zusammen und strahlen namentlich an dem Sulcus med. ant. und an der Fiss. med. post. in die Pia mater aus.

Ueber die streifigen (porösen) Absonderungsprodukte (Epithelialsäume) an den freien Flächen der Epithelien hat Kölliker (Untersuchungen zur vergleichenden Gewebelehre etc. Würzburg. Verh. 1856) eine grosse Reihe einzelner Beobachtungen mitgetheilt. Die hauptsächlichsten Resultate sind bereits im allgemeinen Theile angegeben. Ref. glaubt hier noch folgende Einzelheiten hervorheben zu müssen. Gestreifte Epithelialsäume fanden sich deutlich im Klappendarm der Plagiostomen, ferner bei *Chimaera* im Spiraldarm, während bei *Cepola* und *Gobius* im Dünndarm nur leicht verdickte Säume ohne Streifung an den Zellen sichtbar waren. Bei den Aalen beobachtete der Verf. gestreifte Säume und zugleich Flimmerung. Bei *Sphagebranchus imberb.* zeigten sich im Dünndarm flimmernde und flimmerlose Stellen, und letztere werden von Zellen mit streifigen Säumen bedeckt. Aehnlich verhält sich *Muraena helena*; dagegen fehlte die Flimmerung bei *Conger vulgaris*, *myrus*, *niger*. Verdickte Säume mit Streifen und zugleich Flimmerung wurde im Darmkanal bei vielen Strahlthieren vorgefunden. Bei *Holothuria tubul.* war nur ein ausgezeichnet streifiger Epithelialsaum vorhanden. Der Verf. wirft hier gelegentlich die Frage auf, ob nicht die gestreiften Epithelialsäume aus früher dagewesenen Flimmersäumen sich hervorbilden. An dem ziemlich dicken, strei-

in den Sehnen der Muskeln wirbelloser Thiere (Krebse etc.) unzweifelhaft chitinisirte Binde-substanzgebilde besitzen. (Leydig).

In Betreff des mehrfach geschichteten Pflasterepitheliums bemerkt Leydig (Lehrb. der Histolog. p. 39), dass die zackigen Formen, welche man als eine Eigenthümlichkeit des Epithels des Blasenhalases ansieht, überall in den unteren Lagen der geschichteten Plattenepithelien bei den Wirbelthieren vorkommen, wovon man sich namentlich nach Aufbewahrung der Präparate in doppelchromsaurem Kali überzeuge. — Ref. hat diese zackigen und strahligen Formen bisher für Kunstprodukte gehalten. Wie leicht vollsaftige, mit einem konsistenteren Inhalt versehene, rundliche Zellen, wie es scheint, nach jedesmaliger Zerstörung der Zellmembran, zackige und strahlige Formen annehmen können, ist bekannt. Durch einfache mechanische Zerrungen werden die pigmentirten Epithelialzellen der Membrana pigmenti vieler Thiere zackig und strahlig. Auf gleiche Weise entstehen die zuerst von Remak beschriebenen sternförmigen Pigmentzellen im Malpighischen Netz, namentlich der Haare. In anderen Fällen bilden sich die bezeichneten Formen beim Einschrumpfen der Zellen oder insbesondere des Zellinhaltes in Folge von Wasserentziehung, namentlich, wenn die so häufig nothwendig werdende Ablösung des einschrumpfenden Körpers von der Umgebung nicht gleichzeitig und gleichmässig im ganzen Umfange oder an einzelnen Stellen gar nicht erfolgt. Eine sehr gute Gelegenheit, diese künstlichen Formbildungen zu beobachten, bieten die Zellen der Konferven dar, wenn sie mit Wasser entziehenden Mitteln behandelt werden. Auf solche Weise entstehen z. B. die sternförmigen Knorpelkörperchen in rundlichen Knorpelhöhlen. Konzentrirte Lösungen von Chromsäure und chromsaurem Kali verändern die normale Beschaffenheit saftreicher Gewebe oft sehr auffallend, und ihrer Anwendung ist es wohl auch zuzuschreiben, dass die oben besprochene Verbindung der Epithelialzellen mit dem darunter liegenden Schleimhautsubstrat so in Aufnahme gekommen ist. Denn auch das saftreiche, formlose Binde-substanzgebilde an der freien Grenze dieses Substrats wird durch die genannten Mittel sehr verändert. Was die zackigen und strahligen Zellen im Malpighischen Netz oder überhaupt in der saftreichen unteren Zellschicht, des mehrfach geschichteten Plattenepitheliums betrifft, so hat Ref. dieselben an feinen Schnittchen, die von geeignet getrockneten Präparaten entnommen waren, niemals beobachtet. Auch spricht für ihre künstliche Bildung der Umstand, dass in den äusseren Schichten des geschichteten Pflasterepitheliums dergleichen Formen nicht vorkommen, obschon die tieferen Lagen in die oberflächlichen übergegangen sind.

“In Bezug auf die Drüsenzellen führt Leydig an, dass cilientragende epitheliale Drüsenzellen bisher nur an folgenden Stellen nachgewiesen seien: in den Nieren, in den Uterindrüsen des Schweines, in den Zungendrüsen des *Triton igneus* und in der Leber von *Cyclas*. Die Lungen scheint der Verf. nicht zu Drüsen zu rechnen (a. a. O. p. 39). — Zu den Cuticularbildungen der Wirbelthiere rechnet Leydig die sogenannte Hornlage im Muskelmagen der Vögel, die das in Schichten erhärtete Sekret der darunter befindlichen Sekretionszellen darstellen. Der Umstand, dass sich einzelne Zellen zwischen den Schichten eingeschlossen vorfinden, kann dieser Deutung nicht Abbruch thun; auch in den dicken Cuticularbildungen der Wirbellosen, z. B. im Kiefer von *Helix*, lassen sich nach längerer Kalibehandlung einzelne Zellen, namentlich gegen die Wurzel zu, nachweisen. — Im Darm von *Nais* fand Leydig die Tunica intima, welche das Darmepithel an der freien Fläche überzieht, mit Cilien bekleidet, — eine höchst auffallende Erscheinung, welche die in jüngster Zeit bedeutend erschütterte Lehre von den Epithelien in neue Schwierigkeiten verwickelt (a. a. O. p. 364) (R.). In dem an Beobachtungen so reichhaltigen Handbuche sind noch eine grosse Menge von Einzelheiten über die Cuticularbildungen der Wirbellosen mitgetheilt, hinsichtlich deren Ref. auf die Schrift selbst verweisen muss.

Ein besonders geartetes Epithel, aus sog. Stachelzellen bestehend, beschreibt Leydig aus dem Labyrinth des Gehörorganes (a. a. O. p. 264, 270, 274). Der Verf. rech-

len Ueberzugs ermangele. Leydig bringt hiermit in Zusammenhang, dass das Epithel im Darm von *Cobitis fossilis* fehle (Müll. Arch. 1853). In seinem Handbuche (a. a. O. p. 384) hebt der Verf. hervor, dass bei Lungenschnecken an der Decke, wie am Boden der Lungenhöhle gar kein Epithelium zu sehen sei. Semper bestätigt zunächst in seiner Abhandlung „Beiträge zur Anatomie und Phys. der Pulmonaten“ (Zeitsch. f. w. Zool. Bd. VIII. p. 369) die Angabe Williams, dass nicht blos, wie von Siebold behauptet, *Limnaeus*, sondern bei allen Pulmonaten in der Gegend der grossen Gefässe Flimmerbewegung vorhanden sei. Dagegen fehlt nach des Verf. Untersuchungen an den Stellen wo feinere Gefässe sich verzweigen, jegliches Epithel, so dass sich hieraus der von Williams beobachtete Mangel einer Flimmerbewegung an diesen Stellen genügend erkläre. — Bei dem Interesse, das dieses anatomische Faktum für die Physiologen hat, unterwarf Ref. die einfachen, der Untersuchung leicht zugänglichen Lungen der Tritonen einer Prüfung. Es war nur ein in Weingeist aufbewahrter, ausgewachsener, weiblicher Triton zur Hand. Die aufgeschnittene und mit Essigsäure behandelte Lunge liess in der ganzen Ausbreitung und ohne Unterbrechung ein aus polyedrisch sich abgrenzenden Zellen bestehendes Epithelium deutlich erkennen. Ob an den Zellen Cilien vorkommen, war an dem Weingeist-exemplare nicht zu entscheiden. Das Epithelium liess sich leicht abtrennen.

Ref. schliesst den Bericht über die Epithelien mit einigen Mittheilungen aus der Arbeit des Dr. Semper „über die Bildung der Flügel, Schuppen, Haare der Lepidopteren“ (Zeitsch. f. w. Zool. Bd. VIII. p. 326 ff.). Der Verf. rechnet zu den epidermoidalen Anhängen der Arthropodenhaut zwei Arten, nämlich 1) solche, welche nur Ausstülpungen der Epidermis selbst sind, wie die Extremitäten (Beine, Flügel), Fühler, Kiefer, Dornen, grössere Haare, 2) diejenigen, welche durch Auswachsen einzelner Zellen, die aus der Epidermis hervorgegangen sind, entstehen, wie die Schuppen und feineren Haare, welche an allen Theilen des Körpers, auch an den Fühlern und grösseren Haaren sich vorfinden. Für die Ansicht, dass die zuerst genannten Bestandtheile epidermoidale, d. h. aus Epithelien und der Epidermis hervorgegangene Gebilde seien, fehlt der genügende Beweis (R.). Man nennt allerdings den Fortsatz, welcher die Anlage z. B. der Flügel darstellt, einen in Form eines doppelten Blattes ausgestülpten Theil der Epidermis, findet aber, dass aus den immerhin sich polyedrisch begrenzenden Zellen des genannten Fortsatzes schliesslich nicht allein die Epidermis des Flügels, sondern auch Nerven, Tracheen, Fettkörper hervorgehen, wodurch allein schon bewiesen ist, dass die Anlage des Flügels nicht als eine Ausstülpungsbildung

der Epidermis betrachtet werden könne. Wir begegnen hier einem ähnlichen Fehler in der Auslegung der Erscheinungen, wie derjenige, welcher in Betreff der Bildung der Haare aus einem Fortsatz des Malpighi'schen Netzes der Epidermis gemacht worden ist. Was nun die Schuppen der Schmetterlingsflügel betrifft, so hat der Verf. beobachtet, dass dieselben aus je einzelnen unter den Epidermis gelegenen Zellen hervorgehen. Diese grossen, rundlichen Zellen befinden sich daselbst in kurzen Abständen in einem Hohlraum, der sich zwischen der Epidermis und der Grundmembran des Flügels eingestellt hat, und senden einen Fortsatz zwischen die cylinderförmigen Zellen der Epidermis hindurch, der sich plötzlich in eine mehr oder minder kuglige Blase erweitert. Die Blase ist die erste Anlage der künftigen Schuppe; sie nimmt auffallend an Grösse zu, entwickelt am freien Rande einige Zipfel und lässt alsbald die Form der künftigen Schuppe nicht verkennen. Die Entstehung der grossen, kugligen Zellen, welche sich in die Schuppen verwandeln, hat sich nicht mit Genauigkeit verfolgen lassen; inzwischen bleibe, unter den vorhandenen Umständen, nach des Verf. Ansicht, keine andere Wahl, als ihre Bildung aus den Epidermiszellen abzuleiten.

In dem Artikel „Tegumentary organs“ werden von Huxley die Epidermis und ihre Anhänge vergleichend-anatomisch behandelt. (Todd. cyclop. Part. XLVII.)

Gebilde der Bindesubstanz.

Dr. v. Wittich hat die Frage, ob die spindel- und stern-

stischen Platten oder Häute, und die durchlöcherten Membranen an. Zu den Imbibitionsversuchen benutzte der Verf. eine Lösung reducirten Indigo's, die beim Aufsteigen in die zelligen Röhren Sauerstoff absorbiren und sich niederschlagen musste.*) Um möglichst zu verhindern, dass der Sauerstoff nicht zur Imbibitionsflüssigkeit gelangt (siehe Anmerk.), wurden die Präparate durch den Kork hindurch, welcher das Gefäß verschloss, mit jener Flüssigkeit in Verbindung gesetzt. Der Kork wurde zu diesem Behufe gespalten und das Präparat zwischen den beiden Hälften so luftdicht eingeschlossen, dass die Enden zum Aufsaugen und zum Verdunsten frei blieben. In anderen Fällen wurden die Präparate in kürzern Glasröhrchen möglichst luftdicht hineingepresst, und das Röhrchen durch den durchbohrten Kork luftdicht hindurchgeführt. Nachdem die Präparate durch blaue Färbung den Erfolg der Imbibition verrathen hatten, wurden sie getrocknet und zu Quer- und Längsschnitten verwandelt. Es zeigte sich an Querschnittchen der Sehne ein äusserst zierliches blaues Netz, dessen Fäden angeblich von Zellkörpern ausliefen, deren Kerne jedoch meist durch Niederschlag verdeckt waren. Desgleichen markirten sich jene als Spiralfäden beschriebenen Gebilde durch Reihen von blauen Körnchen. Sehr klar soll dieses Verhältniss der so gefärbten Zellen in jenen am Rande von Querschnitten sich ablösenden bandartigen Schichten (? R.) hervortreten. Der Verf. liess die Schnittchen in stark verdünnter Essigsäure aufquellen. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass v. Wittich's netzförmige Linien auf die Interstitien zwischen den einzelnen, sogenannten primären und sekundären Bündeln und Strängen der Sehne zu beziehen sind. Von Interesse ist aber, dass die sog. Kernfasern gleichfalls Indigo blau niederschlagen hatten und also auch im ausgebildeten Zustande hohl sein müssen. Bei der Cornea gestalteten sich die Verhältnisse ähnlich. Der Verf. hat hierbei zugleich die Beobachtung gemacht, dass die Hornhautkörperchen in zwei, unter einem rechten Winkel sich kreuzenden Haupttrichtungen verlaufen. Die Zellen (? R.) der Conjunctiva, wenn sie in gleicher Weise behandelt werden, füllen sich leicht mit Indigo-Niederschlägen, wogegen die netzförmigen Fasern der Sclerotica (? R.), sowie die elastischen Fasernetze des Lig. nuchae

*) Der Verfasser bereitete sich den reducirten Indigo auf die Weise, dass er in einer enghalsigen Flasche 3 Theile ungelöschten Kalk, 2 Theile Eisenvitriol und 1 Theil fein zerriebenen Indigo mit Wasser vermischte und diese Mischung im wohl verschlossenen Gefäß stehen liess, bis die jetzt gelbliche Flüssigkeit klar über den Bodensatz stand. Mit der oberflächlichen Schicht dieser Flüssigkeit, die nur Indigo in Kalkwasser gelöst enthält, wurde der Querschnitt einer Sehne in Berührung gebracht.

meist vollkommen homogen blau gefärbt werden und sich hiermit als solide Körper erweisen.

An obige Mittheilungen schliesst v. Wittich einige Bemerkungen über die Identität der Binde substanzkörperchen und des sternförmigen Pigmentkörpers, sowie der Fettzellen an. Die Binde substanzkörperchen sollen auf zweifache Weise ihren Inhalt und ihre Gestalt ändern, wobei sie zugleich jedenfalls auch ihre Eigenschaft als saftführende Zellen einbüßen; auf die eine Weise werden sie zum sternförmigen Pigment, auf die andere, durch allmälige Ausdehnung und Ablagerung von Fett, zu wahren grossen Fettzellen. Dass die sternförmigen Pigmentkörper pigmentirte sternförmige Binde substanzkörperchen darstellen, ist von dem Ref. schon 1852 (in der citirten Abhandl.) als wahrscheinlich bezeichnet worden und später von Leydig gradezu ausgesprochen. Der Verf. verfolgte die allmälige Ablagerung von Pigmentkörnchen in den sternförmigen Binde substanzkörperchen des gallertartigen Bindegewebes der Schwanzflosse von *Bombinator igneus* im Larvenzustande. Noch übersichtlicher ist diese Pigmentablagerung nach des Ref. Beobachtungen bei Fischembryonen wahrzunehmen. Ein anderer geeigneter Ort für die Untersuchung ist nach v. Wittich die Sclera auf ihrem Uebergange zur Cornea beim Schaaf, Rinde, Pferde, vielen Vögeln etc., sowie die Chorioidea von menschlichen und thierischen Neugeborenen, bei welchen die strahligen Binde substanzkörperchen unmittelbar nach der Geburt farblos sind. Auch das schwarze Pigment des Lungengewebes wird in den dasselbe konstituierenden Binde substanz-

destens 10 Jahre ausser Gebrauch gewesen war, will v. Wittich auch die Umwandlung von spindel- oder strahligen Binde-substanzkörperchen der Muskelscheiden (? R.) in runde Fettzellen verfolgt haben. Die bezeichneten Bindegewebszellen füllen sich mit kleineren und grösseren Fetttröpfchen, die dann konfluieren und bei ihrer Vermehrung die Zellen ausdehnen, so dass letztere anfangs runde mit einzelnen, spitzigen Hervorragungen besetzte Körper, schliesslich aber vollkommen abgerundete Fettzellen darstellen. Mit dieser Metamorphose ist zugleich ein Schwinden des Zellkernes verbunden.

Die gallertartige Binde-substanz der Scheibe von *Medusa aurita* beschreibt M. Schultze (Müll. Arch. 1856 p. 314 ff.). In einer vollständig durchsichtigen Grundsubstanz liegen eingebettet fein granulirte Zellen von der Grösse der Eiterkörperchen mit strahligen Fortsätzen. Die feinen, nur an ganz frischen Präparaten sichtbaren Ausläufer der Zellen verbinden sich untereinander. Nicht selten sah sie der Verf. auch frei enden. Hier und da theilen sich die Strahlen in ihrem Verlauf. Unter der Einwirkung von Wasser gehen sie verloren, während der Zellkörper unter Bildung von Hohlräumen im Inneren aufquillt. In dünner Kalilauge lösen sich die Zellen vollständig auf; bei Anwendung von Chromsäure, Alaun, Sublimat, Jodtinktur etc. schrumpfen sie ein. Ausser den faserartigen Fortsätzen der Zellen zeigt sich bei günstiger Beleuchtung in der Grundsubstanz noch ein zweites System von Fasern, die netzartig untereinander verbunden sind. Die Fasern sind sehr blass, treten jedoch bei Anwendung von Metallsalzen, Chromsäure, Jodtinktur deutlicher hervor. Diese schon von Virchow gekannten Fasern haben eine Breite von 0,001—0,0001" und ein mikroskopisches Ansehen, als ob sie hohl seien. Sie zeichnen sich durch ihre Resistenz aus; bestehen nicht aus einer eiweissartigen Substanz und geben auch keinen Leim. Verdünnter heisser Essigsäure widerstehen sie; dagegen lösen sie sich in Kalilauge schnell. Würden sie nicht hohl sein, so könnte man eine Parallele mit dem Netzknorpel ziehen und in dem erwähnten Fasernetze ein, dem elastischen Fasernetze vergleichbares Gebilde sehen (Ref.).

Eine sehr eigenthümliche Form von Binde-substanz beschreibt Semper aus dem Magen von *Limnaeus stagnalis* (Beiträge etc. Zeitsch. für w. Zool. Bd. VIII., p. 361 ff.) In einer homogenen oder fein streifigen, an Masse zurückstehenden Grundsubstanz liegen überall gleichmässig und abwechselnd eingebettet dreierlei Formen von Binde-substanzkörperchen. 1) Zellen von erstaunlicher Grösse, vollkommener Durchsichtigkeit und ovaler, länglich runder Form, deren grosser, runder, feinkörniger, durch 1—2 Kernkörperchen ausgezeichneter Kern von feinkörniger, in mehrere kurze

Zacken oder Strahlen auslaufender Substanz umlagert ist. 2) 6—8 Mal kleinere, rundliche Zellen, welche ohne Ausnahme von einer Menge kleiner, runder, scharf kontourirter Bläschen angefüllt sind und einen Kern nicht erkennen lassen. Die Bläschen lösen sich in Aether auf und sind also

Fetttröpfchen. 3) Die dritte Form von Binde-substanzkörperchen erkennt man erst deutlich nach Anwendung der Essigsäure, welche ihren aus kohlen-saurem Kalk bestehenden Inhalt beseitigt. Zuweilen füllt der in Form von ziemlich grossen, rundlichen oder ovalen, unkrystallinischen Konkrementen auftretende kohlen-saure Kalk die Zelle nicht ganz an, und in solchen Fällen wird auch der an die Zellenwand gedrängte Kern sichtbar. Ausserdem werden in der Grundsub-stanz auch feine Kerne und Kalkkugeln wahrgenommen.

Die Struktur- und Texturverhältnisse des Faserknorpels der Hornhaut hat His erneuter Untersuchung unterworfen. (Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie der Cornea; Basel 1856; mit 6 Tafeln.) Die „vordere Grenzschicht“ hat eine Dicke von 0,003—0,004" und ist von der Grundsub-stanz des mittleren Hauptgewebes der Hornhaut weniger scharf abgegrenzt, als die Descemet'sche Haut. Nach Mazeration des vorderen Theiles der Hornhaut in verdünnter Salzsäure liess sie sich theilweise abschaben, und die abgetrennten Stückchen haben dann in hohem Grade die Tendenz, sich nach innen aufzurollen. Durch andauerndes Kochen wird sie aufgelöst, ebenso bei längerer Behandlung mit concentrirten Mineralsäuren, und zwar früher, als die Descemet'sche Haut. Mit Rücksicht auf die aus der Ent-

frischen Hornhäuten mittelst eines äusserst scharfen Skalpells feine, senkrechte Schnittchen verfertigen, und den Schnitt in einem Zuge, nicht sägeartig führen. Jede Zerrung trübt das Bild; es muss selbst das Deckgläschen vermieden werden. An solchen Präparaten erscheint die Grundsubstanz gleichfalls durchaus homogen, beinahe gallertartig mit eingebetteten, glänzenden, strahligen Hornhautzellen. Hornhäute, die irgend eine Quellung erlitten haben, oder die getrocknet sind, setzen eben so, wie direkte mechanische Eingriffe, die Bedingungen zur Bildung künstlicher Spalten und Lücken, das sich sofort durch opake Trübung der Hornhaut zu erkennen giebt. Es sind also nach dem Verf. in der Grundsubstanz weder präformirte Lamellen noch eben solche Fibrillen vorhanden, wohl aber besteht die Neigung, sich in gewissen Richtungen in faserartige Lamellen und Fibrillen zu spalten. Die Disposition zu dieser Spaltbarkeit wird durch mehr oder weniger einseitige Entwicklung der eingelagerten Zellen bedingt. Als Lamelle wird hiernach diejenige Partie der Grundsubstanz bezeichnet, welche nach einer Richtung (Längsrichtung der Lamelle) spaltbar ist, und von Durchkreuzung der Lamellen kann insofern gesprochen werden, als damit gesagt wird, dass die Substanz in verschiedenen Ebenen verschiedene Spaltrichtung besitze. In diesem Sinne existiren nach His in der Grundsubstanz der Hornhaut lamellenartige oder bandartige Streifen von unbestimmter Länge, von einer zwischen 0,04—0,12" wechselnder Breite und von 0,002—0,004" Dicke. Sie haben im Allgemeinen eine parallele Schichtung, doch sollen die Bänder auch unter wenig geneigten Winkeln sich übereinander lagern und zu einem Maschenwerk verflechten. Am häufigsten ziehen die Lamellen in verschiedenen Schichten in gekreuzter Richtung über- und untereinander hinweg. Die Durchkreuzung erfolgt bei Thieren mit runder Hornhaut (Vögeln, Amphibien, Fischen) vorwiegend unter Winkeln von nahezu 90°; bei Säugethieren mit oval geformter Cornea ist der Kreuzungswinkel stumpfer. Die Hornhautzellen liegen, was an senkrechten Schnittchen äusserst deutlich wird, stets zwischen den Lamellen; von den beiden Axen, in denen sie ihre Flächenausläufer ausschicken, läuft die eine mit der überliegenden, die andere mit der unterliegenden Lamelle parallel. Die Bowman'schen Stützfasern der *Anterior elastica* sind solche, von parallel verlaufenden Zellen begleitete Lamellen. Die auf allen und in jeglicher Richtung gefertigten, senkrechten Schnittchen so deutlich hervortretende parallele Streifung erklärt der Verf. aus einer fibrillären Zerklüftung, deren Parallelismus mehr scheinbar sei (! R.).

Der einzige, anscheinend sichere Beweis, dass in der Hornhaut ein Flechtwerk sich durchkreuzender Bänder vorliege, ist, wie dem Ref. scheint, in den Angaben des Verf. über

das Verhalten senkrechter Schnittchen bei Untersuchung vermittelst des polarisirten Lichtes enthalten. Zwischen gekreuzten Prismen erscheint nämlich der Schnitt vollkommen dunkel, sobald er seiner Lage nach mit der Polarisationsebene eines der beiden Prismen parallel läuft; wird er dagegen gedreht, so dass er mit diesen einen Winkel, am besten von 45° macht, so bietet er ein Bild dar, in welchem die Lamellen abwechselnd hell und dunkel erscheinen, und zwar bilden die hell erscheinenden Streifen ein flach gedrücktes Netzwerk, dessen Maschen, gleich als ob es blos Lücken wären, dunkel erscheinen. Aus dem Vorangeschickten geht aber nach des Verf. Meinung hervor, dass es sich hier nicht um Lücken handele, sondern um diejenigen Lamellen, deren Querschnitt vorliege, während die längsdurchschnittenen Lamellen hell und gefärbt erscheinen müssen. Die Fähigkeit der Grundsubstanz in der Hornhaut, das Licht doppelt zu brechen, ist nach des Verf. Untersuchungen nicht jederzeit vorhanden. Beim Fötus war sie nicht zu beobachten. Ausserdem verliert die Hornhaut die bezeichnete Eigenschaft, wenn sie stark aufgequollen ist. Die Hornhautkörper, sowie beide elastischen Grenzschichten der Subst. propria besitzen nicht die Fähigkeit, das Licht doppelt zu brechen; sie erscheinen zwischen gekreuzten Nicol'schen Prismen unter allen Verhältnissen dunkel.

In Bezug auf die Hornhautzellen unterscheidet His hauptsächlich drei, durch den Ort des Vorkommens geschiedene Modifikationen. Die Hauptform ist die sternförmige; von dem platt gedrückten, ziemlich grossen Zellenkörper gehen

vereinigen. Die dritte Form findet sich in der Cirkulärschicht der Cornea an der Uebergangsstelle zur Scleroticā (? R.). Sie ist auch multipolar mit längeren und kürzeren Ausläufern. Die längeren Ausläufer nehmen einen circulären Verlauf und verbinden sich nicht untereinander; sie sollen durch ihren parallelen Verlauf an Bindegewebsfibrillen erinnern. Eine Verbindung der Strahlen der Hornhautkörperchen mit den Blut- oder Lymphgefässen hat sich nicht mit Sicherheit nachweisen lassen, obschon pathologische Fälle dafür sprechen. Die am Rande der Hornhaut und in der Sclera vorkommenden strahligen, ganz aus körnigem Pigment bestehenden Figuren haben nach His einen doppelten Ursprung. Einerseits entstehen sie durch Pigmentablagerung in den Hornhautkörperchen, anderseits durch pigmentirte, untergegangene Blutgefässe.

In Bezug auf die Entwicklung der eigentlichen Hornhautsubstanz bemerkt der Verf., dass sie ursprünglich nur aus Zellen bestehe und somit die Grundsubstanz als eine anfangs ganz homogene Masse sekundär auftrete und unter dem strahligen Auswachsen der Hornhautzellen allmählig an Menge zunehme. Der Verf. lässt es unbestimmt, ob diese Intercellularsubstanz aus den Gefässen oder von den Zellen abgesetzt werde.

Nach Winther (Unters. üb. d. Bau der Hornh. und des Flügelfelles; Giessen 1856. 4to.) entsenden die Hornhautkörperchen vier Fortsätze, von welchen je zwei diametral gegenüberstehen, so dass der Zellenkörper mit dem Kern in der Mitte eines recht- oder meist schiefwinkligen Kreuzes liegt. Durch die Vereinigung der Fortsätze benachbarter, grösserer oder kleinerer Zellen entstehen rautenförmige Figuren; in den vier Ecken derselben befinden sich die Zellenkörper und Kerne der vier Zellen, welche an der Bildung einer Raute sich betheiligen. In grösseren Rautenfeldern werden kleinere sichtbar, von denen sich nicht mit Sicherheit aussagen lasse, ob sie durch Vereinigung von sekundären Strahlen oder kleineren primären gebildet werden. Die beschriebenen Bilder sollen an feinen Flächenschnittchen frischer Hornhäute von Menschen und Schweinen zu erkennen sein. In dem Mittelpunkt der vorderen Hornhautoberfläche vom Schweine soll sich ein durch seine Grösse und durch die Dicke der Strahlen ausgezeichnetes Hornhautkörperchen vorfinden, das von dem Verfasser centrales Hornhautkörperchen genannt wird. — In einem späteren Nachtrage (Virchow's Arch. Bd. X. p. 507) bemerkt Winther, dass er die bezeichnete Centralzelle auch bei einem 1½-jährigen Knaben beobachtet habe; die Ausläufer zeigten sich hier feiner, und schnitten sich unter rechten Winkeln, welche dem inneren, äusseren, oberen und unteren Hornhautrande gegenüber sich öffneten. Nach demselben Typus, wie die Centralzelle,

waren im Allgemeinen die übrigen Hornhautkörperchen der menschlichen Hornhaut gebaut, sie bildeten mit ihren Ausläufern in Reihen geordnete parallele Züge, welche in nahezu gleichen Winkeln sich kreuzten und durchflochten.

Auch Dornblüth hat einige Vervollständigungen und Berichtigungen der im letzten Jahresberichte mitgetheilten Beobachtungen über den Bau der Hornhaut gegeben (Henle und Pfeuf. Zeitschr. Bd. VIII. p. 156 ff.). Auch beim Hecht und Flussbarsch bestehen die dickeren Lamellen, wie bei Säugethieren, aus einer Anzahl (2, 3 und mehr) feineren. Die beim Hecht so ausgezeichnete, vordere, elastische Grenzschicht lässt mehrere feinere Lamellen erkennen. Desgleichen ist die hinterste Hornhautlamelle beim Hecht durch Stärke und Helligkeit so ausgezeichnet, dass man sie als Descemet'sche Haut ansprechen kann. Das früher in der Mittelgegend der Hornhaut des Hechtes beschriebene Flechtwerk wird für ein Kunstprodukt erklärt. Dagegen wird noch immer die Faserverflechtung in den vordersten Lagen der Hornhaut festgehalten. Beim Barsch unterhält die Hauptmasse der Hornhaut eine Verbindung mit der Iris, oder wie der Verf. sich ausdrückt: die Fasern der Iris bilden die Hauptmasse der Hornhaut. Bei den höheren Thieren sind Unterbrechungen der Lamellen selten, oft nur scheinbar. Die vordere, elastische Grenzschicht ist beim Menschen, wie die Descemet'sche Haut, scharf geschieden. Ref. hat bereits in seiner Schrift (die Bindesubstanzgebilde etc. 1845) gezeigt, dass bei gehörig feinen Schnittchen selbst die Descemet'sche Haut nicht scharf von der übrigen Substanz der

theils in das Fasergeflecht der Sclera in der Umgebung des Canal. Schlemmii sich fortsetzen. Nach des Ref. Untersuchungen lässt sich in letzterer Beziehung nur ein kontinuierlicher Uebergang in die innerste, den Schlemm'schen Kanal von Innen her begrenzende, mit ihrer Streifung in der Richtung der Meridiane fortziehende, an elastischen Fasern reiche Sehnensubstanz der Sclerotica nachweisen. Das äquatoriale Lamellen- und Fasergeschlecht der Sclera steht nirgends mit der Substanz der Cornea in kontinuierlichem Zusammenhange. Als Resultat der an der Cornea eines $3\frac{1}{4}$ Zoll langen Kaninchenfötus gemachten Beobachtungen wird angegeben: die grössere Zartheit der Lamellenschichten, welche anscheinend den Bowman'schen Lamellen entsprechen und keine weitere Zusammensetzung aus feineren Lamellen erkennen lassen, was möglicherweise lediglich in der Kleinheit der betreffenden Gebilde begründet sein dürfte; — und die dichtere Lage der Hornhautkörperchen, welche sich ausserdem durch meistentheils deutlichere zellige Textur und leichtere Isolirbarkeit auszeichnen. Jedenfalls, — und darauf wünscht der Verf. ein besonderes Gewicht zu legen, um gewissermaassen die Lamellentheorie zu stützen, ist in der Cornea dieses Fötus nicht eine strukturlose Grundsubstanz mit eingelagerten Hornhautkörperchen vorhanden gewesen, sondern es waren bereits deutliche, parallele Streifen auch an Stellen sichtbar, wo sich keine Zellen befanden.

Ref. gehört zu denen, die das Vorhandensein eines geschichteten Baues in der Cornea nicht bezweifeln, wenn auch Henle in seinem Berichte vom Jahre 1856 das Gegentheil mittheilt und sich dabei, wie es scheint, auf seine Kenntniss vom Jahre 1845 bezieht. Des Ref. Ansicht von der Schichtbildung in den Gebilden der Binde substanz ist älter, als Henle's Erläuterungen über den Lamellenbau der Hornhaut; sie wurde zuerst im Jahresbericht vom Jahre 1848 (Müll. Arch. 1849, p. 41) besprochen; sie wird vom Ref. selbst für die Sehnensubstanz in Anspruch genommen, nur muss man die Kriterien dafür nicht, wie Dornblüth, dort suchen, wo sie nicht zu finden sind. Des Ref. Ansicht wurde noch mehr durch das Zerfallen der verschiedenen Binde substanzgebilde (Knorpel, Faserknorpel, Sehnensubstanz etc.) in Lamellen beim längeren Kochen (Zellinsky: Diss. inaug. de telis quibusdam collam edentibus, Dorpat. Liv. 1852, p. 45 ff.) befestigt. Gleichwohl giebt es embryonale Zustände der Binde substanzgebilde und namentlich auch der Cornea, in welchen mit Hilfe des Mikroskopes auch nicht die Spur einer Streifung wahrgenommen wird. Die Schichtbildung dürfte sehr leicht erst nachträglich in der Grundsubstanz eintreten. Es giebt ferner eine Schichtbildung in den Binde substanzgebilden, wie z. B. im hyalinen Knorpel, deren Vorhandensein durchs Kochen, durch Mazeration etc.

nachgewiesen werden kann, die aber durch das Mikroskop nicht erkannt wird. Was die Hornhaut betrifft, so sind die Lamellen, welche beim längeren Kochen schliesslich gewonnen werden, viel feiner, als diejenigen, welche sich durch die parallele Streifung verrathen; die Schichtbildung wird also auch mit Hilfe des Mikroskops nur andeutungsweise erkannt. Die Zahl der Streifen ist überdies so variabel bei verschiedenen Schnittchen selbst einer und derselben Cornea, noch mehr bei Hornhäuten verschiedener Individuen einer und derselben Spezies, je nach der Behandlung des Präparats, dass man sie; vorausgesetzt, dieselben gehören Trennungslinien zwischen den Lamellen an, dennoch in gewissem Sinne als zufällige Texturercheinungen der Hornhaut hinstellen kann.

Ueber den gallertartigen Kern der Intervertebralknorpel im frühesten Kindesalter sind uns durch Luschka folgende Beobachtungen mitgetheilt (Altersveränderungen der Zwischenknorpel in Virch. Arch. Bd. IX. p. 316 ff.). Der Nucleus pulposus lässt bei Betrachtung zwischen Glasplatten schon ohne Vergrösserung zahlreiche weissliche Klümpchen erkennen. Diese Klümpchen sind theils sphärisch, theils länglich rund, öfters auch kolbenartig; zuweilen stellen sie ein, unregelmässige Maschenräume einschliessendes, Balkenwerk dar. Bei mikroskopischer Untersuchung erkennt man in den Klümpchen eine Anhäufung von neben- und übereinandergelagerten Zellen von bald mehr runder, bald mehr eckiger Form und 0,04 Mm. Breite. Die Wandungen der meisten Zellen zeigen doppelte Kontouren, so dass das Ob-

Stellen beobachtete der Verf. sogar, dass die bezeichneten Lamellen sich zwischen und über die beschriebenen Klümpchen hinweg erstrecken. Ebenso bemerkt Luschka, dass die Substanz des Annulus fibrosus gegen die Höhle weicher werde, und dass ferner an glücklich gewählten mikroskopischen Objekten zahllose feine Fasern und auf alle mögliche Weise ramifizierte und zu zarten Netzen (? R.) verbundene Bindesubstanzkörperchen bis in die Gallertmasse hineingehen und den späteren Nucleus pulposus darstellen. — Nach Henle's Beschreibung (Bänderlehre p. 16; Jahresb. p. 50) ist „die scheinbare Höhlung der Wirbelsynchondrosen des Neugeborenen von einzelnen, zarten, knorpelkörperhaltigen, elastischen Lamellen und von einem zerreislichen, netzförmigen Gewebe durchsetzt, dessen Bälkchen in einer strukturlosen Grundsubstanz Kernzellen und kleinere und grössere, kuglige, von wasserheller Flüssigkeit erfüllte Hohlräume enthalten, die sich auf Kosten der Grundsubstanz zu vergrössern und diese zu verdrängen scheinen.“ Sieht man von den Bemühungen Henle's, der Lehre von den Bindesubstanzgebilden irgend welche Konzessionen zu machen, ab, so verräth sich in seiner Beschreibung nach des Ref. Erfahrungen eine genauere Kenntniss von einem Bestandtheil des Gallertkernes, den Luschka nicht genügend gewürdigt hat; auf der andern Seite hat Henle den zweiten Bestandtheil übersehen. Legt man in die Hohlräume Henle's die Klümpchen Luschka's hinein, so kommt nahezu das Strukturverhalten des Gallertkernes heraus. Letzterer besteht nämlich aus einem schwammartigen Gerüste von Lamellen, die im kontinuierlichen Zusammenhange mit den Knorpelplatten und dem Annulus fibrosus stehen und zwischen sich Hohlräume lassen, die von der sulzigen Masse erfüllt werden. Die Lamellen bestehen aus einer dem Faserknorpel ähnlichen Substanz, die sulzige Masse steht der gallertartigen Bindesubstanz zunächst, doch ist die Grundsubstanz etwas fester, wenigstens in nächster Umgebung der Bindesubstanzkörperchen selbst. Die sulzige Masse liegt übrigens ebenso wenig locker in ihren Hohlräumen, wie der ganze Gallertkern in der scheinbaren Höhle der Knorpelplatten und des Annulus fibrosus. Die verschiedene Konsistenz, sowie der verschiedene Wassergehalt der hier beisammenliegenden, verschiedenen Bindesubstanzgebilde bewirken es, dass sowohl bei mechanischen Eingriffen als beim Eintrocknen Trennungen leicht eintreten. An Schnittchen von glücklich getrockneten Präparaten sieht man zuweilen Partien der sulzigen Masse in inniger, fester Verbindung mit den Lamellen; auch besitzen letztere nicht selten eine flockige Begrenzung, wie wenn die sulzige Masse nur künstlich sich losgetrennt hätte. Für diejenigen Histologen, welche mit der natürlichen Auffassung der Bindesubstanzgebilde vertraut sind, und sich durch den versteckten Vorwurf Henle's, der Rei-

chert-Virchow'schen Binde substanztheorie Konzessionen gemacht zu haben, nicht weiter aus ihrer Ruhe bringen lassen, sei hier gelegentlich bemerkt, dass Ref. schon seit Jahren die Intervertebralknorpel älterer Fötus und Neugeborener dazu benutzt, um die verschiedenen Formen der Binde substanzgebilde mit den kontinuierlichen Uebergängen den Zuhörern zu demonstrieren und anschaulich zu machen.

Henle hat die Ueberzüge der Gelenkenden einer erneuten Untersuchung unterworfen (Bänderlehre). Der Faserknorpel oder wie der Verf. sich ausdrückt, ein dem Bindegewebe ähnliches Fasergewebe mit eingestreuten Knorpelkörperchen — (das Knorpelgewebe wird von Henle in seinem letzten Jahresbericht zu den „kompakten Geweben“ gerechnet) — findet sich in grösserer Ausbreitung vor, als seine allg. Anat. es angab. Von der Bandscheibe des Sternoclaviculargelenkes wird gesagt, dass dasselbe nicht aus Faserknorpel d. h. aus einem in Essigsäure unlöslichen*) Fasergerüste mit Knorpelzellen, sondern, gleich den übrigen Bandscheiben, aus Bindegewebe mit einer grösseren Menge Knorpelzellen bestehe. Wir würden sagen, es ist ein Faserknorpel, dessen Grundsubstanz, wie die des reifen Bindegewebes oder Sehnengewebes durch zahlreiche Streifen ausgezeichnet ist und durch Essigsäure stärker aufquillt. Dasselbe Gewebe überzieht auch die beiden Gelenkflächen im Sternoclavicular- und Acromioclaviculargelenk. Aehnlich verhalten sich die Bandscheiben des Kniegelenks: die Binde substanz- oder Knorpelkörperchen sind meist vereinzelt und kuglig.

wird, wenn der Unterarm mit dem Oberarm einen rechten Winkel bildet; desgleichen im unteren Radioulnargelenk, sowohl auf der Endfläche der Ulna als auf der Circumf. annularis, im Hüftgelenk auf dem Schenkelkopf im Umfange der Insertion des Lig. teres, endlich im unteren Tibiofibulargelenk auf beiden Flächen (Henl. u. Pf. Zeitsch. 3. Reihe. Bd. X. p. 48).

A. Hannover hat seine ausführlichen Untersuchungen über die Entwicklung und den Bau des Säugethierzahns in den Verhandl. der Kais. Leopoldinisch. Carol. Akad. der Naturf. (Bd. XXV., ersch. Ende des Jahres 1855; p. 807—936.) mitgetheilt. Die eigentliche Zahnsubstanz, vom Verf. „Dentine“ genannt, besteht aus dickwandigen Röhren, welche in einer Intertubularsubstanz ruhen. Die Wände der Elfenbeinröhren sind im Verhältniss zum Lumen sehr dick; sie können aber nicht immer unterschieden werden, weil sie gewöhnlich mit der Intertubularsubstanz verschmelzen; sie werden überhaupt nur an Querschnitten erkannt. Die Wände sind nach dem Verf. im Allgemeinen an der Krone dicker, als an der Wurzel; desgleichen in jüngeren Zähnen dicker, als in älteren. Da die Röhren nach innen, gegen den Keim hin, dichter liegen und ihr Lumen zugleich grösser wird, so ist ihre Wand aus diesen Gründen nach innen dünner. Dickere Wände der Röhren finden sich sonst gewöhnlich in Begleitung von grösserem Lumen vor; daher ist das Lumen dicker in der Krone als in der Wurzel etc. Das Lumen der Röhren ist nach aussen, in der Peripherie des Zahnes und in den Zweigen immer feiner, als nach innen. Eine irrige Annahme sei es aber, dass die Zahnröhren überhaupt nach aussen hin feiner werden; dieses gelte nur vom Lumen, nicht aber von der Röhre selbst mit ihren Wänden. Die Röhren zeigen, wie schon Retzius bemerkt, zuweilen Varicositäten. Die Pachydermen zeichnen sich gewöhnlich durch weite Röhren, die Edentaten und Cetaceen durch feine aus. Als Inhalt der Röhren wird im frischen Zustande eine durchsichtige kalkhaltige Flüssigkeit angegeben; im getrockneten Zustande erscheinen dieselben leer oder mit abgelaagerten Kalktheilchen gefüllt. Die Zahnröhren sind Stämme, aus welchen mehr oder weniger zahlreiche Zweige abgehen, doch wird ihre Zahl öfters — wegen der Dicke der Schnitten — zu hoch angegeben. Die äussersten Spitzen der Stämme und Zweige verlieren sich in der Intertubularsubstanz, indem ihre Wände mit derselben verschmelzen. Schlingen und Anastomosen benachbarter und entfernter gelegener Stämme und Zweige gehören zu den Ausnahmen. Die Annahme von Anastomosen der Zweige rührt nach Hannover oft von solchen Fällen her, wo die ursprüngliche, kuglige Grundform der Zahnsubstanz noch sichtbar geblieben ist, und die Interstitien zwischen den Kugeln mit Zweigen ver-

wechselt wurden. Der Verf. tritt ferner der Annahme entgegen, dass die Elfenbeinröhrchen sich zuweilen in den Schmelz fortsetzen (Erdl, Tomes u. A.). Diese Ansicht soll öfters von Präparaten gewonnen werden, wo das Zahnbein über den Schmelz hinüber greift. In anderen Fällen, wo es wirklich statt hat, soll es als ein *Vitium primae conformat.* angesehen werden. Ebenso wird die Verbindung der Dentinröhrchen mit den Knochenkörperchen in Abrede gestellt, da Cement und Elfenbein noch durch das *Stratum intermedium* getrennt sind, worüber später des Verf. Beobachtungen mitgetheilt werden. Gegen das centrale Ende hin liegen die Zahnröhrchen oft in Bündeln so nahe aneinander, dass der Durchschnitt polygonal wird. In seltenen Fällen vereinigen sich hier mehrere Röhrchen zu einem Stamm, der jedoch an Weite die einzelnen Röhrchen nicht übertrifft. Die Zellen des Zahnkeimes setzen sich in die, in Verknöcherung begriffenen Röhrchen fort. In ihren verschiedenen Biegungen verlaufen die Röhrchen, wie dieses Retzius richtig vom Elephanten beschreibt, gewöhnlich wellenförmig und gekräuselt. Die konzentrische Streifung des Zahnbeins wird von der periodisch und schichtweise vor sich gehenden Verknöcherung oder wie der Verf. lieber sagen möchte, „Verzahnung“ abgeleitet. Die Intertubularsubstanz ist strukturlos, an der Wurzel bedeutender, als an der Krone. Die kugelförmige Bildung (Interglobulär-Räume) scheint eine Andeutung derjenigen Art und Weise zu sein, auf welcher das Elfenbein ursprünglich aus runden Zellen des Zahnkeimes sich bildet. Niemals sah der Verf. die Zahnröhrchen durch die Kugeln

Cements bedeutend ist. Verschieden von den im Cement vorkommenden Markkanälchen sind feine Gänge, die entfernte Aehnlichkeit mit Zahnröhrchen haben, jedoch selten oder niemals verzweigt sind und gewöhnlich der Quere nach verlaufen. Beim Menschen sind sie etwas gröber, als die Zahnröhrchen. Der Angabe Tomes und Köllikers, dass sie mit den Zahnröhrchen in Verbindung stehen, wird widersprochen, da Cement und Zahnbein überall durch das Strat. intermed. getrennt sind. Verbindungen mit den Knochenkörperchen wurden nur beim Dugong beobachtet. Das Innere dieser Kanälchen ist immer hell; auch haben sie keine Verbindung mit Markkanälchen, so dass sie also nicht für rudimentäre Markkanälchen gehalten werden können.

Das Email besteht aus den durch Emailzellen gebildeten „Emailsäulen“. Letztere sind beim Menschen regelmässig sechsseitig; sie liegen dicht aneinander ohne Zwischensubstanz. Die Enden der Säulen sind grade abgeschnitten oder leicht abgerundet. Die Substanz der Säulen erscheint entweder einformig durchsichtig oder wie aus übereinander geschichteten, eckigen Bruchstücken zusammengesetzt. Der Verf. vergleicht ihr Aussehen mit den geldrollenartig koagulirten Blutkörperchen. Dadurch entsteht die quergestreifte Zeichnung der Säulen. Treffen die Querstreifen der Säulen aufeinander, so zeigt das Email eine mit der Oberfläche des Zahnbeines konzentrisch verlaufende Schichtung. Die Ursache der Querstreifung liegt in der schichtweisen Verkalkung jeder einzelnen Emailzelle; daher dieselbe bei jüngeren Thieren auch deutlicher ist. Eine jede Emailsäule, die wahrscheinlich die ganze Dicke des Emails durchsetzt, hat entweder einen graden, oder bogenförmigen oder leicht geschlängelten Verlauf. Das Nähere über die Richtung der Säulen muss in der Schrift selbst nachgelesen werden. Das Email grenzt unmittelbar an die Zahnschubstanz. Die Grenze zwischen beiden ist bei allen vom Verf. untersuchten Thieren scharf, von einer einfachen dunkeln Linie gebildet. Die Grenze zwischen Email und Cement wird durch das Strat. intermedium gebildet.

Das Stratum intermedium findet sich im entwickelten Zahn nach dem Verf. nur zwischen Cement und Zahnbein an der Wurzel und giebt sich hier als einen hellen strukturlosen Saum zu erkennen, der öfters dadurch verändert wird, dass sich fein- oder grobkörnige, unförmliche und undurchsichtige Kalkmassen in demselben ablagern. Diese Kalkmassen haben oft eine grosse Aehnlichkeit mit Knochenkörperchen und können mit ihnen verwechselt werden. In den verschiedenen menschlichen Zähnen sieht man das Strat. intermed. bald als hellen, strukturlosen Streifen zwischen der „Dentine“ und dem Cemente, bald als feinkörnige Schicht, ausserhalb welcher ein heller Saum im Cement auftreten kann,

die grösseren und kleineren unförmlichen Kalkmassen sind kleiner als die Knochenkörperchen und auch weniger leicht mit ihnen zu verwechseln. In den Wurzeln der Backenzähne sind helle Säume zu beiden Seiten der körnigen Schicht wahrnehmbar. An der Wurzelspitze ist das Strat. intermed. häufig undeutlich; es entsteht hier eine Vermengung der Dentine und des Cements, die aber von keiner wahren Kommunikation der Elfenbeinröhrchen und der Strahlen der Knochenkörperchen begleitet ist. Das Strat. intermed. ist auch schon von früheren Beobachtern (Tomes „granular layer“; Kölliker's „körnige aus kleinen Zahnbeinkugeln bestehende Schicht“ u. A.) gesehen: allein man hat es nicht genügend gewürdigt, da man die Membrana intermedia, woraus das Stratum entsteht, übersehen hat. — Der Verf. geht am Schlusse seiner Abhandlung ausführlicher auf die Umstände ein, welche die irrige Annahme eines Ueberganges der Dentinröhrchen in Knochenkörperchen herbeigeführt haben (a. a. O. p. 920 ff.).

In Betreff der Entwicklung und Verknöcherung des Zahnes werden uns über die Bildung des Zahnsäckchens keine nähern Erläuterungen gegeben. Der Verf. hebt nur mit Recht hervor, dass die Goodsir'sche Ansicht in allen Schriften wiedergegeben wird, ohne dass sie von Jemand bestätigt worden wäre, und obgleich Marcusen, dessen Beobachtungen Ref. zu verfolgen Gelegenheit hatte, ihre Unrichtigkeit nachgewiesen hat. An dem fertigen Zahnsäckchen, das mit seinem Inhalt zum Zahne verknöchert, sind vier Bestandtheile, entsprechend den 4 Bestandtheilen des Zahnes, anzunehmen: der Dentinkeim (Pulpa dentis — Zahnkeim); der Cementkeim, der durch Verknöcherung in das Cement umgewandelt wird; der Schmelz- oder Emailkeim, der unmittelbar den Dentinkeim bedeckt; und die Membrana

dem Zellinhalt hervorgehen. Nachdem die Anlage der Röhren erfolgt ist, verändert sich die weiche Masse zu einer festen kalkartigen Substanz und zwar zuerst in den ältesten Theilen am freien Rande und so fort; diese Veränderung wünscht der Verf. mit dem Namen „Verzahnung“ zu belegen. Die Ablagerung der Kalksubstanz geschieht zuerst um das Lumen der Röhren, später in den Wänden und in der Grundsubstanz. Ein Knochenscherbchen, von seiner inneren Fläche betrachtet, zeigt die Lumina der Röhren als kleine Fragmente mit runder oder ovaler Oeffnung; sie ragen aber über das Niveau der umgebenden Substanz hervor. Jene Fragmente sind natürlich die peripherischen Enden der bleibenden Zahnröhren. Gleichzeitig mit der „Verzahnung“ der Röhren geht die Solidification der Grundsubstanz zur Intertubularsubstanz vor sich. Wie Marcusen, so erklärt auch Hannover die *Membrana praeformativa* für die zuerst in Knochen verwandelte Partie des Zahnkeimes. Eine solche gefäßlose Schicht findet sich übrigens nicht allein beim Beginn der Verknöcherung des Zahnknorpels, sondern zu allen Zeiten auf der Innenfläche des Zahnscherbchens, indem die Gefäße von dem verzahnenden Theile des Dentinkeimes sich zurückziehen. Eine Vermehrung der Kerne der Dentinzellen durch Quertheilung wurde nicht beobachtet. — Als Cementkeim wird von dem Verf., übereinstimmend mit Marcusen (Cementorgan), das sogenannte Schmelzorgan (Raschkow) angesehen. Dieser Theil des Zahnsäckchens hat gar nichts mit der Bildung des Schmelzes zu thun; er wird von demselben überall durch eine besondere Haut, die vom Verf. sogenannte *Membr. intermed.* getrennt. Der Cementkeim umgibt kappenartig den Dentinkeim von allen Seiten, mit Ausnahme der Grundfläche, wird aber von demselben durch die *M. intermed.* und durch die Schmelzzellen der Krone geschieden. In seinem frühesten Entwicklungsstadium (als Primordialkeim) hat er eine fast flüssige Beschaffenheit und besteht aus einer mehr flüssigen Grundsubstanz mit eingebetteten, rundlichen, lichten Zellen. Darauf zeigt der Cementkeim eine schwach gelatinöse Konsistenz, und die Zellen sind nunmehr sternförmig ausgewachsen (Gallertartige Bindesubstanz R.). Später verwandelt sich das Cementorgan in eine Substanz, die der Verf. Faserknorpel nennt und welche auch aus einer streifigen Grundsubstanz und darin eingebetteten rundlichen Knorpelkörperchen besteht. Der Verf. schildert aber die Entstehung dieses Faserknorpels so, als ob die Streifen der Grundsubstanz durch die Strahlen der sternförmigen Körperchen gebildet würden, was sicherlich ein Irrthum ist. Die Verknöcherung des Cementorganes beginnt mit einer Ablagerung von Kalksalzen in der Intercellularsubstanz. Die Bildung der Markkanälchen könne man sich als eine Verflüssigung des Cementkeims und des Cementes selbst vor-

stellen, deren nächste Ursache höchst wahrscheinlich in der Bildung der Gefäße zu suchen sei. — Der Emailkeim (Schmelzmembran der Aut.) besteht durch und durch aus Zellen ohne Intercellularsubstanz. Die Zellen liegen anfangs noch locker beisammen und sind mehr rundlich; später sind sie dicht aneinandergedrückt, prismatisch, und füllen in nahezu senkrechter Stellung den Raum zwischen Membr. intermed. und dem Dentinkeim aus, hängen jedoch fester mit der ersteren zusammen. Der Kern der Zelle hat stets seine Lage an demjenigen Ende, welches mit der Membran. intermedia in Verbindung tritt und zuweilen bleibt er auch mit dem entsprechenden Theile der Zelle (beim Zerreißen der Präparate) an der letztern haften. Obgleich die Stellung der Zellen eine senkrechte genannt wurde, so bemerkt der Verf. doch, dass sie auch unter mehr oder weniger spitzen Winkeln gegen die Membr. int. und den Dentinkeim gerichtet sind. Die Schmelzzellen haben eine Neigung an dem einen, dem Dentinkeim zugewandten Ende, zugespitzt zu werden, und diese Spitze sehe man oft in lange Fäden ausgezogen. Zuweilen ist der Faden durch einen deutlichen Absatz von dem Zellkörper getrennt; er zeichnet sich auch durch eine scharfe Kontour aus. Sehr unwahrscheinlich sei, dass die Fäden losgerissene, noch nicht verzahnte Dentinröhrchen darstellen, zumal sie gewöhnlich als Fortsetzung der Emailzellen erscheinen. Die Verkalkung der nach und nach verlängerten Zellen beginnt an dem zuletzt besprochenen Ende und schreitet von hier nach der Membr. intermed. zum kernhaltigen Ende fort, um sie zur Schmelzsäule zu verwandeln. Die Ablage-

Diss. inaug. Petropoli. 1856 etc. tab. II.) neigt sich zu der Ansicht Owen's, dass besonders die Kerne der Pulpa dentis bei der Bildung der Zahnröhrchen betheiligt sind. Die Kügelchen, aus welchen die Zahnröhrchen entstehen, zeigen sich in der äussersten Perefherie des Zahnbeins ordnungslos beieinander gelagert. Gegen die Höhle des Zahnes hin sieht man sie in Reihen geordnet, aber noch nicht verschmolzen, bis endlich die fertigen Röhrchen sich anschliessen, während die Kügelchen geschwunden sind. Die Röhrchen haben sogar anfangs einen varikösen Habitus. Die Interglobularräume sind, wie gehörig feine Zahnschnittchen lehren, dichte Reihen übereinander gelagerter Kügelchen, aus denen die Röhrchen hervorgehen. Das Cement verdankt seine Entstehung einer Schicht von Zellen, welche am äusseren Rande des Schmelzes sichtbar wird. Sie betheiligen sich an der Bildung des Cementes auf die Weise, dass sie sich allmählig auflösen, der Inhalt zur Grundsubstanz verwendet wird, und die Kerne in die Knochenkörperchen sich verwandeln (! R.). Der Verf. sah häufig das Cement von Röhrchen durchzogen, die den Zahnröhrchen gleichen. Ebenso liessen sich Fortsetzungen der Zahnröhrchen in den Schmelz hinein verfolgen. Den Schluss der Arbeit nimmt die genaue Beschreibung eines gesunden und kranken Pferdezahns ein.

„Ueber das Wachsthum der Knochen nach der Dicke“ (Freiburg, 1856; c. tab. II.) veröffentlichte R. Maier seine Beobachtungen. Auch der Verf. ist der Ansicht, dass die Verdickung des Knochens durch Verknöcherung einer Wucherungsschicht der Beinhaut erfolge; doch sind seine Vorstellungen darüber im Einzelnen eigenthümlich und unrichtig. Es werden an der Beinhaut, wie gewöhnlich, zwei bis drei Schichten unterschieden, indem auch die verknöchernde Wucherungsschicht dazu gerechnet wird. Die äussere hat den Charakter des Sehnengewebes, welches keine elastischen Fasernetze enthält; auf sie folgt die an elastischen Fasern reiche Schicht. In der zuletzt genannten Schicht mehr nach dem Knochen hin werden die elastischen Fasernetze besonders reichlich und bilden ein Maschengewebe von grösseren und kleineren Maschen. Die Gefässformationen sind hier zugleich geringer. Je weiter man gegen die Verknöcherungsgrenze vorschreite, desto mehr überzeuge man sich, dass in dieser als Wucherungsschicht zu bezeichnenden Zone der Beinhaut eine grosse Menge von Kernen und Zellenformationen auftreten und die übrigen Theile verdecken. Auf das Bestimmteste glaubt der Verf. sich überzeugt zu haben, dass ein grosser Theil dieser Kerne und späteren Zellen innerhalb der elastischen Faser entstehen (? R.). Namentlich soll die Theilungsstelle der elastischen Fasern die Bildungsstätte der Kerne und Zellen sein. Eine eigentliche Blastemschicht zwischen Periost und Knochen wird geleugnet; es erstarrt die

innerste Lage der Beinhaut, nachdem sie gewisse Veränderungen durchgemacht hat, zu Knochensubstanz. Hierbei soll nun das durch die Zellenformationen nur verdeckte Maschenwerk von elastischen Fasern in das Netzwerk von Balken des ersten werdenden Knochens übergehen, während jene die Maschen ausfüllenden Zellformationen noch mehr überhand nehmen und das Ansehen der gewöhnlichen, röthlichen Markzellen erhalten. In den Balken soll anfangs noch das elastische Fasernetz zu erkennen sein und später erst schwinden, während die erwähnten Zellen darin zu Knochenkörperchen verwendet werden. Die von den ersten knöchernen Bälkchen eingeschlossene Substanz enthält nach dem Verf. gleichfalls noch Faserzüge elastischen Bindegewebes, namentlich in der Nähe der Balken selbst; sie werden zur Vergrößerung oder Vermehrung des Lamellensystems der Havers'schen Kanäle verbraucht. Nur die die Kanäle zunächst einschliessenden Gewebstheile empfangen ihre Bildung durch sekundäre Formationen, durch die Bildungszellen, welche im Periost entstehen. Aus ihnen gehen Gefässe hervor, und um diese entwickeln sich die konzentrischen Lamellen der Havers'schen Kanäle. Ref. ist nicht im Stande gewesen, sich vollständig in den Vorstellungen Maier's zurecht zu finden. Jene Substanz, welche während des Wachsthum's der Knochen nach der Dicke zwischen der eigentlichen Beinhaut und den verknöcherten Theilen sich befindet, daselbst fortdauernd wuchert und in die Rindensubstanz des Knochens umgewandelt wird (Vergl. Brandt: de processu ossificationis etc. 1852; tab. II. fig. 3), trägt die Charaktere eines Gewebes an sich,

besitzen. Freie Ausmündungen der Kanälchen kommen an der äusseren, der Beinhaut zugewandten Oberfläche des Knochens, ebenso an der inneren, der Markhöhle zugekehrten, endlich sehr zahlreich an der Innenseite der Havers'schen Kanäle vor.

Muskelgewebe.

Die so räthselhafte morphologische Beschaffenheit der gestreiften Muskelfasern hat seit dem Jahre 1856 die Aufmerksamkeit der Histologen von Neuem in höherem Grade in Anspruch genommen. Die Anregung dazu ging von Leydig aus (Müll. Arch. 1856; p. 156 ff.). Der Verf., von der keineswegs allgemein gültigen Ansicht ausgehend, dass die Existenz präformirter Fibrillen ihre Hauptstütze in den mikroskopischen Erscheinungen des Querschnittes der gestreiften Muskelfaser besitze, gelangte bei seinen Untersuchungen zu dem Resultat, dass die von Bowman und Kölliker für Querschnitte von Fibrillen gehaltenen Pünktchen vielmehr die Querschnitte von Hohlräumen sind, welche wahrscheinlich mit Kernen zusammenhängen und mit diesen Körperchen darstellen, die sich mit den verästelten Bindesubstanzkörperchen vergleichen lassen. Leydig macht darauf aufmerksam, dass die an dem Querschnitt eines getrockneten und mit Wasser wieder angefeuchteten Froschmuskels sichtbaren Pünktchen durchaus nicht so zahlreich seien, wie es erwartet werden müsste, und dass vielmehr die zwischen den Pünktchen gelegene Masse weit überwiege. Ausserdem haben die Pünktchen das Aussehen von Ringelchen, wie sie Bowman zeichne, grade so wie beim Querschnitt von Kanälchen. Endlich sehe man bei schräg getroffenen Primitivbündeln die lichten, scharf kontourirten Ringelchen zu länglichen, gezacktrandigen Figuren sich verlängern, deren Durchmesser mit dem des Primitivbündels parallel verlaufen. Bei Anwendung von Essigsäure schliessen sich die Lücken und nehmen sich als dunkle Pünktchen und Pünktchen-Reihen aus, grade so wie bei den Bindegewebkörperchen. Wenn ein Primitivbündel Fett enthält, so scheinen die Fettkörperchen ausschliesslich in diesen gezackten Hohlräumen untergebracht zu sein. Die zwischen diesen Pünktchen gelegene Zwischensubstanz ist also nach dem Verf. nicht als sogenannte „verkittende Substanz“ anzusehen, sondern als die eigentliche kontraktile, sog. Fibrillär-Substanz. Die Längs- oder Querstreifung dieser Substanz soll durch das bezeichnete Kanalsystem innerhalb des Sarcolemma's herbeigeführt sein. — Nach des Ref. Ansicht lehrt die Untersuchung besonders der Thoraxmuskeln von Insekten, dass die Fibrillen als natürliche Bestandtheile neben der primitiven Scheide, den Kernen und einer nur geringen Menge interfibrillären Stoffes in den Bau der gestreiften Muskelfasern aufzunehmen sind. Auch geht der Verf. zu weit,

wenn er es ganz und gar leugnet, dass diese Fibrillen sich auf dem Querschnitt der Figur zu erkennen geben können. Auf der anderen Seite muss man Leydig darin Recht geben, dass die Fibrillen ebenso, wie auf dem Längsschnitt, so auch auf dem Querschnitt sich wenig oder gar nicht verathen, und dass die im letzteren Falle sichtbaren Pünktchen oft deutlich das Ansehen von Lücken haben, in denen sogar kleine Kügelchen oder Fetttröpfchen bemerkt werden.

Kölliker hat auch sofort in seiner Abhandlung (Bemerk. zum Bau der Muskelfaser. Zeitsch. f. w. Zoolog. Bd. VIII. p. 313 ff.) die Existenz der Fibrillen in der gestreiften Muskelfaser wenigstens der höheren Geschöpfe gegenüber Leydig in Schutz genommen. Der Verf. gesteht zwar ein, dass er selbst, und wohl auch viele andere Forscher, früher die Querschnitte der später zu erwähnenden Körnerzüge in der Muskelfaser mit den Querschnitten der Fibrillen verwechselt haben, und dass letztere keineswegs so häufig und so deutlich wie man es vielfältig annahm, zu Tage treten. Dennoch komme an Querschnitten gestreifter Muskelfasern zuweilen eine so regelmässige, gleichartige, aber zarte Punktirung vor, die kaum auf etwas Anderes als auf die querdurchschnittenen Fibrillen bezogen werden könne. Die Pünktchen stossen so dicht beisammen, dass mikroskopisch wenigstens eine verkittende Zwischensubstanz nicht nachzuweisen sei. Was die gezacktrandigen Körper Leydig's betrifft, so glaubt Kölliker sich zu dem Ausspruch berechtigt, dass dieselben nichts Anderes sind, als die längst bekannten Kerne der primitiven Muskelbündel im eingeschrumpften Zustande.

Höhlen) der kontraktilen Substanz, welche die Körnchen enthalten, oft ziemlich scharf begrenzt. Nach Anwendung der Essigsäure werden die Körnchenreihen durch die aufgequollenen Fibrillen komprimirt und zu faserartigen Streifen verwandelt. Die Körnchenzüge liegen hier zahlreich auch in der Nähe der Kerne. Von den Lücken, in welchen Körnchenzüge mit und ohne Kerne sich befinden, sind bald grössere, bald kleinere Vacuolen zu unterscheiden, die in reihenförmiger Anordnung nach Anwendung von diluirten Salzlösungen (Glaubersalz 3—7%) dadurch entstehen, dass die kontraktile Substanz durch Aufnahme von Salzlösung an den Stellen stärker auseinanderweicht, wo die interstitiellen Körnerzüge liegen. An Querschnitten der Muskelfasern sind mehr oder weniger deutlich die Kerne, die Durchschnitte der Fibrillen und endlich die interstitiellen Körnerzüge zu erkennen. Der Verf. macht ferner darauf aufmerksam, dass die längst bekannten, dunkeln Fettkörnchen, die namentlich auch in Froschmuskeln sehr häufig sich finden, einer Metamorphose der normal in jeder Muskelfaser vorkommenden und bisher übersehenen blassen Körnchen ihren Ursprung verdanken. Die Grösse sowohl, als die Lage und Anordnung der Fettkörnchen stimmt mit den beschriebenen Zügen von blassen Körnchen überein. Es lag nur die Frage nahe, die chemische Beschaffenheit der letzteren Körnchen genauer zu ermitteln. Bei Anwendung von Kalilösung (20%) werden bekanntlich die Muskelfasern blass, und die Körnchenreihen treten auf kürzere Zeit äusserst deutlich hervor. Nach 1—2 Stunden und Zusatz von Wasser entleeren sich die Muskelfaserscheiden ihres Inhaltes; die kontraktile Substanz ist dann in einen feinkörnigen Detritus zerfallen, die Kerne sind bekanntlich hellblasig, die Körnchenreihen bleiben im Wesentlichen unverändert. Nach 24 Stunden sind Sarcolemma, Kerne und Körnerzüge noch immer zu erkennen. In Kalisolution (5—10%) ist nach 24 Stunden jede Spur der Körnerzüge geschwunden. In kalter Essigsäure erhalten sich die Körner gut, doch meist in Form von kernfaserartigen Fäserchen; nach längerem Kochen in Essigsäure schwinden sie und zwar früher als die Fibrillen. In Wasser, Alkohol, Aether lösen sie sich auch beim längeren Kochen nicht auf, ausgenommen diejenigen, die aus Fett bestehen. Kölliker glaubt sich hiernach zu der Folgerung berechtigt, dass die interstitiellen Körner in chemischer Beziehung ziemlich mit der kontraktilen Substanz übereinstimmen, nur dass sie in Kalisolutionen sich schwieriger und in Essigsäure leichter lösen (? R.).

Die vom Verf. genauere beschriebenen Körnerreihen, welche in Interstitien (Leydig's Höhlensystem) zwischen den Fibrillen öfters in Begleitung von Kernen und umspült von einer grösseren oder geringeren Menge eines nicht näher zu bestimmenden Fluidums vorkommen, gehören zu längst bekann-

ten Erscheinungen der gestreiften Muskelfasern. Wenn dieselben bisher, und zwar zunächst bis auf Leydig, für den Bau der Muskelfasern nicht besonders verwerthet wurden, so geschah dieses wohl aus dem Grunde, weil man sie für Produkte des Stoffwechsels gehalten oder auch in die granulirte, kernreiche Axensubstanz vieler Muskelfasern untergebracht hat. Für die Histologie ist die Entscheidung der Frage von Wichtigkeit, ob die interfibrillären Interstitien mit den Körnchen etc. in die normale Struktur der Muskelfasern aufzunehmen sind, oder nicht, und im ersteren Falle, wie man sich mit ihnen den Bau der gestreiften Muskelfasern zu denken habe. Bei Entscheidung dieser Fragen werden die Resultate aus der Entwicklungsgeschichte der gestreiften Muskelfaser wesentlich mitzusprechen haben, und diese ist bis zur heutigen Stunde noch zu wenig bekannt, am wenigsten allgemein anerkannt. Gegen Leydig's Versuch, die interfibrillären Hohlräume und ihren Inhalt mit verzweigten Bindesubstanzkörperchen zu vergleichen, spricht der Umstand, dass besondere Wandungen an diesen Hohlräumen nicht nachzuweisen sind. Kölliker nimmt sofort die Frage auf, ob die interstitielle Körnersubstanz nicht mit dem Stoffverbrauche in den Muskeln zusammenhänge und gewissermaassen als mikroskopischer Ausdruck des raschen Umsatzes des Materiales in denselben anzusehen sei. Der Verf. denkt sich die Möglichkeit, dass die Körnchen, welche eine ähnliche Anordnung (lineare) und Grösse, wie die Sarcous elements von Bowman, besitzen, einem direkten Zerfallen der Fibrillen ihren Ursprung verdan-

seien. Endlich wird noch die Möglichkeit aufgestellt, dass die Körnerreihen, wenn auch der beständigen Regeneration von Fibrillen angehörig, nicht sowohl auf das Zerfallen der letzteren, als vielmehr auf ihre Neubildung bezogen werden müssen. Für diese Ansicht liesse sich vielleicht anführen, dass schon bei Embryonen und Neugeborenen schöne Reihen von blassen, zuweilen auch von dunklen, fettartigen Körnchen in den Muskelfasern angetroffen werden.

Wie man sich leicht überzeugt, und wie auch Kölliker selbst eingesteht, muss die ganze Frage als eine, noch lange nicht spruchreife angesehen werden. Zunächst scheint wohl noch die Frage erledigt werden zu müssen, ob die kernähnlichen Gebilde der gestreiften Muskelfasern, desgleichen die öfters vorkommende körner- und kernreiche Axensubstanz derselben mit den so leicht fettartig werdenden Körnerreihen der Muskelfasern sehr vieler Thiere in eine Kategorie zu stellen sind. Ref. möchte dieses bezweifeln. Die an Kernen reiche Axensubstanz und die zerstreut vorkommenden Kerne des primitiven Muskelbündels sind am Auffälligsten im Embryo und Fötus während der Bildung und Entwicklung des primitiven Muskelbündels, ohne dass man etwas Genaueres über ihre Bedeutung daselbst aussagen könnte. Die Körnchenreihen dagegen werden in den schon gebildeten und in Thätigkeit gesetzten Muskelfasern angetroffen und dürften hier wohl als Erscheinungen entweder der Regeneration oder des einfachen Stoffwechsels der Muskelfibrillen zu deuten sein. Kölliker's Ansicht neigt sich mehr zur Regeneration hin. Wenn jedoch, wie nach der Beständigkeit der Körnchenreihen in vielen Muskelfasern angenommen werden muss, die Regeneration beständig vor sich geht, so müssen auch die darauf bezüglichen Erscheinungen des Zerfallens der Fibrillen und der Neubildung in übersichtlicher Reihenfolge vorliegen, und dieses ist nicht der Fall. Viel wahrscheinlicher ist es, dass man es mit Erscheinungen des bei den Muskelfasern so regen, einfachen Stoffwechsels, mit Niederschlägen des zwischen den Fibrillen abgesetzten Stoffes zu thun habe. Mögen indess die Körnchenreihen der Regeneration oder dem einfachen Stoffwechsel der Fibrillen angehören, in beiden Fällen darf man nicht übersehen, dass dieselben bei der Frage nach der Struktur und Textur der gestreiften Muskelfaser eine nur untergeordnete Stellung gegenüber den übrigen Bestandtheilen einnehmen.

Was die Ausbreitung der in Rede stehenden Körnchenreihen betrifft, so bemerkt Kölliker, dass sie eine, wenn auch vielleicht nicht allgemeine, so doch sehr verbreitete Erscheinung in den gestreiften Muskelfasern sind. Am auffallendsten sollen sie zwischen den so leicht in einzelne Fibrillen zerfallenden Muskelfasern der Insekten sein. Der Verf. rechnet nämlich hierher jene bekannten Körner und

die fein granulirte Substanz zwischen den Muskelfasern daselbst. Inzwischen dürfte es noch fraglich sein, ob die bezeichnete Substanz mit den interfibrillären Körnerreihen der Wirbelthiere zu identificiren ist. Man findet nämlich die fragliche Substanz der Insekten auch zwischen ganzen Muskelbündeln und zwischen den Fibrillen derselben keine Spur davon. Noch in den letzten Tagen untersuchte Ref. die Muskelfasern am Stachel der Bienen; die meisten primitiven Bündel zeigten eine an Kernen reiche Axensubstanz; nirgends waren zwischen den Fibrillen Körnerreihen zu bemerken. Auffallend sind die Körnerreihen, wie der Verf. hervorhebt, bei den nackten Amphibien; ferner bei Fischen, namentlich sehr schön in den blassen Muskeln eines im Mai gefangenen Störes. Von den Muskeln der Herzkammern der Frösche lassen sich die blassen, interstitiellen Körner leicht isolirt erhalten. Bei den Säugethieren und dem Menschen sind obige Körner nur dann gut zu sehen, wenn sie fettig entartet sind.

„Ueber freie Enden quergestreifter Muskelfäden im Innern der Muskeln“ haben wir einige Mittheilungen durch A. Rollet erhalten (Sitzungsb. der Akademie d. W. zu Wien; Bd. XXI. p. 176—180). Um die freien Enden der Muskelfasern im Verlaufe der Muskeln leichter aufzufinden, müssen letztere zuerst gekocht und dann in Glycerin gelegt werden, worauf sie nach Zusatz von Wasser sich bequem in ihre Fasern trennen lassen. Die im Innern der Muskeln vorgefundenen, freien Enden der Muskelfasern laufen sämmtlich, sich allmählig verschmälernd, in eine Spitze aus, welche langgezogen sich zwischen die benachbarten Muskelemente

im Laufe des Muskels auf der einen Seite spitz, auf der anderen, wie bei der Insertion der Sehnen, stumpf endigten. Desgleichen zeigten sich die spitz auslaufenden Enden von Muskelfasern gegen beide Insertionspunkte des Muskels gerichtet. Rollet hat endlich auch die Frage aufgeworfen, ob die im Innern des Muskels endigenden Muskelfasern nur als solche anzusehen seien, die sich in einem vorübergehenden Entwicklungsstadium befinden und die schliesslich bei beendetem Wachsthum die Sehne noch erreichen würden. Bei einem Vergleich der, im Innern gleicher Muskeln des Kindes und Erwachsener spitz endigenden, Muskelfasern zeigte sich, dass die Anzahl derselben bei ersterem nicht häufiger sind, als bei letzteren. Wesentlich dasselbe Resultat wurde bei Vergleichung der Muskeln des Rindes und Kalbes gewonnen. Die spitzen Enden der Muskelfasern des Kalbes sind schlanker, als die des Rindes, allein dieser Unterschied in der Dicke der Muskelenden verschiedener Altersstufen steht in gleichem Verhältniss zur Dicke der Muskelfasern überhaupt. Die erwähnten Umstände sprechen also nicht sehr dafür, dass die spitz auslaufenden Muskelenden einem vorübergehenden Entwicklungsstadium angehören.

A. Fick hat Beobachtungen über die Anheftung der Muskelfasern an die Sehnen angestellt (Müll. Arch. 1856, p. 425 ff.). Der Verf. geht bei seinen Untersuchungen und bei Abfassung seiner Abhandlung, wie es scheint, hauptsächlich von der Unterlage aus, welche ihm die Kölliker'schen Handbücher der Gewebelehre unterbreiten und glaubt, dass eine „eigens dem Uebergang der Muskel in die Sehnenfaser gewidmete Untersuchung“ nicht vorliege. Ref. erlaubt sich daher auf seine Schrift über die Binde substanzgebilde (Dorpat 1845, p. 76—79), desgleichen auf den Jahresbericht vom Jahre 1850 (Müll. Arch. 1851, p. 56) hinzuweisen, an welchem letzteren Orte sogar die Bowman-Kölliker'schen Ansichten kritisch besprochen worden sind. Von den Leydig'schen Arbeiten auf diesem Gebiete war im letzten Jahresbericht die Rede. A. Fick ist zunächst in Betreff des Sarcolemma zu demselben Resultate gelangt, zu welchem auch Ref. und Leydig gelangt waren. Ob die Muskelfasern unter spitzen Winkeln an die Ränder und Flächen der Sehnen stossen, oder sich gradlinig in die letzteren fortsetzen, überall sieht man die primitive Muskelscheide sich kontinuierlich in die Sehnen substanz fortsetzen. Da Kölliker und vor ihm Bowman behauptet hatten, dass nur bei den unter spitzen Winkel an die Sehne stossenden Muskelfasern ein solcher Uebergang stattfinden sollte, so wurden besonders die gradlinig in ihre Sehne sich fortsetzenden Muskeln untersucht; so namentlich der *Musc. gastrocnemius* des Frosches, desgleichen derselbe Muskel von der Maus und vom Kaninchen, endlich auch vom Menschen. Es wurden theils

frische Präparate gewählt, theils solche, die eine kurze Zeit in Alkohol gelegen hatten und nun sich sehr bequem zertheilen liessen. Während aber der Verf. hinsichtlich des Sarcolemma sich ganz auf die Seite des Ref. gestellt hat, so wird in einem andern Punkte die ältere, auch von Kölliker für gewisse Fälle angenommene Ansicht als allgemein gültig wiederholt, nämlich die Ansicht, dass die fibrilläre Substanz der Muskelfasern direkt in die Sehnensubstanz übergehen solle. Der Verf. sagt ausdrücklich, dass innerhalb des Schlauches, durch welchen die Sehne in das Sarcolemma übergeht, noch Sehnenfäden sichtbar seien, die mit den Fibrillen der Muskelfasern im Zusammenhange stehen. Später wird hinzugefügt, dass die bezeichneten Fäden sich wahrscheinlich zum Theil zwischen die Fibrillen der Muskelfasern hinein erstrecken. Es ist dem Ref. aus der Abhandlung nicht ganz klar geworden, ob alle Fäden direkt sich mit Fibrillen verbinden, oder nur ein Theil derselben, oder ob alle Fäden schliesslich doch zwischen den Fibrillen hinziehen. Referent muss jeden Zusammenhang der Fibrillen mit der Sehnensubstanz leugnen. Es wird übrigens auch aus den beigegebenen Zeichnungen des Verf. offenbar, dass derselbe die feinen Fältchen des Sarcolemma am Ende einer Muskelfaser als Fädchen gedeutet hat, die von der Sehnensubstanz zu den Fibrillen hinziehen sollen.

Die Muskelfasern von *Oxyuris ornata* (*Triton igneus*) beschreibt G. Walter (Zeitsch. f. w. Zool. Bd. VIII. p. 175 ff.). Es lassen sich an ihnen eine äussere, direkt vom Corium entspringende, fein längstreifige Membran, des Sarcolemma,

angefüllt, die mit einem bei durchfallendem Lichte röthlich erscheinenden Kern versehen sind. Werden die Präparate aber frisch ohne Anwendung von Wasser beobachtet, so sieht man keine Zellen, sondern nur die röthlich schimmernden kernartigen Körper. Aus den Durchschnittsenden solcher Muskelfasern treten dagegen grosse, hüllenlose, eiweissartige Tropfen hervor, welche den röthlich schimmernden Körper enthalten und theils durch Druck, theils, wenn auch selten, freiwillig verschiedene Formen annehmen. Der Verf. wünscht diese Fasern als Sarcodeschlänche zu betrachten, die später zu den beschriebenen Muskelfasern älterer Individuen sich umwandeln.

An den noch nematodenartig gestalteten Cysticerken aus der Leber von Kaninchen besteht die unter der Epidermis gelegene, ziemlich dicke Muskelhaut aus bandartigen, glashellen, homogenen Fäden von beträchtlicher Länge und 0,0019 Mm. Breite; Kerne lassen sich nicht nachweisen (Leuckart: Die Blasenwürmer etc. Giessen 1856, p. 128).

— Die Muskelfasern der Pulmonaten besitzen nach Semper (Zeitsch. f. w. Z. Bd. VIII, p. 345) ein deutliches Sarcolemma, an welchem zuweilen Kerne bemerkbar werden. Im Inhalte werden zwei Schichten, die Rinden- und Marksicht unterschieden. Die Rindenschicht ist homogen und durchsichtig, hat aber grosse Neigung in kleine Stücke zu zerfallen, die an dem durchgeschnittenen Ende der Muskelfasern herausfallen. Die Marksicht ist fein granulirt, im frischen Zustande jedoch so blass, dass man die Muskelfaser für hohl halten könnte. Mit Wasser behandelte Muskelfasern lassen die Rindenschicht in Stückchen austreten, worauf der solide Axenstrang deutlich hervortritt; der Name „Muskelröhren“ (Leydig) erscheint hiernach für diese Muskelfasern nicht ganz passend. — Die Muskelfasern der *Medusa aurita*, welche sich besonders an der unteren Fläche der Scheibe konzentrisch in den central gelegenen Mund u. s. w. ausbreiten, stellen nach M. Schultze 0,001—2" breite, sehr blasse, kernlose Bänder dar, an welchen bei frisch aus dem Seewasser entnommenen Thieren deutliche Querstreifung zu erkennen ist, wie dieses schon R. Wagner von der *Pelagia noctiluca* angegeben und gezeichnet hat (Müll. Arch. 1856, p. 314).

Ch. Morel, développement et structure du système musculaire. Thèse présentée au concours pour l'aggrégation en anatomie etc. Paris. 4to.

Histologische Formbestandtheile des Nervensystems.

Gastaldi's Untersuchungen über die Endigung des Geruchsnerven waren, wie der Verf. hervorhebt, bereits zum Abschluss gelangt, bevor ihm die Abhandlung Ecker's bekannt gewesen (*Nuove Ricerche sopra la terminazione del*

nervo olfattorio; Mem. approvata per la stampa nei Vol. Accad. nell' adunanza del 29 giugno 1856). Der Verf. ist durch seine Beobachtungen an Fröschen bei Anwendung der Chromsäure zu Resultaten gelangt, die ein ähnliches Verhalten der Endigung des Geruchsnerven, wie das des Nerv. acusticus nach Corti und des Sehnerven nach Müller und Kölliker herausstellen. An feinsten Schnittchen, die senkrecht durch die Membr. Schneid. gemacht werden, unterscheidet der Verf. folgende Schichten. 1) Unmittelbar auf den knorpligen Theilen findet sich die nervöse Schicht, welche ebenso, wie die Nervenfaserschicht der Netzhaut in Betreff des N. opticus, als flächenhafte Ausbreitung des Nerv. olfactorius anzusehen ist. Sie enthält viele sternförmige Pigmentzellen. 2) die Anhänge der Nervenfasern (Appendici nervei), welche sich unter einem rechten Winkel von der Nervenfaserschicht abheben, um sich an das centrale, innere Ende der sogenannten Coni anzufügen. Dieselben zeigen in ihrem Verlaufe eine gangliöse Anschwellung mit einem deutlichen, grossen Kern; ihr direkter Uebergang in die Nervenfasern war nicht zu verfolgen, doch ist er wahrscheinlich. Die fragliche Schicht wird mit der Körnerschicht der Netzhaut verglichen. In der tieferen Lage dieser Schicht kommen zahlreiche Schleimdrüsen — Follikel vor. 3) Unmittelbar unter dem Cylinderepithel liegt eine Schicht kegelförmiger Körper (Coni), deren breitere Basis mit dem Befestigungs-ende je einer Cylinderzelle sich verbindet, und deren entgegengesetztes schmaleres Ende auf den peripherischen Ausläufern der unter (2) angeführten Nervenanhänge stösst. Ein

kennen, deren Zellennatur zweifelhaft ist. Von den um den Kanal vertheilten Nervenfasern sind die unterhalb desselben gelegenen von geringerer Dicke, als die oberhalb sichtbaren. Eine besondere Aufmerksamkeit verwendete der Verf. auf Untersuchung der Nervenfasern beim Verlaufe derselben in dem Bulbus olfact. und durch diesen hindurch in die Riechschleimhaut. Die Nervenfasern des Tract. olf. ziehen im graden Verlauf bis zum Bulbus, weichen hier allmählig auseinander, nehmen an Zahl ab und hören etwa 1" P. hinter dem konvexen Rande desselben auf. Gegen die Spitze des Bulb. hin waren nur noch sehr wenige Fasern bemerkbar; niemals liess sich eine Faser in die Fortsätze hinein verfolgen, welche aus dem Bulbus olf. in die Nasenhöhle hineintreten. Wo die Nervenfasern im Bulbus olf. aufhören, ist die Substanz des letzteren durch ein dichtes Kapillarnetz ausgezeichnet. Wie die Fasern im Bulbus endigen, war nicht genau zu ermitteln. Doch sah man die Enden der dickern und dünneren Nervenfasern gegeneinander geneigt, und es wäre also möglich, dass sie schlingenförmig so ineinander übergehen, wie es Böttcher beim Nerv. cochleae bemerkt hat. Bei den Säugethieren verhält sich der Tract. und Bulb. olf. wie beim Menschen. Die Nervenfasern des Hundes hatten eine Breite von 0,0020", die der Katze von 0,0010" P. — Die zwölf bis funfzehn Fortsätze, welche vom Bulb. olf. durch die Foram. cribrosa zur Schneider'schen Riechhaut entsendet werden, nehmen hier in Form eines netzförmigen Geflechtes zunächst die Lage zwischen Beinhaut und dem innersten Theile der Schleimhaut ein. Beim Menschen liess sich von hier kein Aestchen, kein Zweig zur Oberfläche der Riechhaut verfolgen. Beim Frosch laufen aus dem Netzwerk Fortsätze aus, die in das Schleimhautsubstrat eintreten und hier mit dem bindegewebigen Stroma so verschmelzen, dass sie nicht mehr unterschieden werden können. Bei Hunden und Katzen haben die frisch untersuchten Fortsätze des Bulbus innerhalb des Schädels eine grauliche Färbung, eine sehr weiche, leicht zerreissliche Beschaffenheit und ein mehr hyalines Ansehen. Weiterhin, nachdem sie von Scheiden der Dura mater umhüllt in die Riechhaut eingetreten sind, zeigen die Stränge unregelmässige, parallele Streifung und sind von stäbchenförmigen, längsovalen, kernähnlichen Körperchen besetzt. Bei Hunden und Katzen lassen sich die Stränge mit einiger Mühe in dünne Fasern von 0,006" - 0,0084" P. spalten. Die Fasern sind plattgedrückt, bandförmig, von feingranulirtem Ansehen; die länglichen, fast stäbchenförmigen, zuweilen in sehr feine Fäden auslaufenden Kerne lösen sich leicht von ihnen ab. Der Verf. stimmt in der Beschreibung dieser Fasern im Allgemeinen mit den Angaben Kölliker's, Harless's, Hessling's überein, doch glaubt er dieselben nicht als Hohlkörper auffassen zu dürfen, man solle sie viel-

mehr als Stränge ansehen, deren peripherischer Theil solide, deren fein granulirte, centrale Masse zähflüssig sei und beim Druck, niemals aber von selbst, theilweise heraustrete (? R.). Bei jungen Thieren zeige sich die centrale Masse etwas flüssiger. Die Zertheilung der Riechnerven in faserähnliche Gebilde gelingt sehr leicht beim Hecht und überhaupt bei Fischen. Bei erwachsenen Vögeln ist die centrale Masse der Fasern fester und selbst beim stärkeren Druck nicht auszu-pressen. Seeberg ist daher der Ansicht, dass die beschriebenen Fasern der vom Bulbus olf. abgehenden Fortsätze, obgleich sie im Laufe (gleichsam in der Fortsetzung R.) des Nerven liegen, nicht als Elemente des Nervensystems angesehen werden dürfen. Es fehlen denselben diejenigen Eigenschaften, welche die Elemente des Nervensystems charakterisiren; man solle sie vielmehr als Hilfsorgane des Tract. und Bulb. olf. betrachten, die sich analog der Stäbchenschicht der Retina oder den Fortsätzen des Schnecken-nerven (Böttcher) etc. verhalten. Histologisch sollen die in der Riechschleimhaut ausstrahlenden Aeste und Zweige des N. olfact. als eine besondere Form von Bindesubstanz betrachtet werden, mit welcher sie auch in ihrem Verhalten gegen Essigsäure und Schwefelsäure übereinstimmen.

Bei Scyllium verhält sich die allerletzte Nerven- ausbreitung des N. olfactorius nach Kölliker folgendermaassen (Würzb. Verhandl. 1857; p. 34 ff.). Von den sekundären Blättern der mit Chromsäure behandelten Geruchsorgane lassen sich dünne, zarte Häutchen isoliren, die unmittelbar unter dem Epithel liegen und vom Verf. als wirkliche Nerven-

der Verf., mache die ganze letzte Nervenansbreitung den Eindruck, als ob sie aus einem Netze von einfachen Nervenfasern und anastomosirenden mit diesen Fasern verbundenen Zellen bestände, und möchte daher auch die Annahme gerechtfertigt erscheinen, dass die Kerne auch da, wo sie in Nervenzweigeln liegen, die aus mehreren Fasern zusammengesetzt sind, in den Fasern selbst ihre Lage haben. Kölliker wünscht übrigens die Vergleichung der Kerne mit Ganglienzellen noch nicht als eine ausgemachte Sache betrachtet zu sehen; es käme hauptsächlich darauf an, mit Rücksicht auf die Strukturverhältnisse der Retina und des Verhaltens des Nerv. cochleae in der Endausbreitung, den bezeichneten Gedanken aufzunehmen. Weitere Untersuchungen, schliesst Kölliker, werden zu zeigen haben, welche Verbreitung die eigenthümlichen von ihm aufgefundenen kernhaltigen Nervenfasernetze bei anderen Thieren haben, und ob dieselben die wirklichen Endigungen des Geruchsnerven darstellen oder nicht.

H. Müller hat seine ausführlichen Untersuchungen über den Bau der Netzhaut in der Abhandlung „Anatomisch-physiologische Untersuchungen über die Retina des Menschen und der Wirbelthiere“ (Zeitsch. f. w. Zool. Bd. VIII. p. 1—123) niedergelegt. Bei allen Wirbelthieren findet sich in der Netzhaut dieselbe Zahl und dieselbe Reihenfolge von Schichten: die Stäbchenschicht, die äussere Körnerschicht, die Zwischenkörnerschicht, die innere Körnerschicht, die granulöse Schicht, die Nervenzellenschicht, die Sehnervenfaserschicht, die *M. limitans*. Zahllose und konstante Verschiedenheiten dagegen zeigen sich in Form, Grösse, Anordnung der Elementartheile, sowie in dem Massenverhältniss der einzelnen Schichten. Die Stäbchenschicht besteht fast überall*) aus Stäbchen und Zapfen, deren Grösse im Allgemeinen, wie schon Hannover angiebt, ein umgekehrtes Verhältniss zeigen, so zwar, dass die Zapfen niemals länger, oft aber kürzer als die Stäbchen sind. Stäbchen und Zapfen lassen eine innere und äussere Abtheilung unterscheiden, welche sehr häufig nach dem Tode (weniger im frischen Zustande) durch die bekannte Querlinie angedeutet wird. Die äussere, stets cylindrisch geformte Abtheilung der Stäbchen besitzt überall die gleichen, bekannten Eigenschaften; die innere Abtheilung ist meist etwas blasser, zeigt andere Metamorphosen nach dem Tode und hat öfters nicht cylindrische Form. Die äussere Abtheilung der Zapfen (Zapfenspitze, Zapfenstiel) ist meist konisch, bald dicker, bald dünner (Barsch — Frosch) als die entsprechende Abtheilung der Stäbchen; zuweilen ist die Form auch cylindrisch (Tauben, gelber Fleck

*) Die Zapfen wurden bei den Plagiostomen vermisst, die Stäbchen dagegen bei Petromyzon und einigen Amphibien.

des Menschen) und den wahren Stäbchen sehr ähnlich, wie denn überhaupt durch zahlreiche Uebergangsstufen es sehr wahrscheinlich gemacht werde, dass Zapfen und Stäbchen nicht wesentlich verschieden seien. Zuweilen (Frosch, Mensch) beobachtete der Verf., dass das freie Ende des Zapfenstiels noch eine durch eine helle Querlinie getrennte, feine Verlängerung trug. Die Querlinie, durch welche der Zapfenstiel vom Zapfenkörper geschieden wird, liegt nicht immer genau in gleichem Niveau mit der Scheidegrenze beider Stäbchenabtheilungen; letztere befindet sich öfters mehr nach innen. Der Zapfenkörper verlängert sich durch eine blasse, das Licht weniger stark brechende Partie (Fortsatz d. Verf.) über die Grenzlinie hinweg, durch welche die Stäbchenschicht und äussere Körnerschicht geschieden wird. An frischen Präparaten geht die das Licht stärker brechende und sonst scheinbar abgerundete Partie des Zapfenkörpers unmerklich in die innere, das Licht weniger stark brechende Partie über. Die Verbindung zweier Zapfen zu Zwillingszapfen kommt reichlich bei Fischen, sehr sparsam bei Vögeln, gar nicht bei Fröschen und Säugern vor. Die farbigen Oeltropfen sah der Verf., wie Vintschgau, auf der Grenze des Stiels und Körpers der Zapfen; beim Frosch sind sie innerhalb des Zapfenkörpers gezeichnet. Bei Fischen, Amphibien, Vögeln sollen, wie schon Hannover angab, Scheidenfortsätze der Zellen der Membr. pigmenti chor. zwischen die Elemente der Stäbchenschicht eingreifen. Ref. hält diese Scheidenfortsätze für Kunstprodukte. — Die kleinen Zellen der äusseren Körnerschicht stehen entweder unmittelbar oder vermit-

beim Menschen und den Säugethieren sind dieselben weniger deutlich von den anderen Zellen zu unterscheiden. — Von der granulösen Schicht hebt der Verf. die verschiedene Dicke derselben bei verschiedenen Thieren hervor. — In Betreff der Ganglienzellenschicht bemerkt der Verf., dass die Verbindung der Strahlen mit den Sehnervenfaseru wohl allgemein verbreitet vorkomme. Dasselbe gelte wohl auch von dem Eindringen anderer Fortsätze der Nervenzellen in die äusseren Schichten der Retina und von den Anastomosen der Nervenzellen untereinander, obschon hier genauere Untersuchungen wünschenswerth erscheinen. — Allgemein verbreitet werden die Radialfasern angetroffen. Sie gehen von der Innenfläche der Netzhaut mehr, weniger grade bis zur inneren Körnerschicht, wo sie eine kernhaltige Anschwellung zeigen, von welcher eine Fortsetzung in die äusseren Schichten der Retina sich erstreckt. Die Zahl der inneren Radialfasern ist, wie es scheint, durchgängig geringer, als die der äusseren Schichten, so dass nicht ein Stäbchen oder Zapfen, sondern eine ganze Gruppe derselben in den Bereich eines inneren Radialfaser-Endes fällt. Die Radialfasern hängen, besonders vorn in der Retina, sehr innig mit der Membr. limitans zusammen; an anderen Stellen soll dieses gar nicht der Fall sein, so dass also wohl die inneren Enden der Radialfasern je nach der Lokalität ein verschiedenes Verhalten haben mögen. Bei Menschen sind in der Macula lutea die inneren Enden der Radialfasern gar nicht zu finden. Eine grössere oder kleinere Strecke vor der Ora serrata sammelt sich, worauf auch Blessig hinwies, eine grosse Menge von Flüssigkeit zwischen den starken, inneren, kegelförmigen Enden der Radialfasern an, so dass dadurch von Säulen durchsetzte Hohlräume gebildet werden. Was die sonstigen Verbindungen der Radialfasern namentlich mit Nervelementen betrifft, so drückt sich der Verf. darüber viel vorsichtiger, wie früher aus. Der Anschein spreche indess nicht selten für eine Verbindung, namentlich der inneren Partie, mit den Nervenzellen. Dennoch glaubt der Verf. nicht, dass jede Zelle mit einer Radialfaser zusammenhänge, oder umgekehrt (? R.). Diese Annahme ergebe sich schon aus dem Umstande, dass am gelben Flecke viele Nervenzellen vorhanden seien, die inneren Enden der Radialfasern aber nicht vorhanden seien. Im Allgemeinen glaubt Müller annehmen zu können, dass jede Nervenfasern des Opticus in eine Zelle übergehe, von welcher einerseits ein Fortsatz zur M. limitans (innerster Theil der Radialfaser), anderseits Fortsätze nach aussen zu den Körnern des Strat. gran. int. sich hinbegeben. Die Verbindung des äusseren Theiles der Radialfasern mit den Körnern der äusseren Schicht sei gleichfalls dem Anscheine nach kontinuierlich, namentlich scheine ein Zweifel kaum zulässig für

diejenigen Fäden, welche in der Gegend der *M. lutea* von den inneren Körnern zu den Zapfen gehen.

Eine besondere Beschreibung widmet H. Müller drei Stellen der menschlichen Retina: der Eintrittsstelle des Sehnerven, dem gelben Flecke und dem vorderen Ende der Netzhaut. In einem sonst normalen Auge sah der Verf. die von der Lamina cribrosa einwärts gelegene Partie des Sehnerven ganz besät mit strahligen Pigmentzellen. Die Entfernung der Mitte der Eintrittsstelle von der Mitte des gelben Fleckes betrug in einem Auge 4,6 Mm., in einem anderen 3,9 Mm.; in dem ersteren Auge hatte die Eintrittsstelle einen Durchm. von 1,6—1,7 Mm., in dem letzteren 1,5—1,68 Mm., so dass die Stelle merklich oval war. Ferner hat der Verf. bemerkt, dass die Radialfasern am Rande der Eintrittsstelle des Sehnerven nicht aufhören, sondern, wenn auch sparsam, noch weiterhin die Nervenmasse durchsetzen und dabei um so mehr eine schräge Richtung annehmen, je mehr die Nervenfasern beim Durchzuge durch die Lamina crib. radial werden. Diese schrägen Radialfasern erstrecken sich dann bis zur Lamina selbst, ja scheinen von ihr auszugehen, ein Umstand, der darauf hinweist, dass die inneren Radialfaserenden nicht nervös seien, sondern der Binde substanz angehören. Der Durchmesser des gelben Fleckes kann, wenn man auf die nach dem Tode eintretende Diffusion des Farbstoffes Rücksicht nimmt, auf etwa zwei Mm. angenommen werden. Das *Foram. centrale* ist sicherlich nur eine verdünnte Stelle und nicht eine Lücke in der *M. lutea*. Nur die granulöse Schicht scheint im mittleren Theile

Zwischenkörnerschicht ist hier ferner durch ihre leichte Spaltbarkeit in Fibrillen ausgezeichnet, zwischen welchen nach Innen zu eine beträchtliche Menge granulöser Substanz eingelagert ist. Die Fibrillen verlaufen theils schräg, theils selbst eine Strecke horizontal, bevor sie zu den Körnerschichten hinziehen. Die Körner der inneren Körnerschicht nehmen nicht allein an Zahl, sondern auch an Grösse zu; die ganze Schicht erscheint ausserdem häufig senkrechtstreifig angeordnet, — wegen der zahlreichen Verbindungsfäden zwischen der äusseren und inneren Körnerschicht. Die granulöse Schicht, welche in der Mitte der *M. lutea* fast oder vielleicht ganz verschwindet, enthält zahlreiche feine Fäden, welche von den Nervenzellen in sie hinein und durch sie hindurchtreten. In der Ganglienzellenschicht glaubt der Verf. acht übereinander gelagerte Reihen von Zellen erkannt zu haben. In der Fovea nimmt die Zahl der Nervenzellen wieder ab, und in der Mitte derselben liessen sich etwa drei Reihen von Zellen unterscheiden. Die Nervenzellen der *M. lutea* sind kleiner, als an anderen Stellen der Netzhaut, jedoch durch die Länge der nach aussen gerichteten Fortsätze ausgezeichnet. H. Müller stimmt darin Hannover bei, dass der gelbe Fleck nicht in seiner ganzen Ausdehnung der Nervenfaserschicht ermangele, gleichwohl stehe es fest, dass die Mitte des gelben Fleckes zwar nicht der Nervenfasern, wohl aber einer regelmässigen Ausbreitung derselben an der Oberfläche entbehre, indem die Fasern im bogenigen Verlauf zwischen die Zellen treten. In der Mitte des gelben Fleckes fehlen die Blutgefässe; im übrigen Theile findet sich ein reiches Kapillarnetz; in der Umgebung desselben verlaufen, wie schon Michaelis genau beschreibt, grössere Stämmchen bogenförmig, wie die Nerven. Wie Vintschgau und Kölliker, so lässt auch Müller die Retina an der *Ora serrata* als *Pars ciliaris ret.* sich unmittelbar fortsetzen. Dieser Theil besteht aus gekernten Zellen, welche beim Menschen anfänglich eine Höhe von 0,04—0,05 Mm. und eine Dicke von meist 0,005—0,008 Mm. besitzen. Weiterhin gegen die Ciliarfortsätze werden die Zellen niedriger und rundlich. Beim Schwein sind die Zellen gleich von der *Ora ser.* an niedrig und von rundlicher Gestalt. Viel schwieriger ist die Frage zu beantworten, in welchem Zusammenhange die *Pars ciliaris retinae* mit den einzelnen Schichten der Netzhaut stehn. Sie kann jedenfalls nicht als Fortsetzung einer Schicht der Retina zu betrachten sein, welche mit nervösen Funktionen begabt sei. Die Nervenfasern, die Stäbchen, die Nervenzellen sind schon hinter der *Ora serrata* geschwunden; auch haben die Zellen der *Pars ciliar.* keine Aehnlichkeit mit den Nervenzellen, die sparsam hinter der *Ora serrata* vorgefunden werden. Auch von einer der übrigen Schichten der Netzhaut lässt sich kaum behaupten, dass sie als solche über

die Ora serrat. hinaus sich erstrecke. Am nächsten schliesst sich die Pars ciliaris an die innere Körnerschicht an, welche gegen die Ora serrat. hin ihren Charakter bereits auffallend verändert hat. Namentlich sei wohl das indifferente Stroma dieser Schicht, welches seine Vertretung in den mit kernhaltigen Anschwellungen versehenen Radialfasern (also in den inneren Theilen der Radialfasern) findet, von dem man vielleicht sagen könne, dass es sich in die Pars ciliar. fortsetzt. Der Verf. glaubt in den, zuweilen mit zackigen Enden versehenen Zellen der P. ciliaris ret. Binde-substanzkörperchen zu erkennen.

Unter Bidder's Anleitung hat Arthur Böttcher die Endigungsweise des Nervus cochleae bei Säugethieren einer genauen mikroskopischen Untersuchung unterworfen (Obs. microscop. de ratione, qua nervus cochleae mammal. terminatur. Dorpati Liv. 1856; c. tab. I.). Der Verf. geht, wie Reissner und Claudius, davon aus, dass die häutige Schnecke nicht als Platte (Pars membranacea laminae spiralis), sondern als Kanal anzusehen sei, und nennt den Kanal, wie Reissner den seinigen, canalis cochlearis. Es ergibt sich aber aus der Beschreibung, dass der Verf. den Reissner'schen Canalis cochlearis ebenso wenig als Claudius (vergl. Jahresb. Müll. Archiv. 1856, p. 85 ff.), gekannt hat, und dieses ist um so mehr zu bedauern, als ihm die Gelegenheit geboten war, Reissner'sche Präparate zu sehen. Böttcher's Canalis cochlearis ist der von Claudius beschriebene Kanal, indem auch der Verf. die Deckmembran des Corti'schen Organes nicht frei endigen, sondern im na-

Sehen wir von dieser Kontroverse einstweilen ab, so scheint es dem Ref. doch keinem Zweifel unterworfen zu sein, dass der von Reissner gewählte Name „*Canalis cochlearis*“ für den von ihm entdeckten Kanal beibehalten werden muss, und dass dieser Kanal, wie die Entwicklungsgeschichte lehrt, das häutige Labyrinth der Schnecke darstellt.

Was nun den Nerv. cochleae betrifft, so bemerkt der Verf., dass er im Verlaufe des Nerven durch den Modiolus bis zur Habenula ganglionaris nirgends Nervenzellen vorgefunden habe. Die von Nervenfasern durchflochtene Habenula gangl. enthält zum grössten Theile kleinere Nervenzellen, die keineswegs so leicht zerstörbar sind, wie es Corti angiebt. Es wurde ferner vom Verf. ebenfalls der Zusammenhang der Nervenzellen mit den Nervenfasern beobachtet. Die meisten Ganglienzellen sind bipolar, wie es Corti angebe, doch finden sich auch tripolare unter ihnen, woraus hervorgehe, dass die Nervenzellen auch in den peripherischen Ganglien durch Anastomosen sich untereinander verbinden. Die aus der Habenul. gangl. hervortretenden, doppelkontourirten Nerven ziehen nun, ohne sich zu theilen, in Form eines netzförmigen Geflechtes bis zu den Löchern, welche das Labium tympanicum durchbohren und zum Corti'schen Organe führen. Die Nervenfasern als solche dringen aber nicht, wie es Kölliker angiebt, durch die Löcher; sie formiren vielmehr eine Schlinge und laufen central zurück. In ihrem Verlaufe bis zu den bezeichneten Löchern werden die Nervenfasern in mässiger Distanz von Bündeln feiner Fasern quer durchsetzt, über deren Beschaffenheit, Ursprung und Ende der Verf. keine Rechenschaft abzulegen weiss. Von den terminalen Schlingen der Fasern des Schneckenervens gehen aber Fortsätze aus, die durch die erwähnten Löcher hindurch in das Corti'sche Organ übergehen. An dem Corti'schen Organe unterscheidet Böttcher nicht 4, sondern 2 Theile oder Glieder, nämlich die Stäbchen erster und zweiter Ordnung. Die breiten aneinander stehenden Enden der Stäbchen beider Reihen sind von Corti als besondere Glieder aufgeführt. Böttcher's Stäbchen erster Reihe umfassen Corti's „*branche postérieure ou interne des dents de la deuxième rangée*“ und „*coin postérieur ou interne*“. Sie gehen als cylindrische Fortsätze von den Nervenfasern-Schlingen aus und bilden zunächst, nachdem sie durch die Kanälchen aufgestiegen sind, eine trianguläre, zellenähnliche Anschwellung, welche bei Betrachtung von oben das Lumen des Kanälchens erkennen lässt und so die Kontour eines Kernes vorspiegelt. Weiterhin läuft der Fortsatz verdünnt weiter und schwillt von neuem an seinem Ende an, das etwa die Form eines Parallelepipedium besitzt. Die Stäbchen zweiter Ordnung beginnen auf dieselbe Weise, wie das Ende der ersten, verschmälern sich dann ähnlich, wie jene, um schliesslich durch

das zweite, breitere Ende mit der Membrana basilaris zu verschmelzen. Ein jeder mit der Nervenfaserschlinge zusammenhängende Fortsatz theilt sich übrigens bei seinem Austritt aus dem Kanälchen und geht in zwei Stäbchen erster Ordnung über; desgleichen schliessen sich an je drei Stäbchen erster Ordnung etwa zwei Stäbchen der zweiten an. Der Verf. leugnet, dass in dem Corti'schen Organe irgend ein Gelenk vorkomme. Was die Lage des Corti'schen Organes betrifft, so hebt Böttcher hervor, dass dasselbe nicht lang gestreckt über der Membr. basil. sich hinziehe, sondern nahezu einen S-förmigen Bogen beschreibe, dessen zweite stärkere Krümmung die Verbindungsstelle beider Stäbchen aufnehme. Das Corti'sche Organ und die Membr. basilaris wird nicht von einer mehrfachen (Claudius), sondern von einer einfachen Schicht polyedrischer Epithelialzellen bekleidet, die öfters sich dachziegelartig decken; der übrige Raum zwischen der Membr. Cortiana und der Membr. basil. wird von der Endolympha eingenommen; eine durch einen Stiel vermittelte Anheftung dieser Zellen auf dem Corti'schen Organe, wie es Corti beschrieben hat, findet nicht Statt. Der Verf. wendet sich am Schluss seiner Arbeit zur Beantwortung der Frage, ob die durch die Kanälchen zwischen den Dentes auditivi im Labium tympanicum hindurchtretenden Fortsätze mit dem Corti'schen Organe im Sinne Kölliker's als Bestandtheile des Nervensystems und als terminale Endigungen des Nerv. cochleae anzusehen seien, oder ob dieselben in die Kategorie von besonderen Vorrichtungen und Hilfsapparaten der im Labium tympanicum

schaften der Zähne (Stäbchen) und der Membr. basilaris egal zu sein scheinen.

Leydig hat in den Papillen der sogenannten Daumen-drüse des Froschmännchens Tastkörperchen entdeckt (Müll. Arch. 1856, p. 154). Die Nervenfasern steigt in die betreffenden Papillen senkrecht auf und bildet eine Art Nerven-Glomerulus von ovaler Form, der grosse Aehnlichkeit mit einem Tastkörperchen darbietet. Häufig ist in Folge der Präparation das Bild derartig verändert, dass anstatt der queren und geschlungenen Linien des Nervenknäuels sechs und mehr rundliche Klümpchen, zu einer Gruppe zusammengestellt, das Tastkörperchen repräsentiren. Dagegen bezweifelt der Verf. zufolge seiner Untersuchungen, dass im Schlunde der Vögel, wie es Berlin angiebt, Tastkörperchen vorkommen. Was die Struktur der Tastkörperchen beim Menschen anbelangt, so neigt sich Leydig zu der Ansicht, dass die Nervenfasern in die Axensubstanz der Tastkörperchen eindringen. Der Verf. findet, dass der innere Strang der Tastkörperchen in seiner Natur ganz mit dem Cylinder übereinstimme, zu welchem die Nervenfasern innerhalb der Vater-Pacini'schen Körperchen der Vögel anschwillt. Um den Nervenknopf schlägt sich das mit Querkernen versehene Neurilemma.

In Bezug auf die Enden der Nerven im elektrischen Organe der Zitterrochen erhalten wir durch Remak folgende Mittheilungen (Müll. Arch. 1856, p. 467 ff.). An jedem Blättchen der Säule, welches kaum $\frac{1}{100}$ in der Dicke messen dürfte, unterscheidet der Verf. eine glatte und eine raue Seite. Die glatte Seite jedes Blättchens, welche wahrscheinlich nach oben gewendet ist, ist der rauhen Seite des angrenzenden Blättchens zugekehrt. Sie wird durch eine durchsichtige beinahe glashelle, ziemlich feste Membran gebildet, welche in grossen, regelmässigen Entfernungen runde, kernhaltige Höhlen enthält. Die raue Seite wird von der Nervenschicht eingenommen. Die Verästelungen der Nervenfasern in derselben geht viel weiter, als sie von R. Wagner erkannt worden ist; der ganze scheinbar freie, körnige Raum, der zwischen den gröberen Verästelungen liegt, ist von feinen Nervenverästelungen ausgefüllt. Es bleiben nur kleine, runde oder polyedrische Figuren von kaum $\frac{1}{800}$ und darunter übrig, welche von Nervenfasern, deren Durchmesser auf weit weniger als $\frac{1}{1500}$ geschätzt wird, umsäumt werden. Das Ansehen von Körnchen entsteht durch die knieförmigen Umbiegungen der terminalen Fäserchen, welche in senkrechter Richtung der Glasmembran zustreben. Gleichwohl hält es der Verf. für möglich, dass die feinen, durch die Dicke des Blättchens hindurch ziehenden Linien nicht auf die Fortsetzungen der Nervenfasern, sondern auf eine differente, der Muskelsubstanz ähnliche Masse zu beziehen seien. In der Nervenschicht wurden zuweilen sternförmige oder spindel-

förmige, mit grossen Kernen versehene Bindegewebszellen vorgefunden.

Kölliker unterscheidet an jeder Säule des Zitterrochens, abgesehen von den dickeren, bindegewebigen Umhüllungen, 1) die Scheidewände, Septa; 2) die seitlichen Wandungen und 3) die von je zwei Septa und den betreffenden Seitenwänden umschlossenen, einen mehr flüssigen Inhalt führenden Räume, die Fächer, alveoli. Der Inhalt der Alveolen ist mehr gallertartig und enthält, ausser den von R. Wagner beschriebenen Nervenfaserverästelungen und feinen Blutgefässen, vereinzelte spindelförmige oder sternförmige Bindegewebskörperchen, deren lange, feine Ausläufer vorzugsweise in der Nähe der Septa liegen. Die Höhe der Fächer oder der Abstand zweier Septa beträgt $0,006-0,008''$, wie es auch Pacini fand. Die Scheidewände bestehen aus zwei dünnen, mit einander verklebten, doch sonst nicht weiter verbundenen Lamellen: der homogenen Bindegewebshaut und der Nervenhaut (Bilharz's elektrische Platte). Die Bindegewebshaut bildet die obere Seite der Scheidewand und ist dem Anscheine nach strukturlos. Ob sie auch die von anderen Autoren erwähnten kern- oder zellenartigen Bildungen enthalte, darüber drückt sich der Verf. etwas zweifelhaft aus, da die bezeichneten Körper zuweilen auch frei an der oberen Seite der Nervenhaut angetroffen wurden. In anderen Fällen dagegen ist ihre Lage innerhalb der Bindegewebshaut so deutlich, dass man sie zu derselben gehörig betrachten müsse. Die stets nach unten gelegene Nervenhaut besteht hauptsächlich aus den feinsten, blassen Ausläufern der Nerven der Septa

der gewöhnlichen Rochen unterscheidet Kölliker in dem vorderen Abschnitte, dem sog. Schwammkörper (der hintere Abschnitt wird Gallertkern genannt) die Nervenplatte, welche in einem weicheeren, bindegewebigen Stroma zahlreiche Nervenverzweigungen enthält. Die feinen, blassen Primitivröhren, welche in ihrem Verlauf hie und da spindelförmige, an den Theilungsstellen dreieckige, homogene, gelbliche Anschwellungen (Zellenkörper) zeigen, wenden sich, indem ihre Elemente immer feiner werden, gegen die konvexe, glatte Fläche der Nervenplatte. Ihre Endigungsweise ist schwer zu bestimmen, soviel glaubt jedoch der Verf. ermittelt zu haben, dass die Fäserchen gegen die Oberfläche der Nervenplatte zu sich senkrecht stellen und 'bis an die äusserste Grenze derselben hinanreichen: In einigen Präparaten endigten sie hier frei mit leichten, knopfförmigen Anschwellungen; in anderen von frischen Thieren bildeten sie, wie es schien, ein horizontal ausgebreitetes Netz, dessen Fasern und Maschen grösser waren, als im elektrischen Organe der Zitterrochen (a. a. O. p. 12 ff.).

Die Anastomosen und Endschlingen der Nervenfasern nimmt Kölliker von Neuem in Schutz und giebt eine darauf bezügliche Zeichnung der Nervenendigungen aus der Haut der Hausmaus, die von ihm schon vor Jahren angefertigt ist (Zeitsch. f. w. Z. Bd. VIII., p. 311 ff.).

Walter fand in den von ihm entdeckten Ganglien bei *Oxyuris ornata* unipolare und bipolare Ganglienzellen. Die unipolaren Nervenzellen sind am häufigsten in der auf der Bauchseite des Darmendes gelegenen Ganglienmasse, sowie in dem, den unteren Rand des Rectum's umgebenden Ganglienwulste. Auch im Gehirn finden sich unipolare Ganglienzellen; in den spindelförmigen Ganglien des Schwanzes scheinen nur bipolare Ganglienzellen vorzukommen. Die Fortsätze der Nervenzellen bilden in ihrem weitem Verlauf die Nervenfasern selbst (Zeitsch. f. w. Z. Bd. VIII., p. 189.)

J. Drummond, art. Sympathetic nerve. (Todd's cyclopaedia Part. XLVII.).

Blut und Lymphe.

E. Hirt hat nach der Moleschott'schen Methode (Wiener Wochenschrift 1854, No. 8) Zählungen der Blutkörperchen unternommen, um das numerische Verhältniss der weissen und rothen Blutkörperchen im normalen und im krankhaften Zustande zu bestimmen. Als Verdünnungsflüssigkeit wurde nach Welcker eine Lösung von Kochsalz (20 Gr. auf 200 C. C. Wasser) gewählt, zu derselben ein Blutropfen auf dem Objektglase zugemischt, und zur Kontrolle auch ein Tropfen aus der vorher zubereiteten Mischung zur Untersuchung benutzt. Der Verf. erhielt folgende Resultate. Früh nüchtern (10—12 Stunden nach dem Abendessen)

fanden sich im Mittel 1761 rothe Blutkörperchen auf ein weisses; 1—1½ Stunde nach dem Frühstück 695 : 1; 2½—3 Stunden nach dem Frühstück 1514 : 1; ½—1 Stunde nach dem Mittagessen 429 : 1; 2½—4 Stunden nach dem Mittagessen 1481 : 1; ¼—1 Stunde nach dem Abendessen 544 : 1; 2¼—3½ Stunden nach dem Abendessen 1227 : 1. Aus drei Zählungen, die 10 Minuten nach Beendigung der Mahlzeit unternommen waren, ging hervor, dass der Anfangspunkt des Steigens in der Zahl der weissen Blutkörperchen innerhalb dieser Zeit noch nicht stattgefunden hatte. Die Schwankungen in der Zunahme und Abnahme der Zahl der weissen Blutkörperchen innerhalb 24 Stunden erinnern an die Schwankungen in der Pulsfrequenz und Temperatur. — In der Milzarterie wurden auf 1 weisses Blutkörperchen einmal 2600, dann 1843 und ein drittes Mal 2095 rothe Blutkörperchen gezählt; die Milzvene enthält bei drei Zählungen auf 1 weisses Blutkörperchen 74, 54, 82 rothe Blutkörperchen. Drei Zählungen in Betreff des Pfortaderblutes ergaben das Verhältniss 1 : 708, 768, 97 und für die Lebervene 1 : 68, 274, 67 (Müll. Arch. 1856, p. 174 ff.).

In dem Blute der Leber (Vena port. ? R.) neugeborner und säugender Thiere (Katzen, Hunde, Mäuse) fand Kölliker folgende Elemente, 1) Viele ein- und zweikernige, runde Zellen von 0,003—0,007^m mit mässig grossen Kernen, die durch Wasser granulirt werden, frisch ganz homogen sind und zuweilen gelblich erscheinen; 2) eine oft nicht unbedeutende Zahl bisquitförmiger, d. h. in Theilung begriffener Zellen mit zwei Kernen; 3) fein granulirte, 0.01—0.02^m

mit Sicherheit auffinden können. Die Vermehrung der Blutzellen ist im Allgemeinen schwierig zu verfolgen, doch das scheint dem Verf. unzweifelhaft, dass die Blutkörperchen nicht den ganzen primitiven Zellen entsprechen, sondern aus Metamorphosen jener entstehen, deren Zellmembranen allein zur Bildung der Gefäßwandungen verschmelzen (? R.) (Untersuchungen über die Entwicklung der Gefäße etc. Berlin 1856, fol.).

A. Milne Edwards: Note sur les dimensions des globules du sang chez quelques vertébrés à sang froid (Annal. des scienc. nat. Tom. V. p. 165. — IVe Série).

Nach Kölliker stammen die oben beschriebenen, farblosen Elemente des Leberblutes junger Thiere vielleicht alle, auf jeden Fall die Mehrzahl, aus der Milz, — da dieselben sich ebenfalls darin vorfinden. Namentlich kommen viel reichlicher die bisquitförmigen Zellen mit zwei Kernen in der Milz vor, und die einkernigen, kleineren Zellen haben oft eine entschiedene gelbe Farbe (a. a. O. p. 188).

Aus zwei Beobachtungen, die Kölliker beim Ochsen und beim Kalbe gemacht hat, dass nämlich die Vasa lymphatica superficialia der Milz arm, die Vasa lymph. profunda dagegen ziemlich reich an Lymphkörperchen sind, wird gefolgert, dass die Milz die Funktion habe, farblose Blutkörperchen zu bilden, zumal die Lymph peripherischer (? R.) Organe, wie die der Leber und des Hodens (Hund, Stier) sehr arm an farblosen Zellen ist, oder derselben gänzlich ermangelt. Der Verf. hält es übrigens für möglich, daß die in den Lymphgefäßen gefundenen Körperchen aus der Milzpulpa herrühren. Gelegentlich sucht Kölliker die unter der Anleitung des Ref. von Hlasek angestellten Untersuchungen über die Struktur der Milz zu verdächtigen, ohne Thatfachen dagegen vorzubringen und überhaupt sich genauer mit der Arbeit bekannt gemacht zu haben; denn sonst müsste der Verf. wissen, dass Hlasek recht viele Injektionen gemacht hat.

Blutgefäße.

Das Resultat der Billroth'schen Untersuchungen über die Bildung der Blutgefäße (a. a. O. p. 80) ist folgendes. Der Verf. unterscheidet drei Arten der Gefäßbildung: 1) Primäre Gefäßbildung, wobei runde, dicht aneinander gelegene, solide Cylinder bildende Zellen durch Sprengung derjenigen Wand der Zellmembran, mit welcher sie dem künftigen Lumen des Gefäßes zugewendet sind, den zum Blutkörperchen metamorphosirten Inhalt frei machen und durch Verschmelzung des übrigen Theiles der Zellmembran zur Wandung des Gefäßes werden (erste Gefäßbildung der Area vasculosa, im Schwanz der Batrachierlarven, Gefäßbildung in den Granulationen, in den Plexus chorioideus, in

den Gefäßknäuelgeschwülsten); 2) Sekundäre Gefäßbildung, bei welcher Zellen in spindelförmiger Form mit ihren Längsachsen dicht neben einander liegen und zwischen sich einen Kanal lassen (spätere Gefäßbildung in der Area vasculosa, Gefäßbildung im fötalen Bindegewebe, in den Granulationen, im Collonema, Cylindroma, in den Teleangiectasien); 3) Tertiäre Gefäßbildung, bei welcher aus den strukturlosen Gefäßwänden fadenförmige Schösslinge hervortreten, die entweder mit gleichen Schösslingen oder mit Ausläufern verzweigter Zellen oder mit einem anderen Gefäße direkt sich vereinigen und von dem Kanal des Muttergefäßes aus allmählig hohl werden. Letztere Gefäßbildung soll vorkommen im weiteren Verlaufe der Gefäßbildung in der Area vasculosa, desgleichen in der Allantois, ferner bei der weiteren Ausbildung des Gefäßnetzes im Schwanz der Batrachierlarven, im fötalen Bindegewebe, im Collonema. Die Gefäßschlingen in den papillen- und zottenartigen Gebilden entwickeln sich analog den Drüsenbläschen aus Zellenkomplexen, welche in Form von Kolben und warzigen Auswüchsen auseinander hervorsprossen.

Des Ref. Ansicht über die Gefäßbildung sind in den soeben die Presse verlassenden „Studien der physiologischen Anstalt etc.“ niedergelegt.

In der Gegend der sackförmigen Ausbuchtungen der Venen, welche sich im blutgefüllten Zustande an der Herzseite der Klappen vorfinden, besteht die Wand des Gefäßes nach Remak aus einer dünnen äusseren und ebenfalls dünnen inneren, elastischen Bindegewebsschicht, zwischen welchen glatte Muskelfasern im Allgemeinen cirkulär, jedoch auch in anderen Richtungen hinziehen (deutsche Klinik;

1856, No. 3)

unreifer Binde substanz mit spindelförmigen Binde substanzkörperchen, welche in der Nähe des Knochens (Beinhaut) mit ihrem Längsdurchmesser parallel der Oberfläche des Knochens geordnet sind. Bei Erwachsenen hat dieses Stroma den histologischen Charakter des reifen Bindegewebes angenommen, und an der freien Oberfläche sind spitz auslaufende Papillen bis zu der deutlich markirten Stelle des harten Gaumens vorzufinden, wo die Schleimdrüsen auftreten und der Uebergang zum weichen Gaumen erfolgt. — Was den weichen Gaumen betrifft, so ist die Beschaffenheit des Epitheliums bekannt; an der unteren Fläche findet sich mehrfach geschichtetes Pflasterepithelium, an der oberen cylindrisches Flimmerepithelium. In dem Substrat des weichen Gaumens sind, abgesehen von den Nerven und Gefässen, besonders beachtungswerth das feinere morphologische Verhalten des bindegewebigen Stroma's, der Muskeln, der Drüsen. In dem bindegewebigen Stroma sind ausser den interstitiellen Zügen zwei besonders geformte Bestandtheile, die elastische Haut und die *Fascia muscularis*, hervorzuheben. Die elastische Haut breitet sich an der unteren Fläche des Substrats des weichen Gaumens aus, liegt hier ganz nahe der freien Oberfläche, nimmt gegen den hinteren Rand des harten Gaumens an Dicke zu, verschmilzt hier zum Theil (in der Mittellinie) mit der Muskelfascie und wirkt als Antagonist des Tensor palati mollis. In der Mittellinie steigt eine Lamelle der elastischen Membran aufwärts und trennt daselbst die Schleimdrüsenschicht in zwei symmetrische Hälften, ohne jedoch die hintere Grenze selbst dieser Schicht zu erreichen; sie ist an die *Spina nasalis posterior* befestigt. Die feinen, elastischen Fasernetze verfolgen in dem weichen Gaumen den Zug von Vorn nach Hinten. Die Muskelfascie des weichen Gaumens hat ihre Lage an der hinteren, gegen das Rachengewölbe gewendeten Fläche, reicht daselbst bis zum freien Rande des harten Gaumens und hängt seitlich mit Fascien zusammen, die an der Seitenwand des Schlundes hinziehen. Es müssen in derselben zwei Lagen unterschieden werden, eine, unmittelbar an der freien Fläche gelegene und mit elastischen Fasernetzen stark durchsetzte Lage, und die zweite tiefere Schicht, in welcher keine oder doch nur wenige elastische Fasernetze vorkommen. Die zuletzt genannte Schicht darf als Ausbreitung der Sehne des Tensor palati mollis angesehen werden. Die elastische Partie der Muskelfascie dient zur Insertion des *Musculus azygos uvulae* und der von den Seiten in den weichen Gaumen einstreichenden Muskeln. Die Schleimdrüsen bilden eine die Hälfte der Dicke des weichen Gaumens einnehmende Schicht besonders an der unteren, gegen die Mundhöhle zugekehrten Fläche zwischen der elastischen Membran und der Muskulatur. Auch an der oberen Fläche des weichen Gaumens, namentlich mehr seitlich und gegen

den freien Rand hin befindet sich eine ziemlich dicke Drüsenschicht. Nur im Zäpfchen werden Schleimdrüsen durch die ganze Dicke des Substrats verbreitet angetroffen. Die Muskulatur hat ihre Lage zwischen der unteren Drüsenschicht und der Fascia muscularis. Der Verf. unterscheidet sechs Muskeln: die Levator. palat. mollis, Tensor. palati m. (durch seine Sehne), die Ausläufer des M. glossopalatinus und des M. pharyngopalatinus, den Azygos uvulae und die bisher noch nicht genügend gewürdigten Muskelbündel, welche aus dem Constrictor pharyngis sup. oberhalb des Levator palat. moll. zugleich mit den Ausläufern des M. pharyngopalatinus in den weichen Gaumen übergehen. Ausserdem hebt Goldstücker hervor, dass man nach Entfernung der Muskeln an der oberen Fläche des weichen Gaumens Muskelbündel gewahre, welche in der Nähe der Mittellinie von der Fascia muscularis entspringen und quer über die Mittellinie zur anderen Seite hinüberziehen, um daselbst in gleicher Weise zu inseriren. Die von der Seite her in dem weichen Gaumen eintretenden Muskeln gehen zum grössten Theile über die Mittellinie hinweg zur anderen Seite hinüber. Dennoch sieht man an mikroskopischen Schnittchen grade in der Mittellinie eine lichtere Stelle, wie ein Septum, welches die hinüberziehenden Muskeln zu trennen scheint, und das wahrscheinlich durch die stärkere Anhäufung von Bindegewebe an dieser Stelle gebildet wird. Die beiden Muskeln des Azygos uvulae entspringen nicht von der Spina nasalis posterior, sondern von der Fascia muscularis und zwar in einiger Entfernung von der Mittellinie, so dass sie erst im weiteren Verlauf nach

Verf. zählte in einem Falle 250 Schleimdrüsen-Ausführungsgänge am hinteren Theile des harten Gaumens, 100 an der vorderen, 40 an der hinteren Fläche des weichen Gaumens, 12 an der Uvula. Ausser diesen acinösen Drüsen fanden sich an manchen Gaumen, einfache, ziemlich weite, aber kurze Tubuli, die in ihrem Verlaufe oft rechtwinklig geknickt sind und mit einer blinden Erweiterung aufhören. Sie waren besonders am oberen Theile des weichen Gaumens auf beiden Flächen sichtbar. In Betreff der Muskeln macht der Verf. die richtige Bemerkung, dass einzelne Fascikeln auch zwischen den Drüsen hinziehen und dieselben theilweise umschliessen, so dass sie bei ihrer Kontraktion die Drüsen nothwendig pressen müssen. Das schon oben erwähnte Verhalten der beiden Muskeln des Azygos uvulae in der Nähe des harten Gaumens, dass dieselben nämlich hier weiter auseinanderstehen, ist auch von v. Szontágh hervor gehoben. Endlich theilt der Verf. mit, dass das Neurilemma der Gaumennerven auch bei Erwachsenen, obgleich spärlich, Kerne besitze.

Drüsen.

Die Drüsen in der Schleimhaut der Vaginalportion beschreibt E. Wagner (Vierordt's Archiv für phys. Heilk. Jahrg. 1856, p. 494 ff.). Der Verf. fand Drüsen in der ganzen Schleimhaut der Vaginalportion, in grösster Menge und von dem grössten Volumen namentlich zunächst dem Muttermunde. Die Drüsen haben im normalen Zustande entweder und zwar am häufigsten eine einfach schlauchförmige Gestalt, oder sie werden an ihrem blinden Ende etwas breiter, schwach kolbenförmig. Ihre Länge wird etwa auf $\frac{1}{4}$ —1 Mm. geschätzt; ihr gegenseitiger Abstand beträgt durchschnittlich $\frac{1}{4}$ —1 Mm. Die Dicke der Drüsen schwankt zwischen $\frac{1}{24}$ und $\frac{1}{12}$ Mm. Die Drüsen bestehen aus einer strukturlosen, sehr dünnen Haut und aus dem an der Innenfläche derselben ausgebreiteten Epithel, das aus cylindrischen oder kubischen, nicht mit Flimmerhärchen versehenen Zellen gebildet wird. Das obere Drüsenende mündet stets in eine flache, kegelförmige Vertiefung der freien Schleimhautfläche, an welcher jedoch das Epithel sich nicht theiligt. Das Epithel der Vaginalportion ist bekanntlich mehrfach geschichtetes Pflasterepithel, dessen tiefste Zellschicht nach dem Verf. cylindrisch und keulenförmig sein soll.

Die Angaben, dass die tiefste Zellschicht des geschichteten Pflasterepithels aus langgezogenen Zellen bestehe, mehrten sich gemäss der Vorlagen, welche in den Handbüchern sich finden. Die Beobachter haben allerdings den Augenschein für sich, denn an Schnittchen erhärteter und getrockneter Präparate sind die bezeichneten Zellen mehr oder weniger in die Länge gezogen. Wenn Ref. in der letzten Zeit

seine Einsprache gegen die Ansicht, dass diese langgezogenen Zellenkörper normale Bildungen seien, nicht mehr erhoben hat, so geschah es nur, weil er es für unnütze Arbeit gehalten hat, gegen den Strom zu schwimmen. Es gehört aber in der That nur eine geringe Ueberlegung dazu, sich zu überzeugen, dass die tieferen, vollsaftigen Zellen des mehrfach geschichteten Epithels beim Eintrocknen und Erhärten der Präparate, wobei zunächst die äusseren Schichten des Epithels einerseits und das Substrat anderseits betheiligt sind, unter Bedingungen stehen, durch welche sie nothwendig in die Länge gezogen werden müssen. Unter günstigen Verhältnissen findet man übrigens Stellen des Präparates, wo die Zellen nicht in die Länge gezogen sind, und hat alsdann die gute Gelegenheit, solche Zellen, namentlich nach Anwendung der Essigsäure, durch Druck und Zerrung nach Willkür lang zu ziehen.

H. Sachs hat bei Gelegenheit seiner im Breslauer physiologischen Institut unternommenen Untersuchungen über die Muskulatur der Zunge (*Observationes de linguae structura penitiori*. Vratislaviae 1856; c. tab. II. 4to) auch den *glandulae folliculares linguae* seine Aufmerksamkeit zuwendet. Der Verf. zählte bei einem Weibe 60 *gland. folliculares*. Wie Gerlach, so sah auch Sachs die Oeffnungen derselben öfters auf dem Gipfel einer *Papilla circumvallata*. Durch des Verf. Untersuchungen wird ausser Zweifel gesetzt, dass die von Kölliker als geschlossene Follikel betrachteten und mit den solitären Follikeln des Darmes verglichenen

Zunge hat sich ergeben, dass ein eigener in der Zunge selbst entspringender *Musc. longitudinalis superior* und *inferior* nicht existirt. Der *Musc. longitudinalis superior* wird von den in den Rücken der Zunge auslaufenden Fasern des *M. glossopalatinus*, *pharyngopalatinus* und des *Constrictor pharyngis med. und inf.* gebildet. Der *Musc. longitudinalis inferior* ist als ein *M. lingualis inferior* zu betrachten, welcher vom äussersten Ende des Zungenbeinkörpers und zum kleineren Theile vom kleinen Horn des Zungenbeines (*Chondroglossus*) seinen Ursprung nimmt. Ein *M. chondroglossus*, wie er von den Autoren beschrieben wird, war nicht aufzufinden. Ebenso wird der *M. perpendicularis proprius linguae* geleugnet; denn die perpendicularären Fasern, welche in der Spitze der Zunge vorkommen, sind Ausläufer des *M. genioglossus* und der sog. *Mm. longitudinalis superior et inferior*. Im vorderen Theile der Zunge finden sich quere Muskelfasern, die von einem Rande der Zunge zum anderen hinziehen.

Gauster hat neuerdings seine im physiologischen Institute zu Wien angestellten Untersuchungen über die Balgdrüsen der Zunge veröffentlicht, in welchen er die Kolliker'schen geschlossenen Follikeln wieder in Schutz nimmt (Sitzungsberichte; Bd. XXV, p. 498). Die von Sachs in den letzten Wochen unternommene Revision seiner Beobachtungen hat den Ref. von Neuem von der Richtigkeit der Darstellung überzeugt, die oben gegeben wurde; die angeblich geschlossenen Follikel Kolliker's sind *Acini* der Zungenbalgdrüsen.

Lionel S. Beale hat ausführliche Untersuchungen über die Struktur der Leber angestellt und dieselben in der *Med. Times and Gazette* (Nr. 299, 302, 303, 306), in den *Philosophical Transactions* (Volum. 146. Part. I, p. 375), endlich auch in einem eigenen Werke „On some points in the anatomy of the liver etc.“ (London 1856) veröffentlicht. Das letztere Werk ist von 66 photographischen Abbildungen begleitet, die der Verf. von Zeichnungen seiner Präparate hat anfertigen lassen, und die im Allgemeinen nur wenig instructiv sind. Die von Leydig und dem Ref. gegebene Aufklärung über die letzte Endigung des Drüsenhöhlensystems in der Leber ist dem Verf. unbekannt geblieben; seine Untersuchungen schliessen sich im Wesentlichen an Kiernan und an bereits bekannte Ansichten über die Struktur der Leber an. Zur Erhärtung der Leber oder vielmehr einzelner Stückchen derselben wird besonders eine Mischung von wässrigem Alkohol und einigen Tropfen einer Solution von Soda, durch welche die Präparate durchsichtig gemacht werden, empfohlen. Die Schnittchen wurden dann ausgewaschen und in diluirtem Alkohol oder Glycerin untersucht. Um Behufs der Injektion der Gallengänge und ihres terminalen Netzwerkes (? R.) die Galle zu entfernen, wurden die Blutgefässe so

lange mit Wasser injicirt, bis dasselbe aus dem Ductus hepaticus ausfloss. Das klar ausfliessende Wasser enthält dann eine reichliche Quantität Cylinderzellen und einige rundliche Zellen aus den feineren Gallengängen, niemals aber Leberzellen. Wie es dem Verf. dennoch gelungen, das die Leberzellen enthaltende Höhlensystem zu injiciren, bleibt ein Räthsel. Als Injektionsmasse für das Drüsenhöhlensystem wurde frisch zubereitetes Berliner Blau benützt, zu welchem eine kleine Quantität Weingeist hinzugesetzt war, um auf die Erhärtung der Wandungen der feinen Gallenkanälchen einzuwirken. Bei den Gefässen wurde Leiminjektion angewendet. Von den Resultaten sind folgende hier anzuführen. Die Leberläppchen werden durch die Interlobularvenen markirt, die jedoch nicht, wie Kiernan angiebt, mit einander anastomosiren und das Läppchen ringförmig umschliessen. Das dazwischen gelegene Parenchym wird aus zwei Netzwerken zusammengesetzt: aus dem Kapillarsystem, welches das Blut in die Intralobularvene abführt und dem terminalen Netzwerk des Drüsenhöhlensystems, welches aus einer feinen Tubular-Membran gebildet wird und die Leberzellen enthält. Das Kapillarsystem wird also ganz frei dahin ziehend gedacht; sein Netzwerk zeigt eine Konvergenz nach dem Centrum (V. intralob.) des Läppchens hin. Einzelne Zweigchen der Art. hepatica dringen bis in diese Kapillaren hinein. In dem Netzwerk des Drüsenhöhlensystems liegen die Zellen beim Menschen und den Säugethieren in der Regel einzeln aneinander gereiht; selten zu 2 und 3. Die Leberzellenhaltigen Kapillaren stehen in kontinuierlicher Verbindung mit den

Handbücher und Hilfsmittel.

H. Welcker: Ueber Aufbewahrung mikroskopischer Objekte etc. Giessen 1856.

Schlossberger: Die Chemie der Gewebe des gesammten Thierreiches. Leipz. u. Heidelb. 1856.

Lionel Beale: The microscope and its Application to clinical Medic. London. 1856.


Perrone: Compendio elementare d'anatomia generale; etc. 2 Vol. Napoli. 1856.

Theod. Margo: Histologische Briefe. Ungar. Zeitschrift VII. 4, 23, 32, 33, 37, 42.

Leydig: Lehrbuch der Histologie des Menschen und der Thiere. Frankf. 1857.

C. Robin: Memoire sur les objets, qui peuvent être conservés en préparations microscopiques transparentes et opaques etc. Paris. 1856.


R. B. Todd: The cyclopaedia of anatomy and phys. Part. XLIV—XLVIII. Lond. 8.




1

2

12.



13.




14.




15.



26.





17.





20.

21.

22.




a







37.



38.







1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.






1

1



7



Archiv



226


XII








•









no. 1357.

Tog. All.






15.




Hand. 18.












11

















ms



1. The first part of the document is a list of names and dates.

2. The second part of the document is a list of names and dates.

3. The third part of the document is a list of names and dates.

4. The fourth part of the document is a list of names and dates.

•

•

•

•



UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 06223 3104



UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 06223 3104

